~~Rare Book Room~~
SE
18
0
I,AT
~~20.d~~.

Johann Lathams
allgemeine Uebersicht
der Vögel.

Aus dem Englischen übersetzt
und
mit Anmerkungen und Zusätzen versehen
von

Johann Matthäus Bechstein,

Gräflich Schaumburg-Lippischem Bergrath, Vorsteher einer Anstalt zur Bildung junger Forstmänner und Kameralisten, der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, der Churfürstlich Mainzischen Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt, der Churfürstlich Sächsischen ökonomischen Societät zu Leipzig, der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, der Botanischen Gesellschaft zu Regensburg und der physikalischen Privatgesellschaft zu Göttingen Mit- oder Ehrenmitgliede.

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY

Zweyten Bandes zweyter Theil.

Mit drey und zwanzig ausgemahlten Kupfertafeln.

Nürnberg,
in der kaiserl. königl. privilegirten Kunst- und Buchhandlung A. C. Weigels und Schneiders.
1795.

John Latham's
allgemeine Übersicht
der Vögel
mit gemalten Kupfern
aus dem Englischen
übersetzt.
Vierter Band.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

Der schwarzstirnige Sänger.

Nürnberg,
In der Kaiserl: Kön: privil: Kunst- u: Buchhandlung,
bei J. B. Schneider u: Weigel. 1795.



Sr. Hochgebohren

dem

Herrn

Grafen von Mellin

Königlich Preußischen Kammerherrn,

zu Schloß Domizov in Vorpommern ꝛc.

aus reinster Verehrung

seiner ausgezeichneten Verdienste

um die praktische Forstnaturgeschichte

geweihet

vom Verfasser.

Inhalt.

A.

Argus-Faſan p. 678.
Auerhuhn p. 693.

B.

Bachſtelze, Afrikaniſche p. 406. aſchgraue p. 399. aus Hudſonsbay p. 407. Auſtraliſche p. 407. Capſche p. 405. Gelbe p. 402. Gelbköpfige p. 405. Geſchäckte p. 405. Graue p. 400. Grüne p. 406. Indiſche p. 402. Schwarzgezäumte p. 407. Tſchutſiſche p. 406. Weiße p. 396.

C.

Caſuar, gehelmter p. 770. Neuholländiſcher p. 772.

D.

Dudu, gemeiner p. 764. Einſiedler-Dudu p. 765. Nazar-Dudu p. 766.

F.

Faſan, Afrikaniſcher p. 689. gekrönter p. 685. gemeiner p. 679. geſchäckter p. 689. Haubenfaſan p. 690. prächtiger p. 677.
Feigenfreſſer p. 433. gefleckter p. 434.
Fitis p. 502.
Felſenhahn p. 516. Peruaniſcher p. 516.

G.

Grasmücken, Alpengrasmücke p. 435. Gartengrasmücke p. 412. geſchwätzige p. 417. geſperberte p. 515. großſchwänzige p. 488. kleine p. 415. roſtgraue p. 507. ſchwarzköpfige p. 415. weißbrüſtige p. 446.
Gelbkehlchen p. 438.
Goldhähnchen p. 496. Meiſengoldhähnchen p. 497.
Goldfaſan p. 683.
Goldkehlchen p. 455.
Guan p. 654.

H.

Haſelhuhn p. 702.
Hocko, Cumaniſcher p. 666. gehelmter p. 667. gekrönter p. 661. nacktſtirniger p. 667. pfeifender p. 666. ſchreyender p. 665.
Huhu, wilder p. 658.
Haushuhn p. 670.

J.

Jaku, p. 654.

K.

Kronentaube, große p. 602. kleine p. 604
Kugelträger p. 664.

Inhalt.

L.

Lachtaube p. 624.
Laubvögelchen p. 501.
Lerche, Afrikaniſche p. 388. aſchgraue p. 388 Baumlerche p. 373. Berglerche p. 386 Brachlerche p. 379. Capſche p. 385 dunkelfarbige p. 393. Feldlerche p. 369. Feldlerche, kleine p. 377. Florentiniſche p. 379. gelbrothe p. 387. gelbrückige p. 372. Malabariſche p. 381. Haubenlerche p. 389. Italiäniſche p. 374. Kalanderlerche p. 383. Louiſianiſche p. 372. Mongoliſche p. 384. Neuſeeländiſche p. 385. Pieplerche p. 392. 430. Portugieſiſche p. 391. Rieſenlerche p. 395. Senegalſche p. 391. Sumpflerche p. 378. Tatariſche p. 382. veränderliche p. 382. von Gingi p. 381. Waldlerche p. 390. Weißbäuchige p. 395. Weißflügellige p. 384. Wieſenlerche p. 375. Winterlerche p. 395. Peltoniſche p. 394. Ziegelfarbige p. 391.

M.

Manakin, aſchgrauer p. 329. blauer p. 323. blaurückiger p. 518. dreyfarbiger p. 531. gelber p. 525. gefleckter p. 424. goldköpfiger p. 520. Manakin p. 530. Mexikaniſcher p. 530. mit dem Halsbande p. 525. mit karmoiſinrothen After p. 528. mit weißem Geſichte p. 526. muſikaliſcher p. 529. orangenbäuchiger p. 529 Papuaniſcher p. 528. purpurfarbiger p. 525. prächtiger p. 530. roth und ſchwarzer p. 522. ſchwarzkappiger p. 519. ſchwarzkehliger p. 528. ſchwarzköpfiger p. 527. ſtreifköpfiger p. 523. weißkappiger p. 521. weißkehliger p. 521. weißköpfiger p. 521. weißöhriger p. 524. weißſtirniger p. 519.
Marail p. 655.
Mauerſchwalbe, Chineſiſche p. 575. gemeine p. 574. mit weißem Halsbande p. 576. weißbäuchige p. 575.
Meiſen, Alpenmeiſe p. 552. Bartmeiſe p. 547. Beutelmeiſe p. 542. Blaumeiſe p. 538. Canadiſche Meiſe p. 538. Capſche p. 546. Chineſiſche p. 348. fremde p. 835. großköpfige p. 550. Guianiſche p. 542. Haubenmeiſe p. 340. Indiſche p. 552. Klettermeiſe p. 551. Kohlmeiſe p. 531. Lazurblaue p. 533. Languedokiſche p. 544. Malabariſche p. 549. Meiſe von Hudſonsbay p. 550. Neuſeeländiſche p. 551. Norwegiſche p. 533. Prinzchen Meiſe p. 553. Rothhaubige p. 535. Rothſteißige p. 534. Schwanzmeiſe p. 544. Schwarzbrüſtige p. 535. Sibiriſche p. 549. Sumpfmeiſe p 536. Tannenmeiſe p. 536. Toupetmeiſe p. 540. Verliebte p. 542. Virginiſche p. 541.
Motmot p. 686.
Müllerchen p. 417.

N.

Nachtigall p. 408. Madagaskariſche p. 412. Binſennachtigall p. 418. Waſſernachtigall p. 419.
Nachtſchwalbe, Amerikaniſche p. 586. Bombayiſche p. 587. Braſiliſche p. 585. Caroliniſche p. 580. Europäiſche p. 580. gelbrothe p. 584. graue p. 579. große p 578. Guianiſche p. 584. Jamaikaiſche p. 579. Indiſche p. 588. mit goldnem Halsbande p. 587. mit weißem Halsbande p. 585. Neuholländiſche p. 588. ſchwarzſchwänzige p. 586. Virginiſche p. 582. weißhälſige p. 585. weißkehlige p. 583.

P.

Paupi p. 665.
Protonotar p. 484.
Pfau, gemeiner p. 644. Japaniſcher p. 647.
Pfaufaſan p. 648.
Pfau, Tibetiſcher p. 649.
Perlhuhn, gemeines p. 657. Aegyptiſches p. 661. gehäubtes p. 660. gehörntes p. 759.
Paraka p. 686.

R.

Rebhuhn p. 717. Arragoniſches p. 744. Aſiatiſches p. 745. aus Pondiſcherey p. 731. Bergrebhuhn p. 724. Capſches p. 745. Domascaner p. 723. geperltes p. 729. Gingiſches p. 730. Griechiſches p. 725. Guianiſches p. 733. grünes p. 734. Javaniſches p. 732. kahlhälſiges p. 719. Kragenrebhuhn p. 724. Maryländiſches p. 734. Mexikaniſches p. 733. Madagaskariſches p. 719 perlhuhnfarbiges p. 770. rothbrüſtiges p. 729. rothhälſiges p. 729. von Chittygong p. 744. Senegalſches p. 717. Virginiſches p. 734. Zeylaniſches p. 718.
Rothkehlchen p. 442.

Rothſchwänzchen, braunbäuchiges p. 424. Caſſerſches p. 427. gemeines p. 421. graues p. 424.
Rohrkönig p. 406.
Rubinkehlchen p. 458.

S.

Sänger, Afrikaniſcher p. 437. Aſiatiſcher p. 570. begürteter p 478. Binſenſänger p. 421. Black-burmiſcher p. 457. blauer p. 445. blaugeſtreifter p. 492. blauköpfiger p. 491. blaugrauer p. 440 von Diemens Sänger p. 509. braunſchwänziger p. 457. blauer p 471. Bourboniſcher p. 469 bleyfarbiger p. 550 brauner p. 495. braunkehliger p 475. Caroliniſcher p. 505. Cayenniſcher p. 491. citronbäuchiger p. 470. Chineſiſcher p. 468 citrongelber p. 460. Dortforder p. 436. Dauriſcher p. 456. dunkelfarbiger p. 471 eirfarbiger p. 488. fetter p. 485. federfarbner p. 514. Fichtenſänger p. 476. finſterer p. 513 gehäubter p. 483. gelbbäuchiger p. 440. gelbbrüſtiger p. 439. graubrüſtiger p. 774. gelbgefleckter p 475. gelbköpfiger p. 503. gelbrother und ſchwarzer p 483. goldfarbiger p. 482. gelbrother Sänger p. 432. gelbrüfiger p. 441. gelbſtirniger p. 457. grauer p. 466. grüner Indianiſcher p. 468. großer Caroliniſcher p. 775. grauköpfiger p. 456. grauer und weißer p. 473. gewellter p. 470 grüner p. 476. goldköpfiger p. 478. graukehliger p. 486. Guira-Sänger p. 493. Guzuratſcher p. 510. Hangneſt-Sänger p. 486. hellgelber p. 483. langbeiniger p. 460. langſchnäbliger p. 512 himmelblauer p. 481. Surinamiſcher p. 513. Jamaikaiſcher p. 477. kleiner p. 515. künſtlicher p. 37. langſchwänziger p. 489. Louiſianiſcher p. 472. Madagaskariſcher p. 470. mit gelben Steiß p. 474. Magellaniſcher p 459. mit dem halben Halsbande p 484. mitternächtlicher p. 509. mit der Kappe p. 514. mit gelblichen Geſicht p. 447. mit gelben Augenbraunen p. 455 mit dem Hute p. 457. mausfarbiger p 459. Neuyorker p. 437. ockerſchwänziger p. 512. olivenbrauner p. 485. olivenfarbiger p. 467. ockergelber p. 438. orangenköpfiger p 482. orangenkehliger p. 474. orangenbäuchiger p. 485. Palmen-Sänger p. 487. Piſang-Sänger p 487. prächtiger p 489. Patagoniſcher p. 436. rother p 467. rothbäuchiger p. 492. rothkehliger p. 481. rothkappiger p. 514 rothſeitiger p. 480. rothköpfiger p. 472. roſtköpfiger p. 447. rothſchwänziger p. 440. Rohrſänger p. 431. ſchillergrüner p. 468. ſpitzſchwänziger p. 459. ſchwarzhälſiger p. 509. ſchwarzkehliger p. 479. ſchwarzkorpiger p. 457. ſchwarzſchnäbliger p. 446 ſchwarzbrauner p. 510 ſchwarzköpfiger p 427. ſchöner p. 513. ſchwarzſtirniger p. 515. Südamerikaniſcher p. 511. St. Mauritius-Sänger p. 469. Tſchetantſhiſcher p. 511. Uferſänger p. 512. von Watcha p. 506. von Quebet p. 477. weißköpfiger p. 466. weißſtirniger p. 775. weißäugiger p. 469 weißlicher p 472. weißkappiger p. 480. weißkinniger p. 487. Zeylaniſcher p 467. Zimmetbrauner Sänger p. 446.
Schneehuhn p. 705.
Schneidervogel p. 506.
Silberfaſan p. 684.
Spitzkopf p. 511.
Sproſſer p. 411.
Steinſchmätzer, ſchwarzkehliger p. 447. brauner p. 451. braunkehliger p. 551. Brillen-Steinſchmätzer p. 450 Caſſerſcher p. 449. Capſcher p. 464. Coromandelſcher p. 450. gefleckter. p. 466. gelbrother p. 453. großer p. 460. Lugoner p. 449 Madagaskariſcher p. 448. Mauriſcher p. 454 orangenbrüſtiger p. 465. Phillippiniſcher p. 451 Provencer p. 465. röthlicher p. 463. röthlichbrauner p. 464 rußfarbiger p. 450. Senegaliſcher p. 453 Sibiriſcher p. 453 ſchwarz und weißer p. 454. ſchwarzköpfiger p. 465. weißbunter p. 453.

Schwalbe, Amberſchwalbe p. 560. aſchbäuchige p. 565. blauköpfige p. 463. Braſiliſche p. 567. Canadiſche p. 567. Capſche p. 550. Dauriſche p. 562. eßbare p. 569. Felſenſchwalbe p. 562. grauſteißige p. 571. Hausſchwalbe p. 557. Javaiſche p. 577. mit braunem Halsbande p. 568. Otaheitiſche p. 554. Panayiſche p. 558. Paruamiſche p. 565. Purpurſchwalbe p. 566. Rauchſchwalbe p. 564. rothbäuchige p. 588. rothköpfige p. 563. rothſteißige p. 572. ſchwarze p. 564 ſchweifſchwänzige p. 573. Senegaliſche p 559. Stachelſchwalbe p. 572. ſtahlſchwarze p. 566. Uferſchwalbe p 560. Steinſchwalbe p. 56. violette p. 565. von Unalaſchka p. 563. von St Domingo p. 564. Waizenſchwalbe p. 571. weißbäuchige p. 560. weißflüglige p. 568.
Strauß, ſchwarzer p. 767.

Inhalt.

T.

Taube, Aegyptiſche p. 642. blaue p. 613. braune p. 642. gemeine p. 590. Granatflüglige p. 605. grauköpfige Taube p. 605. Gewürztaube p. 610. grauflüglige p. 606. goldflüglige p. 642. haakenſchnäblige p. 611. Haustaube mit ihren Abänderungen p. 592. Holztaube p. 589. Jambu-Taube p. 608. Madagaskariſche p. 615. Martinikiſche p. 13. mit dreyeckigen Flecken p. 616. mit roſtfarbigen After p. 612. Muskatennußtaube p. 615. Neuſeeländiſche p 618. Nikobariſche p. 620. Papageytaube p. 609. Pompadurtaube p. 605. purpurbrüſtige p. 909. purpurfarbige p. 609. purpurköpfige p. 607. Rebhuhntaube p. 598. ringelſchwänzige p. 617. Ringeltaube p. 613. rothköpfige p. 608. ſchäckhälſige p. 620. ſchwarzgefleckte p. 612. ſchwarzflüglige p. 611. St. Thomastaube p. 611. von Tanna p. 641. Waalia-Taube p. 642. Wandertaube p. 636. von der Inſel Frankreich p. 619. Waldhuhntaube p. 599. weißbäuchige p. 606. weißflüglige p. 600. wilde p. 590. weißköpfige p. 599. weißſchulterige p. 413. weiße Muskatennußtaube p. 616.

Turteltaube, Afrikaniſche p. 631. Ambiriſche p. 638. Aſiatiſche p. 635. Bantamſche p. 640. blauhäubige p. 630. blauköpfige p. 627. blutrothe p. 632. Cambayiſche p. 628. Canadiſche p. 632. Capſche p. 639. Caroliniſche p. 637. Erdturteltaube p. 633. geränderte p. 638. geſtreifte p. 626. geſtrichelte p. 626. graue p. 635. grüne p. 628. Javaniſche p. 629. langſchwänzige p. 640. Malukiſche p. 634. Malabariſche p. 628. mit dem Halsbande p. 624. Orientaliſche p. 623. purpurſchultrige p. 635. rothbrüſtige p. 631. Senegaliſche p. 630. mit dem Halsbande p. 630. Sperlingsturteltaube p. 634. Schwarzköpfige p. 629. Suratiſche p. 627. Surinamiſche p. 624. von St. Domingo p. 641.

Trappe, Arabiſcher p. 754. Caffer ſcher p. 783. Chiliſcher p. 762. dickknieiger p. 760. geöhrter p. 762. großer p. 751. kleiner p. 753. Kragentrappe p. 759. Trappe Indiſcher p. 759. Rhaad-Trappe p. 759.

Trompetenvogel, goldbrüſtiger p. 748. gewellter p. 750.

Tuju, Amerikaniſcher p. 722.

Truthuhn, Amerikaniſches p. 649. gehörntes p. 652. zahmes 651.

Tinamu, großer p. 691. aſchgrauer p. 692. gefleckter p. 692. großer p. 691. kleiner 692.

W.

Wachtel, Andaluſiſche p. 747. Cambayiſche p. 746. Chineſiſche p. 738. Coromandelſche 743. gemeine p. 733. graukehlige 742. große Mexicaniſche p. 741. Haubenwachtel p. 739. kleine Mexicaniſche p. 741. Luognſche p. 748. Louiſianiſche p. 140. Madagaskariſche p. 742. Maluiniſche p. 740. Neugrineiſche p. 740. Wackerwachtel p. 741. von Hudſonsbay p. 740. Wachtel von Gibraltar 746. ſchwarzhälſige p. 747.

Waldhuhn, buntes p. 700. dreyzehiges p. 716. Felſenwaldhuhn p. 715. geflügeltes p. 704. gelbgeflecktes p. 700. Halſingiſches 715. Indiſches p. 714. langſchwänziges p. 796. Kragenwaldhuhn p. 702. 703. Lappländiſches p. 714. nadelſchwänziges p. 711. Namagrawaldhuhn p. 712. Sandwaldhuhn p. 713. weißes p. 706.

Weidenzeiſig p. 432. 499. 503. rother p. 709.

Wiſtling p. 425. Guianiſcher p. 726. ſchwarzer p. 426.

Wurmfreſſer p. 788.

Z.

Zaunkönig, gemeiner p. 393. Rubinköpfiger p. 498.

Verzeichniß

der in dieſem Theile enthaltenen Gattungen.

Neun und dreyßigſte Gattung. Lerchen. S. 369.	Enthält	34	Arten.
Vierzigſte Gattung. Bachſtelzen. S. 369.	—	14	—
Ein und vierzigſte Gattung. Sänger. S. 408.	—	177	—
Zwey und vierzigſte Gattung. Manakin. S. 516.	—	28	—
Drey und vierzigſte Gattung. Meiſen. S. 531.	—	30	—
Vier und vierzigſte Gattung. Schwalben. S. 554.	—	38	—
Fünf und vierzigſte Gattung. Nachtſchwalben. S. 578.	—	18	—

Die vierte Ordnung: Taubenarten.

Sechs und vierzigſte Gattung. Tauben. S. 589.	—	77	—

Die fünfte Ordnung: Hausvögel.

Sieben und vierzigſte Gattung. Pfauen. S. 644.	—	4	—
Acht und vierzigſte Gattung. Truthühner. S. 649.	—	5	—
Neun und vierzigſte Gattung. Perlhuhn. S. 657.	—	4	—
Funfzigſte Gattung. Hocko. S. 661.	—	8	—
Ein und funfzigſte Gattung. Faſan. S. 668.	—	14	—
Zwey und funfzigſte Gattung. Tinamu. S. 690.	—	4	—
Drey und funfzigſte Gattung. Waldhühner. S. 693.	—	21	—
Vier und funfzigſte Gattung. Rebhühner. S. 717.	—	46	—
Fünf und fünfzigſte Gattung. Trompetenvogel. S. 748.	—	2	—
Sechs und funfzigſte Gattung. Trappe. S. 751.	—	12	—

Die Sechſte Ordnung: Laufvögel.

Sieben und funfzigſte Gattung. Dudu. S. 764.	—	3	—
Acht und funzigſte Gattung. Strauß. S. 767.	—	1	—
Neun und funfzigſte Gattung. Caſuar. S. 770.	—	2	—

Anhang.

Gattung *) Tuju. S. 772.	—	1	—
Gattung **) Pflanzenmäher. S. 774.	—	1	—

Drey und zwanzig Gattungen und fünf hundert und vier und vierzig Arten.

Namen

Namen der Abbildungen.

Der schwarzstirnige Sänger (S. 515) steht auf dem Titelkupfer.

Taf. 52. Fig. 1. Die Pieplerche S. 392. 430.
Fig. 2. Die Neuseeländische Lerche S. 385.

— 53. Fig. 1. Das Junge der weißen Bachstelze S. 458.
Fig. 2. Das Junge der gelben Bachstelze S. 399.

— 54. Fig. 1. Das Rubinkehlchen S. 458.
Fig. 2. Der stachelschwänzige Sänger.

— 55. Der prächtige Sänger. S. 489.

— 56. Die rostgraue Grasmücke. S. 507.

— 57. Fig. 1. Der streifköpfige Manakin. S. 523.
Fig. 2. Die großköpfige Meise. S. 550.

— 58. Fig. 1. Die Otaheitische Schwalbe. S. 556.
Fig. 2. Die rothköpfige Schwalbe. S. 563.

— 59. Die Jamaikaische Nachtschwalbe. S. 579.

Taf. 60. Fig. 1. Die kleine Kronentaube S. 604.
Fig. 2. Die Haakenschnäblige Taube S. 611.

— 61. Eine hahnfedrige Pfauhenne. S. 647.

— 62. Der Jaku. S. 654.

— 63. Fig. 1. Das gehaubte Perlhuhn. S. 660.
Fig. 2. Das Kragenrebhuhn. S. 724.

— 64. Das Weibchen des gekrönten Hacko. S. 663.

— 65. Der gekraute Fasan. S. 685.

— 66. Der Fasan mit den Federstraus. S. 692.

— 67. Der gefleckte Tinamu. S. 692.

— 68. Fig. 1. Das grüne Rebhuhn. S. 734.
Fig. 2. Die Andalusische Wachtel. S. 747.

— 69. Der gelbbrüstige Trompetenvogel. S. 748.

— 70. Der weißöhrige Trappe. S. 756.

— 71. Der gemeine Dudu. S. 764.

— 72. Der schwarze Strauß. S. 767.

— 73. Der gehelmte Casuar. S. 770.

Neun und dreyßigste Gattung. Lerche.

Dieſe Gattung hat einen geraden, dünnen, gegen die Spitze hin etwas gebogenen, ſcharf zugeſpitzten Schnabel. Die Naſenlöcher ſind mit Federn und Borſten bedeckt. Die Zunge iſt am Ende geſpalten. Die Zehen ſind bis an ihren Urſprung getrennt; die Klaue der hinterſten ſehr lang, und entweder gerade, oder doch nur ſehr wenig gebogen *a*).

1. Die Feldlerche. (die Himmelslerche. Sky-Lark.)

Alauda arvensis. Lin. Syst. Nat Ed. 13. 1788. Tom. I. P. I. p. 791. No. 1. *b*). Faun Suec. 209. — Scop. ann. I. No. 84. — Brünn. orn. No. 221. — Müller p. 28. No. 229. — Frisch pl. 15. f. 1. — Kram. elench. p. 562. 2.

L'Alouette. Briss. orn. III. p. 335. No. 1.

— — Buff. ois. V. p. 1. pl. 1. *c*).

— — Pl. enlum. 363. f. 1.

Field-lark, or Sky-lark. Ray. Syn. p. 69. A. 1. — Will. orn. 203. — Albin. I. pl. 41. — Br. Zool. I. No. 136. pl. 55. — Arct. Zool. II. p. 394. *d*).

Br. Mus. Lev. Mus. *e*)

Die Länge dieſes Vogels iſt ohngefähr ſieben Zoll, und am Körper iſt er nicht viel größer, als ein Hausſperling. Sein Schnabel iſt über einen halben Zoll lang, und dunkelhornfarbig, die untere Kinnlade gelblich; der Scheitel des Kopfs röthlichbraun, und die Mitte jeder Feder ſchwarz; der Hinterkopf zieht ſich ins Aſchgraue, und iſt einfärbig; das Kinn weißlich; *f*) die Federn an den obern Theilen des Körpers ſind röthlichbraun, die Mitte derſelben dunkelbraun, und

a) Gen. of Birds.

b) Latham Index ornithologicus s. Systema ornithologiae Londini. 1790. Vol. II. p. 491. n. 1. B.

c) Ueberſ. von Büffons Vögeln durch Otto. Bd. XIV. S. 152. B.

d) Ueberſ. von Zimmermann Bd. II. S. 367. B.

e) Man ſehe auch meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 494. und die Naturgeſchichte der Stubenvögel. Gotha, bey Ettinger 1795. S. 129. Ingl. Zorns Pethinotheologie. II. S. 289. B.

f) Die Kopffarbe iſt eigentlich dieſe: Stirn und Scheitel ſind roſtgelb, der Länge nach ſchwarzbraun gefleckt; über die Augen läuft eine weißgraue Linie, eine etwas undeutlichere umgiebt die graubraunen Wangen; Hinterkopf und Hinterhals ſind weißgrau, ſchwarzbraun geſtrichelt. B.

und die Ränder ſehr blaß; der Vorderhals gelbröthlichweiß, mit ſchwärzlichen Streifen; von der Bruſt bis zum After iſt die Farbe gelblichweiß; die Schwungfedern ſind braun mit gelblichen äußern Rändern, und gegen die Spitze hin weißlich; die zwey mittlern Schwanzfedern ſchwärzlich, mit gelbrothgrauen Rändern, die übrigen nicht ſehr verſchieden an Farbe, die vierte aber hat einen weißen Rand, die fünfte iſt an der äuſſern Fahne weiß, die äuſſerſte außer dieſem auch an der innern Fahne und an der Spitze weiß; die Füße ſind dunkelgrau; g) die Klauen ſchwärzlich, die hinterſte lang und gerade.

Das Männchen iſt größer, als das Weibchen. h)

Dieſe Vögel ſind ſehr zahlreich in England, und ſehr wahrſcheinlich durch die ganze alte Welt verbreitet; denn wir hören von ihnen in Norwegen, Schweden, Deutſchland, Frankreich, Italien, Griechenland i) und auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, k) ohne Zweifel werden ſie auch in den dazwiſchen gelegenen Ländern angetroffen, obgleich die Schriftſteller dieß nicht ausdrücklich ſagen. Sie ſind ſehr gemein in Rußland und Sibirien, gehen ſogar bis nach Kamtſchatka, und in einigen Gegenden Deutſchlands ſind ſie ungleich häufiger anzutreffen, als in irgend einem Theile von England l). Ich finde keine Nachrichten, daß ſie auch in Amerika zu Hauſe wären; obgleich Sloane verſichert, daß man ſie einige Meilen von der See entfernt angetroffen habe.

In

g) Eigentlich graubraun, im Frühjahr gelbbraun und die Zehen in den Gelenken ſchwärzlich. B.

h) Das Weibchen erkennt man nebſt dem, daß es kleiner iſt, als das Männchen, an dem Mangel der weißlichen Linie, welche die Wangen umgiebt, und an den häufigen ſchwarzen Flecken, womit Rücken und Bruſt bezeichnet ſind; auch iſt die weiße Farbe der Bruſt nicht roſtfarben überlaufen. B.

i) Brünnich. — Faun. ſuec. p. 76. — Friſch — Buffon Olina uccel. p. 12. — Belon. obss. 12.

k) Kolb. Cap. III. p. 164. — Eine von Herrn Maſſon vom Cap geſandte Lerche, die jetzt der Ritter Banks beſitzt, iſt etwas weniges kleiner, als die unſrigen, und die hinterſte Klaue kurz, aber doch gerade. Haſſelquiſt ſagt, ſie ſey gemein an den Küſten des Nils und in den umliegenden Gegenden. ſ. Iter Palaest.

l) Herr Pennant ſpricht von 4000 Dutzenden, die in der Nachbarſchaft von Dunſtable, zwiſchen den Monaten September und Februar gefangen worden ſind; dieß kommt aber nicht in Anſchlag gegen die Menge, welche zuweilen in verſchiedenen Gegenden von Deutſchland gefangen wird, wo Acciſe auf ſie gelegt iſt. Keyßler berichtet, daß blos die Acciſe der Stadt Leipzig, deren Lerchen, wegen ihres vortreflichen Geſchmacks, durch ganz Deutſchland berühmt ſind, jährlich 6000 Thaler eintrage. Aber nicht allein um Leipzig, ſondern auch in der Gegend um Naumburg, Merſeburg, Halle u. a. m. werden ſie in ſo großer Menge gefangen. ſ. Keyſsler Trav. Vol. IV. p. 315. (In den ebenen Gegenden Thüringens werden ſie auch in großer Anzahl im Herbſte in den Tag- und Nachtgarnen gefangen, und ihr Geſchmack iſt auch der nämliche, wie um Leipzig herum. Es iſt daher nichts ungewöhnliches, daß aus Thüringiſchen Gegenden Lerchen nach Leipzig verkauft, und von da in die nördlichen und ſüdlichen Gegenden Deutſchlands unter dem Namen der Leipziger Lerchen verkauft werden. Der gute Geſchmack der ſogenannten Leipziger Lerchen ſoll von wildem Knoblauch entſtehen. Ob dieß die Urſache ſey, habe ich noch nicht entdecken können. Soviel aber iſt gewiß, daß man in Thüringen oft in einem Abende Lerchen fängt, wovon die Hälfte dieſen Geſchmack hat, die andere Hälfte aber nicht.

Vor-

In Rückſicht ihrer Lebensart kann ich zu dem, was Herr Pennant in ſeiner Brittiſchen Zoologie hierüber anführt, nur wenig beyfügen; denn dieſer hat mit ſeiner ihm gewöhnlichen Eleganz alles erſchöpft; und in der That, überhebt mich die allgemeine Bekanntſchaft, die Jedermann mit dieſem Vogel hat, alle weitere Unterſuchung.

1. Var. A. Die weiße Feldlerche. (White L.)

Alauda arvensis. L. I. 2. p. 791. No. 1. β
L'Alouette blanche. Bries. orn. III. p. 339. A. pl. 19. f. 1. — Buff. ois. V. p. 20. *m*)
Weiſse Lerche. Frisch t. 16.

Eine bloße Spielart von der letztern, die man öfterer in kalten Himmelsſtrichen antrifft; wenigſtens wenn ſie ganz weiß iſt; *n*) denn diejenigen, die ich geſehen habe, hatten eine Miſchung von verſchiedenen andern Farben. Im Leverſchen Muſeum iſt eine braun und weiß melirte mit ganz weißem Bauch, und eine andere über und über weiß geſprenkelt, doch das Weiße regelmäßig durch das ganze Gefieder vertheilt, der ſchönen Zeichnung des Wendehalſes ähnlich; *o*) auch beſitze ich ſelbſt einen ſolchen Vogel, der ganz lichtgraulichweiß iſt.

1. Var. B. Die ſchwarze Feldlerche. (Duſky L.)

Alauda arvensis. L. I. 2. p. 791. No. 1. γ
L'Alouette noire. Brlss. orn. III. p. 340. B. — Buff. ois. V. p. 22. *p*). — Pl. enlum. 650. f. 1.
Black Lark. Albin. III. pl. 51.
Br. Mus.

Bey dieſem von Albin *q*) beſchriebenen Vogel, war das Schwarze nicht rein, ſondern dunkel rothlichbraun, ans Schwarze gränzend, der Hinterhals ausgenommen, der dunkelgelb, und einige Bauchfedern, die weiß eingefaßt waren. Schnabel und Füße waren ſchmutzig gelb. *r*)

Vorzüglich habe ich auch an denjenigen, die einige Zeit todt gehangen hatten, dieſen Geſchmack bemerkt. B.)

m) Ueberſ. Bd. XIV. S. 181. B.

n) Dieß iſt nicht bloß der Fall bey den Vögeln des nördlichen Climas, wie vor unſerm Verfaſſer ſchon Friſch behauptet, und Klein längſt widerlegt hat. Denn ich habe ſelbſt in Thüringen ganz rein weiße Feldlerchen angetroffen; zwar auch gelblich weiße, und ſolche, die mit etwas grau vermiſcht waren. Schnabel, Füße und Nägel ſind an dieſer Spielart weiß. B.

o) Dieſe beyden Vögel rechne ich zu meiner bunten Varietät, die nur ſelten am Schnabel und Füßen weiß iſt. (ſ. unten Var. E.) B.

p) Ueberſ. Bd. XIV. S. 186. B.

q) Ich weiß wohl, daß dieſer und andere Vögel, wenn ſie mit Hanfſaamen gefüttert werden, ſchwarz werden, wie ich dieß auch beym Stieglitz und Hausſperling bemerkt habe; das nämliche trägt ſich aber auch bisweilen aus einer minder künſtlichen Urſach zu, denn Albin's Vogel wurde zu Highgate, mit andern Vögeln, im Netz im Freyen gefangen. Das Exemplar im Brittiſchen Muſeum iſt durchaus tief ſchwarz.

r) Ich habe mehrere geſehen, die am ganzen Körper rauchſchwarz waren, mit etwas durchſchimmernder Roſtfarbe und weißlicher Einfaſſung der Federn am Unterleibe. Diejenigen, welche in der Stube ſchwarz werden, verwandeln ſich gewöhn-

1. Var. C. Die langbeinige Lerche. (Long-legged L.)

Alauda arvensis. L. I. 2. p. 791. No. 1. ♂

In Rußland findet sich eine Spielart, die mir unter dem Namen der langbeinigen beschrieben wurde. Sie ist der Feldlerche sehr ähnlich, aber größer, und höher von Beinen; sie steigt nicht auf, sondern singt auf dem Boden sitzend.

Sie findet sich nur an der Mongolischen Gränze. *s*)

2. Die gelbrückige Lerche. (Rufous-backed L.)

Alauda rufa *t*). L. I. 2. p. 792. No. 7. *u*).
L'Alouette noire à dos fauve. Buff. ois. V. p. 23 *v*).
Alouette noire de la Encenada. Pl. anlum. 738. f. 2.

Diese ist viel kleiner, als die Feldlerche, und mißt kaum fünf Zoll. Ihr Schnabel ist einen halben Zoll lang; die obere Kinnlade an der Spitze etwas ausgeschnitten; der Kopf, Schnabel, die Füße, die Kehle, der Vorderhals, die untern Theile des Körpers und die obern Deckfedern des

wöhnlich bey der folgenden Mauserung wieder in ihre natürliche Farbe, welches die weiße Varietät nicht thut.

Ich füge noch folgende Varietäten, die ich in Thüringen bemerkt habe, bey:

Var. D. Die rothe Feldlerche.
Alauda arvensis rufa.

Sie ist am ganzen Leibe rostrothbraun.

Var. E. Die bunte Feldlerche.
Alauda arvensis varia.

1. Am ganzen Leibe weiß und lerchenfarbig gezeichnet, wohin auch die gemischten Abänderungen gehören, die Latham oben unter der weißen Varietät beschreibt. 2. Halb weiß und halb lerchenfarbig. 3. Mit weißem Kopfe. 4. Mit weißen Schwingen. 5. Mit weißen Flügeln und Schwanze.

Var. F. Die Feldlerche mit rothbraunem Kopfe.
Alauda arvensis ruficeps.

Von dieser Varietät fieng ich im März 1789 bey hohem Schnee sieben vor meiner Thür unter einem Siebe. Sie hielten sich in einer Gesellschaft Baumlerchen auf; unter den andern Lerchen, die damals in meiner Gegend zu Tausenden gefangen wurden, war keine mehr von dieser Spielart anzutreffen. Ich hielt sie anfangs für eine besondere Art, bis mir Betragen, Locktöne und Geschrey, da ich sie lange Zeit in der Stube hatte, zeigten, daß es Feldlerchen waren. Doch zogen sie keine Kuppe. Vielleicht sind es Feldlerchen, die in weit südlichern oder nördlichern Gegenden zu Hause gehören; denn meine Beobachtungen haben gezeigt, daß es eine beständige Varietät seyn muß.

Sie ist merklich größer; der Schnabel dicker; der Sporn kleiner; der Kopf rothbraun mit schwarzen Strichelchen, die in etliche Streifen zusammen fließen; die Wangen braun, ohne bemerkliche weiße Einfassung; zwischen dem Schnabel und den Augen ganz weiß; die Brust rostbraun mit vielen schwarzen Strichen, die wie Linien nach dem Bauche zu laufen; die äußerste Schwanzfeder bis auf einen kleinen aschgrauen Streifen ganz weiß; die zweyte auch an der äußern Fahne mehr weiß als gewöhnlich; überhaupt die Farbe röthlicher; die Füße schmuzig gelbroth. B.

s) Herr Pennant.

t) Dieser Trivial-Name kommt noch einmal vor. s. unten Nr. 20.

u) Latham Ind. orn. II. p. 492. n. 2. Alauda fulva. B.

v) Uebers. Bd. XIV. S. 188. B.

des Schwanzes ſind ſchwärzlichbraun; Schwungfedern und Schwanz etwas dunkler, die äuſſerſte Feder des letztern gelbroth gerändert; der Hinterhals, der ganze Rücken und die Schulterfedern gelbroth-orangenfarben; die kleinern und die mittlern Deckfedern der Flügel ſchwärzlich mit rothgelben Rändern.

Dieſe kam von Buenos-Ayres.

3. Die Baumlerche. (Waldlerche. Wood L.)

Alauda arborea. L. I. 2. p. 793. No. 3. *w*). — Faun. Suec. 211. — Scop. ann. I. No. 166 *x*). — Brünn. orn. p. 224. — Kram. elench. p. 362. 3. — Müller p. 28. No. 241. — Olin. uccel. p. 27.

L'Alouette de bois, ou le Cujelier. Briss. orn. III. p. 340. No. 2. t. 1. — Buff. ois. V. p. 25. — Pl. enlum. 660. f. 2. *y*).

Wood Lark. Ray. Syn. p. 69. A. 2. — Will. orn. p. 204. — Albin. I. pl. 42. — Br. Zool. I. No. 137. — Arct. Zool. II. p. 395. B. *z*).

Br. Mus. Lev. Mus. *a*).

Auch dieſe iſt nicht ſo groß, als die Feldlerche, von dickern und kürzern Bau, und drey Viertel Zoll weniger in die Länge meſſend; ihr Gewicht iſt eine Unze. Die Farben ſind überhaupt bläſſer, als bey jener, doch nicht hinlänglich verſchieden, um eine beſondere Beſchreibung nöthig zu machen; um den Kopf herum iſt eine Art von Kranz von bläſſerer Farbe, wenigſtens von einem Auge zum andern rückwärts, der ſehr ſichtbar iſt. In der That findet ſich auch bey der Feldlerche die Spur eines ſolchen Kranzes, aber in viel geringerm Grade, bey der Baumlerche iſt die erſte Schwungfeder kürzer, als die zweyte; bey der Feldlerche hingegen ſind ſie faſt gleich; die Füße der Baumlerche ſpielen mehr ins Fleiſchfarbene, und die hintere Klaue, ob ſie gleich ſehr lang iſt, iſt etwas gekrümmt.

Dieſer Vogel findet ſich nicht in ſo großer Menge, als die Feldlerche, und in ſeiner Lebensart geht er ſehr von ihm ab. Er ſitzt auf den Bäumen, was man an dem andern niemals bemerkt *b*); wie jener, ſingt er im Fliegen, pflegt aber ebenfalls des Nachts zu ſingen, und zwar der Nachtigall ſo ähnlich, daß man ihn oft mit ihr verwechſelt hat *c*); ja er ſingt auch, wenn

w) Latham Ind. orn. II. p. 492. n. no. 3. B.

x) Ueberſ. von Günther. S. 153. n. 186. B.

y) Ueberſ. Bd. XIV. S. 190. Frisch Taf. 15. Heidelerche. B.

z) Ueberſ. II. S. 267. B. B.

a) Vergl. Zorns Pethinoth II S. 295. §. 2.; Meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 495. Nr. 2. und die N. G. der Stubenvögel. S. 141. Taf. I. fig. 1. B.

b) Mitten im Thüringerwalde auf dem höchſten Berge, dem Inſelsberg, giebt es Feldlerchen, und dieſe, die in Wäldern wohnen, ſetzen ſich allerdings auf die Bäume und Sträucher, wie ich mehrmalen geſehen habe. B.

c) Unter den Lerchen ſingt die Waldlerche am ſchönſten; ja nach meinem Geſchmack ſingt ſie unter allen deutſchen Vögeln, die ihren natürlichen Geſang haben, die Nachtigall und den gemeinen Finken etwa ausgenommen, am anmuthigſten. Allein mit dem Nachtigallengeſang hat ihre Stimme und Melodie gar keine Aehnlichkeit. Ihre Stimme iſt hell flötenartig und die

er auf einem Baumzweig ſitzt. Er baut auf den Boden, legt fünf dunkelfarbige, mit Braun, vorzüglich am dickern Ende, gefleckte Eyer. *d*) Sein Neſt beſteht, wie das der Feldlerche, aus Grashalmen, u. ſ. w. mit weichen Haaren ausgelegt. Er brütet ſo frühzeitig, daß in manchen Jahren ſeine Jungen ſchon zu Ende des Märzmonats flück ſind, und hiebey hat er einen Vorſprung (the start) vor der Feldlerche, die nicht vor dem April zu brüten beginnt. Beyde bauen zwey Neſter in einem Jahr.

Vermuthlich iſt dieſer Vogel ein allgemeiner Bewohner von ganz Europa, wie die verſchieden Synonymen bezeugen. Unſere letzten Reiſenden haben ihn in Kamtſchatka angetroffen. *e*)

4. Die Italiäniſche Lerche. (Italian L.)

Alauda italica. L. I. 2. d. 793. No. 13. *f*).
L'Alouette d'Italie. Briss. orn. III. p. 355. No. 7.
La Girole. Buff. ois. V. p. 47. *g*)
Giarola Aldrovandi. Ray Syn. p. 70. No. 10. — Will. orn. p. 209. §. 9.

Ihre Länge iſt acht Zoll. Der Schnabel iſt roth; *h*) die obern Theile des Gefieders ſind kaſtanienbraun, der Rand jeder Feder aber röthlichweiß, beſonders bey denen, die den Kopf umgeben, und die ſehr ans Weiße gränzen; Bruſt, Bauch und Seiten ſind weiß; acht der mittlern Schwanzfedern kaſtanienbraun, mit hellern Rändern, die vorlezte zu beyden Seiten eben ſo, mit einer weißen Spitze, und die äuſſerſte ganz weiß; die Füße ſind fleiſchfarben, und die Klauen weißlich.

Sie iſt in Italien zu Hauſe, wie Briſſon ſagt, und nach ihm hat ſie das Anſehen eines jungen Vogels.

Ray bemerkt, die Farbe der Schwanzfedern ausgenommen, ſey ſie der Waldlerche ſehr ähnlich; und ich vermuthe ſehr, daß ſie eine bloße Spielart von dieſem Vogel iſt. *i*)

Büffon *k*) führt an, daß zu Bologne zu Ende des Mays, ein Vogel geſchoſſen worden ſey, der mit obiger Beſchreibung übereinſtimme. Die äuſſerſte Schwanzfeder war bey demſelben weiß, und die nächſte zur Hälfte weiß, von der Spitze an; die hintere Klaue einen halben Zoll lang, und nur an der Spitze gekrümmt.

5. Die

die deutlich abeſetzten Strophen ihres Geſanges, den ſie ſtundenlang entweder mit ausgeſpreiteten Schwanze in der Luft hangend, oder auf dem Gipfel eines Baums oder auf der Erde ſitzend hören läßt, klingen zärtlich melancholiſch. B.

d) Die Eyer ſind weißgrau, violetbraun geſprenkelt. B.

e) Ellis's Narrat. vol. II. p. 229.

f) Latham Ind. orn. II. p. 492. no. 4. B.

g) Ueberſ. Bd. XIV. S. 235. B.

h) Eigentlich muß es heißen: der Schnabel iſt bey der weiten Oeffnung roth, und die Mundwinkel ſind gelb. So ſehen gerade alle junge Lerchen aus. B.

i) Wenn man die etwas genauere Beſchreibung in Büffons Vögeln nachlieſt, ſo iſt aller Wahrſcheinlichkeit nach dieß ein junger Vogel von der Feldlerche, die noch nicht den völlig ausgewachſenen Schwanz hatte. Aldrovand hat den Vogel nicht genau genug beobachtet. B.

k) Hist. des Ois. V. p. 48.

5. Die Wieſenlerche. (Tit-L.)

(ſ. die erſte Figur der zwey und funfzigſten Kupfertafel.)

Alauda pratenſis. L. I. 2. p. 792. No. 2. *l*) — Faun. Suec. No. 210. — Brunn. orn. No. 223. — Muller p. 28. No. 230. — Frisch pl. 16. *m*) — Olin. ſuccell. p. 27.

L'Alouette de pré, ou la Farlouse. Briss. orn. III. p. 343. No. 3. — Buff. ois. V. p. 31. pl. 3. *n*) Pl. enlum. 660. 1.

First Spipola of Aldrovand, and other Spipola of ditto. Will. orn. p. 110?

Tit-Lark. Raii Syn. 69. p. A. 3. — Will. orn. 206. — Albin. I. pl. 43. — Br. Zool. I. No. 138. — Arct. Zool. II. p. 395. *o*)

Br. Mus. Lev. Mus.

Dieſe iſt viel kleiner, als die Feldlerche, und hat nur ſechsthalb Zoll Länge; ihr Schnabel iſt einen halben Zoll lang, und ſchwarz, unten heller; der Augenſtern nußbraun; die obern Theile des Kopfs und des Körpers ſind grünlichbraun, die Mitte jeder Feder ſchwärzlich; über jedem Auge iſt ein blaſſer Streifen; die untern Theile ſind weiß, die Bruſt aber ſpielt mehr ins Gelbe, und iſt mit länglichen, ſchwarzen Flecken bezeichnet; der Schwanz iſt ſchwärzlich, die äuſſerſte Feder ihrer ganzen Länge nach an der äuſſern Fahne weiß, an der innern aber nur zur Hälfte vom Ende, die folgende aber hat nur einen weißen Flecken an der Spitze; die Füße ſind gelblich, und die Klauen braun. *p*)

Dieſer Vogel iſt häufig in England, und ſingt, wie die Baumlerche, auf den Bäumen. Seine hintere Klaue iſt ziemlich lang, aber gebogen. Er hat eine angenehme Stimme, aber nicht

l) Latham Ind. orn. II. p. 493. n. 15. B.

m) Wenn man die Natur ſelbſt zu Rathe zieht, ſo iſt Friſchens Wieſenlerche (Alauda pratorum) Taf. 16. Fig. 1. b. nichts anders als das Männchen der Pieplerche, wozu unten Fig. 2. a. (die Pieplerche) als das Weibchen gehört. B.

n) Ueberſ. Bd. XIV. S. 203. B.

o) Ueberſ. II. S. 368. C. B.

p) Nicht bloß in der Beſchreibung, ſondern auch in den Abbildungen ſtimmen alle hier angeführten Schriftſteller ſo zuſammen, daß ich hier nichts als das Männchen der Pieplerche beſchrieben und abgebildet finden kann. Wer gewohnt iſt, die Vögel in der Natur ſelbſt zu beobachten, der wird mit mir darin übereinſtimmen. Es iſt nämlich bekannt, daß die Pieplerche im Sommer ganz andere Sitten annimmt als im Herbſt. Sie lockt im Herbſt ganz anders, als im Frühjahr, ſetzt ſich dabey gar nicht auf die Bäume, ſondern läuft immer tief auf der Erde herum. Die Pieplerche hat man gewöhnlich im Herbſt beſchrieben, wo ſie allenthalben im Felde angetroffen wird, die Männchen weißer und nicht ſo gelblich am Unterleibe ſind, wie im Sommer. Auch trifft man alsdann ſo viele Junge an, die auch noch nicht die gelbliche Farbe der alten Männchen haben, ſo wie die Weibchen. Außerdem iſt es gewiß, daß in der Geſchichte dieſes Vogels und der Brachlerche oder der Pieps und Brachlerche ſehr viel Verwirrung herrſcht, und man mehrere Eigenſchaften beyder unter einander vermiſcht hat. Ich werde hier das nöthige beyfügen; in meiner N. G. Deutſchlands Bd. IV. der ſo eben unter der Preſſe iſt, wird man aber alles ausführlicher und deutlicher auseinander geſetzt finden, da ich dort beyde Vögel, ihrer Geſtalt, Eigenſchaften und Lebensart nach beſchrieben habe, wie man dieß alles in der Natur ſelbſt findet.

Hr. Beſeke in ſeiner N. G. der Vögel Curlands giebt S. 72. Nr. 154. eine Spielart der Wieſenlerche an, die durchaus ſchwarz iſt. Es wäre dieß alſo eine ſchwarze Varietät der Pieplerche. B.

nicht viele Mannigfaltigkeit in derſelben, ob ſie gleich einige mit der des Canarienvogels, und andere mit der der Nachtigall vergleichen; und es iſt unterhaltend dieſen Vogel in der Luft ſchweben zu ſehen, wo er oft ſeinen Geſang verſtärkt, ſo wie er zu einem Zweige herabſteigt, auf den er ſich zu ſetzen gedenkt. Ich habe das oft geſehen; er ſingt aber in jeder Lage gut.

Sein Neſt baut er auf den Boden *q*) und legt es mit Roßhaaren aus; er legt fünf bis ſechs dunkelbraune Eyer, und die Jungen werden ohngefähr zu Anfang des Junius ausgebrütet.

Was ſeine Nahrung anbetrifft, ſo ſagt Willughby, er habe Käfer und andere Inſecten in ſeinem Kropfe gefunden. Er frißt auch Saamen *r*). Büffon hat einen ein ganzes Jahr hindurch blos damit erhalten.

Man hat bemerkt, daß dieſer Vogel, die Singdroſſel, Schwarzdroſſel, der Weidenzeiſig (Willowwren) und einige andere, um Johannis (in the Midſummer) ihren Geſang verlieren, und im September wieder bekommen *s*).

Das Männchen unterſcheidet ſich blos durch ein lebhafteres Colorit.

Briſſon *t*) hat eine weiße Spielart von dieſem Vogel bemerkt; und in der Brittiſchen Zoologie wird eine mit dunkelfarbigen Füßen gedacht, die an der Küſte von Caernarvonſchire geſchoſſen worden iſt.

Olina bemerkt, er lebe nur vier bis fünf Jahre, und ſey ſchwer aufzubringen. Im Gegentheil verſichert Willughby, daß er lange lebe, und ſehr dauerhaft ſey. Ich weiß nicht, welcher von beyden Recht hat. „)

Man hat mir geſagt, der Kuckuck lege ſeine Eyer oft in das Neſt dieſes Vogels. *v*) Dr. Heysham erzählte mir, er habe im letzten Jahre einen jungen Kuckuck in dem Neſte eines ſolchen Vogels gefunden. Er war eben erſt ausgekrochen. Die alte Wieſenlerche ſaß über ihm, und äßte ihn. Die jungen Wieſenlerchen, obſchon noch nicht ganz flück, ſaßen auf der Außenſeite des Neſtes.

6. Die

q) Willughby ſah eines auf dem Ginſterbuſche (furze-buſh) am Boden.

r) Mohn, aber ſonſt nichts, wie ich dieß aus vieljähriger Erfahrung weiß, freſſen dieſe Vögel in der Stube, wenn ſie nach und nach daran gewöhnt werden. In meiner N. G. der Stubenvögel habe ich S. 150 angegeben, womit man ſie nähren muß, wenn man ſie ſechs Jahre lang erhalten will. B.

s) Br. Zool. (Davon habe ich keine Erfahrung. Vielleicht iſt dieß eine einzelne Beobachtung, die in der Stube gemacht iſt, im Freyen iſts nicht ſo. B.)

t) La Farlouse blanche. Tom. III. p. 346.

u) Man ſehe hierüber meine N. G. der Stubenvögel, wo ich alles Merkwürdige über dieſen Gegenſtand angegeben habe. Ich habe dergleichen Vögel beſtändig neben mir im Zimmer herumlaufen. B.

v) Dieß habe ich mehrmalen gefunden. B.

6. Die kleine Feldlerche. (Field L.)

Alauda minor L. I. 2. p. 793. No. 12 *w*).
Lesser Field Lark. Will. orn. p. 207.
Field Lark. Br. Zool. I. No. 139. — Arct. Zool. II. p. 395. D. *x*)
Lev. Mus.

Diese hat ohngefähr die Größe der letztern, aber einen röthlichbraunen Anstrich durch das ganze Gefieder, statt des grünen. Kinn, Kehle und Brust sind hellsohlenlederfarben; das Kinn einfärbig, die andern gefleckt, so ziemlich, wie bey der Wiesenlerche; die Deckfedern der Flügel sind schmutzigweiß gerändert, und dunkler als bey letzterm Vogel; Bauch und Kinn (?) beyde weiß; die Füße hellbraun; die hintere Klaue kürzer, und krümmer als bey der letztern Art.

Sie hat die nämlichen Eigenheiten, und zum Theil auch gleiche Lebensart, wie die Wiesenlerche. *y*)

7. Die Louisianische Lerche. (Louisiana L.)

Alauda ludoviciana L. I. 2. p. 793. No. 14 *z*).
La Farlouzzane. Buff. ois. v. p. 38. *a*)

Diese ist länger, als die letztbeschriebne, und mißt wenigstens sieben Zoll. An den obern Theilen des Körpers scheint die Farbe mattbraun zu seyn, bey genauerer Untersuchung aber sieht man, daß sie aus einer grünlichen und schwärzlichbraunen Mischung zusammengesetzt ist; die obern Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern sind schwärzlichbraun mit heller braunen Rändern; der Schwanz braun, die äußerste Schwanzfeder halb braun, halb weiß, und die nächste hat eine weiße Spitze; die Kehle ist gelblichgrau; Hals und Brust eben so, mit braunen Flecken; die übrigen untern Theile rothgelb.

Diese kam aus Louisiana, und hat große Aehnlichkeit mit der letztbeschriebenen, wenn sie nicht gar eine bloße Spielart von derselben ist.

8. Die

w) Latham Ind. orn. II. p. 494. n. 8.

x) Uebers. Bd. II. S. 368. D. die Brachlerche. Pennant beschreibt unter diesem Namen die Brachlerche, und führt auch Synonymen an, die zu ihr gehören. Man sieht hieraus, daß die Schriftsteller nicht einig in Bestimmung dieser Vogelart sind. B.

y) Es ist hier wiederum weiter nichts beschrieben, als ein altes Männchen der Pieplerche, welches die ganze Beschreibung, wenn man eine Vergleichung anstellen will, ausweißt. Denn das mehr oder weniger Röthlichgelb an der Brust trifft man in der Natur so an. B.

z) Latham Ind. orn. II. p. 494. n. 9. B.

a) Uebers. Bd. XIV. S. 216. Pennant sagt in seiner Arkt. Zool. bey dem vorhergehenden Vogel, oder seiner Brachlerche: Der Graf Büffon beschreibt eine Varietät von dieser unter dem Namen La Farlouzzard, welche, wie er spricht, von Louisiana kam. Eine Brachlerche kann nun zwar dieser beym Büffon beschriebene Vogel nicht seyn, aber eine junge Pieplerche männlichen Geschlechts ist es gewiß; also nicht einmal eine Varietät. B.

8. Die rothe Lerche. (Red L.)

Alauda rubra. L. I. 2. p. 794. No. 15 *b*).
L'Alouette de Pensylvanie. Briss. orn. App. 94. No. 13.
L'Alouette aux joues brunes de Pensylvanie. Buff. ois. V. p. 58. *c*)
Lark from Pensylvania. Edw. pl. 297. *d*)
Red Lark. Br. Zool. I. Nr. 140. — Arct. Zool. II. n. 229. *e*)
Lev. Mus.

Diese gleicht an Größe der Feldlerche. Ihr Schnabel ist schwärzlich; die obern Theile des Körpers sind dunkelbraun; durch die Augen geht ein schwarzer Flecken, und über denselben ist ein thonfärbiger; die Augenlieder sind lichtfarbig; die Augen dunkel; die untern Theile des Körpers sind licht röthlichbraun, mit dunkelfarbigen Flecken; die Füße dunkelbraun; die hintere Klaue lang, und etwas gebogen.

Dieß ist Herrn Edward's Beschreibung; Herrn Pennant seine ist nicht sehr verschieden, doch setzt er hinzu, die obern Theile wären schwarzgefleckt, und die mittlere Schwanzfeder schwarz, mit braunen Rändern, und die zwey äußern weiß *f*).

Dieser Vogel ist gemein in Nordamerika, und wird auch oft in der Nachbarschaft von London angetroffen, wo ihn Herr Edward's zuerst beobachtet hat.

Ich habe ihn niemals gesehen, außer im Leverschen Museum, wo sich ein schönes Exemplar befindet.

9. Die Sumpflerche. (Marsh L.)

Alauda mosellana L. I. 2. p. 794. No. 16. *g*)
La Rossaline ou l'Alouette de marais. Buff. ois. V. p. 60. *h*) — Pl. enlum. 661. f. 1.

Diese ist von schlankerm Wuchs, und kleiner, als die Feldlerche; ihre Länge ist sechs und ein Viertel Zoll; ihr Schnabel acht Linien lang. Das ganze Gefieder spielt mehr oder weniger ins Gelbrothe; der Schnabel ist gelblich; der Scheitel und die obern Theile des Halses und Körpers sind gelbroth, mit Braun vermischt; die Seiten des Kopfs und die Kehle sehr blaß; zu beyden Seiten, unter den Augen, sind drey schmale, braune Streifen; die untern Theile des Körpers sind gelbröthlichweiß, Brust und Schenkel aber spielen mehr ins Gelbrothe, erstere ist mit schmalen, braunen Linien bezeichnet; der Schwanz ist sehr dunkel, mit gelbrothen Rändern; Füsse und Klauen sind gelblich. *i*)

Sie

b) Latham Ind. orn. II. p. 494. n. 10. B.
c) Uebers. Bd. XIV. S. 253. B.
d) Seligmanns Vögel. VIII. Taf 87. f. 1. B.
e) Uebers. Bd. II. S. 366. n. 196. B.
f) Auch noch: Ueber jedem Auge stünde eine weiße Linie und noch eine andere neben denselben; der Schnabel wäre dick; Kinn und Kehle weißlich; der ganze Oberleib blaßrostfarben, schwarz gefleckt ꝛc. B.
g) Latham Ind. orn. II. p. 495. n. 11. B.
h) Uebers. Bd. XIV. S. 255. B
i) Ich vermuthe, daß es eine Pieplerche sey. B.

Sie findet ſich in Deutſchland, beſonders in Elſaß; und niſtet zuweilen an die Ufer der Moſel, in der Nachbarſchaft von Metz, wo man ſie alle Jahre im October antrifft.

Der Name, den ihr Büffon gab, hat ſeinen Grund darin, daß ſie ſich oft am Waſſer ſehen läßt. Sie ſoll ſehr lieblich ſingen.

10. Die Brachlerche. (Meadow L.)

Alauda campestris L. I. B. p. 794. No. 4. *k*) — Faun. Suec. 212. — Brünn. orn. No. 224. 22. 5. — Müller p. 29. No. 232. — George Reise p. 173.
L'Alouette de champ. Briss. orn. III. p. 349. N. 5.
La Spipolotte. Büff. ois. V. p. 43. *l*)
Alauda minor campestris. D. Gessop. Ray Syn. p. 70. A. 6.
Brachlerche. Frisch tab. 15. *m*)

Sie hat die Größe der Wieſenlerche. Die obere Kinnlade iſt ſchwärzlich, die untere fleiſchfarbig; das Gefieder an den obern Theilen des Körpers iſt grünlich olivenbraun; an den untern ſchmutzig gelblichweiß; der untere Theil des Halſes und der Bruſt ſind mit länglichen, braunen Flecken bezeichnet; über den Augen iſt ein gelblichweißer Streifen, die zwey mittlern Schwanzfedern ſind graubraun, die andern ſchwärzlich; die äußerſte iſt ihrer ganzen Länge nach an der äuſſern Fahne weiß, und an der innern zur Hälfte, von der Spitze an *n*); die nächſte hat einen weißen Flecken an der Spitze; Füße und Klauen ſind braun.

10. Var. A. Die Florentiniſche Lerche.

Alauda campestris, Spinoletta L. I. 2. p. 794. No. 4. β.
Alauda spinoletta. Linn. Syst. Nat. Ed. 12. 1. p. 288. Nr. 7. — Scop. ann. I. No. 187.
Spipoletta Florentinis. Rai Syn. p. 70. No. 9.
Spipoletto, or Tordino. Will. orn. p. 209. §. 10.

Kleiner als eine Feldlerche, und über ſieben Zoll lang. Ihr Schnabel iſt einen halben Zoll lang, und ganz ſchwarz; der Scheitel, der Hals, die Schultern und der Rücken ſind aſchgrau, mit einem grünen Anſtrich (daſh); Bruſt und Bauch weiß; die Kehle gefleckt; die Schwungfedern dunkelfarbig, mit hellen Rändern; der Schwanz drey Zoll lang; die Federn

k) Latham Ind. orn. II. p. 495. B.
l) Ueberſ. Bd. XIV. S. 224. B.

m) Man vergleiche auch Pennant Arct. Zool. II. p. 395. D. und Ueberſ. Bd. II. S. 368. D. Weiter meine N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 469. n. 3. und meine N. G. der Stubenvögel. S. 153. Not. *a*) Zorns Pethinoth. II. S. 297. n. 4. Scopoli Ueberſ. von Günther. S. 153. B.

n) Linne' ſagt, die Wurzelhälfte (base half) der Schwanzfedern, die zwey mittlern ausgenommen, ſey weiß. Faun. Suec. p. 77. n. 212.

sehr dunkel; die zwey äußersten an beyden Seiten an den äussern Fahnen und an den Spitzen über die Hälfte weiß; die Füße schwarz, und die hintere Klaue sehr lang o).

Diese Lerche wird in Venedig gewöhnlich unter andern Vögeln auf dem Markte verkauft; und nach Linne' ist sie eine von der vorigen verschiedene Art; Brisson aber wirft alle von ihm angeführten Synonymen zusammen, in der Absicht seine Meynung vom Gegentheil zu beweisen, daß nämlich die beyden letzten Vögel bloße Spielarten von einander seyen; aber der wesentlichste Unterschied liegt in den Schwanzfedern, wie ich sie oben beschrieben habe; in den Schwungfedern, die weit dunkler sind, und in der Farbe der Füße und des Schnabels. — Ich kann hierinn nichts entscheiden, weil ich den Vogel niemals gesehn habe.

Skopoli bemerkt, er niste in Krayn, an feuchten Plätzen, wo einige, in gelinden Jahren den ganzen Winter p) hindurch bleiben. q)

II. Die

o) Es ist dieß die gewöhnliche Brachlerche. Man findet die graue Farbe bald höher, bald tiefer, und der olivengrüne Anstrich ist bald mehr bald weniger bemerklich. Der schwarze Schnabel und Füße wären das einzige, was der Beschreibung der Brachlerche entgegenstünde; allein wie leicht sich Füße und Schnabel verfärben, besonders, wenn die Beschreibung nicht an frischen Exemplaren gemacht wird, ist bekannt genug. Der Aufenthalt in sumpfigen Gegenden ist auch kein Gegenbeweiß, da ich selbst ein Nest von diesem Vogel auf einer sumpfigen Wiese gefunden habe.

Aller Wahrscheinlichkeit nach gehört hieher als

Var. B. Die bunte Brachlerche, Alauda campestris varia. L.

welche Sander im Naturforscher St. 11. S. 24. III. unter dem Namen einer seltenen Wiesenlerche beschreibt. Er sagt, an dem weißem Kranze, der um die Augen herumläuft, erkannte ich sogleich die Wiesenlerche (Alauda pratensis. Lin.) Es war ein Männchen, welches aber eine beträchtliche Größe hatte. Kopf, Hals, Rücken und Brust, waren dunkelbraun; die Flügel schneeweiß und zwischen denselben lief ein schmaler brauner Streifen bis gegen den Schwanz; der Steiß bräunlich mit einer blaßbraunen Farbe; der Schwanz einfarbig blaßbraun mit rostfarbigen Rändern. B.

p) Sie soll im Winter um Woronesch und an dem Donaustrom gemein seyn. Decouv. Russ. Vol. I. p. 2109.

q) Da dieser Vogel zu mehrern Irrthümern in der Ornithologie Anlaß gegeben hat, und da er besonders in Hinsicht der Beschreibung und Geschichte so oft mit der Pieplerche verwechselt wird; so will ich eine etwas genauere Beschreibung hier mittheilen, die um so viel richtiger seyn wird, da dieser Vogel, so wie alle diejenigen, welche mit ihm verwechselt werden, in Thüringen sehr haufig angetroffen werden: Die Brachlerche ist ein schlanker Vogel, der sich durch seinen länglichen Kopf, durch die Länge seines Schnabels, der drey Viertel Zoll mißt, und die Kürze seines Sporns gar merklich von andern Lerchen unterscheidet. Der Oberkiefer ist schwärzlich und ausgeschnitten, der Unterkiefer hellfleischfarben; die Füße blaßfleischfarben; der Oberleib graubraun ins olivengrüne schimmernd, am Kopf und Rücken verlohren schwärzlich gesprengt; von den runden Nasenlöchern läuft über den Augen weg ein weißlicher Streifen bis an den Hinterkopf; die Backen sind olivengrau; Kehle, Vorderhals und Brust gelblichweiß mit einzelnen schwarzgrauen Strichelchen; der übrige Unterleib schmutzig weiß; die Schwungfedern und die zwey untern Reihen ihrer Deckfedern graubraun, von erstern die letztern, und von letztern alle schmutzig weiß kantirt; die Ruderfedern schwärzlich, die beyden äußersten mit merklich weißen keilförmigen Flecken am Ende, und die mittelste, so wie die mittelmäßigen Deckfedern des Schwanzes braungrau; die Unterflügel weißgrau.

Am Weibchen fehlen die Flecken der Brust fast gänzlich.

11. Dee Malabarische Lerche (Malabar L.)

Alauda malabarica L. I. 2. p. 795. No. 17. *r*)
L'Alouette huppée de la côte de Malabar. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 203 pl. 113. f. 1.

Ihre Länge ist fünf und drey Viertel Zoll. Der Schnabel ist schwarz; die Federn auf dem Scheitel sind braun, mit weißen Spitzen, und lang genug, um einen Federbusch zu bilden; die des Halses blaß gelbroth, mit einem schwarzen Streifen längs den Schäften herab bezeichnet, und der untere Theil am breitesten; Kehle und Bauch gelbröthlichweiß; der Rücken und die Deckfedern der Flügel blau, an den Enden sehr hell gelbroth gerändert, und mit einem weißen Flekken an der Spitze jeder derselben; Schwungfedern und Schwanz schmutzigbraun, mit hell gelbrothen Rändern; die Füße von letzterer Farbe.

Sie ist auf der Küste von Malabar zu Hause.

12. Die Lerche von Gingi. (Gingi L.)

Alauda gingica L. I. 2. p. 794. No. 18. *s*)
La petite Alouette grise de Gingi. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 203. pl. 115. f. 2.

Sie hat die Größe des Stieglitzes, und ihre Länge ist fünfthalb Zoll. Schnabel und Füße sind hell braunröthlichgrau; das Gefieder an den obern Theil ist grünlich ocherfarben; der Kopf aschgrau; zwischen den Augen ein schwarzer Streifen; die Kehle und die untern Theile schwarz.

Sie findet sich um Gingi, und in andern Gegenden der Küste von Coromandel.

Die Jungen sehen im Neste, und ehe sie sich mausern fast gerade aus wie die jungen Männchen der Feldlerche. Alle Federn am Oberleibe sind dunkelgraubraun, weiß wie geschuppt eingefaßt. Kehle, Hals und Brust röthlich weiß mit vielen dreyeckigen schwarzen Flecken.

Nach der ersten Mauser sehen sie folgendergestalt aus: der Oberkopf ist dunkelbraun an den Seiten röthlichgrau gerändet und an den Spitzen außerordentlich fein weiß kantirt; von den Nasenlöchern läuft von den Augen an bis zu den Ohren ein röthlich weißer Strich; die Zügel sind schwärzlich; die Wangen olivenfarben; die Seiten und Hinterhals weißgrau, dunkelbraun gefleckt; die Rücken- und Schulterfedern dunkelgrau, olivenfarben angeflogen und weiß kantirt; alle Federn fein zerschlissen. Der Steiß graurostfarben auf den Schäften mit einem schwarzen Striche; Kehle bis zur Brust röthlich weiß mit einem kleinen dreyeckigen Fleck an jeder Feder; die Brust und der Bauch weiß; die Seiten und der After röthlich weiß; die Deckfedern der Unterflügel röthlich weißgrau; die kleinsten Deckfedern wie der Rücken; die folgenden schwarz mit großen weißen nach den schwarzen röthlich angeflogenen Kanten, die auf den Flügeln drey wellenförmige Queerlinien bilden, wovon die mittlern die breiteste ist; die Deckfedern der ersten Ordnung Schwungfedern, so wie die großen Schwungfedern selbst schwärzlich, fein weiß kantirt, die mittlern Schwungfedern breit in der Mitte etwas ausgeschnitten, die hintern wieder länger zugespitzt, alle blaß rostfarben gerändert; die Schwanzfedern schwarz, die erste die Hälfte keilförmig röthlich weiß, die zweyte mit einem kleinern dergleichen Fleck, und die beyden mittlern mit breiter rostfarbener Einfassung. B.

r) Latham Ind. orn. II. p. 495. n. 13. B.

s) Latham Ind. orn. II. p. 496. n. 14. B.

13. Die Tatariſche Lerche. (Die ſchwarze Lerche. Black L.)

Alauda tatarica L. I 2. p. 795. No. 19. *t*) Pallas Trav. vol. II. p. 707. No. 15. tab. c. *u*)
Tanagra ſibirica. Sparrmann Mus. Carlson. No. 19. *v*)

Von der Größe des gemeinen Staars. Der Schnabel ſtark, gelblichhornfarben, und die Spitze braun; die Naſenlöcher ſind mit haarigen Federn bedeckt; die Hauptfarbe des Gefieders tief ſchwarz; die Federn des Kopfs und Halſes dunkel weiß gerändert; die obern Theile des Körpers eben ſo, aber mit größern weißen Rändern; die Schwungfedern ſchwarz, an der Spitze herzförmig; der Schwanz etwas gabelförmig, ſeine zwey mittlern Federn ſchwarz, mit hellen Rändern, die nächſte am Rande nach der Spitze zu blaß, die andern ganz ſchwarz; die Füße ſchwarz; die hintere Klaue verlängert, ſcharf und ſehr ſtark.

Die Weibchen und die jungen Vögel ſind braun, der Feldlerche nicht unähnlich; die Federn um den Schnabel herum ſind weißgrau; die an den obern Theilen des Körpers grau gerändert; an den untern weißlich, die Mitte jeder Feder mit Schwarz bezeichnet; die Schwungfedern und die zwey äußern Schwanzfedern weiß gerändert; die Füße braun.

Dieſe Art trifft man in den dürreſten Wüſten zwiſchen der Wolga und dem Jaick, in Rußland, und in der ganzen Tatariſchen Wüſte an, ſie iſt den Sommer hindurch ein einſam lebender Vogel, ſo wie aber der Winter herbeykommt, beſucht ſie in großer Anzahl die bewohnten Plätze.

Ihr Geſang iſt nicht auszeichnend.

14. Die veränderliche Lerche. (Mutabile L.)

Alauda mutabilis L. I. 2. p. 796. No. 20. *w*) Nov. Comm. Acad. Petrop. vol. XV. p. 459. tab. 23. fig. 2.

Dieſe Art iſt ohngefähr ſieben Zoll lang. Ihr Schnabel iſt acht Linien lang, an der Wurzel weißlich, und an der Spitze ſchwärzlich; der Augenſtern ſchwarzgelb (livid); der ganze Vogel iſt ſchwarz, am Hinterhalſe aber, und vom Rücken bis zum Steiß, haben die Federn ſchimmelgraue Ränder, und die Achſelfedern ſind bey einigen ganz ſchimmelgrau; Schwungfedern und

t) Latham Ind. orn. II. p. 496. n. 15. Tangara Sibirica. L. I. 2. p. 899. n. 42. B.

u) Man vergl. auch Ebendaſ. Th. III. p. 647. und Ueberſ. von Büffons Vögeln. XIV. S. 288. Zuſ. B.

v) Auf dieſe Citation beziehet ſich die Anmerkung im Suppl. S. 177. „Ich finde, daß dieſer Vogel mit meiner ſchwarzen Lerche ein und eben derſelbe iſt, und ich habe auch einige Gründe zu glauben, daß die veränderliche Lerche (Nr. 14.) eine Spielart von erſtbenannter, und keine eigene Art ſey.“ (Man ſ. oben Bd. II. Th. I. S. 239. Zuſ. 46, wo ſie als Sibiriſche Merle wegfällt. B.)

w) Latham Ind. orn. II. p. 496. n. 15. β. Was unten Hr. Latham in der Note *v*) zur Tatariſchen Lerche vermuthet, hat er im Index beſtätigt, und ſie wirklich als Varietät derſelben aufgeführt. Sie fällt alſo als beſondere Species hier weg. B.

und Schwanz haben braune Spitzen; letzterer ist etwas gabelförmig, und die äusserste Feder nicht braun an der Spitze; Füße und Klauen sind schwarz.

Das Weibchen unterscheidet sich durch eine schimmelgraue Stirn, die bey dem Männchen von der nämlichen Farbe wie der übrige Kopf ist.

Bey jungen Vögeln ist das Gefieder aschfarben, bey einigen sehr ins Rothe spielend, und zuweilen auch mit Grau melirt; die Weibchen aber haben die schimmelgraue Stirn in allen Stufen des Alters.

Dieser Vogel ist sehr gemein in Astrachan, im Winter, und kömmt im Frühjahr in grosen Flügen an die abgelegenen Plätze bey der Wolga.

Ich habe ein schönes Exemplar vom Männchen in der Sammlung der Miß Blomefield gesehen. Die Ränder der Federn waren milchrahmfarben, und bildeten an den obern Theilen ungemein schöne Querstreifen, am Kopf waren es bloße Linien, die sich mehr und mehr erweiterten, so wie sie abwärts nach dem Steiß kamen; der Schwanz hatte nur eine einzige Farbe; die hintere Klaue war gerade, und einen halben Zoll lang.

Diese kam aus Sibirien.

15. Die Kalander-Lerche. (Calandre L.)

Alauda Calandra L. I. 2. p. 799. No. 9. *x*) — Faun. Arragon. p. 84.
La grosse Alouette, ou la Calandre. Briss. orn. III. p. 252. No. 6. pl. 20. f. 2.
Buff. ois. V. p. 49. *y*) — Pl. enlum. 363. f. 2.
Calandra. Olina uccell. p. 30.
Calandre Lark. Will. orn. p. 200. — Edw. pl. 26. *z*) Arct. Zool. II. No. 28. *a*)

Diese ist größer, als die Haubenlerche (No. 23), und sieben und ein Viertel Zoll lang; ihr Schnabel ist drey Viertel Zoll lang, sehr stark, und von blasser Farbe; das Gefieder an den obern Theilen des Körpers ist braun und grau melirt, und zwar jede Feder in der Mitte braun; die Kehle ist weiß, und unter diesem ein schwarzer Flecken, fast in der Form eines halben Mondes; unter diesem ist die Farbe schmutzigweiß; die Schenkel und die Seiten sind gelbrothbraun; die Schwungfedern sehr dunkel, ihre äußern Fahnen braun, und der eigentliche Rand weißlich, die kürzern Schwungfedern zum Theil eben so, doch haben sie auch weiße Spitzen; der Schwanz schwarz, die äußerste Feder an der äußern Fahne, und ohngefähr zur Hälfte vom Ende an, an der innern, weiß, die nächste an der äußern Fahne weiß eingefaßt, und mit einer weißen Spitze, die dritte grau gerändert, mit einer weißen Spitze, und die vierte blos grau gerändert; Schnabel und Füße hellgrau.

Sie findet sich in Italien *b*), Provence *c*), in Frankreich, in Sardinien, Aleppo *d*) und in andern Ländern der alten Welt. In den Tatarischen Wüsten, und zwischen den Flüssen

x) Latham Ind. orn. II. p. 496. n. 17. B.
y) Uebers. Bd. XIV. S. 238. B.
z) Seligmanns Vögel. VIII. Taf. 58. B.
a) Uebers. Bd. II. S. 366. Nr. 198. Man vergl. Uebers. von Cetti N. G. von Sardinien. Bd. II. S. 140. Nr. 142. B.
b) Olina. *c*) Hist. des Ois.
d) Edwards — Russel Hist. Alepp. p. 61.

sen Don und Wolga, so wie in andern Gegenden des Rußischen Reichs, ist sie gemein; sie soll auch in Amerika zu Hause seyn *e*).

Man hält diesen Vogel sehr oft in der Stube wegen seines Gesangs, den einige für vortrefflich halten, weil er nicht bloß mit seiner natürlichen Stimmme das Ohr ergötzt, sondern auch die Stimmen anderer Vögel, als des Stieglitzes, Hänflings, Kanarienvogels u. d. gl. nachahmt.

Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen dadurch, daß es größer ist, und mehr Schwarzes am Halse hat *f*).

Er soll auf den Boden nisten, wie die Feldlerche, vier bis fünf Eyer legen, und vier oder fünf Jahre leben *g*).

15. Var. A. Die weißflügelige Lerche.

(White-winged L.) *h*)
Alauda Calandra? Pallas Trav. vol. II. p. 708. No. 15. *i*)

Sie hat die Größe der Haubenlerche. Ihr Schnabel ist schwarzgelb, die Spitze braun; der Scheitel, die Ohren, die kleinern Deckfedern der Flügel, und die Deckfedern des Schwanzes sind rostigroth, ins Gelbe spielend; die untern Theile schmutzigweiß, am Vorderhalse mit rostigroth melirt; die kürzern Schwungfedern sind mehrentheils weiß, das am meisten in die Augen fällt, wenn die Flügel ausgebreitet sind, die äußerste der großen Schwungfedern ist ganz weiß, die nächste am Rande; die Füße sind grau.

Diese Art trifft man in großer Menge auf den sonnigen Feldern in der Nachbarschaft des Irrtisch in Sibirien an, wo sie sich, wie die Feldlerche, ein Nest auf den Boden macht, am Gesang aber steht sie ihr nach *k*).

16 Die Mongolische Lerche. (Mongolian L.)

Alauda mongolica L. I. 2. p. 799. No. 30. *l*) Pallas Trav. vol. III. 697.

Sie ist größer, als die Kalanderlerche. Ihr Schnabel ist stark; Kopf und Hals sind rostigroth

e) Edwards'— Im Suppl. S. 177. steht der Zusatz: „Dieser Vogel ist in Indien zu Hause, vielleicht auch in China; von ersterm bestätigen es die Gemälde der Lady Impey; ich habe ihn aber auch auf andern Gemälden abgebildet gesehen, die aus letzterm Lande gekommen seyn sollen."

f) Nach Lapeirouse in Nov. Act. Stock. III. p. 100. (der Uebers. vom Kästner) unterscheidet sich das Weibchen dadurch vom Männchen, daß ihm der schwarze halbe Mond am Halse fehlt. B.

g) Olina.

h) Alauda Sibirica. L. I. 2. p. 799. n. 31. und Latham Ind. orn. A. Calandra. β B.

i) Id. III. p. 697. B.

k) Die Kenntniß dieser Lerche verdanken wir eigentlich Herrn Pallas, der anfangs zweifelhaft war, ob er sie zur Feldlerche rechnen sollte, nachher aber ausdrücklich sagt, daß sie eine besondere, von der Kalanderlerche noch mehr als die Mongolische Lerche verschiedene, Art sey. Wir würden sie also Sibirische Lerche nennen, wie Gmelin in der 13ten Ausgabe des Linneischen Natursystems trennen, und sie statt der veränderlichen Lerche Nr. 14. einschalten müssen. B.

l) Latham Ind. orn. II. p. 497. n. 18. B.

roth, am dunkelsten auf dem Scheitel, der mit Weiß eingefaßt ist, und einen weißen Fleck in der Mitte hat; an der Kehle ist ein großer, zweygespaltener, schwarzer Fleck.

Sie bewohnt die Salzwiesen (Salt Meadows) zwischen den Flüssen Argun und Onon, an der Chinesischen Gränze. Man sieht sie meistentheils auf dem Boden, und sie hat einen sanften Gesang.

17. Die Neuseeländische Lerche. (New Zeeland L.)

(s. die zweyte Figur der zwey und funfzigsten Kupfertafel)

Alauda novae Seelandiae L. I. 2. p. 799. No. 29. *n*)

Ihre Länge ist achthalb Zoll. Der Schnabel ist einen halben Zoll lang, hellaschfarben, und der obere Theil schwarz; die Federn an den obern Theilen des Körpers sind dunkelbraun, und hell aschfarben gerändert; über den Augen ist ein weißer Streifen; zwischen den Augen ein gewölkter (mottled) schwarzer; der Vorderhals ist wie die obern Theile gezeichnet, aber viel heller; Brust und Bauch sind weiß; der After hellaschgrau; die Füße röthlichaschfarben; die Klauen schwarz, die hintere fast gerade, und einen halben Zoll lang.

Sie ist auf Charlotten-Sund zu Hause, und wird daselbst Kogod aroure genannt. Aus des Ritters Banks Gemälden.

18. Die Capsche Lerche. (Cape L.)

Alauda capensis L. I. 2. p. 798. No. 8.
L'Alouette du Cap de b. E. Briss. orn. III. p. 364. No. pl. 19. f. 3.
La Cravate jaune, ou Calandre du Cap de b. E. Buff. ois. V. p. 54. *p*). Pl. enlum. 504. f. 2.
Lev. Mus.

Ihre ganze Länge ist acht Zoll; der Schnabel zehn Linien lang, und von gelblich brauner Farbe; die obern Theile des Körpers und der Schwanz sind braun, mit dunklerm Braun untermischt, und diese letzte Farbe nimmt die Mitte jeder Feder ein; Kinn und Kehle sind orangefarben; von da an bis zum After ist die Farbe gelblichweiß, am After stark ins Gelbe spielend; über den Augen ist ein gelblicher Streifen, und unter denselben, an den Ohren, ein dunkelfarbiger; vier der äußern Schwanzfedern sind an der Spitze weiß, aber unregelmäßig, denn die äußerste ist fast einen Zoll breit weiß, die vierte hingegen nur an der Spitze; die Füße sind dunkelbraun; die Zehen ziemlich lang; die hintere Klaue über einen halben Zoll lang, und ein wenig gebogen.

Diese

m) Act. Stock. 1775. 6. 3. Taf. 7. Fig. 2. Uebers. von Büffons Vögeln XIV. S. 292. Zusatz. B.

n) Latham Ind. orn. II. p. 497. n. 19. B.
o) Latham Ind. orn. II. p. 497. n. 20. B.
p) Uebers. XIV. S. 247. B.

Diese Beschreibung ist nach einem Exemplar in Leverschen Museum gemacht, das ich für ein Weibchen halte; denn die Männchen sind, wie ich finde, etwas davon verschieden. Bey ihnen ist das Gelbe an der Kehle ringsherum schwarz eingefaßt; der Streifen über den Augen ist orangefarben oder dunkelgelb, die Brust besteht aus einer Mischung von Braun, Grau und Hellgelb; der Bauch und die Seiten sind gelbroth orangefarben; die großen Schwungfedern gelb, und die kleinern grau gerändert.

Büffon sagt, er habe zwey Weibchen gesehen, die eine hell gelbrothe Kehle, und eine braungefleckte Brust hatten.

Diese Vögel sind auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause, und daselbst nicht selten.

19. Die Berglerche. (Die Uferlerche. Shore L.)

Alauda alpestris. L. I. p. 800. No. 10 *q*) Georgi Reise p. 173.
L'Alouette de Virginie, Briss. orn. III. p. 367. No. 12.
Le Hause-col noir, ou l'Alouette de Virginie. Buff. ois. V. p. 55. *r*)
Schneelerche. Frisch tab. 16. *s*)
The Lark. Catesby Carol. pl. 32.
Shore Lark. Philosoph. Transact. vol. LXII. p. 398. Arct. Zool. II. n. 278. *t*)
B. Mus. Lev. Mus.

Sie hat die Größe und den Bau der Feldlerche, und ihre Länge ist siebenthalb Zoll. Ihr Schnabel ist sieben Linien lang, und schwarz; die obern Theile des Körpers sind röthlichbraun, mit dunkelbraunen Streifen, am dunkelsten am Kopf; die Augen liegen in einem gelben Fleck, der an der Wurzel des Schnabels entsteht, und über die Stirn weggeht; an der Wurzel des Schnabels entsteht auch ein schwarzer Streifen, der unter den Augen weggeht, und sich ein wenig am Halse hinabzieht; Kehle und Vorderhals sind gelb; am untern Theil des Halses ist ein breites schwarzes Band; alle untern Theile unter diesem sind sehr hellgelb; die Deckfedern des Schwanzes sind rostigroth, aber hell, und zwey dieser Federn fast so lang, als der Schwanz selbst; die Flügel und die Schwanzfedern haben einerley Farbe mit den obern Theilen des Körpers, aber hellere Ränder; Füße und Klauen sind schwarz.

Männchen und Weibchen sind etwas verschieden. Bey letzterm ist der Rücken grau, und die Streifen sind dunkler; der Scheitel ist dunkelbraun, da er beym Männchen fast schwarz ist. Außerdem sind beyde einander sehr ähnlich.

Dieser Vogel ist in Nordamerika zu Hause, und daselbst ein Zugvogel. Er besucht die Nachbarschaft von Albany *u*) zu Anfang des Mais, zieht aber weiter nach Norden, um dort zu brüten. Im Winter kommt er in großen Flügen nach Virginien und Carolina *v*), und kehrt

q) Latham Ind. orn. II. p. 498. n. 21. B.
r) Uebers. Bd. XIV. S. 249. B.
s) Seligmanns Vögel IV. Taf. 54. B.
t) Uebers. IX. S. 305. n. 195. Meine N. G. des In- und Ausl. I. 1. S. 498. n. 6. und N. G. der Stubenvögel S. 123. 6. Pallas Reisen III. S. 697. B.
u) Philosoph Transact. *v*) Catesby.

kehrt im Frühling wieder nach Norden zurück. Während ſeines Aufenthaltes in den mehr ſüdlich gelegenen Ländern lebt er von Hafer und andern Getraide; und wenn er zu Albany iſt, von Gras und den Knospen der jungen Birke (Sprig Birch). Er läuft in Löcher; daher ihm die Einwohner der letztbenannten Gegenden den Namen Chi-chuz-zi-ſus gegeben haben.

Die Engländer nennen ihn den Ortolan, und halten ihn für ein köſtliches Gericht. Von einigen wird er Schneevogel genannt, weil er in der Schneezeit ſehr häufig iſt. Er wird oft in großer Anzahl in Pferdehaarſchlingen, die auf eine kahle Stelle, von welcher der Schnee weggebracht worden iſt, gelegt werden, und auf welche ein wenig Spreu geſtreuet wird, gefangen. Man ſieht ihn beſtändig auf dem Boden, und er hat wenig, oder gar keinen Geſang.

Dieſer Vogel gehört Nordamerika nicht allein eigen, ich höre auch von ihm in Deutſchland [w]). Er iſt ſowohl im April, als im December in Danzig gefangen worden [x]); auch findet er ſich in großer Menge durch ganz Rußland und Sibirien [y]), wo er im Frühjahr in die nördlichen Gegenden zieht.

19. Var. A. Alauda flava L. I. 2. p. 800. No. 32. [z])
La Ceinture de Petre, ou l'Alouette de Sibirie. Buff. ois. V. p. 61. [a]) Pl. enlum. 650. f. 2.

Dieß iſt ein ſehr ſchöner Vogel. Die Länge iſt fünf, und drey Viertel Zoll; der Schnabel iſt über einen halben Zoll lang, und bleyfarbig; Stirn, Kinn, Kehle und die Seiten des Kopfs ſind gelb, zwiſchen den Augen und dem Schnabel iſt ein ſchwarzer Fleck, der unter den Augen weggeht, und ſich mit einem größern unter denſelben vereinigt; der Scheitel und die obern Theile des Körpers ſind gelbroth und graubraun gemiſcht, mit ſchwarzen Flecken auf dem Scheitel; an der Bruſt iſt ein breites ſchwarzes Band; von da an, bis zum After iſt die Farbe weißlich; die Schwungfedern ſind grau, mit dunkelgrauen Rändern; die obern Deckfedern des Schwanzes gelblich; die Schwanzfedern faſt ſchwarz mit grauen Rändern; die äußern ausgenommen, die weiß geränder ſind; die Füße ſind bleyfarben; die hintere Klaue iſt beynahe einen halben Zoll lang, und ſehr wenig gebogen.

Er iſt in Sibirien zu Hauſe, aber kein gemeiner Vogel.

20. Die gelbrothe Lerche. (Rufous L.)

Alauda rufa L. I. 2. p. 798. No. 28. [b])
La Variole. Buff. ois. V. p. 63. [c])
Petite Alouette de Buenos Ayres. Pl. enlum. 738. f. 1.

w) Friſch.
x) Hiſt. des Ois.
y) Decouv Russ. vol, II. p. 102. — vol. IV. p. 459. etc.
z) Latham Ind. orn. Alauda alpetris. β. B.
a) Ueberſ. Bd. XIV. S. 257. Büffon und Gmelin trennen dieſen Vogel als eine beſondere Art, und ich glaube ſie haben Recht darzu. B.
b) Latham Ind. orn. II. p. 498. n. 22. B.
c) Ueberſ. Bd. XIV. S. 259. B.

Diese hat eine Länge von fünf und ein Viertel Zoll. Ihr Schnabel ist acht Linien lang, und braun; der Scheitel und die obern Theile des Körpers sind schwärzlich, mit verschiedenen Schattirungen (tints) von Gelbrothem; der Vorderhals ist mit der nämlichen Farbe glänzend schön; die Kehle und alle untern Theile des Körpers sind weiß; die großen Schwungfedern grau, die kleinern braun, alle aber gelbroth gerändert; die Schwanzfedern braun, die acht mittlern hell gelbroth eingefaßt, die zwey äussersten weiß gesäumt; die Füße gelblich.

Man trifft diesen Vogel auf Büenos-Ayres, und sonst in der Nachbarschaft des Platastroms, in Südamerika an.

21. Die aschgraue Lerche. (Cinereous L. *d*)

Alauda cinerea L. I. 2. p. 798. No. 27.
La Cendrille. Buff. ois. V. p. 64. *e*)
Lev. Mus.

Ihre Länge ist sechs Zoll. Der Schnabel ist drey Viertel Zoll lang; die Nasenlöcher liegen in einer weichen, häutigen Furche, die Oeffnung derselben aber ist sehr klein, und rund; das Gefieder der obern Theile ist aschfarben; Schwungfedern und Schwanz sind dunkelbraun; Bauch und After weißlich; die äußern Schwanzfedern, an der Außenseite, nahe an der Spitze, weiß; die Füße dunkelbraun.

Ich sah diesen Vogel in der Leverschen Sammlung, woher er aber kam, ist unbekannt. Büffon erwähnt eines Vogels, dessen Beschreibung nach einem Gemälde gemacht ist, das vom Vorgebirge der guten Hoffnung geschickt wurde, und der vielleicht ein Männchen dieser Art seyn könnte. Bey seinem Vogel war der Scheitel gelbroth, und dieß bildete eine Art von Hut, der vom Schnabel an bis über die Augen hinaus weiß eingefaßt war; Schwungfedern und Schwanz waren schwarz.

22. Die Afrikanische Lerche. (African L.)

Alanda africana L. I. 2. p. 798 No. 26. *f*)
Le Sirli du Cap de bonne Esperance. Buff. ois. V. p. 65. *g*). — Pl. enlum. 712.

Ihre Länge ist acht Zoll; der Schnabel schwarz, einen Zoll lang, und gegen die Spitze hin gebogen; die obern Theile des Körpers haben eine Mischung von Braunen, Gelbrothem und Weißem, in verschiedenen Schattirungen *h*); die Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern und der Schwanz sind braun, mit weißen Rändern; die untern Theile des Körpers weiß, mit länglichen braunen Flecken; die Füße braun; die hintere Klaue sieben Linien lang, grade, und am Ende zugespitzt.

Sie ist auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause.

23. Die

d) Latham Ind. orn. II. p. 499. B.
e) Uebers. Bd. XIV. S. 261. B.
f) Latham Ind. orn. II. p. 495. n. 24.
g) Uebers. Bd. XIV. S. 263. B.
h) Viele Federn sind dunkelbraun in der Mitte, mit gelbrothen Rändern und weißen Spitzen.

23. Die Haubenlerche. (Crested L.)

Alauda cristata. L. I. 2. p. 796. *i*). — Brünn. orn. p. 64. No. 228. — Scopp. an. I. p. 128. No. 185 *k*). — Kram. elench. p. 362. — Müller zool. p. 29. No. 234. — Georgi Reise. p. 173.
L'Alouette huppée, ou le Cochevis. Briss. orn. p. 357. No. 8.
Le Cochevis, ou la grosse Alouette huppée. Buff. ois. V. p. 64. *l*). — Pl. enlum. 503. f. 1.
Alauda cristata major. Ray. Syn. p. 69. No. 4.
Heidelerche. Frisch. tac. 15. *m*).
Lodola capelluta. Olin. uccell. tab. 13.
The crested Lark. Will. orn. p. 208. pl. 40. — Albin. Vol. III. pl. 52. *n*). Br. Mus.

Diese ist größer, als die Feldlerche *o*), sechs und drey Viertel Zoll lang; ihr Schnabel ist fast drey Viertel Zoll lang und braun; der Augenstern nußbraun; auf dem Kopf befindet sich ein Busch, der aus verschiedenen Federn besteht, die dunkler, als das übrige Gefieder, und fast einen halben Zoll lang sind; der Rücken ist mehr aschgrau, und weniger gefleckt, als bey der gemeinen Lerche; der Schwanz ist über zwey Zoll lang, seine zwey äußern Federn an den äußern Rändern weiß, mit einem rothen Anstrich.

Dieß ist Willughby's Beschreibung, nach dessen Bemerkung sie sich von der gemeinen Lerche, erstens durch die Größe, zweytens, durch den Federbusch, drittens, durch den Rükken, der minder gefleckt, und nicht schön ist, viertens, durch das Maaß des Schwanzes, der bey diesem Vogel kürzer ist, fünftens, dadurch, daß sie nicht so hoch in die Luft steigt, und wenn sie auch aufsteigt, doch nicht so lang darinne schwebt, sechstens, dadurch, daß sie nicht in ganzen Flügen fliegt, wie jene, endlich auch noch dadurch unterscheidet, daß man sie oft an den Ufern der Seeen und der Flüsse sieht.

Diese Art soll sich in verschiedenen Ländern von Europa vorfinden, in Italien, Deutschland, Frankreich, Dänemark und Rußland; aber in unsern Königreichen finde ich sie nicht *p*); auch zählt sie Linne' nicht zu den Schwedischen Vögeln.

Sie singt schön, fast wie die Feldlerche, legt vier bis fünf Eyer, die sie auf eine sehr sorgloſe Art ausbrütet, und wenn sie die Wahl hat, so zieht sie die Nachbarschaft der Wachholdersträuche vor, um unter ihnen sich aufzuhalten. Sie soll zweymal des Jahrs nisten.

i) Latham Ind. orn. II. p. 499. n. 25. B.
k) Uebers. von Günther S. 152. n. 185. B.
l) Uebers. Bd. XIV. S. 267. B.
m) Ist hier falsch citirt, denn Frisch giebt hier eine Abbildung von der Baumlerche. B.
n) Vergl. auch meine N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 497, und N. G. der Stubenvögel. S. 137. B.
o) Wenigstens stärker. B.
p) Nach Sibbald hat man sie in Schottland angetroffen; es sind aber keine hinlänglichen Gründe vorhanden, um sie in die Brittische Zoologie aufzunehmen.

24. Die Waldlerche. (Die kleine Haubenlerche. Lesser crested L.)

Alauda nemorosa. L. I. 2. p. 797. No. 21. *q*).
Le petite Alouette huppée. Briss. orn. III. p. 361. No. 5.
Le Lulu, ou la petite Alouette huppée. Buff. ois. V. p. 74. *r*). — Pl. enlum. 503. f. 2.
Alauda cristata minor. Ray. Syn. p. 69. A. 5.
Lesser crested Larck. Will. orn. p. 207. — Br. zool. 1. No. 141. *s*).

Kleiner als die letzte. Aldrovand *t*) ist der einzige, der sie beschreibt, und selbst dieser sagt bloß, sie sey nicht so braun, als die größere Haubenlerche, der Federbusch auf dem Kopf, im Verhältniß zu der Größe des Vogels, breiter, und die Füße roth. Er bemerkt auch, daß sie in großen Flügen zieht, da man hingegen die größere Haubenlerche selten anders, als allein sieht. Meistentheils trifft man sie in Wäldern und im Dickicht an, wo sie nistet.

Man hat diesen Vogel in Italien, Oestreich, Polen und Schlesien gefunden; auch in den nördlichen Theilen Englands und Yorkshire soll er in großer Menge seyn *u*).

25. Die gewellte Lerche. (Undated L.)

Alauda undulata. L. I. 2. p. 797. No. 22. *v*).
La Coquillade. Buff. ois. V. p. 77. *w*) — Pl. enlum. 662.

Diese ist sechs, und drey Viertel Zoll lang, ziemlich stark, oben braun und unten weißlich. Ihr Schnabel ist beynahe einen Zoll lang; Auf dem Kopf steht ein Federbusch, den der Vogel nach Willkühr aufrichten kann, die Federn woraus er besteht, sind schwarz, mit weißen Rändern; das Gefieder an den obern Theilen des Kopfs und des Körpers ist schwärzlich und hellgelbroth gemischt; die größern Deckfedern der Flügel haben weiße Spitzen; die Flügel und die Schwanzfedern sind braun mit hellgelbrothen Rändern, einige wenige Flügelfedern ausgenommen, die weiße Ränder der Spitzen haben; und alle untern Theile des Körpers sind weiß, am Hals und an der Brust mit schwärzlichen Flecken bezeichnet; die Füße sind gelblich *x*).

Diese Art wurde Büffon aus der Provence geschickt, wo sie den Morgen mit ihrem Gesang begrüßt. Männchen und Weibchen sind beständige Gesellschafter, sowohl zur Brütezeit, als auch wenn sie Futter suchen, das aus Raupen, Heuschrecken, Schnecken und d. gl. besteht. Büffon führt sie als eine neue, bisher noch nicht beschriebne Art auf; inzwischen giebt es eine Ler-

q) Latham Ind. orn. II. p. 499. n. 26. B.
r) Uebers. XIV. S. 277. B.
s) Uebers. S. 102. Pennant hat sie aber nicht selbst gesehen. B.
t) Orn. II. p. 371.
u) Die Synonymen, Beschreibung und Geschichte dieses Vogels zeigt, daß hier nichts anders als die Baumlerche n. 3. gemeynt sey. Auch der Name Lulu, den ihm Büffon giebt, deutet auf die Lockstimme der Baumlerche, die deshalb auch in Thüringen Dull's oder Lullerche heißt. B.
v) Latham Ind. orn. II. p. 500. B.
w) Uebers. XIV. S. 281. B.
x) Wenn es auf Muthmaßungen ankäme, so würde ich diesen Vogel für eine junge Baumlerche ausgeben. Die ganze Beschreibung trifft überein. B.

Lerche, die vom Vorgebirge der guten Hoffnung kommt, und nicht wesentlich von dieser verschieden ist, ausgenommen, daß sie keinen Federbusch hat, die untern Theile mehr ins Gelbe spielen, und nichts Weißes, weder in den Flügeln noch im Schwanze ist — allzu geringfügige Verschiedenheiten, als daß sie uns abhalten sollten, sie hier, entweder als ein Weibchen der oben beschriebenen Art, oder als einen jungen Vogel aufzustellen.

26. Die Senegalsche Lerche. (Senegal L.)

Alauda senegalensis. L. I. 2. p. 797. No. 23. *y*).
L'Alouette huppée du Senegal. Brisson. orn. III. p. 362. No. 10. pl. 19. f. 2.
La Grisette, ou le Cochevis du Senegal. Buff. ois. V. p. 79. *z*). — pl. enlum. 504. f. 1.

Ihre Länge ist siebenthalb Zoll; der Schnabel zehnthalb Linien lang, und hornfarben; auf dem Kopf steht ein kleiner Federbusch; die Farbe des Gefieders an den obern Theilen ist grau und braun gemischt, nämlich jede Feder in der Mitte braun, mit grauen Rändern; die untern Theile sind weißlich, an der Kehle mit kleinen, braunen Flecken bezeichnet; die Seiten und die Stelle unter den Flügeln spielen ins Gelbrothe; die Schwungfedern sind graubraun, mit grauen Rändern; an der Wurzel aber sind sie, zwey Drittheile ihrer Länge, von innen gelbroth; die zwey mittlern Schwanzfedern sind grau, die andern braun, die äußerste aber fast in ihrer ganzen Breite gelbröthlich-weiß, die nächste an ihr hat den Rand von der nämlichen Farbe; Füße und Klauen sind grau.

Diese wird im Senegal gefunden.

27. Die ziegelfarbige Lerche. (Testaceous L.)

Alauda testaeea. L. I. 2. p. 797. No. 24. *a*).

Ihr Schnabel ist schwarz; die obern Theile des Körpers sind ziegelfarbig; der Scheitel ist schwarz gestreift; die Deckfedern der Flügel sind eben so bezeichnet; die untern Theile des Körpers ziegelfarbigweiß; die Schwungfedern dunkelbraun, die kürzern tief hinein ziegelfarbig gerändet; die Ränder der größern blaß; vier der mittlern Schwanzfedern sind eben so bezeichnet, wie die Schwungfedern, die andern ziegelfarbigweiß; die Füße gelb, die hintere Klaue ein wenig gekrümmt.

Sie ist auf Gibraltar zu Hause *b*).

28. Die Portugiesische Lerche. (Portugal L.)

Alauda lusitana. L. I. 2. p. 798. No. 25 *c*).

Ihr Schnabel ist stark, weiß, mit einer dunkelbraunen Spitze; die obern Theile des Gefieders sind milchrahmfarben, jede Feder in der Mitte dunkelbraun; Deckfedern und Schwungfedern

y) Latham Ind. orn. II p. 500. n. 28. B.
z) Uebers. XIV. S. 284. B.
a) Latham Ind. orn. II. p. 500. n. 29. B.
c) Latham Ind. orn. II. p. 500. n. 30. B.

federn grau gerändert; die untern Theile gelblichweiß, am dunkelsten an der Brust; der Schwanz wie die obern Theile; einige d) der äußern Federn gelblichweiß; die Füße fleischfarben; die Klauen dunkelbraun.

Sie ist in Portugal zu Hause.

Ich füge hier noch folgende Vögel als Zusätze bey:

29. Die Pieplerche.

(s. die erste Figur der zwey und funfzigsten Kupfertafel.)

Alauda trivialis. L. I. 2. p. 796. No. 5.
— — Latham Ind. orn. II. p. 493. No. 6.
Uebers. von Büffons Vögeln. XIV. S. 218.
Uebers. der Arkt. Zool. II. S. 392. L.
Meine N. G. der Stubenvögel. S. 146. No. 36.
Meine N. G. des In- und Ausl. I. 1. S. 469. No. 4.

Die übrigen Synonymen von diesem Vogel, findet man unten unter der Gattung der Sänger Nr. 20.

Es ist allerdings zweifelhaft, wo man diesen Vogel hinrechnen soll, ob unter die Lerchen- oder unter die Sängerarten. Von beyden hat er Kennzeichen der Gestalt und Lebensart; doch glaube ich, daß ihn das äußere Ansehen mehr zu einer Stelle unter den Lerchen berechtigt, weshalb ihn auch fast alle Schriftsteller, außer Pennant hieher rechnen; auch selbst Herr Latham in seinem Index ornithol.

Dieß ist nun der Vogel, der unter den Lerchen unter so vielerley Gestalten erscheint, welches den Grund theils in seiner Farbe, theils in seiner Lebensart hat. Ich will daher eine etwas genauere Beschreibung hierher setzen, wornach man die andern Vögel, die ich für synonym halte, vergleichen kann.

Sie ist unter den deutschen Lerchen die kleinste, fünf und ein halben Zoll lang, wovon der Schwanz zwey und ein halben Zoll mißt. Sie trägt sich, und bewegt auch den Schwanz, wie eine Bachstelze, daher sie den schicklichsten Uebergang von den Lerchen zu den Bachstelzenarten macht. Der Schnabel ist sehr zugespitzt, die obere Kinnlade schwarzbraun, die untere weißlich; der Augenstern dunkelbraun und die zehn Linien hohen Schienbeine mit den Zehen blaß fleischfarben. Der Kopf ist mehr lang als rund und mit dem Nacken, Rücken, Steiß und den Seiten olivenbräunlich, schwärzlich gefleckt, an den Nacken, Steiß und den Seiten am wenigsten, auf dem Kopf am kleinsten, und auf den Rücken am stärksten; der Unterleib bis zum Bauch rothgelblich, auch nach dem Alter gelbröthlich, mit vielen schwarzen länglichen Flecken, die vom Schnabelwinkel an der Seite der Kehle herablaufen und sich über die Brust ausbreiten; der Bauch und Steiß sind weiß; die kleinern Deckfedern der Flügel olivenbräunlich, die zwey Reihen größere schwärzlich, die

d) Da diese Beschreibung von einem Gemälde genommen ist, so kann die Anzahl derselben nicht bestimmt werden. Herr Pennant.



1. Die Pieplerche. 2. Die Neuseeländische Lerche.

die obern mit weißlicher Einfassung und die untern mit röthlichweißer, daher zwey weißliche Streifen auf den Flügeln hinlaufen; die Schwungfedern dunkelbraun, olivengrau kantirt; der Schwanz etwas gabelförmig, alle Federn etwas zugespitzt, dunkelbraun, die äußerste äußerlich zur Hälfte weißlich, die zweyte in der Mitte an der Spitze mit einem kleinen keilförmigen weißen Fleck; die Unterflügel grau und ihre Deckfedern gelblichgrau.

Das Weibchen ist wenig vom Männchen unterschieden. Kehle, Hals, und Brust sind nicht so gelb, fast weiß; der weiße Fleck in der zweyten Schwanzfeder ist kleiner, und die zwey Streifen auf den Flügeln sind weißer. Auch alle einjährige Männchen sehen nicht so gelb am Unterleibe aus.

Man vergleiche auch, was ich über die Wiesenlerche, die nichts anders als das alte Männchen ist, gesagt habe.

Es ist dieß in Waldgegenden ein sehr gemeiner Vogel. Im Herbst und Frühjahr hält er sich im Felde auf, wo man ihn alsdann in Menge auf den Hafer- und Kohläckern antrifft, wo er mit großer Schnelligkeit auf den Boden weg läuft, und fortfliegend seine piepende Stimme beständig hören läßt, welche ihm auch den Namen verschafft hat. Im Sommer giebt er seine Herbsttöne gar nicht von sich, sondern läßt einen melancholisch traurigen Ton hören, wenn man sich seinem Neste nähert, wo er alsdann gewöhnlich auf der Spitze eines Baums sitzt. Von da fliegt er auch in einem kleinen Bogen singend in die Höhe und setzt sich sich wieder auf seinen alten Platz. Er hat einen angenehmen Gesang. In den waldigen Berggegenden trifft man ihn in Menge an. Daselbst nistet er auch in Gärten und an Teichen und Sümpfen auf die Erde. Er legt zweymal fünf rundliche graue Eyer, die braun marmorirt sind. Er muß oft einen Kuckuck ausbrüten. Seine Nahrung sind Insecten, und nur in der Stube hat er bey mir nach und nach Mohn fressen lernen.

Die vollständige Geschichte dieses Vogels hat man in meiner N. G. Deutschlands IV unter den Lerchen Nr. 4 zu suchen.

Ich habe mich auch lange Zeit irre führen lassen, die Wiesen- und Pieplerche ꝛc. für verschiedene Species zu halten, bis ich durch Aufziehung und Unterhaltung im Zimmer in der Sache gewiß worden bin.

Zu dem, was Frisch in der Naturgeschichte dieses Vogels No. V. sagt, gehört auch noch das, was er No. III. von der Gereuthlerche erzählt und worunter er die Brachlerche versteht. Das aber, was er von der Wiesenlerche No. IV. angiebt, paßt nur auf die Brachlerche. Er hat also hier nach dem Hörensagen alles unter einander geworfen, und von ihm mag dann die Verwirrung, die man in der Geschichte dieser drey Vögel, der Wiesen- Brach- und Pieplerche findet, meist in andere naturhistorische Werke übergegangen seyn.

30. Die dunkelfarbige Lerche.

Alauda obscura. Latham Ind. orn. II. p. 494. No. 7.

„Diese Lerche hat Gestalt und Lebensart mit der Wiesenlerche gemein, nur ist sie etwas größer. Sie ist sieben und ein Viertel Zoll lang. Der Schnabel ist dünn, verlängert, dun-

kelbraun, an der Spitze am dunkelsten; die ganze Körperfarbe ist dunkel, oben olivenbraun, die Federn in der Mitte etwas dunkler, oder schwärzlich gefleckt; Kehle, Mittelhals und Bauch sind gelblich, die Seiten des Halses, so wie die Brust eben so, aber mit länglichen, dunkelbraunen Flecken bezeichnet. Der Schwanz ist drey Zoll lang, an der Spitze ganz dunkelbraun, die äußerste Feder die Hälfte schief weißgraulich, die andere nur so an der Spitze; die Füße braunröthlich; die hintere Kralle gekrümmt und kaum länger als die Zehen.

Sie wohnt in den sumpfigen Gegenden Englands, singt kaum, sondern giebt vielmehr eine solche gryllende Stimme, wie die Heuschrecke von sich. Lewin."

Die ganze Beschreibung zeigt, daß hier wieder weiter nichts, als der vorhergehende Vogel, oder die Pieplerche beschrieben ist. Alles stimmt wörtlich überein. Auch bey jungen Vögeln, die sich noch nicht vielmal gemausert haben, sind die weißen Flecken der beyden äußersten Schwanzfedern nicht so rein weiß. Man kann also den Vogel nicht einmal als Varietät trennen.

31. Die Yeltonische Lerche.

Alauda Yeltonensis. Latam Ind. orn. II. p. 490. n. 16.
— — Phil. Transact. Vol. XVII. p. 350.
Uebers. von Büffons Vögeln. Bd. XIV. S. 288. Zus.

„Sie hat die Größe des gemeinen Staars. Der Schnabel ist walzenförmig, grade, pfriemenförmig, an der Wurzel schwarz, ziemlich dick, an der Spitze weißlich; die Zunge zweyspaltig; die hintere Kralle grade und viel länger als die Zehen; der Leib und die Flügel sind schwarz, mit wenigen röthlichen Federn am Kopfe, Rücken und obern Theile der Flügel; der äußere Rand der sechsten Schwungfeder ist weiß; die zwey mittelsten Schwanzfedern rothgelb.

Diese Vögel leben schaarenweis jenseits der Wolga in der Nacharschaft des Yeltonischen Sees. Sie sind von vortreflichem Geschmack und werden im August sehr fett."

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese Lerche bloß eine Varietät der Tatarischen.

32. Die Goreische Lerche.

Alauda Gorensis. Mus. Cars. IV. n. 99.

„Sie ist so groß als eine Brachlerche, und fünf und drey Viertel Zoll lang. Der Schnabel ist dunkelbraun; der Oberkopf, Nacken und die Schultern ist rostbraun, weil die Federn schwarz und am Rande rostfarben sind; der Rücken und Steiß dunkelrostfarben; die Kehle rostfarben; die Gurgel und Brust rostfarben, jede Feder in der Mitte mit reinen schwärzlichen Längsstreifen, der Bauch weißlich und schwarzgestreift; der After weiß; die Schwungfedern rußbraun, die hintern am Vordern Rande vorzüglich blaß rostfarben; die Deckfedern schwarz an der Spitze rostfarbenweiß; der Schwanz oben dunkelrostfarben, unten schwärzlich mit weißlichen Rändern, eigentlich aber sind seine zwölf Federn schwärzlich, weißlich gerändet, die mittlern rostbraun, die äußern schief gegen die Spitze, die Hälfte weiß, und die nächste auf der innern Seite mit einem

einem weißen dreyeckigen Fleck bezeichnet; die Füße geblich."

Auch diese Lerche sieht in der Abbildung grade aus, wie das alte Männchen der Pieplerche.

33. Die Winterlerche.

Alauda brumalis. Scopoli Ann. I. p. 129. n. 188.
Winterlerche. Uebers. von Günther. I. S. 154. No. 188.
— — Uebers. von Büffons Vögeln. XIV. S. 295. Zus.

Scopoli sagt von dieser Lerche nur folgendes, woraus sich aber ergiebt, daß wieder kein anderer Vogel als die Pieplerche gemeynet seyn kann: Ich habe diese Lerchenart alle Jahre in den bergigen Gegenden der Grafschaft Tyrol gesehen. Sie ist kleiner als die Spipoletta und zischet klärer und öfterer hinter einander. Sie fliegt aus den mit Rüben besäeten Feldern in die Höhe und setzt sich gleich wieder.

Im October streicht sie schaarenweis, bleibt den Winter nicht da, und hält sich gern am Wasser auf. Sie wird von den Italiänern Squizzelina genannt.

34. Die weißbäuchige Lerche.

Alauda obscura. L. I. 2. p. 801. n. 33.
— — Cetti Stor. nat. di ucc. di Sard. p. 150 und Uebers. Th. II. S. 150.
— — Uebers. von Büffons Vögeln. XIV. S. 296. Zus.

Cetti läßt es noch ungewiß, ob dieser Vogel eine Lerchernart sey. Er sagt: Ich füge noch die Beschreibung eines Vogels bey, der nicht eigentlich zur Gattung der Lerchen gehört, da ihm das von der Kralle der großen Zehe genommene Unterscheidungszeichen mangelt. Er ist so groß, wie die Feldlerche, sein Schnabel und die Farbe des obern Theils des Körpers hat er ebenfalls mit jener gemein, nur unten ist er ganz weißlich, ohne alle Flecken. Die Kralle der großen Zehe ist zwar wirklich die größte, allein sie ist krumm gebogen, und nicht länger als zwey Linien, da die Zehe selbst merklich länger ist, welche ziemlich an drey Linien reicht. Die große Aehnlichkeit dieses Vogels mit der Lerche macht, daß man ihn von derselben nicht unterscheidet, und ihn mit den Lerchen vermengt. Er hat daher auch in Sardinien keinen eigenen Namen, wiewohl er sich daselbst ziemlich zahlreich aufhalten muß, da ich selbst ihn sehr oft aus der Gegend von Sassari erhalten habe. Diese Art ist übrigens, wie sich vermuthen läßt, diejenige, welche in einigen Gegenden von Italien allodola salvatica genannt wird *e*). B.

f) Die Riesenlerche. Alauda magna. L. I. 1. p. 801. n. 11. ist oben Bd. II. Th. 1. S. 6. n. 3. unter dem Namen des Amerikanischen Staars beschrieben. Nach meiner Ueberzeugung steht sie unter den Staaren an einem schicklichern Platze als hier unter den Lerchen, ob ich gleich mit Hrn. Latham darin nicht übereinstimmend bin, daß er sie für eine Varietät des Louisianischen Staars ausgiebt.

Vierzigste Gattung. Bachstelze g).

Der Schnabel ist weich und dünn, an der Spitze ganz gering ausgeschnitten; die Zunge am Ende zerrissen; die Füße sind dünn; (der Schwanz verlängert).

Die Vögel dieser Gattung halten sich an den Ufern der Bäche auf, haben lange Schwänze, die fast immer in Bewegung sind; ihr Gang ist laufend; ihr Flug mehrentheils wellenförmig, besonders, wenn sie weit wegfliegen; sie sitzen selten auf den Bäumen, und haben im Flug ein zwitscherndes Geschrey h); ihr Nest machen sie entweder auf den Boden selbst, oder doch sehr nahe daran.

Ich glaube, diese ganze Gattung ist auf die alte Welt, und die angränzenden Inseln eingeschränkt.

1. Die weiße Bachstelze. (White Wagtail.)

Motacilla alba. L. I. 2. p. 960. No. 11. *i*) — Faun. Suec. No. 232. — Scop. ann. I. No. 224. *k*) — Brünn. orn. No. 271. — Müller Zool. No. 272. — Kram. elench. p. 373. No. 1. — Frisch tab. 23. f. 4. — Olina pl. in p. 43. — Georgi Reise p. 174. — Sepp. Vog. pl. p. 119. — Faun. Arragon. p. 88.

La Lavandiere. Briss. orn. III. p. 461. No. 38. — Buff. ois. V. p. 251. pl. 14. f. 1. *k*) — Pl. enlum. 652. f. 1. — Eine Spielart f. 2.

White Water-Wagtail. Ray Syn. p. 75. A. 1. — Will. orn p. 237. — Albin. I. pl. 49. — Br. Zool. I. No. 142. pl. 55. *m*). — Arct. Zool. II. p. 396. E. *n*).

Die Länge dieser Art ist sieben Zoll, wovon der Schwanz die Hälfte mißt. Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern nußbraun; der Hinterkopf und der Nacken sind schwarz; die Stirn, die Augenkreiße und die Seiten des Halses weiß; das Kinn, der Vorderhals und die Brust schwarz; die obern Theile des Körpers, die Deckfedern der Flügel und der Steiß aschgrau; die größern Deckfedern der Flügel und die kürzern Schwungfedern dunkelbraun mit grauen Rändern; die gro-

g) Die Englischen Ornithologen trennen gewöhnlich die eigentlichen sogenannten Bachstelzen von den Motacillen oder Sängern als Gattung. In meiner N. G. Deutschlands und des In- und Auslandes findet man sie bloß als Familien getrennt. B.

h) Skopoli. — Ich habe dieß sehr oft bey unsern Arten bemerkt.

i) Latham Ind. orn. II. p. 501. n. 1. B.

k) Uebers. v. Günther, S. 186. n. 124. B.

l) Uebers. XVI. S. 29. B.

m) Uebers. S. 178. B.

n) Uebers. II. S. 368. C. Vergl. auch Meyers illuminirte Thiere. Nürnberg gr. Fol. T. II. S. 21. Taf. 77. meine N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 536. n. 14. und die N. G. der Stubenvögel. N. 101, und Zorns Pethinoth. II. S. 482. §. 50. S. 109. und 154. B.

großen Schwungfedern schwärzlich, die hintersten (secondarii) und die großen (primi) Schwungfedern fast von einerley Länge; die untern Theile der Brust und des Bauchs weiß; die acht mittlern Schwanzfedern schwarz, mit grauen Rändern; die übrigen weiß, ausgenommen an der Wurzel, und an den Spitzen der innern Fahnen, wo sie dunkelbraun sind; die Füße schwarz.

Beym Weibchen spielt der Scheitel ins Braune [o]). Einige Vögel haben bloß einen schwarzen halben Mond an der Brust, Kinn und Kehle sind ganz weiß [p]).

Diese Vögel halten sich größtentheils an wasserreichen Plätzen auf, und leben von Fliegen und andern Insekten. Ihr Nest machen sie auf dem Boden [q]); es besteht aus dürren Gras, zarten Wurzelfasern und Moos, und ist inwendig mit Haaren oder Federn ausgelegt. Der Eyer sind fünf an der Zahl, weiß, mit braunen Flecken, mehrentheils haben sie nur eine Brut des Jahrs [r]). Man sieht sie oft auf dem Boden laufen, und zwar sehr geschwind, wobey sie oft nach den Fliegen u. d. gl. springen, die zu hoch sind, als daß sie sie auf der Erde fangen könnten.

Dieser Vogel ist sehr weit verbreitet, denn man findet ihn durch die ganze alte Welt [s]). Die Schriftsteller erwähnen seiner größtentheils als eines Zugvogels; bey uns verändert er seinen Aufenthalt nach Süden, so wie der Winter herbeykommt, und ein Theil, glaube ich, zieht ganz weg; denn ich kann mich nicht entsinnen, im Winter so viele Bachstelzen der Art gesehen zu haben, als im Sommer [t]). In Schottland und im nördlichen England sieht man sie bey strenger Witterung fast niemals.

Sowohl diese, als andere Vögel dieser Gattung (Clafs) werden von den Franzosen und von uns selbst Waschfrauen (Washer-woman), oder Schüssel-Wäscherinnen (Dish-washers) genennt.

Im Leverschen Museum ist eine schöne Spielart, weiß, die hintern Theile ausgenommen, die gelblich sind.

Man [u]) findet sie bis Island, den Feroe Inseln, und Drontheim; sie ist auch in Rußland, Sibirien und Kamtschatka gemein, verbreitet sich aber nicht weiter gegen Norden.

o) Das Weibchen unterscheidet sich nach meinen Beobachtungen so: Es fehlt ihm die reine, weiße Stirn- und Wangenfarbe, die große schwarze Kopfplatte, die großen weißen Flügelkanten, welche letztern ohnehin auch mehr grau als weiß sind; ja man findet auch Weibchen, welche nur eine halbe schwarze Kopfplatte oder gar keine haben, sondern wo die Farbe des Kopfs dem Rücken gleich ist; endlich sind die Weibchen auch allezeit kleiner und schlanker. B.

p) Diese sind die Jungen gleich nach der ersten Mauser. B.

q) Nur selten steht ihr Nest auf dem Boden. Im Felde findet man es in hohlen Bäumen, Steinbrüchen, Steinhaufen, Ufer- und Ränderhöhlen; im Walde in hohlen Bäumen, Holzhaufen, Felsen- und Steinritzen und bey den Häusern in Holzstößen, Strohdächern, Dach- und Mauerhöhlen. B.

r) Sie bringen des Jahrs zwey, auch drey Bruten. B.

s) Ich habe ihn mehr als einmal auf Chinesischen Gemälden gesehen.

t) In Thüringen ziehen sie beym ersten Zuge im October, wie die Schwalben in Heerden gesammelt weg, und kommen im Februar bey anhaltender schöner Witterung wieder. B.

u) Zus. aus dem Suppl. S. 178.

Dieſe, ſo wie die folgende Art, iſt auch in Indien zu Hauſe; eine Abbildung von beyden, die auf dem Platze gemacht iſt, befindet ſich in der Sammlung der Lady Impey.

1. Var. A. Die Bachſtelze mit dem Halsbande.

Motacilla alba. L. I. 2. p. 960. No. 11. β.
La Bergeronette à collier de l'isle de Luçon. Sonn. Vog. p. 61. t. 29.
Lev. Mus.

Sie hat die Größe der gemeinen. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern nußbraun; die Stirn bis zum Scheitel, um den Schnabel herum, die Wangen und die Kehle ſind weiß; der hintere Theil des Kopfs und Halſes, der untere Theil des Halſes vornen, und die Bruſt ſchwarz; der Rücken aſchfarben; quer über die Flügel läuft ein ſchiefer, weißer Streifen, der an den Afterflügeln anfängt; die Schwungfedern ſind ſchwarz, mit weißen Rändern, die äußerſten ganz ſchwarz; der Schwanz ſchwarz, die zwey äußerſten Federn ausgenommen, die weiß ſind; die Füße ſchwarz.

Dieſe iſt auf Lüçon zu Hauſe. Ich habe auch eine geſehen, die von Kamtſchatka kam, und welche jetzt der Ritter Banks beſitzt v).

2. Die geſchäckte Bachſtelze. (Pied W.)

Motacilla maderaspatensis. L. I. 2. p. 961. No. 78. w).
La Bergeronette de Madras. Briss. orn. III. p. 478. No. 44. — Buff. ois. V. p. 275. x)
Forked

v) Ich habe ſelbſt mehr als ein Exemplar dieſer Varietät geſehen und nach meinen Erfahrungen ſind dieß alte Männchen.

Ich will nun auch noch die folgenden von andern und mir bemerkten Varietäten beyfügen:

Var. B. Die weißliche Bachſtelze.
Motacilla albida. L. I. 2. p. 96. n. 77.
Motacilla alba. Lath. Ind. orn. II. p. 501. n. 1. β.
Jaqu. Beytr. S. 23. n. 17. t. 8.

Es wird von ihr geſagt, ſie ſey weißlich mit aſchgrauen Rücken und Deckfedern der Flügel und röthlichem Schnabel und Füßen.

Es iſt meines Erachtens weiter nichts, als ein junger Vogel der weißen Bachſtelze.

Var. C. Die ganz weiße Bachſtelze.
M. alba candida.

Sie iſt am ganzen Leibe weiß. Man hat auch welche angetroffen, die, wie Latham ſagt, am Hintertheile gelblich waren. Vielleicht gehört hieher auch Sparrmanns weißer Fliegenfänger (Muscicapa alba. Mus. Carls. Fasc. III. t. 74.) ſ. oben Bd. II. Th. 1. S. 354. Note q.)

Var. D. Die weißköpfige weiße Bachſtelze.
M. alba leucocephala.

Sie hat bloß einen ganz weißen Kopf, und iſt übrigens der gewöhnlichen gleich.

Var. E. Die bunte weiße Bachſtelze.
M. alba varia.

Sie iſt unregelmäßig weißgefleckt an denjenigen Theilen des Leibes, die ſonſt anders gefärbt ſind. Ich habe auch Exemplare geſehen, die bloß weiß waren, bis auf die ſchwärzlichen Flügel; andere, die an der ganzen Vorderhälfte, und wieder andere, die an der ganzen Hinterhälfte weiß waren.

Hieher gehört auch die aſchgraue Bachſtelze. Nr. 3. welche ein junger Vogel der Art iſt und in Geſellſchaft des jungen Vogels der gelben Bachſtelze die Art der grauen Bachſtelze gebildet hat. B.

w) Latham Ind. orn. II. p. 502. n. 2. B.

x) Ueberſ. XIV. S. 75. B.

1. Das Junge der weifsen Bachstelze.
2. Das Junge der gelben Bachstelze.

Black and white Wagtail. Ray Syn. p. 194. No. 3. pl. 1. f. 1.
Forked Wagtail. Jbid. No. 4. pl. 1. f. 6.

Schnabel, Kopf, Hals, Brust, und die obern Theile des Körpers sind schwarz; die untern Theile weiß; queer über die Flügel geht auch ein schiefes, weißes Band; die mittlern Schwanzfedern sind schwarz, und einige der äußern weiß, wie viel aber, erhellt weder aus der Abbildung, noch aus der Beschreibung.

Die gabelschwänzige Bachstelze (Forked Wagtail) ist wahrscheinlich das Weibchen, denn es unterscheidet sich blos dadurch, daß diejenigen Theile, die beym Männchen schwarz sind, bey diesem aschfarben sind.

Sie sind auf Madras zu Hause.

3. Die aschgraue Bachstelze. (Cinereous W.)

Motacilla cinerea. L. I. 2. p. 961. No. 79. *y*).
La Bergeronette grise. Briss. III. p. 465. No. 39. pl. 25. f. 1. — Buff. ois. V. p. 261. *z*). — Pl. enlum. 674. f. 1.

Etwas kleiner, als die letzte, und sechs, drey Viertel Zoll lang. Ihr Schnabel ist braun; die obern Theile des Kopfs, des Halses und des Körpers sind aschgrau; die untern weiß; queer über die Brust geht ein bräunliches Band; die Deckfedern der Flügel und die kürzern Schwungfedern sind schwärzlich, mit weißlichen Rändern; die großen Schwungfedern sind schwärzlichbraun; der Schwanz ist dunkelschwarz, seine äußerste Feder aber weiß, die obere Hälfte (base half) der innern Fahne ausgenommen, die zweyte ist eben so, die Fahnen aber sind nur ein Drittheil ihrer Länge weiß, und die innere Fahne ist am Ende schwarz; die Füße sind braun *a*).

Dem Weibchen fehlt das Band an der Brust.

Wir

y) Latham Ind. orn. II. p. 502. n. 3. B.
z) Uebers. XIV. S. 46. B.
a) Es ist wohl so gut, als ausgemacht, daß die aschgraue Bachstelze, wenn man die Synonymen und Abbildungen mit der Natur selbst vergleicht, nichts anders als ein Junges der weißen oder gelben Bachstelze sey. Abbildungen und Beschreibungen, welche letztere freylich nicht immer genau genug gemacht sind, passen auf beyde. Denn beyde junge Vögel haben einen aschgrauen Rücken, einen weißlichen Unterleib, der nur bey letztern nach dem After zu etwas ins Gelbe fällt, und queer über die Brust eine graue, dunkelbraune oder graubraune Queerbinde. Ich habe um die Sache noch deutlicher zu machen, von beyden jungen Vögeln, wie ich sie in Menge im Herbst beym Schaf- und Rindvieh geschossen habe, eine Abbildung gegeben. (s. Taf. 53. Fig. 1. 2.)

Es stimmen mir in meinen Beobachtungen auch mehrere berühmte Ornithologen bey. Hr. Prof. Otto, ein erfahrner Vogelkenner, sagt in einem Anhange in der oben angeführten Stelle von Büffons Uebersetzung S. 52.: Ich habe diesen grauen Stieglitz (Motacilla cinerea) immer für Junge von den gelben gehalten, wenigstens sind ihm diese ähnlich. Linné ist auch zweifelhaft, ob der graue von dem gelben (Motacilla flava) vielleicht bloß dem Geschlecht nach verschieden sey. Herr Pennant hält ihn auch für einerley Vogel mit seiner gelben Bachstelze, und selbst in der französischen Encyclopädie vermuthet man es.

Ba-

Wir haben diesen Vogel nicht in England, obgleich die Schriftsteller von ihm, als von einem auf dem festen Lande gemeinen Vogel reden, wo man ihn häufig in ziemlicher Anzahl im Sommer auf den Weiden, unter dem Vieh antrifft. Wenn die Fliegen anfangen selten zu werden, so zieht er sich zurück nach den Bächen. Man vermuthet, daß nur ein Theil von ihnen wandere.

Im Nestbau weicht er etwas von der unsrigen ab; er bringt es auf einer niedern Weide, nahe am Boden an, und heckt zweymal des Jahrs.

4. Die graue Bachstelze. (Grey W.)

Motacilla boarula. L. I. 2. p. 997. No. 51. *b*). — Mantiss. 1771. p. 527. — Seop. ann. I. No. 225. — Faun. Arragon. p. 89.
La Bergeronette jaune. Briss. orn. III. p. 471. No. 41. pl. 23. f. 1. (das Männchen) — Buff. ois. V. p. 268. *d*). — Pl. enlum. 28. f. 1.
Motacilla flava altera. Ray Syn. p. 75. No. 3.
Yellow Wagtail. Albin. II. pl. 58. (das Weibchen.)
Grey Wagtail. Will. orn. p. 248. — Edw. pl. 259. (das Männchen.) Br. Zool. I. No. 144. — Arct. Zool. II. p. 395. *d*).
Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre Länge ist achthalb Zoll. Der Schnabel ist braun; die obern Theile sind grünlichaschfarben; über den Augen ist ein blasser Streifen; die Seiten des Kopfs sind aschfarben; Kinn und Kehle schwarz; die obern Deckfedern des Schwanzes, und alle untern Theile des Körpers gelb; die untern Deckfedern des Schwanzes dunkelgelb; die Deckfedern der Flügel braun, mit aschfarbnen Rändern; die großen Schwungfedern braun, die kürzern an der Wurzel weiß, und an den Endspitzen braun, und fast so lang, als die großen Schwungfedern; der Schwanz ist der längste unter allen Arten dieser Gattung, seine äußerste Feder weiß, die nächste an der innern Seite und an der Spitze weiß, an der äußern Seite schwärzlich, die dritte fast eben so, der innere

Belon, Brisson und Büffon sind die Schriftsteller, die uns vorzüglich diesen Vogel als eigne Species aufgedrungen haben. Da nicht allein die Jungen von diesen beyden Vögeln, sondern auch die alten von der weißen Bachstelze, besonders die weiblichen im Herbst nach der Mauser, die oben angegebene Zeichnung der aschgrauen Bachstelze haben, und bey den Heerden in großen Menge angetroffen werden, so hat man von denselben die Beschreibung und Geschichte geformt. Die Art der Fortpflanzung ist aber von der gelben Bachstelze allein genommen; und zu Weibchen hat man ihr eine ganz junge kaum aus dem Nest gekommene weiße Bachstelze angepaart.

Man vergleiche übrigens, was ich weitläuftiger über diese Vogelart in meiner Naturgeschichte Deutschlands Bd. IV. bey Gelegenheit der weißen und gelben Bachstelze gesagt habe. B.

b) Latham Ind. orn. II. p. 502. n. 4. B.

c) Ueberf. XIV. S. 58. B.

d) Ueberf. II. S. 369. F. S. auch Zorns Pethinoth. II. S. 154. und 434, meine N. G. des In- und Ausl. I. 1. S. 540. n. 15. (Hier ist ein Druckfehler in der deutschen und lateinischen Benennung.) und meine N. G. der Stubenvögel. B.

re Rand aber ſchwarz, die übrigen ſind ſchwarz, mit grünlichen Rändern; die Füße gelblichbraun.

Das Weibchen hat nichts Schwarzes an der Kehle *e*).

Dieſe Art iſt ein beſtändiger Bewohner unſerer Königreiche, und hält ſich an waſſerreichen Plätzen und kleinen Bächen auf, der Inſekten wegen, von denen ſie ſich nährt. Ihr Neſt iſt auf dem Boden, nicht ſehr weit von Waſſer, beſteht aus dürren Faſern und Moos, und iſt inwendig mit Haaren, Federn oder Wolle ausgelegt. Der Eyer ſind ſechs bis acht, ſchmutzig weiß, mit gelben Flecken bezeichnet.

Es iſt ein ſehr ſchöner Vogel, der in verſchiedenen Gegenden des feſten Landes angetroffen wird, und dauerhafter (more hardy) zu ſeyn ſcheint, als die andern Arten. Linne' ſagt, er halte ſich geſellſchaftlich zuſammen *f*); bey uns ſieht man ihn aber nur einzeln, außer zur Paarungszeit. Zu Bologna kennt man ihn unter den Namen Boarula, oder Boarina. Man findet ihn auch in Senegal *g*).

Ich *h*) habe Urſache zu vermuthen, daß man dieſe Art im ſüdlichen England, im Sommer nicht ſehe; auch habe ich von ihr keinen nähern Brüte-Platz ausfindig machen können, als Cumberland, wo ſie, wie mir Herr D. Heysham verſichert, alle Jahre brütet, und ohngefähr im April daſelbſt ankömmt. Das Neſt hat er niemals angetroffen, aber die Jungen im Junius mehr als einmal geſchoſſen, und er glaubt, ſie ziehe im Oktober nach Süden, um welche Zeit ſie bey uns in Kent erſcheint; denn ich erinnere mich nicht, ſie jemals vor dem achten oder neunten dieſes Monats geſehen zu haben. Herr Jackſon ſagt mir, ſie brüte in Irrland *i*).

4. Var. A. Die Javaiſche Bachſtelze. Javan' W.)

Motacilla boarula. L. I. 2. p. 997. No. 51. b *k*).
La Bergeronette de Java. Briss. orn. III. p. 474. No. 42. pl. 25. f. 2. — Buff. ois. V. p. 272 *l*).

Sie iſt ſieben Zoll lang. Der Schnabel grau; der Kopf, die obern Theile des Körpers und die obern Deckfedern des Schwanzes olivengelb; Kehle und Hals grau; die übrigen untern Theile gelb, am dunkelſten gegen den After hin; die größern Deckfedern der Flügel braun; die Schwung-

e) Und iſt bis unter dem Bauch mehr blaß röthlichgelb, als goldgelb, wie das Männchen. B.

f) Er verwechſelt ſie mit der gelben Bachſtelze. Ueberhaupt iſt in vielen Schriften die Geſchichte dieſer Bachſtelze und der gelben unter einander gemiſcht. Unſer Verfaſſer beſchreibt und kennt dieſe ſehr gut, macht aber, wie wir unten n. 6. ſehen werden, bey der gelben auch einige Fehler. B.

g) Adanſon. — Er nennt ihn den Ortolan dieſes Landes, und ſagt, es ſey ein Fettklumpen, und von vortreflichem Geſchmacke.

h) Zuſ. aus dem Suppl. S. 178.

i) In den gebirgigen Gegenden Thüringens iſt dieſer Vogel an den kalten Kieſelbächen ſehr gemein. Er zieht gewöhnlich zu Ende des Octobers familienweiſe weg und iſt zu Ende Februars wieder da. Er bleibt aber auch in gelinden Wintern wie 1790 und 1791 da, und begiebt ſich, wenn die Bäche zufrieren nach den Miſtſtätten. B.

k) Latham Ind. orn. II. p. 503. n. 4. β. B.

l) Ueberſ. Bd. XVI. S. 64. B.

Schwungfedern eben ſo, die kürzern aber zur Hälfte, von der Wurzel an, weiß, die dritte von Körper an gerechnet, ſo lang als die großen; die ſechs mittlern Schwanzfedern ſchwärzlich, die zwey nächſten von innen, und an der Spitze weiß, der äußere Rand ſchwärzlich, die äuſſerſte weiß, zwey Drittheile an dem Schaft herab ausgenommen, wo ſie ſchwärzlich iſt; die Füße grau.

Sie iſt auf der Inſel Java zu Hauſe.

5. Die Indiſche Bachſtelze. (Indian W.)

Motacilla indica. L. I. 2. p. 962. No. 80. *m*).
La Bergeronette grise des Indes. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 207.

Der Schnabel dieſes Vogels iſt hell gelbroth; der Augenſtern gelb; der Kopf, Hinterhals, Rücken und Steiß ſchmutzig grünlichgrau; die Kehle, Bruſt und der Bauch ſehr lichtgelb; an der Bruſt ſind zwey weiße, gekrümmte Bänder, die ſich an ihren Enden vereinigen, und auch in der Mitte durch eine Linie von der nämlichen Farbe verbunden ſind; die kleinern Deckfedern der Flügel ſind wie der Rücken, die andern gelb, und die kürzern Schwungfedern theils braun, theils gelb, die großen Schwungfedern ſchmutzigbraun, mit gelben Rändern, die zwey mittlern Schwanzfedern grünlichgrau, die übrigen ſchwärzlichbraun, die zwey äußern weiß, eben ſo die Schenkel und der After; die Füße hell gelbroth.

Er wohnt in Indien.

6. Die gelbe Bachſtelze. (Yellow W.)

Motacilla flava. L. I. 2. p. 963. No. 12. *n*) — Faun. Suec. No. 253. — Scop. ann. I. No. 227. *o*) — Brünn. orn. No. 273. 274. — Müller Zool. No. 273. — Kram. elench. p. 374. No. 2. — Frisch. tab. 23. *p*) — Georgi Reise p. 174. — Sepp. Vog. pl. in p. 103. — Faun. Arrag. p. 88.
La Bergeronette de printemps. Briss. orn. III. p. 468. No. 40. — Buff. ois. V. p. 265. pl. 14. f. 1. — Pl. enlum. 674. No. 2.
Yellow Water-Wagtail. Ray Syn. p. 75. A. 2. — Will. orn. p. 238. pl. 68. — Edw. pl. 158. (das Weibchen).
Yellow Wagtail. Br. Zool. I. No. 142. — Arct. Zool. II. p. 396. F. *r*).
Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre Länge iſt ſiebenthalb Zoll. Der Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern nußbraun; der Kopf und die obern Theile des Körpers ſind olivengrün; der Steiß am hellſten; die untern Theile von der Bruſt an lebhaft gelb; an der Kehle ſind einige wenige ſchwarze Flecken *s*); über den Augen iſt ein gelber Streifen; zwiſchen den Augen ein anderer, dunkelfarbiger, und un-

m) Latham Ind. II. p. 503. n. 7. B.
n) Latham. Ind. orn. II. p. 504. n. 8. B.
o) Ueberſ. von Günther. S. 187. n. 225. Hier beſchreibt Scopoli das Weibchen der grauen Bachſtelze. n. 4. B.
p) Hier iſt ein ſchönes altes Männchen abgebildet. B.
q) Ueberſ. Bd. XVI. S. 54. B.
r) Dieß Synonym fällt hier weg; denn es gehört zu n. 4. B.
s) Bey der zum erſtenmal gemauſerten grauen Bachſtelze n. 4 ſind an der Kehle ſchwarze Flecken, bey dieſer aber nie. B.

unter den Augen ein dritter von der nämlichen Farbe; die kleinern Deckfedern der Flügel ſind wie der Rücken; die andern dunkelbraun, mit hellgelben Rändern; die Schwungfedern dunkelbraun; der Schwanz ſchwarz, zwey der äußern Federn ausgenommen, die halb ſchwarz, halb weiß, ſchief abgetheilt ſind; die hintere Klaue iſt ſehr lang.

Das Weibchen iſt von minder lebhaftem Colorit; der Streifen über den Augen weißlich, und die ſchwarzen Zeichen an der Kehle fehlen *).

Dieſe Art Bachſtelzen iſt in England auf feuchten Wieſen und Kornfeldern, im Sommer gemein, und zieht weg, oder verändert wenigſtens ihren Standort im Winter **). In Frankreich ſieht man ſie zu allen Jahrszeiten, außer wenn der Winter ungewöhnlich ſtreng iſt, wo ſie dann die Berggegenden (uplands) mit den Ufern ſanfter Bäche vertauſcht, wenn das Futter an jenen ſelten wird.

Ihr Neſt baut ſie in Kornfeder ***), auf den Boden, und zwar aus Binſen und Wurzelfaſern, mit Haaren ausgelegt. Der Eyer ſind fünf an der Zahl, mit dunkelfarbigen Flecken und Streifen ohne alle Ordnung geſprenkelt †).

Auf *) Sepp's Figur ſind die Eyer weiß, mit rothbraunen Flecken geſprenkelt. Sie ſoll auch in Schweden zu Hauſe ſeyn, aber nicht weiter gegen Norden. In allen Gegenden Rußlands, Sibiriens, ja ſelbſt in Kamtſchatka, iſt ſie häufig anzutreffen.

*) Das Weibchen iſt am richtigſten beſchrieben, das Männchen aber faſt bey allen Schriftſtellern mit den einjährigen Männchen der gruen Bachſtelze n. 4. verwechſelt, ſo wie überhaupt die Geſchichte und Beſchreibung dieſer beyden Vögel verwirrt iſt. Ich werde daher nichts überflüßiges thun, wenn ich die Beſchreibung beyder Geſchlechter nach der Natur und vieljährigen Beobachtungen entworfen, hier kürzlich beyfüge: Männchen. Der Schnabel iſt ſchwarzbraun; die Füße ſind ſchwarz, die hintere Kralle, wie bey den Lerchen faſt gerade; der Oberleib röthlichgrau, ſtark olivengrün überzogen, das ſich am Steiße in zeiſiggrün verwandelt; der Kopf mehr röthlichgrau als grün, und über die Augen läuft ein röthlich weißgelber Streifen; der Unterleib iſt prächtig gelb, an der Kehle und Bruſt nicht ſo hoch als am Bauche und After; die Flügel ſind dunkelbraun, jede Feder röthlich weiß eingefaßt, die Deckfedern am ſtärkſten, daher einige weißliche Schnüre auf demſelben entſtehen; der Schwanz ſchwarz, die zwey äußerſten Federn faſt ganz weiß, nur an der großen Fahne läuft von der Mitte ein ſchmaler keilförmiger ſchwarzbrauner Fleck nach der Wurzel zu.

Weibchen. — Der Rücken iſt mehr grau als grün, der hintere Unterleib nicht ſo ſchön gelb, der vordere röthlichgelb oder roſtfarben geſprengt und die Kehle weißlich. B.

**) In Hampſhire bleiben einige das ganze Jahr hindurch. Br. Zool. (Hier iſt wohl wieder eine Verwechſelung mit der grauen Bachſtelze, die im Winter bleibt. B.)

***) In Höhlen, unter gefällten Bäumen und Stämmen. Friſch. — Oft unter die Ufer der Bäche. Hist. des Ois.

†) Die Eyer ſind weiß, purpurfarben und ſchwarz gefleckt und geſtrichelt. B.

*) Zuſ. aus dem Suppl. S. 179.

6. Var. A. Die Bachſtelze von Timor. (Timor W)

Motacilla flava. L. I. 2. p. 963. No. 12. b. y).
Bergeronette de l'isle de Timor. Buff. ois. V. p. 275 z).

Ihr Schnabel iſt ſchwarz, ziemlich ſtark an der Wurzel, gegen die Spitze hin dünner, und ein wenig gebogen; der obere Theil des Gefieders iſt aſchgrau; der untere gelb, über den Augen iſt eine gelbe Linie; die größern Deckfedern der Flügel haben weiße Spitzen, und das bildet ein Band quer über die Flügel; Schwungfedern und Schwanz ſind ſchwarz; die Füße gelbroth; die hintere Klaue zweymal ſo lang, als eine der vordern.

Man findet ſie auf der Inſel Lima in Oſtindien a).

17. Die

y) Latham Ind. orn. II. p. 504. n. 8. β. B.
z) Ueberſ. B. XVI. S. 74. III. B.
a) In Gmelins Linne'iſchen Syſtem und Lathams Index werden noch folgende Varietäten angeführt, die Gmelin, aus dem ſie genommen ſind, mit Unrecht für Meiſen ausgiebt. (Vergl. Ueberſ. von Büffons Vögeln, XVI. S. 181.)

Var. B. Parus luteus. S. G. Gmelin Reise II. p. 101. t. 20. f. 1.

Die gelbe Meiſe des Gmelin.

"Die Länge des Vogels iſt 5 Zoll 10 Linien, und die des Schwanzes 2 Zoll 5 Linien; der Schnabel iſt pfriemenförmig, gerade, ſpitzig und ſchwarz; der Kopf vorn gelb, hinten ins olivenfarbene fallend; der Oberleib iſt olivenfarben; der Unterleib iſt gelb; die dunkelgrauen Schwungfedern erſtrecken ſich kaum über den Anfang des Schwanzes, die hintern ſind weißlich gerändet, die zwey letzten mit gelbem Rande; die grünen Deckfedern haben vorn weißliche und hinten gelbliche Spitzen; die zwey äußern Schwanzfedern ſind weiß auf der Mitte mit einem verlängerten ſchwarzen Flecken; Füße Zehen und Nägel ſind ſchwarz.

Das Weibchen iſt am Kopfe, Ober- und Vorderhalſe aſchgrau, hat hinter den Schläfen ein weißes längliches Band, welches auch die Gegend oben und unter den Augen umgiebt; der Rücken iſt grau ins olivenfarbene fallend; das Kinn weiß, und der Unterleib iſt nicht ſo lebhaft gelb. Jedoch iſt dieß letztere Merkmal nicht beſtändig, da Gmelin auch Weibchen geſehen hat, die am Unterleibe wie das Männchen vollkommen pomeranzenfarben waren.

Dieſer Vogel iſt der einzige, der zieht und ſich bald im Frühjahr heerdenweiſe nach Aſtrachan aufmacht, wo er aber nicht niſtet, ſondern ſich über die Wolga bis nach Rußland begiebt, und daſelbſt niſtet, und im Herbſt nach dem Ufern des Caspiſchen Meers fliegt, und ſich hauptſächlich vom Saamen nährt (iſt wohl eine falſche Beobachtung) dabey aber auch kleine Inſekten nicht verachtet."

Ich finde in dieſer Beſchreibung gar keinen Unterſchied der Varietät, ſondern es iſt die beſchriebene gelbe Bachſtelze.

Var. C. Parus caspicus. S. G. Gmelin Reise. II. p. 104. t. 20. f. 2.

Die Caspiſche Meiſe des Gmelin.

„Sie iſt etwas größer als die Schwanzmeiſe, ſonſt ihr an Dicke gleich. Kopf, Ober- hals und Rücken ſind aſchgrau, mit etwas Gelb untermiſcht; der Unterhals iſt vorn weiß, der übrige Unterleib ſchön ſafranfarben; der Steiß iſt auch gelb; hinter den Augen ein kleiner weißer Fleck; die Schwungfedern ſchwärzlich, ſo wie die Schwanzfedern; die letztern weiß gerändet; der Schwanz iſt viel größer als der Leib, faſt 4 Zoll lang, da dieſer nur anderthalb beträgt, die äußerſte Feder iſt auf beyden Seiten ganz weiß, die beyden folgenden eben ſo, nur mit einem ſchwarzen Rande auf der vordern Seite; die Füße fleiſchfarben.

Er hält ſich häufig bey Enpeli auf und läuft auf den Straßen, bey den Häuſern und am Strande herum. Seine Nahrung beſteht hauptſächlich in Saamen"

Dieß iſt der Beſchreibung nach das Weibchen von der grauen Bachſtelze. Nr. 4.

Var.

7. Die gelbköpfige Bachſtelze. (Yellow-headed W.)

Motacilla citreola. L. I. 2. p. 962. No. 84.
— — Pallas Trav. Vol III. p. 696. No. 14. *b*).

Sie iſt etwas größer, als die gelbe Bachſtelze, ihr aber nicht unähnlich. Der Kopf, Hals und alle untern Theile ſind gelb; am Nacken iſt ein ſchwärzlicher halber Mond; der Rükken iſt bläulichaſchfarben; Flügel und Schwanz ſind wie bey der gelben Bachſtelze.

Sie iſt ſehr gemein in Sibirien, ſelbſt im Arktiſchen Kreiſe, wird auch in Rußland, aber weniger zahlreich gefunden. Sie hat einerley Lebensart mit den andern Bachſtelzen.

Vielleicht iſt dieß der nämliche Vogel, deſſen Lepechin *c*) erwähnt, und der ſiebenthalb Zoll lang war; ſeine zwey äußern Schwanzfedern waren weiß, und die äußerſte ſchwarz geſtreift; übrigens war er wie der oben beſchriebene geſtaltet.

8. Die Capſche Bachſtelze. (Cape W.)

Motacilla capensis. L. I. 2. p. 979. No. 24. *d*).
La Bergeronette du Cap de bonne Esp. Briss. orn. III. p. 476. No. 43. pl. 25. f. 3. — Buff. ois. V. p. 273. *e*) — Pl. enlum 28. 2?

Var. D. Parus variegatus. S. G. Gmelin Reise II. p. 101. t. 20. f. 3.

Die geſpengte Meiſe des Gmelin. Dieſer Vogel iſt 5 Zoll, 6 Linien lang. Der pfriemenförmige, rundliche Schnabel iſt ſchwarz; die Naſenlöcher ſind rund und befiedert; Kopf, Oberhals und Rücken haben ſchwarze, ringsum röthlich ausgezackte Federn, von letzterer Farbe wird der Kopf faſt ganz roth; der Steiß iſt halb weiß und halb kaſtanienfarben; die Kehle iſt ſchwarz mit Federn, welche gelbe Endungen haben; der Bauch weiß; die dunkelgrauen Schwungfedern gehen bis auf die Hälfte des Schwanzes, die vorletzten mit weißen und die letztern mit gelben Spitzen und Rändern; die nächſten Deckfedern ſchwarz mit weißen und kaſtanienfarben Rändern, die entfernteren werden weiß bekleidet; der gerade Schwanz iſt an der Wurzel weiß, dann ſchwarz, an der Spitze und den Seitentheilen aber ockerfarben; die Füße ſchwarz.

Dieſer Vogel wird in der Gegend um Schamahie überall angetroffen, bald allein, bald in Geſellſchaft.“

Er ſcheint mir gar nicht hierher zu gehören, ſondern eine beſondere Art von Sängern auszumachen, die vielleicht zu der Familie der Steinſchmätzer müßte geſetzt werden.

Beſſer als dieſe drey ſind mir folgende zwey Varietäten bekannt:

Var. C. Die gelbe Bachſtelze mit weißem Bauche.

M. fl. leucogaster.

Am Oberleibe iſt ſie wie die gemeine, am Unterleibe aber nur am After hellgelb, übrigens weiß. — Es ſchien mir ein junges Weibchen, das ſich aber ſchon gemauſert hatte.

Var. F. Die gefleckte gelbe Bachſtelze. M. Fl. varia.

Der ganze Kopf iſt weiß gefleckt; die hintern Schwungfedern des rechten Flügels ſind weiß; übrigens wie gewöhnlich. Ein anderes Exemplar war am Oberleibe weiß und aſchgrau gefleckt, am Unterleibe aber wie gewöhnlich und hatte einen weißen Schwanz. Vielleicht gehört hierher Var. D. B.

b) Arct. Zool. II. p. 297. G. Ueberſ. Bd. II. S. 369. G. Ueberſ. von Büffons Vögeln XVI. S. 69. B.
c) Voy. Vol. II. p. 187.
d) Latham Ind. orn. II p. 505. n. 10. B.
e) Ueberſ. Bd. XIV. S. 70. I. B.

Sie hat die Größe der weißen Bachſtelze (No. 1.) Ihr Schnabel iſt dunkelbraun; die obern Theile ſind braun; die untern ſchmutzigweiß, an den Seiten ins dunkelfarbige ſpielend; über den Augen ein weißlicher Streifen; quer über die Bruſt ein dunkelbraunes Band; die Schwungfedern ſind braun, mit grauen Rändern; der Schwanz braun, die zwey äußerſten Federn ausgenommen, deren größte Hälfte zunächſt am Ende weiß iſt; die Füße dunkelbraun.

9. Die Afrikaniſche Bachſtelze. (African W.)

Motacilla afra. L. I. 2. p. 962. No. 83. *f*).
La petite Bergeronette du Cap de b. E. Buff. ois. V. p. 274 *g*).

Sie iſt kleiner, als die vorige; ihr Schnabel ſchwarz, an der Wurzel breit, an der Spitze dünn, und ein wenig gebogen; die obern Theile des Körpers ſind gelblichbraun; die untern gelb, die untern Deckfedern des Schwanzes ausgenommen, die weiß ſind; über den Augen iſt ein ſchwarzer Streifen; die Flügel, der Schwanz (der die Hälfte der Länge des ganzen Vogels beträgt) und die Füße ſind ſchwarz, die hintere Klaue iſt die größte.

Vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

10. Die Tſchutſiſche Bachſtelze. (Tſchutſchi W.)

Motacilla tſchutſchensis. L. I. 2. p. 962. No. 82. *h*).
Tſchutſchi Wagtail. Arct. Zool II. p. 397 *i*).

Der Scheitel und der Rücken ſind dunkelolivenbraun; zwiſchen der obern Kinnlade und dem Auge iſt ein weißer Fleck; die Deckfedern und die großen Schwungfedern ſind braun, jene mit zwey weißen Streifen durchzogen; Bruſt und Bauch weiß, mit Roſtfarbe geſtreift; der After hellgelb; der Schwanz ſehr lang; die ganze äußere, und die Hälfte der innern Fahne der äußerſten Schwanzfeder weiß; alle übrigen dunkelbraun; die Füße ſchwarz *k*).

Dieſe findet ſich auf der Küſte von Tſchutſchi.

11. Die grüne Bachſtelze. (Green W.)

Motacilla viridis. L. I. 2. p. 962. No 81. *l*).
Green Wagtail. Brown's illustr. p. 86. tab. 33.

Ihre Länge iſt vier Zoll *m*). Ihr Kopf aſchgrau; Hals, Rücken und Bruſt hellgrün; Flügel und Schwanz aſchgrau, mit weißen Rändern; der Bauch weiß.

Sie iſt auf Zeylan zu Hauſe.

---

f) Latham Ind. orn. II. p. 405. n. 11. B.
g) Ueberſ. Bd. XVI. S. 72. II. B.
h) Latham Ind. orn. II. p. 505. n. 12. B.
i) Ueberſ. II. S. 369. B.
k) Ich halte dieß für keine beſondere Art, ſondern für ein zum erſtenmal gemauſertes Weibchen der gelben Bachſtelze. B.
l) Latham ind. orn. II. p. 505. n. 13. B.
m) Auf der Kupferplatte, und in der Beſchreibung iſt die Größe nicht angegeben.

Zu-

Zuſätze:

12. Die ſchwarzgezäunte Bachſtelze.

Motacilla melanopa. L. I. 2. p. 997. No. 174.
— — Latham Ind. orn. II. p. 503. 4. 5.

Sie iſt kleiner als die gelbe Bachſtelze, hat kleinere Füße, und einen längern gleichen Schwanz, ſonſt aber ihre Geſtalt. Der Oberleib iſt bräunlichaſchgrau; der Unterleib gelb; Zügel und Gurgel ſind ſchwarz; die Augenbraunen weiß; eine weiße Linie geht vom Schnabelwinkel auf beyden Seiten des Halſes der Länge nach herab; die drey äußern Schwanzfedern ſind weiß, die äußerſte am äußern Rande ſchwarz.

Sie bewohnt die öſtlichen Eißufer von Dauurien und iſt ſelten.

13. Die Bachſtelze aus Hudſonsbay.

Motacilla hudsonica. Latham Ind. orn. II. p. 503. No. 6.

Sie iſt ſechs Zoll lang. Der Schnabel iſt ſehr kurz und braungelblich, ſo wie die Füße; der Oberleib dunkelbraun, alle Federn roſtfarben geändet; Kehle und Gurgel ſind hellroſtfarben mit dunkelgrauen Streifen; Bruſt, Bauch und Aſter weißlich: der Schwanz drey Zoll lang und ſchwärzlich, die äußerſte Feder ganz weiß, am ſchmälern Rande dunkelbraun, und die dritte in der Mitte der Länge nach weiß.

Sie bewohnt die Hudſonsbay.

14. Die Auſtraliſche Bachſtelze.

Motacilla australis.
Motacilla cinerea. subtus flava, gula fere albida.
White t. p. 239. — Meyers Zool. Entd. S. 54. Nr. 1.

Dieſer Vogel hat die Größe der gelben Bachſtelze, ſcheint aber ſtärker zu ſeyn. Der Schnabel iſt blaß gefärbt; der Oberleib aſchgrau, der Unterleib gelb, die Kehle faſt weiß; an den beyden mittlern Schwanzfedern ſind die Außenränder weißlich gezeichnet.

White oder vielmehr ſein Engliſcher Herausgeber ſind nicht recht darüber einig, ob dieſer Vogel ein Fliegenfänger oder Bachſtelze ſey, indeß glauben ſie, er habe mehr von einer Bachſtelze. Der Abbildung nach iſt dieß auch ſo, obgleich der Schnabelbau etwas Abweichendes zeigt. B.

Ein und vierzigſte Gattung. Sänger [d]).

Die Vögel dieſer Gattung haben einen dünnen und weichen Schnabel [e]); kleine, etwas eingedrückte (depressed) Naſenlöcher, und eine geſpaltene Zunge. Die äußerſte Zehe iſt an ihrem untern Theile an die Wurzel der mittlern befeſtigt.

Dieſe und die vorhergehende Gattung hat Linné mit einander vereinigt, Herr Pennant aber ſehr zweckmäßig getrennt, weil ſie in verſchiedenen Stücken ihrer Lebensart von einander abweichen. Die hieher gehörigen Vögel ſetzen ſich mehrentheils auf Bäume, ihr Gang iſt hüpfend, und nicht laufend [f]), und laſſen ſelten im Fluge einen Laut hören. Sie machen die zahlreichſte Gattung aus, und der größere Theil derſelben bewohnt die wärmern Gegenden, wo Inſekten aller Art, ihr eigenthümliches Futter, im Ueberfluſſe vorhanden ſind. Viele unter dieſer Gattung aufgeführte Vögel ſcheinen zu den Fliegenfängern (Flycatcher, Muscicapa) zu gehören; vielleicht findet ſich bey fernerm Nachforſchen, daß es ſich wirklich ſo verhält.

1. Die Nachtigal. (Nightingale.)

Motacilla Luscinia. L. I. 2. p. 950. No. 1. *g*). — Kramer elench. p. 375. No. 9. p. 376. No. 10. — Brünn. orn. p. 79. No. 270. — Müller Zool. p. 32. No. 265. — Frisch tab. 21. *h*). — Olin. uccell. pl. in p. I. — Sepp. Vog. pl. in p. 123. — Faun. Arrag. p. 88.

Sylvia Luscinia. Scop. ann. I. No. 227. *i*).

Le Rossignol. Briss. orn. III. p. 397. No. 13. — Buff. ois. V. p. 81. pl. 6. f. 1. *k*). — Pl. enlum. 615. No. 2.

Nightingale. Ray. Syn. p. 78. — Will. orn. p. 220. pl. 41. — Albin. III. pl. 53. — Br. Zool. I. No. 145. *l*). — Arct. Zool. p. 416. A. *m*). Br. Mus. Lev. Mus.

Die

d) Beym Linné, Motacilla, womit die vorhende Gattung vereinigt iſt; bey den beyden Schriftſtellern Latham und Pennant aber heißt jene bloß Motacilla und dieſe Sylvia, wie ſie auch Scopoli und a. [m. trennen. B.

e) Viele haben einen Ausſchnitt an der Spitze der obern Kinnlade; aber dieſer Character iſt nicht beſtändig.

f) Die Steinſchmätzer (Wheat-ears,) und einige andere, machen eine Ausnahme hievon.

g) Sylvia Luſcinia. Latham Ind. orn. II. p. 506. n. 1. B.

h) Taf. 21. Fig. 1. a. B.

i) Ueberſ. von Günther S. 189. No. 227. B.

k) Ueberſ. B. XV. S. 7. B.

l) Ueberſ. S. 109. Taf. 54. f. 2. B.

m) Ueberſ. II. S. 388. H. S. auch Zorns Pethinoth. II. S. 150. 337. 369. u. 688. meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 531. N. 1. und die N. G. der Stubenvogel. S. 359, wo ſich eine weitläuftige Beſchreibung dieſes Vogels befindet. B.

Dieſer Vogel, ob er gleich unſcheinlich iſt, verdient doch den erſten Platz unter den Sängern wegen ſeiner reizenden Stimme. Er iſt größer, als eine Braunelle (Hedge sparrow; ſ. No. 6. Modacilla modularis L.), und ſeine Länge beträgt ſechs und ein Viertel Zoll. Der Schnabel iſt braun; Kopf und Rücken ſind hell lohfarben, mit olivenfarbigen Ueberzug; der Schwanz dunkel lohfarbenroth; die untern Theile ſind hellaſchfarben, und werden gegen den After hin weiß; die Schwungfedern ſind aſchbraun, mit röthlichbraunen äußern Rändern; die Füße aſchbraun *).

Männchen und Weibchen ſind ſich ſehr gleich.

Die Nachtigall iſt ziemlich gemein in England, doch ſieht man ſie nicht in den nördlichen Provinzen, und ſelten in den weſtlichen. Yorkſchire iſt das entfernſte Land, in das ſie zieht, und in Devonſchire und Cornwall ſieht man ſie faſt gar nicht. Sie beſucht unſer England zu Anfang des Aprils, und zieht zuweilen im Auguſt ſchon wieder weg. Man findet ſie in Sibirien, Schweden, Deutſchland, Frankreich, Italien und Griechenland, aller Orten aber iſt ſie ein Zugvogel, wie in England; inzwiſchen ſind wir in Rückſicht ihres eigenthümlichen Winteraufenthaltes noch nicht ins Reine; wahrſcheinlich iſt er aber Europa nicht. Eben ſo wenig wiſſen wir mit Gewißheit zu ſagen, ob ſie in Afrika zu Hauſe ſey °); daher können wir mit Recht ſchließen, daß ſie ſich, zu der Zeit, da man ſie in Europa nicht vorfindet, in Aſiatiſchen Gegenden aufhalte. Haſſelquiſt p) ſpricht von ihr, als von einem, in Paläſtina einheimiſchen Vogel; und Fryer q) verſichert, man fände ſie um Chulminor in Perſien. So wird ihrer auch als eines Chineſiſchen, Kamtſchadaliſchen r) und Japaniſchen s) Vogels erwähnt, in welchem letztern Lande ſie ſehr hoch geſchäzt und theuer verkauft wird; das nämliche iſt der Fall zu Aleppo, wo ſie in großer Menge zahm in den Häuſern gehalten, und den Leuten, die ſie in der Stadt zu beſitzen wünſchen, um einen geringen Preiß überlaſſen worden, ſo daß im Frühling keine freundſchaftliche Zuſammenkunft ſtatt findet, ohne das Concert dieſer Vögel t).

Wir

*) Die Farbe iſt ſo: Der Oberleib graubraun, roſtfarben überlaufen, welches die breiten Federränder machen, bey ältern Vögeln röthlich aſchgrau; der Steiß braunroth; Kehle, Bauch und After weiß; Bruſt und Seiten weißlich aſchgrau; die Kniebänder grau; die größten Deckfedern der Flügel meiſtens mit ſchwachen ſchmuzig weißen Spitzen; die Schwungfedern graubraun, roſtgelb eingefaßt; die breiten graden Schwanzfedern ſchmuzig roſtroth. Vögel, die in der Stube gehalten werden, ſind theils heller, theils dunkler von Farbe.

Das Weibchen iſt nur dem Kenner durch Haltung und Stellung kenntlich. B.

o) In der Reiſe nach den Canariſchen Inſeln (S. 104.) wird einer Nachtigall erwähnt, die nicht ſo ſchön ſingen ſoll, als die unſrige; daher bleibt es ungewiß, ob ſie auch die nämliche ſey.

p) Er ſagt, ſie ſey ſehr gemein an den Ufern des Nils.

q) Die Nachtigall, der liebliche Herold des Tages, iſt ein beſtändiger Bewohner (chearer) dieſer Luſtwäldchen, und zaubert mit ſeinen wirbelnden Tönen die ſchwermüthigſte Seele in freudige Entzückung. „Fryer's Trav. p. 248.

r) Ellis's Narrat. Vol. II. p. 229.

s) Kaempfer Japan.

t) Ruſſel Alepp. p. 7.

Wir wiſſen faſt mit Zuverſicht, daß ſie in Amerika nicht anzutreffen ſind, obgleich viele Vögel dieſes Landes gleichen Namen führen *).

Nur der niedrigſte Schwelger wird dieſe bezaubernde Sänger eſſen; inzwiſchen hat man mir geſagt, ihr Fleiſch käme dem des Ortolans gleich, und in Gaſcogne würden ſie für die Tafel fett gemacht. Jeder Schüler wird geleſen haben, daß Heliogabal Nachtigallenzungen gegeſſen habe; eben ſo wird ihm auch jenes famöſe Gericht des Römiſchen Tragödienſchreibers Aeſopus bekannt ſeyn, das aus den Zungen aller ſingenden oder ſprechenden Vögel zubereitet war *).

Das Weibchen macht ſein Neſt in irgend einen niedrigen Buſch, oder in eine dicht belaubte Hecke, denn nur ſolche Orte beſuchen dieſe Vögel. Es legt vier oder fünf grünlichbraune Eyer. Das Neſt beſteht von außen aus trocknen Blättern mit Gras und Faſern untermengt, und iſt inwendig mit Haaren oder Pflaum ausgelegt, obſchon nicht immer auf gleiche Weiſe. Ich habe auch geſehen, daß das Neſt auf einem etwas erhabenen Boden angebracht war. Nur das Weibchen ſitzt über dem Neſte und brütet die Eyer aus *), während das Männchen nicht weit davon, es mit ſeinem anmuthigen Geſange tröſtet *); ſobald aber die Jungen ausgekrochen ſind, hört es meiſtentheils auf zu ſingen, und theilt mit dem Weibchen die Mühe, für die Jungen zu ſorgen, und ſie zu äßen. Wenn die Jungen für ſich ſelbſt ſorgen können, ſo macht das Weibchen Anſtalt zu einer zweyten Brut, und der Geſang des Männchens beginnt von Neuem. Man hat auch bemerkt, daß ſie in einem Jahre dreymal, und in heißen Gegenden ſogar viermal gebrütet haben *). So hat man auch beobachtet, daß die Männchen wenigſtens in doppelter Zahl, gegen die Weibchen, vorhanden ſind *).

Die Nachtigallen ſind einſame Vögel, die ſich auch nicht einmal in kleinen Haufen zuſammenhalten; und ſehr ſelten findet man zwey Neſter nahe bey einander. Man nimmt dieſe Vögel, ihres Geſangs wegen, oft aus dem Neſte aus; man fängt ſie aber auch gleich bey ihrer Ankunft

*) Die Virginiſche, die Amerikaniſche, die Spaniſche Nachtigall: zuverläſſig lauter verſchiedenartige Vögel.

*) Dieſes Gericht ſoll ohngefähr 4843 L. 10. S. nach unſerm Gelde gekoſtet haben. Br. Zool. II. p. 656. Note.

*) Wie bey allen Motacillenarten, ſo brütet auch hier das Männchen etliche Stunden des Tages, ohngefähr von 9 bis 1 Uhr. B.

*) Gewöhnlich ſingt nur das Männchen, doch hat man hier und da auch ein Weibchen im Käfig ſingen gehört.

*) Hiſt. des. Ois.

*) Büffon ſagt, es ſeyn immer mehr Männchen als Weibchen; ſo daß, wenn eins getödtet wird, das Weibchen immer wieder einen neuen Gatten bekommt, und im Nothfall, auch wohl einen zweyten und einen dritten. Ich frage: wie wird für die überzähligen Männchen geſorgt? oder hat die Natur dieſen unglücklichen Wittwern (batchelor) einen eheloſen Zuſtand auferlegt? (Nach meinen Erfahrungen iſt es in Anſehung der Gleichheit des Geſchlechts hier wie bey allen Sängern, ja bey allen Vögeln. Und dieſe Büffonſche Beobachtung ſchreibt ſich wohl daher, daß jemand in dem erſten Gehecke faſt lauter Männchen gefunden hat. Dieß iſt ziemlich durchgängig der Fall bey allen Singvögeln. Bey der zweyten Hecke findet man aber auch oft nichts als Weibchen. B.)

Die Männchen kommen zuerſt, und etwa eine Nacht ſpäter die Weibchen, die ſelten ein Männchen bey ſich haben. Daher iſt denn kein Wunder, daß alle zuerſt gefangenen Vögel Männchen ſind. Br. Zool. II. p.

kunft, und, ob sie gleich alt sind, lehrt man sie doch die Gefangenschaft ertragen, wo sie dann so gut singen, als die von dem Neste ausgenommenen *a*) — So viel von ihrer Lebensart im Allgemeinen; denn alles hierher Gehörige würde einen ganzen Band anfüllen. Wer Lust hat, mehr zu wissen, der sehe die Brittische Zoologie nebst dem Anhange, wie auch Büffons Geschichte der Vögel nach, wo dieser Gegenstand sehr weitläufig abgehandelt ist.

1. Var. A. Der Sprosser. (Die größere Nachtigall. Greater N.)
Motacilla Luscinia L. I. 2. p. 950. No. 1. β. *b*)
Le grand Rossignol. Briss. orn. III. p. 400. — Buff. oif. V. p. 113. *c*)
Grosse Nachtigall. Schwenkfeld Av. Silef. p. 296.
Sprossvogel. Frisch tab. 21. f.
Slowick wickszy. Rzacz. Auct. Polon. p. 391.

Diese beschreiben die Schriftsteller um ein Beträchtliches größer, als die andere, und nach Frisch, singt sie auch besser. Ihr Gefieder soll eine Mischung aus braunroth und aschfarben seyn *d*).

Der nämliche spricht auch von einer dritten, die kleiner ist, als die zwey andern, und deren Gesang nur mit ihrer Größe in Verhältniß steht *e*).

Sie sollen vorzüglich in Schlesien gefunden werden, aber man trifft auch Nachtigallen von viel beträchtlicherer Größe um Anjou in Frankreich an.

a) Wenn ein alter Vogel bey seiner Ankunft eingefangen wird, so singt er nach den ersten sechs oder acht Tagen seiner Gefangenschaft, hört um die gewöhnliche Zeit auf zu singen, und fängt dann zu Ende des Decembers wieder an; und so alle Jahre; wenn sie aber aus dem Neste genommen werden, so singen sie das ganze Jahr hindurch, die Mauserzeit ausgenommen; und oft besser als eine wilde Nachtigall.
(Dieß letztere stimmt schlechterdings mit meinen vieljährigen Beobachtungen nicht überein. Die jungen aufgezogenen Nachtigallen schlagen gar selten ein, lernen immer fremde Töne und Strophen mit ihren natürlichen Gesang vermischen, und singen auch nicht das ganze Jahr hindurch, ob es gleich oft der Fall ist, daß sie länger als die sogenannten Wildfänge anhalten. Ich lobe mir einen rechten guten alten Vogel, der im Frühjahr gefangen wird, den man sich freylich aussuchen muß; denn auch unter den Nachtigallen giebt es Virtuosen und Stümper. Was hiervon zu bemerken ist, habe ich weitläuftig in meiner N. G. der Stubenvögel l. c. auseinander gesetzt. B.)

x) Latham Ind. orn. II. p. 506. n. 1. β. B.

c) Ueberf. XV. S. 59. B.

d) Ich halte diese Nachtigall für eine besondere Art und nenne sie Motacilla Philomela. Denn 1) ist sie weit größer, 2) der Kopf dicker, 3) die Farbe und 4) der Gesang verschieden. Der Oberleib ist schmutzig graubraun; die Kehle weiß, schwärzlich eingefaßt; die Brust hellgrau, dunkelbraun gesprengt; der Bauch schmutzig weiß; die Flügel sind dunkelbraun, die Schwungfedern schmutzig rostfarben eingefaßt; der Schwanz und die obern Deckfedern desselben breit, und schmutzig rothbraun, dunkler als bey der gemeinen Nachtigall. B.

e) Kramer elench. p. 376. p. n. 10?

1. Var. B. Die weiße Nachtigall. (White N.)

Motacilla Luscicia L. I. 2. p. 950. N. 1. γ.
Le Rossignol blanc. Briss. orn. III. p. 401. — Buff. oiſ. V. p. 114. — Aldrov. Av. II. p. 777.

Sie hat die Größe der gemeinen Nachtigall, iſt aber ganz weiß *f*). Man ſieht auch andere, bey denen Kopf, Hals, Flügel und Schwanz weiß ſind; das übrige Gefieder hellbraun und weiß melirt *g*).

2. Die Madegaſkariſche Sänger. (Madagascar Warbler.)

Motacilla madagascariensis L. I. 2. p. 952. No. 56. *h*)
Le Rossignol de Madagascar. Briss. orn. III. p. 401. No. 14. pl. 22. f. 1.
Le Foudi-jala. Buff. oiſ. V. p. 116.

Sie die Größe unſrer Nachtigall, und ihre Länge iſt faſt ſiebenthalb Zoll. Ihr Schnabel iſt dunkelbraun; der Kopf gelbroth; hinter jedem Auge iſt ein brauner Fleck; die obern Theile des Körpers ſind olivenbraun; die Kehle weiß; die Bruſt hellroth; der Bauch rothbraun, ins Olivenfarbne ſpielend; der Schwanz oben olivenbraun, unten ins Olivenfarbne ſpielend; die Füße dunkelbraun.

Man trifft ſie in Madagaskar an, wo ſie Foudi-jala genannt wird.

3. Die Gartengrasmücke. (Pettychaps.)

Motacilla hortensis L. I. 2. p. 955. No. 62. *i*)
La Fauvette. Briss. orn. III. p. 372. No. 2.
— — Buff. ois. V. p. 117. pl. 7. k).
— — Pl. enlum. 579. f. 1.

Sie hat die Größe der Braunelle, und iſt ſechs Zoll lang. Ihr Schnabel iſt ſchwärzlich; die Wurzel der untern Kinnlade heller; das Gefieder an den obern Theilen graulichbraun; am dunkelſten am Kopf; von der Wurzel des Schnabels geht ein weißlicher Streifen, über das Auge hinweg, und nicht über daſſelbe hinaus; die untern Theile ſind gelbröthlichweiß, gegen den After hin am meiſten in die letzte Farbe ſpielend; die Schenkel und die Seiten gränzen ans Graue; die Schwungfedern ſind aſchbraun, mit gräulichen Rändern; der Schwanz iſt braun, mit

f) Sie wurde für ein, der Agrippina, der Gemahlin des Kaiſers Claudius, würdiges Geſchenk gehalten, für welches 6000 Seſterzien geboten wurden. Plin. hist. nat. t. X. c. 29.

g) Dieß nenne ich Var. B. die bunte Nachtigall.
M. Luscinia varia.
Ich habe einige Exemplare geſehen, an welchen der Kopf weiß war, ſo wie einige Flecken auf den Flügeln.
Var. C. Die ſchwarze Nachtigall.
M. Luscinia nigra.
Sie iſt braun oder rauchſchwarz und wird in der Sonne ſo.

h) Latham Ind. orn. II. p. 507. n. 2. B.

i) Latham Ind. orn. II. p. 507. n. 3. B.

k) Ueberſ. Bd. XV. S. 64. B.

mit graubraunen Rändern; die äußere Feder an der äußern Fahne und gegen die Spitze der innern ſchmutzigweiß, wodurch die Feder ſchief abgetheilt wird *l*); die Füße braun *m*).

Dieß iſt eine in Frankreich und Italien gemeine Art, wo ſie ſich in Feldern und Gärten aufhält, und oft an den Erbſenſtengeln niſtet. Ihr Neſt beſteht aus dürren Kräutern, mit feinen Faſern und Haaren ausgelegt. Der Eyer ſind fünf an der Zahl.

Ein dieſem Vogel ſehr nahe verwandter, wo nicht der nämliche Vogel, iſt auch in England nicht ſelten. Größe und Länge ſind die nämlichen; die obern Theile grünlichbraun, mit einem Anſtrich von Grünen; die untern dunkelweiß, über die Bruſt herüber und über den Schenkeln etwas ins Braune ſpielend; die Schenkel ſelbſt ſind noch dunkler; Schwungfedern und Schwanz dunkelfarbig, mit der Hauptfarbe der obern Theile verändert, alle Federn der letztern aber von einer Farbe; über dem Auge iſt eben auch eine undeutliche Spur von Weißem, wie bey dem oben beſchriebenen; Schnabel und Füße braun *n*) (vielleicht im Cabinet ſonſt ſind letztere aſchgrau. B.)

Dieſer Vogel iſt nicht ſelten in Lancaſhire, woher mir Sire A. Lever ein Paar geſchickt hat. Männchen und Weibchen ſind einander ſehr gleich. Die Eyer ſind ſchmutzigweiß, mit unregelmäßigen, dunkeln Flecken von verſchiedener Größe, beſonders in der Mitte, und hier und da ein ſchwarzes Streifchen (scratch.) Ich erhielt ihn unter dem Namen: Pettichaps.

3 * Die Baſtardnachtigall. (Lesser Pettychaps.)

Metacilla Hippolais. L. I. 2. d. 954. No. 17 *o*).
Pettychaps, or Beccafigo. Ray Syn. p. 79. A. 7. — Will. orn. p. 216. — Br. Zool. I. No. 249. (die Beſchreibung.) *p*)

l) Die Spitze der vorletzten Feder iſt auch weiß. Hist. des Ois.

m) Dieſen Vogel habe ich in Thüringen in ſeinem vollkommenen Zuſtande nicht ſo angetroffen; ich kenne ihn alſo nicht, wenn es nicht ein junger der gemeinen Grasmücke (M. sylvia. Lin.) iſt. Dieſe ſehen gerade ſo aus; und mit dieſem Vogel trifft auch die unten angegebene Geſchichte des Vogels überein. Vielleicht, daß die Beſchreibung von einem ſolchen Vogel, den man im Julius und Auguſt in Menge antrifft, genommen iſt. B.

n) Dieſen Vogel kenne ich ſehr wohl, und in meiner N. G des In- und Auslandes I. 1. S. 535 habe ich ihn dem Namen graue Grasmücke (Motacilla dumetorum,) der aber nun beſſer, da auch Latham dieſen Vogel hier herzählt, (M. hortensis) heißen ſollte, gegeben, obgleich der Linne'iſche Name einen andern Vogel, aber keinen andern als Motacilla Curruca bezeichnet. Dieſer Name war alſo noch leer. In meiner N. G. Deutſchlands Bd. IV. Taf. 13. ſteht eine Abbildung mit einer ſehr genauen Beſchreibung. Mit dieſem Vogel geht die Verwirrung unter den Motacillen an, ſowohl was Beſchreibung als Geſchichte und Synonymen betrifft. In meiner N. G. Deutſchlands habe ich daher die vollſtändigſte Beſchreibungen und Geſchichten allezeit mit einer Abbildung begleitet geliefert, und ich hoffe dadurch allen Mißverſtändniſſen vorgebeugt zu haben. Die Synonymen hier zu berichtigen und zu verbeſſern, iſt faſt eine unnütze Arbeit, da alles gar zu ſehr unter einander geworfen iſt. B.

o) Latham Ind. orn. II. p. 507. n. 4. B.

p) Ueberſ. S. 112. B.

Etwas kleiner, als ein gemeiner Hänfling. Der Schnabel kurz, die obere Kinnlade schwarz, die untere bläulich; die innere Seite des Mundes fleischfarbig; über und und unterdem Auge eine gelbliche Linie; der Kopf, der Hals, und die obern Theile grünlichaschfarben; Schwungfedern und Schwanz mausfarben, mit grünlichen Rändern und Schäften; die untern Deckfedern der Flügel gelb; der Bauch silberweiß; die Brust dunkler, und Gelb angeflogen, die Füße bläulich oder bleyfarben.

Diese Art ist häufig in verschiedenen Gegenden Englands, und macht ein gewölbtes Nest, das aus dürren Binsen, mit ein wenig Moos untermengt, besteht, und dick mit Federn ausgelegt ist; es ist auf dem Boden unter einem Grasbusch, oder an dem Grund eines Strauches angebracht. Der Eyer sind fünf an der Zahl, weiß und über und über mit kleinen, rothen Flekken gesprenkelt, hauptsächlich an dem breitern Ende *q*). In Dorsetshire kennt man sie unter den Namen: Heuvogel (Haybird *r*). In Yorkshire wird sie Strahlenvogel (Beambird) genannt *s*)."

4. Die

q) Beschreibung und Geschichte passen nicht auf auf die eigentliche Bastardnachtigall (Motacilla Hippolais. L.) Es ist hier ein Vogel beschrieben, den ich Motacilla Fitis nenne, und den ich nirgends so genau, wie hier, beschrieben gefunden habe. Vergl. N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 543. Nr. 23. N. G. Deutschlands Bd. IV. Taf. 28. und N. G. der Stubenvögel. Nr. 107.

Ich will hier eine hinlängliche Beschreibung der Bastardnachtigall geben. (Vergl. auch N. G. Deutschlands IV. Taf. 24.) Der Schnabel ist 7 Zoll lang, gerade, stumpf, an der Wurzel breit, oben grau ins Bläuliche und unten gelb ins fleischfarbene spielend mit gelblichen Schnabelwinkeln und citrongelben Rachen; der Augenstern dunkelbraun; die Füße sind bleyfarben; die Schienbeine 10 Linien hoch. Der spitzig zulaufende Kopf, der Rükken, Steiß, die kleinen Deckfedern der Flügel sind olivenfarbig aschgrau; von den Nasenlöchern läuft bis zu den Augen ein hellgelber Streifen; der ganze Unterleib ist schön hellgelb; die Flügel sind dunkelbraun, die hintern so stark weiß kantirt, daß davon ein weißlicher Fleck gebildet wird; der Schwanz ist dunkelbraun.

Das Weibchen ist etwas blässer und der gelbe Augenstreifen ist undeutlicher.

Dieser Vogel hält sich in Laubhölzern auf; kommt im Mai an, und zieht im August wieder weg. Sein Gesang ist außerordentlich melodisch, daher man ihn auch, ob er gleich sehr zärtlich ist, im Käfig hält. Sein Nest stellt er auf einen Busch oder kleinen Baum. Er ist schön gebaut, äußerlich mit Puppenhülsen oder wo es seyn kann, mit weißen Birkenschaalen überzogen. Die Eyer sind fleischroth und braunroth punktirt, an der Zahl 5 bis 6. Er nistet nur einmal des Jahrs.

Ich habe auch eine Spielart angetroffen, die auf jedem Flügel einen großen weißen Fleck hatte, welcher von den breiten weißen Rändern der großen Deckfedern und hintern Schwungfedern herkam. Ich nenne sie

Var. A. Die weißflügelige Bastardnachtigall.
M. H. leucoptera. B.

r) Obige Nachrichten verdanke ich den verehrungswürdigen Herrn Lightfoot. Vogel, Nest und Eyer sind in der Sammlung der verwittweten Herzogin von Portland, zu Bulstrode.

s) Br. Zool.

4. Die kleine Grasmücke. (Passarine W.)

Motacilla passerina. L. I. 2. p. 954. No. 61 *t*).
La petite Fauvette. Briss. orn. III. p. 374. No. 5.
Passerinette. Buff. ois. V. p. 123. — Pl. enlum. 579. f. 2. *u*)
Borin. Aldrovand. Av. II. p. 733. tab. in p. 735. Johnston 416. tab. 44. — Ray Syn. p. 81. No. 10. — Will. orn. p. 216.

Sie iſt kleiner, als die letzte, und nur fünf und ein Viertel Zoll lang. Ihr Schnabel iſt dünn, ſcharf, und braun von Farbe; der Augenſtern rothbraun; die obern Theile des Körpers hellaſchfarben *v*); die untern graulichweiß; die Seiten ins Braune ſpielend; über den Augen iſt ein kleiner, weißlicher Streifen; Schwungfedern und Schwanz ſind dunkelfarbig; die Füße bleyfarben *w*).

Dieſe Art iſt in verſchiedenen Gegenden von Europa, aber nicht in England zu Hauſe. Sie findet ſich in Provence in Frankreich, wo ſie Passerinette genannt wird. Bey den gemeinen Leuten in Bologna heißt ſie Chiwin; zu Marſeille, Becafigulo, und bey den Genueſern, Barin.

Ihr Neſt baut ſie in irgend einen niedern Buſch, nahe am Boden; z. B. in eine Stachelbeerſtaude. Es beſteht aus dürrem Laub, das auſſen ſehr grob (largest), innen aber zärter (finer) iſt. Der Eyer ſind vier an der Zahl, ſchmutzigweiß, mit Grün von zweyerley Schattirungen gefleckt, vorzüglich am breiten Ende.

Sie hat keine andere Stimme, als ein eine oder zweyfaches Zwitſchern, das ſie wiederholt, wenn ſie von einem Buſch zum andern hüpft.

5. Die ſchwarzköpfige Grasmücke oder der Mönch. (Blackcap.)

Motacilla atricapilla. L. I. 2. p. 970. No. 18. *x*) — Faun. Suec. No. 256. — Scop. ann. I. No. 229. *y*). — Kramer elench. p. 377. No. 15. — Brünn. orn. No. 278. 279. — Müller Zool. p. 33. No. 277. — Frisch tab. 23. — Olin. uccel. pl. in p. 9.
La Fauvette à tête noire. Briss. orn. III. p. 380. No. 6. — Buff. ois. V. p. 125. pl. 8. f. 1. *z*).
Blackcap. Ray. Syn. p 79. A. 8. — Will. orn. p. 226. — Br. Zool. I. No. 148. *a*) — Arct. Zool. II. p. 418. F. *b*).
Br. Mus. Lev. Mus.

Sie

t) Latham Ind. orn. II. p. 500. n. 5. B.
u) Ueberſ. XV. S. 72. Nr. 4. B.
v) Willughby ſagt, der Steiß ſey weiß, aber Briſſon noch Büffon erwähnen dieſes Umſtandes.
w) Dieſen Vogel kenne ich nicht, oder es iſt, wie es mir in der That ſcheint, der Weidenzeiſig, (Motacilla rufa et accredula,) dann trifft nicht nur ſeine Beſchreibung, ſondern auch, was Büffon und andere von ſeiner Naturgeſchichte erzählen, überein; nur das Neſt wäre von dem Müllerchen (M. Curruca) geborgt. B.
x) Latham Ind. orn. II. p. 508. n. 6. B.
y) Ueberſ. von Günther. S. 190. Nr. 220. B.
z) Ueberſ. Bd. XV. S. 75. Nr. 5. B.
a) Ueberſ. S. 112, Taf. 53. f. 5. B.
b) Ueberſ. II. S. 390, F. S. weiter Zorns

Pe-

Sie ist kleiner, als die Gartengrasmücke (No. 3.), und fünf und ein Viertels Zoll lang c). Der Schnabel ist braun; der Scheitel schwarz; die obern Theile des Körpers sind grünlich aschfarben; die Seiten des Kopfs und die untern Theile grau, das gegen den After hin sehr lichtgrau oder fast weiß wird; Schwungfedern und Schwanz braun, mit der nämlichen Farbe, die die obern Theile haben, geändert; die zwey mittlern Schwanzfedern sind die kürzesten; die Füße bleyfarben; die Klauen schwarz.

Das Weibchen geht blos darinn vom Männchen ab, daß sein Kopf statt schwarz, rostigkastanienbraun ist.

Dieser Vogel ist nicht selten in England und allenthalben in Europa, bis nach Italien, wo er überall brütet, im Frühjahr ankommt, und im September wieder wegzieht.

Bey uns macht er alle Jahre nur ein Nest d), das gewöhnlich in einem niedrigen Gebüsche, nicht weit vom Boden, angebracht ist. Es besteht aus dürren Halmen, um den Umkreiß (verge) herum mit ein wenig Wolle und grünem Moos untermischt; inwendig ist es mit Wurfasern ausgelegt, und mit schwarzen Roßhaaren dünn bedeckt. Der Eyer sind fünf, von hellröthlichbrauner Farbe, mit einer dunklern Farbe gewölkt (mottled), und mit einigen wenigen dunkeln Flecken gesprenkelt.

Das Männchen wechselt mit dem Weibchen im Brüten ab; und die Jungen hüpfen sehr frühzeitig aus dem Neste, besonders wenn sich ihm jemand nähert, und verlassen es auf immer.

Seine Nahrung ist nicht blos auf Insekten eingeschränkt, denn, in Ermangelung derselben; frißt er auch die Früchte des Zeilands (Spurge Laurel), des Speyerlings (Service) und Epheus e). Letztere scheint er sogar sehr gerne zu fressen, weil er sich häufig auf solchen Bäumen aufhält, die damit überwachsen sind; und ich habe mehr als einmal Epheubeeren in dem Magen dieser Vögel gefunden, zu einer Zeit, wo es Insekten aller Art in Menge gab. Auch habe ich einmal gesehen, daß ein Paar auf einem alten Epheubaum sehr hoch vom Boden nistete.

Sein Gesang wird sehr geschätzt, und in mancherley Rücksicht selbst dem der Nachtigall gleich geachtet; er giebt ihm auch wohl kaum etwas nach (Scarcely deficient), es müßte denn der anmuthigen Abwechselung der Stimme seyn f). Daher ihn auch einige die Spott-Nachtigall (Mock Night-ingale) genannt haben.

Hievon giebt es drey Spielarten g):

1. Var.

Pethinoth. II. S. 372. Meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 534. Nr. 3. N. G. der Stubenvögel. S. 398. Nr. 91. und N. G. Deutschlands. Bd. IV. Taf. 12. (Weibchen.) B.

c) Sie ist vielmehr etwas größer. B.

d) In Italien brütet er des Jahrs zweymal. Olina. (So auch in Thüringen. B.)

e) Bey uns in Thüringen frißt er Insecten, Johannis- und Holunderbeeren. B.

f) Der Vorzug liegt hauptsächlich in der anmuthigen flötenden Stimme, und darin, daß er in der Stube des ganzen Jahr singt, da die Nachtigall aufs höchste nur ein halbes Jahr anhält. B.

g) Vielleicht daß dessen angegebene Varietäten andern Motacillen sind, oder gar unter die Fliegenfänger gehören. Ich habe noch keine davon gesehen. B.

5. Var. A. Motacilla atricapilla. L. I. 2. p. 970. No. 18. β. gg).
La Fauvette à tête noire. Briss. orn III. p. 383.
Ficedula varia. Aldrov. Av. II. p. 579.

Diese unterscheidet sich von der erstern dadurch, daß sie durchaus schwarz und weiß geschäckt ist.

5. Var. B. Motacilla atricapilla. L. I. 2. p. 970. No. 18. γ. h).
La petite Columbade. Buff. ois. V. p. 131. i).

Diese ist etwas größer; die obern Theile sind von dunkler, fast schwärzlicher Farbe; die Kehle ist weiß; die Seiten sind grau.

Sie findet sich in Provence, wie sie sich in den Wäldern aufhält.

5. Var. C. Motacilla atricapilla. L. I. 2. p. 970. No. 16. δ. k).
Fauvette verdâtre de la Louisiane. Buff. ois. V. p. 162. l).

Von der Größe des Mönchs. Der Schnabel ist dunkelfarbig; der Scheitel schwärzlich; der Hinterhals dunkelaschfarben; die Seiten und der Rücken hellbraun, mit einem Anstrich von Grünem; Flügel und Schwanz schwärzlich mit bräunlichgrünen Rändern; bey den Augen ist ein weißer Streifen; die Kehle ist weiß; die untern Theile des Körpers sind grau.

Sie ist in Louisiana zu Hause.

6. Das Müllerchen oder die geschwätzige Grasmücke. (Babbling W.)

Motacilla Curruca. L. I. 2. p. 954. No. 6. m). — Faun. Suec. No. 247. — Scop. ann. I. No. 228. mm). — Müller Zool. p. 3. No. 267.
La Fauvette Babillarde. Briss. orn. III. p. 384. No. 7. — Buff. ois. V. p. 135. n) — Pl. enlum. 586. f. 3.
Beccafigo cannabino. Olin. uccell. p. 11. f. 2. — Will. orn. pl. 23. o). Br. Mus.

Ihre Länge ist fünf Zoll. Der Schnabel ist schwärzlich; der Scheitel aschbraun; die übrigen obern Theile eben so, aber ins Braune spielend; unter den Augen ist ein dunkel aschfarbner Streifen; die untern Theile und der Rand (edge) der Flügel sind gelbröthlichweiß; die Schwungfedern braun, inwendig weiß — und auswendig gelbröthlichweiß gerändert; die größern aber aschfarben; der Schwanz braun, mit grauen Rändern; an der äussern Feder zu beyden Sei-

gg) Latham Ind. orn. I. c. β. B.
h) Lath. Ind. orn. I. c. 8. B.
i) Uebers. XV. S. 89. B.
k) Lath. I. c. B.
l) Uebers. B. XV. S. 152. Nr. 4. B.
m) Latham Ind. orn. II. p. 509. n. 9. B.
mm) Uebers. S. 189. Nr. 228. B.
n) Uebers. B. XV. S. 97. Nr. 7. B.
o) Arct. Zool. II. p. 422. U. Uebers. B. II. S. 395. U. Vergl. N. G. des In- u. Auslands. I. 1. S. 536. Nr. 6. N. G. der Stubenvogel. 414. und N. G. Deutschlands IV. Taf. 16. Frisch. Taf. XXI. f. 2. a. B.

Seiten ist die äußere Fahne und die Spitze weiß; die innere Fahne aschgrau, und weiß eingefaßt; die mittlere Feder ist die kürzeste, wodurch der Schwanz etwas gabelförmig wird; die Füße sind braun *p*).

Diese Art ist in Frankreich und Italien zu Hause, wo sie sich in Hecken aufhält, und darin nicht weit vom Boden nistet *q*). Die Eyer sind grünlich, und schwarz punktirt *r*).

Ihre Nahrung besteht größtentheils in Raupen.

Skopoli bemerkt, sie sey ein unruhiger, vorlauter Vogel, der die Stimme anderer Vögel nachahme *s*), und halte sich im Sommer in den Gärten zu Pisa auf, wo sie Bianchetto genannt würde.

7. Die Binsen-Nachtigall. (Reed W.)

Motacilla Schoenobaenus. L. I. 2. p. 953. No. 4. *t*). — Faun. Suec. No. 246.

p) Bey dieser und der gemeinen Grasmücke (Motacilla Sylvia L.) Nr. 23. herrscht unter den Schriftstellern die größte Verwirrung. Wirklich sind auch die beyden Vögel wovon man aber gewöhnlich nur einen, das Müllerchen beschreibt, einander sehr ähnlich, sowohl in Gestalt als Lebensart. In meiner N. G. Deutschlands habe ich sie nach der Natur genau unterschieden, und ich stimme dort Hrn. Tengmalm (Schwed. Abh. 1783. S. 81) vollkommen bey, der zuerst den Unterscheid genau angegeben hat. Er sagt: die Motacilla Curruca (Krukan) und M. Sylvia, sind einander ganz ähnlich und leicht zu verwechseln. Beyde sind oben grau, unten weiß, mit einiger Beymischung von roth. Beyde halten sich in Gärten auf und thun, wie die Gärtner meynen, an den Erbsen Schaden, (vielleicht suchen sie die Würmchen in den Schoten). Man nennet sie daher beyde Erbsenvögel. Sie unterscheiden sich aber 1) durch die Größe. M. Sylvia ist so groß als eine gemeine Motacilla, aber M. Curruca gehört unter die kleinsten. 2) M. Sylvia ist am Kopfe aschgrau, am Rücken grau, rostfarbig. Die Schwungfedern an der äußern Kante sind rostfarbig. M. Curruca hat nur eine Farbe, am Kopfe und Rücken aschgrau und keine Beymischung von Rostfarbe; außerdem noch einen kleinen, dunklern Flecken hinter dem Ohre, der gar nicht bey Sylvia ist.

Ich will noch hier die genaue Beschreibung beyfügen: die geschwätzige Grasmücke ist der gemeinen an Farbe und Gestalt ähnlich, aber kleiner und nicht so rostfarben auf den Flügeln. Ihre Länge beträgt 5 Zoll, wovon der Schwanz etwas über 2 Zoll mißt. Der Schnabel ist 5 Linien lang, sehr spitzig, schwarz, unten blaulich; der Augenstern doppelringig, auswendig weißgelb und inwendig goldglänzend braun; die Füße sind schwarzblau; die Schienbeine 7 Linien hoch. Kopf und Steiß sind röthlichdunkelaschgrau: der übrige Oberleib grau, röthlich überlaufen und die Wangen dunkler als der Kopf; der Unterleib weiß, an der Kehle weiß, an den Seiten der Brust etwas röthlichgrau und in den Seiten röthlich überlaufen; die kleinen Deckfedern der Flügel blaßbraun, die großen und die Schwungfedern dunkelbraun, alle röthlichgrau eingefaßt; der Schwanz dunkelbraun, die äußerste Feder mit einem keilförmigen weissen Fleck, die andern mit röthlichgrauen Rändern.

Das Weibchen ist sehr schwer, fast gar nicht vom Männchen zu unterscheiden; doch sieht man, wenn man beyde Geschlechter beysammen hat, deß es einen etwas hellern Kopf und hellere blaue Füße hat.

q) Am liebsten in Stachelbeerbüschen. B.

r) Aschfarben, mit rostigrothen Flecken. Faun. Suec. (Sie sind weiß, besonders am obern Rande aschgrau und gelbbraun gefleckt. B.)

s) Ist ungegründet. B.

t) Latham Ind. orn. II. p. 510. n. 10. Hier führt Hr. Latham auch Arct. Zool. II. n. 419. I Uebers II. S. 391. J. an. Allein dieß ist ein anderer Vogel nach der Größe zu urs-

246. — Scop. ann. I. No. 235. *u*). — Faun. Arab. p. 6. No. 17.
Motacilla yvica. Hasselq. iter. p. 186. No. 50.
La Fauvette de bois, ou la Roussette. Briss. oru. III. p. 393. No. 11. — Buff. ois. V. p. 139. *v*) Ray. Syn. p. 80. No. 1.
Small Nightingale. Will. orn p. 237.

Sie hat die Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3). Ihr Schnabel iſt ſchwärzlich, der Kopf, der Hinterhals, die Bruſt, der Rücken, der Steiß, die Deckfedern der Flügel und des Schwanzes ſind braun und gelbroth, nämlich, jede Feder iſt braun, und gelbroth eingefaßt. Die Kehle der Vorderhals, der Bauch, die Seiten, die Schenkel und der After ſpielen ins Gelbrothe; die Schwungfedern ſind braun, mit gelbrothen Rändern; der Schwanz iſt ganz braun; die Füße weißlich *w*).

Dieſe findet ſich ſowohl in Frankreich als in Italien, und iſt auch in Schweden zu Hauſe. Ob ſie in letzterm Lande ein Zugvogel ſey, weiß ich nicht; im ſüdlichen Frankreich aber pflegt ſie zu überwintern, indem ſie ihren Standort verändert, wie der braunkehlige Steinſchmätzer *x*) in England.

Sie niſtet in den Wäldern und ihr Neſt beſteht aus Moos und Wolle, worein ſie vier bis fünf himmelblaue Eyer legt *y*).

Die Jungen ſind ſehr leicht aufzuziehen; und der Vogel überhaupt ſehr zahm und zutraulich. Sein Geſang iſt nicht unangenehm; beſonders da er uns den Winter hindurch damit ergötzt *z*).

8. Die Waſſernachtigall. (Aquatic W.)

Motacilla aquatica. L. I. 2. p. 953. No. 58. *a*).
Sylvia Schoenobaenus. Scop. ann. I. No. 235. *b*)

Dieſe ſcheint mir eine von der letzten verſchiedene Art zu ſeyn.

Skopoli beſchreibt den Vogel ſo; die obern Theile ſind hell gelbroth, mit braunen Flekken; Kehle und Bruſt ins Gelbrothe ſpielend; Bauch und Steiß weißlich; ſo iſt auch ein weißlicher

urtheilen, und hiermit ſtimmt Linne in Faun. Suec. l. c. überein. B.

u) Ueberſ. S. 194. Nr. 235. Hier wird der braunkehlige Steinſchmätzer (M. Rubetra) beſchrieben. B.

v) Ueberſ. B. XV. S. 106. Nr. 8. wie Büffon beſchreibt Latham eine junge Braunelle; Beſchreibung und Geſchichte zeigen dieſes deutlich. B.

w) Dieſer Vogel macht eine Zuſammenſetzung aus der jungen Braunelle (Mod. Modularis L.) und dem braunkehligen Steinſchmätzer (M. Rubetra L.) aus. Pennant und Linne beſchreiben leztern allen Vermuthen nach, und Büffon und Latham erſtern. Bey beyden trifft auch die angegebene Eyerfarbe zu. B.

x) Whin-Chat. M. Rubetra L.

y) Dieſer Aufenthaltsort paßt blos auf die Braunelle. B.

z) Paßt blos auf die Braunelle. B.

a) Latham Ind. orn. II. p. 510. n. 11. B.

b) Wie ich oben ſchon Note *u*. bemerkt habe, ſo fällt dieſer Vogel weg. Es iſt der braunkehlige Steinſchmätzer, und zwar ein junges Männchen oder altes Weibchen. Alles trifft wörtlich zu. B.

licher Fleck über dem äußern Augenwinkel, und ein weißes Band an der Wurzel der Flügel; die Schwanzfedern sind zugespitzt. Er sagt: er nistle auf dem Boden; man sehe ihn oft auf den Spitzen der Pflanzen sitzen; er wandere zeitig im Herbst, und heiße bey den Italiänern, Grisato. Da dieser Vogel wandern soll, so vermuthe ich, daß er eine, von der vorigen verschiedene Art sey; ausserdem können beyde einigermaßen mit einander überein.

9. Die Braunelle. (Hedge W.)

Motacilla modularis. L. I. 2. p. 952. No. 3. — Faun. Suec. No. 245. — — Brünn. orn. p. 70. No. 269. — Müller Zool. p. 32. No. 266. — Frisch tab. 21. fig. 2. b.

La Fauvette de Haye, ou la Passebuse. Briss. orn. III. p. 394. No. 12.

Le Traine-buisson, Mouchet, ou la Fauvette d'hiver. Buff. ois. V. p. 151. pl. 9. *d*) — Pl. enlum. 615. f. 1.

Hedge Sparrow. Ray Syn. p. 791. A. 6. — Will. orn. p. 215. — [Albin. III. pl. 39. — Br. Zool. I. No. 150. — Arct. Zool. II. p. 418. *e*). Br. Mus. Lev. Mus.

Dieser wohlbekannte Vogel mißt fünf und ein Viertel Zoll. Sein Schnabel ist schwärzlich; der Augenstern nußbraun; der Kopf dunkelbraun, aschfarben gemischt; die Wangen sind mit länglichen, schmutzigweißen Flecken bezeichnet; der Rücken und die Deckfedern der Flügel dunkelbraun, mit röthlichbraunen Rändern; Schwungfedern und Schwanz dunkelbraun; der Steiß grünlichbraun; Kehle und Brust dunkelaschfarben; der Bauch schmutzigweiß; die Seiten, die Schenkel und der After hell lohgelblichbraun; die Füße matt fleischfarben.

Beym Weibchen sind die Farben minder lebhaft, als beym Männchen.

Dieser Vogel hält sich in England in Hecken auf, und ist sehr gemein. Sein Nest macht er aus Moos und Wolle, und legt es mit Haaren aus; er legt vier bis fünf Eyer, von schöner, hellblauer Farbe. Bey uns, und in den mehr nördlich gelegenen Ländern, sieht man ihn zu jeder Jahrszeit, in Frankreich aber ist er ein Zugvogel, der im October ankömmt, und im Frühjahr wieder nach Norden zieht; doch bleiben einige wenige da; denn hier und da hat man sein Nest in Frankreich gefunden, obschon selten *f*).

Er ist ein Winterfänger; und sein Gesang wäre angenehm, wenn er uns nicht an die Annäherung des Winters erinnerte; denn er fängt mit dem ersten Froste an, und singt etwas in das Frühjahr hinein *g*). Die Worte Tit, tit, tit, die er so oft wiederholt, sind Ursache, daß man ihn Titling genannt hat; ein Name, unter dem man ihn an vielen Orten kennt.

Der Kuckuck legt oft seine Eyer in das Nest dieses Vogels.

10. Der

c) Latham Ind. orn. II. p. 511. n. 13. B.

d) Uebers. XV. S. 129. Nr. 12. B.

e) Uebers. II. S. 391. Vergl. Zorns Pethis noth. II S. 390. 153. Günthers Scopoli S. 193. Nr. 234. N. G. des In- und Auslandes. I 1. S. 536. Nr. 7. N. G. der Stubenvögel. S. 417. B.

f) In Thüringen bleiben zuweilen des Winters auch einige, wenn er nicht gar zu strengist. B.

g) Er singt im Sommer so gut als im Winter, bey uns im Winter gar nicht. Alsdann singt aber der Zaunkönig, der diesem im Gesang und Farbe ähnelt. B.

10. Der Binsensänger. (Rush W.)

Motacilla juncorum. L. I. 2. p. 952. No. 57. *h*).
Le Moineau de Virginie. Briss. orn. III. p. 101. No. 14.
Little brown Sparrow. Catesby Carol. I. p. 35.
Rush Warbler. Arct. Zool. II. No. 323. *i*).

Er ist kleiner, als unsre **Braunelle**, und vier und drey Viertel Zoll lang. Der Schnabel ist braun; die Hauptfarbe des Gefieders eben so, unten am hellsten; der Schwanz etwas gabelförmig; die Füße braun.

Er ist in **Virginien** und **Carolina** zu Hause, lebt von Insekten, hat so ziemlich die Eigenschaften der **Braunelle**, ist nicht zahlreich, aber sehr gemein bey den Häusern in **Virginien** und **Carolina**, das ganze Jahr hindurch.

11. Das gemeine Rothschwänzchen. (Redstart.)

Motacilla Phoenicurus. L. I. 2. p. 987. k) No. 34. — Faun. Suec. No. 257. — Scop. ann. I. p. 157. No. 232. *l*). — Brünn. orn. No. 280. 281. Müller Zool p. 33. No. 278. — Georgi Reise p. 174. — Frisch tab. 19. *m*). — Kram. elench. p. 376. No. 11. — Olina uccell. pl. in p. 47.
Le Rossignol de Muraille. Briss. orn. III. p. 403. No. 15. — Buff. ois. V. p. 170. pl. 6. f. 2 *n*). — Pl. enlum. 351. f. 1. 2.
Redstart. Ray Syn. p. 78. A. 5. — Will. orn. p. 218. — Albin, I. pl. 50. — Br. Zool. I. No. 146. *o*) — Arct. Zool. II. 416. B. *p*).
Lev. Mus.

Es ist etwas kleiner, als das **Rothkehlchen** (No. 38.) und fünfund ein Viertel Zoll lang. Der Schnabel ist schwarz; die Stirn weiß; der Scheitel, der Hinterhals, und der Rücken dunkel blaugrau, bey einigen fast schwarz; Wangen und Kehle schwarz; Brust, Steiß und Seiten roth; der Bauch weiß; die zwey mittlern Schwanzfedern braun, die übrigen roth; die Füße schwarz *q*).

h) Latham Ind. orn. II. p. 501. n. 14. **B.**
i) Uebers. II. S. 387. Nr. 240. **B.**
k) Latham Ind. orn. II. p. 511. n. 15. **B.**
l) Uebers. von Günther. S. 192. Nr. 232. **B.**
m) Fig. 1. a. Taf. 20. f. 1. a. f. 2. a. b. **B.**
n) Uebers. B. XV. S. 165. V. 9. **B.**
o) Uebers. S. 111. Taf. 53. f. 6. 7.
p) Uebers. II. S. 388. b. Vergl. ich Zorns Pethmoth. II. S. 386. Meine N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 539. V. 13. N. G der Stubenvögel Nr. 100. und N. G. Deutschland IV. Taf. 19. **B.**
q) Man verwechselt diesen Vogel immer mit dem Wistling Nr. 14. Ich will daher zur Vergleichung eine eigne Beschreibung beyfügen: Eine kleine Einfassung des Oberschnabels, Wangen und Kehle sind schwarz, letztere weiß bespritzt; der weiße Vorderkopf verbreitet sich in einen dergleichen Streifen über die Augen; Hinterkopf, Hinterhals, Rücken und kleine Deckfedern der Flügel sind dunkelaschgrau, röthlich überlaufen; der Steiß rostroth; die Brust, Seiten und der Oberbauch rostroth, letzterer weiß gewölkt; der Unterbauch und After rostgelb; die großen Deckfedern der Flügeln und ihre Schwungfedern dunkelbraun, rostgelb eingefaßt; der Schwanz rostroth, die beyden mittlern Federn dunkelbraun.

Das

Beym Weibchen sind der Scheitel und der Rücken aschgrau; das Kinn weiß; die Theile, die beym Männchen roth sind, sind es auch bey diesem, aber nicht so lebhaft; die Flügel sind bey beyden braun. Es ist ein Zugvogel, der sein Standquartier nach der Nachtigall und andern Zugvögeln abmißt, im Frühling ankommt, und im Herbst, etwa im October, weiter wegzieht. Ich glaube, er zieht früher oder später weg, nach Maasgabe, der mehr nördlich gelegenen Gegenden seines Sommeraufenthaltes *r*). In Italien sieht man ihn um einen Monat später, als bey uns *s*).

Er ist nicht so scheu, wie viele andere Vögel, in Rücksicht seiner (in respect to itself); denn er nähert sich den Wohnungen, baut oft sein Nest in das Loch einer Mauer, wo eine Menge Leute beständig vorüber geht, und ist schon zufrieden, wenn sich nur niemand um sein Nest bekümmert (meddles); denn die geringste Unordnung in den Eyern, oder nur das Hineingucken nach denselben, besonders wenn das Weibchen dadurch beunruhigt wird, macht, daß sie das Nest auf immer verlassen. Sie nisten auch oft in Baumhöhlen.

Das Nest besteht hauptsächlich aus Moos, mit Haaren und Federn ausgelegt. Die Eyer sind blau, vier bis fünf an der Zahl, denen der Baumnachtigall nicht unähnlich, aber etwas länger.

Sie bewegen oft den Schwanz *t*).

Es hält sehr schwer, diese Vögel in einem Käfig zu halten; denn sie gewöhnen sich auf keine Weise daran, wenn sie alt eingefangen worden sind; doch kann man sie vom Neste aufziehen, wenn man mit großer Sorgfalt zu Werke geht *u*).

Ihr

Das Weibchen ist sehr verschieden, sieht fast, wie das Weibchen des Wistlings, nur heller, aus. Es ist oben röthlich aschgrau; die Kehle weißlich, und ohngefähr vom fünften oder sechsten Jahre an schwarz und weiß gewölkt; die Brust schmutzig rostfarben, weiß gewölkt; der Bauch schmutzig weiß; der Steiß röthlich gelb; die großen Deckfedern der Flügel und die hintern Schwungfedern rostfarben eingefaßt. Wenn das Weibchen sehr alt wird, so bekommt es alle Farben des Männchens, nur weniger lebhaft, wie ich dieß an mehreren Vögeln beobachtet habe. Solche Weibchen legen gewöhnlich nicht mehr, und fliegen den Sommer hindurch von einem Orte zum andern. An den Fasanen bemerkt man diese Eigenschaft unter andern auch.

Die Jungen sehen, bis sie sich mausern, am ganzen Leibe rothgrau und weißlich geschuppt aus. Die jungen Weibchen haben nach der Maußer im Herbst fast einerley Farbe mit der Nachtigall und damit man sie nicht mit derselben verwechselt, darf man nur auf den schwarzen Schnabel und Füße sehen, die der Nachtigall fehlen. B.

r) Skopoli sagt, es ziehe im September weg. (In Thüringen in der ersten Hälfte des Octobers. B.)

s) Olina.

t) Es beugt den Schwanze nach der Seite, wie ein Hund, wenn er vergnügt ist, und nicht auf- und abwärts, wie die Bachstelze. Br. Zool. (Es schüttelt den Schwanz auf und nieder, und hin und her. B.)

u) Ich habe immer welche um mich herum in der Stube laufen, die ich im Herbst einfange. Freylich gewöhnen sich alsdann auch die jung ausgeflogenen besser als die alten. B.

Ihr Geſang iſt nicht ſtark, aber immer angenehm genug; und wenn ſie jung aufgezogen worden ſind, ſo ahmen ſie die Stimmen anderer Vögel nach, und ſingen oft bey Nacht ſo gut, als bey Tage *v*).

In der Wildniß iſt ihr Futter Inſekten, Fliegen, Spinnen, Ameiſenlarven u. d. gl. *vv*), wenn man ſie aber künſtlich aufzieht, ſo laſſen ſie ſich wie eine Nachtigall gewöhnen.

11. Var. A. Motacilla Phoenicurus. L. I. 2. p. 987. No. 34. *β*.
Le Rossignol de Muraille cendrè. Briss. orn. III. p. 406.
Aldrovand's third Redstart. Ray. Syn. p. 78. A. 5. var. 1. — Will. orn. p. 248.

Dieß iſt eine Spielart vom Männchen, und unterſcheidet ſich dadurch, daß ſie nur eine lange, weiße Linie an der Stirn hat, daß der Rücken mehr aſchgrau, und der untere Theil der Bauchs nicht weiß iſt *w*).

11. Var. B. Motacilla Phoenicurus. L. I. 2. p. 987. No. 34. *γ*.
Le Rossignol de Mourailln à poitrine tachetée. Briss. orn. III. p. 407.
Rothſchwaenzlein. Frisch. tab 20.

Dieß iſt ein Weibchen, das vom gemeinen blos darin abgeht, daß es eine rothe, gefleckte Bruſt hat *x*).

11. Var. C. Motacilla Phoenicurus. L. I. 2. p. 687. No. 34. *ε*. *y*).
Sylvia Tithys. Scop. ann. I. p. 157. No. 233. — Lin. Syst. Nat. ed. 10. No. 23.
Sko-

v) Ich habe auch gefunden, daß ſie im Freyen anderer Vögel Stimme nachahmen; ſo hörte ich einen auf einen Dachforſt den Finkenſchlag des Finken nachſingen, der am Fenſter desjenigen Hauſes hing, auf deſſen Dach er ſaß.

vv) Johannis- und Hollunderbeeren. B.

w) Es iſt ein Männchen nach dem erſten Mauſern. B.

x) Die alten Weibchen ſehen ſo aus, auch die jungen Männchen in der Mauſer. B.

y) Dieſen Vogel ſtellt Latham Ind. orn. II. p. 512. n. 16. als eine beſondere Art auf und dieß iſt er auch. Es iſt nämlich nichts anders als der Wiſtling oder das Hausrothſchwänzchen; wohin auch Nr. 12. und Nr. 16. gehören. Auch Büffon erwähnt ſeiner als einer Abart des Rothſchwänzchens, das ihm Hr. Orcy geſchickt hat (Ueberſ. I. c. S. 180.) Denn was man in Büchern gewöhnlich den Wiſtling (Motacilla erithacus L.) nennt, iſt das Weibchen des gemeinen Rothſchwänzchens, das junge Männchen des Rothſchwänzchens oder das einjährige Weibchen des Blaukehlchens. Ich will die Friſchiſchen hieher gehörigen Abbildungen noch erläutern, weil dieſe zu vielen Irrungen in der Geſchichte dieſer Vögel ſcheinen Anlaß gegeben zu haben:

Taf. XI. f. 1. a. das Schwarzkehlein. Es iſt das Männchen des gemeinen Rothſchwänzchens. Fig. 2. b. Ein junges Blaukehlein. Es iſt ein junges Männchen. Auch die Weibchen ſehen nach der zweyten Mauſerung ſo aus.

Taf. XX. f. 1. a. das Rothſchwänzchen mit ganz rothen Schwanze. Es iſt das Weibchen des Rothſchwänzchens, dem die mittleren braunen Schwanzfedern fehlen. b. Das Rothſchwänzchen mit halb rothen halb ſchwarzen Schwanze.

Es

Schnabel kaum länger als der Kopf, dick, an der Wurzel breit, vorn zusammengedrückt, mit scharfer Firste, gebogener Spitze und vorspringendem Zahne; Nasenlöcher klein, rund, offen, mit einer Haut bedeckt; Rachen mäßig; Zunge kurz, dick, fleischig, vorn ausgerandet, gefranzt; Füße mittelmäßig, stark, mit starken Zehen und Krallen; Flügel kurz, gewölbt, die dritte Schwinge die längste; Schwanz mittelmäßig, gerade abgeschnitten, aus zwölf Federn bestehend.

Der breite Schnabel und die kurzen Flügel machen diese Vögel sehr kenntlich.

Sie leben in Wäldern, nisten auf Bäumen und legen mehrere Eier.

Sie fressen Insekten, Würmer und Früchte.

Man hat bis jetzt nur wenige Arten dieser Gattung gekannt.

1. Der graue Rothschwanz. (Grey R.)

Muscicapa gibraltariensis. L. l. a. p. 328. No. 16. c).
Le Rossignol de Muraille de Gibraltar. Buff. orn. III. p. 407. No. 16. — Buff. ois. V. p. 17. d).
Grey Redstart. Lath. gen. syn. — Arct. Zool. II. p. 317. 21).

Er hat die Größe des gemeinen Rothschwanzes. Sein Schnabel ist durchaus schwarz; die Füße, die Zehen und die Krallen sind schwarz; der Schnabel weiß, und dieß zieht sich zuweilen auch an den Augen; der Scheitel, der Hals, der Rücken, die Deckfedern der Flügel, die Brust und der obere Theil des Bauches bleigrau, oder aschgrau; der untere Theil des Bauches weiß; die Schwungfedern graubraun, mit weißen Rändern; Steiß und Schwanz schwarz; die zwey mittelsten Federn des letzten sind braun, und alle andern haben braune Spitzen, die äußerste aufgenommen, die ganz weiß gefärbt ist; die Füße sind braun e).

Er ist in Gibraltar zu Hause.

2. Der feuerschwänzige Rothschwanz. (Der Singer mit feuerschwarzbraunem Steiß. Chestnut-bellied W.)

Muscicapa erythrogastra. L. l. a. p. 331. No. 16. b). — Gmelin. Lath. Ind. Ornith. Vol. XIX. p. 319. No. 4. tab. 13. 17.

Er hat die Größe des grauen Fliegenschnäppers und ist diesem ähnlich gebaut. Der Schnabel ist schwarz; die Augen sind braun; Stirne und Kehle schmutzig rothweiß (sordide albae); der Zügel, die Kehle, die Wangen und die Seiten, der Hals und die Stelle zwischen den Flügeln dunkel bleigrau; die Brust, der Bauch und der After dunkelfeuerbraun; Steiß und Schwanz eben so; die Flügel außen wie über die Mitte des Schwanzes schwarz; die Mitte der Schwungfedern,

a) Linkan. Ind. orn. II. p. 510. n. 27. B.
aa) Naturf. l. c. S. 179. B.
b) Naturf. II. S. 310. C. gehört zu No. 16. B.
bb) Das ist der Vogel Muscicapa Phoenicurus Linkan. Ind. orn. p. 510. n. 16. oder eine Art. II. Var. C. B.
c) Linkan. Ind. orn. II. p. 513. n. 18. B.

Schnabel Dickschnäbler. Eg. a.
a. Der Rothschwanz mit einer schwarzen Mittelfirste. Ein dem Weibchen vom Rothschwanz. b. Der Dickschnäbler mit rothgefärbter Brust. Ein junges im Herbst gleich nach der Mauser erlegtes Männchen des Feuerschwanzes. B.

[illegible]

Beym Weibchen ist der Stoß und der Schwanzfleck, als beym Männchen; die Seiten der äußern Schwanzfedern, und die vorigen grau marmorirt: der übrige Vogel ist einfarbig, eben am dunkelsten, wie beym Männchen am Bauche.

Dieser Vogel, sagt Gildenstädt, hält sich in den östlichen Gegenden der Caucasischen Enime das ganze Sommer hindurch auf; ist ein Zugvogel, der im Winter seine Wohnung südlicher nach Persien nimmt, und an den Ufern des Kuban kommt. Er streift überhaupt, besonders mit den Staaren, und hält gemeiniglich zusammen. Sein Flug kommt es gleichen die Art des Star-Wiegehens (beat-breakdown), dessen Bewegungen [illegible]

14. Der Wildling. (Fringilla.)

Merveille Emblème. [illegible] — Fring. Linn. No. [illegible]
Le Linnet-gorge-rouge, Buff. ois. III. p. [illegible] Pl. [illegible] (das Männchen.) — Linn. ois. V. p. [illegible]
Le Linnet-rieur, Buff. ois. III. p. [illegible] Pl. [illegible] (das Weibchen.)
Bullfinch-rebel, Lath. [illegible] — Will. [illegible] — [illegible]

Etwas größer, als das Hänflingsmännchen. Der Schnabel ist [illegible] der Stirn, der Augenkreis und der Rücken, die Kehlfedern und die äußern Deckfedern der Flügel sind grau: Kopf und Schwanz pechfarbig; an der Kehle, und wie da bis zum Kopf mit der Brust ausgebreitet, unregelmäßig mit hell gelbroth gemischt; die Seiten und die innern Deckfedern der Flügel und des Schwanzes sind von hellerer Farbe; die größern Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern erster Ordnung weißgrau gesäumt; der Schwanz ganz gerade und etwas gabelförmig; die Füße schwarz.

Die Männchen unterscheiden sich vom rothen, welches das Weibchen [illegible] besonders, daß es am Bauche, besonders gröber, in Form eines Hufeisens, mit dem [illegible] Theil nach oben gerichtet, am Vorderhalse, einen [illegible] Flecken gemischt der Farbe des Kopfes und dem Schwanze, die [illegible] Schwanzfedern braun, und die übrigen gelblich [illegible] [illegible] hier, auf Verlangen [illegible] Aufmerksamkeit, als das Männchen auf [illegible]).

Ein

a) Lexham Ind. orn. II. p. [illegible] n. [illegible]. B.
b) Nachr. XV. S. [illegible] n. [illegible]. B.
c) S. oben Note [illegible]. B.

g) Ich habe diese oben Nr. [illegible] Note [illegible] angeführte Art für eine Varietät des Männchens des gemeinen Hänflingsvogels und das Männchen hier für verschieden von [illegible] diesen der gemeinen Hänflingsvogel ohne [illegible] Schwanzfedern ohne [illegible] Schwanzfedern ohne [illegible] Schwanzfedern

Sie sind auf dem festen Lande von Europa zu Hause, und Zugvögel; in Burgund und Lothringen kommen sie im May an, und ziehen im October wieder weg; sie halten sich in Wäldern auf, und nisten in niedrigen Gebüschen, nahe am Boden *b*).

Ihr Nest besteht von außen aus Moos, und von innen aus Wolle und Federn. Der Eyer sind fünf bis sechs an der Zahl, weiß, mit Grau melirt. Man kann sie an dem Vorsaum der Wälder finden, wo sie sich Morgens und Abends aufhalten, und Würmer, Fliegen u. d. gl. aufzusuchen, von denen sie sich nähren *i*). Sie haben kaum einigen Gesang, nur einen einzelnen Laut, gleich dem Worte suit, und bewegen den Schwanz, wie das Rothschwänzchen.

Zu Ende des Sommers sind sie sehr fett, und köstlich zu essen *k*).

15. Der Guianische Wistling. (Guiana R. T.)

Motacilla gujanensis. L. I. 2. p. 988. No. 161. *l*).
Le Rouge - queve de la Guiane. Buff. ois. V. p. 186. *m*). — Pl. enlum 686. f. 2.

Seine Länge ist siebenthalb Zoll. Sein Schnabel blaß; die obern Theile des Kopfs, des Halses und des Körpers grau; die untern Theile weiß; Flügel und Schwanz, welcher ziemlich lang ist, ganz gelbroth; die Füße hell fleischfarben.

Er ist in Guiana zu Hause.

16. Der schwarze Wistling. (Black R. T.)

Motacilla atra. L. I. 2. p. 988. No. 162. *n*).
Lev. Mus.

Seine Länge ist sechs Zoll. Die Hauptfarbe des Gefieders ist schwarz; der Scheitel bleyfarben; die Federn des Rückens dunkelbraun gerändert; die Schwungfedern dunkelfarbig, die äußern Ränder der kürzern weiß eingefaßt; die zwey mittlern Schwanzfedern dunkelfarbig, die andern roth, wie die des Rothschwänzchens *o*).

Woher er kommt, weiß man nicht.

17. Die

b) Daß diese Vögel in niedrigen Gebüsch nisten sollen, ist eine falsche Beobachtung. B.

i) Da halten sich die gemeinen Rothschwänzchen auf; denn diese findet man in den tiefsten Wäldern, so wie in der Nähe der Häuser. B.

k) Richtig, die gemeinen Rothschwänzchen gehören zu den kleinen Schneußvögeln, und schmecken vortrefflich. B.

l) Latham Ind. orn. II. p. 514. n. 20. B.

m) Uebers. XV. S. 195. n. 11. B.

n) Latham Ind. orn. II. p. 514. n. 21. B.

o) Dieß ist ein altes Männchen des Wistlings (M. Tithys Lath. In. orn.) das ohngefähr 6 Jahr alt ist. Die acht und mehrjährigen sind überall, bis auf die Flügel und den Schwanz schwarz, am Unterleibe kohlschwarz, auch schimmelfarben, am Oberleib nicht so dunkel. Das Weibchen ist am Oberleibe schmutzig aschgrau, der Unterleib, aschgrau, röthlich überlaufen, das Kinn ist weißlich und die Flügelkanten röthlich weiß, die Weibchen sehen den ein und zweyjährigen Männchen ähnlich, nur daß bey letztern die Flügelränder heller d. i. weißer sind. — Es ist zu verwundern,

17. Der Caffersche Rothschwanz. (Caffrarian W.)

Motacilla caffra. L. I. 2. p. 997. No. 50. *p*)
— — Mantiss. 1771. p. 527.

Von der Größe der weißen Bachstelze. Kopf und Rücken sind olivenfarben; über den Augen ist ein weißer Streifen; die Stelle zwischen dem Schnabel und den Augen schwarz; Kehle und Steiß rostigroth; Brust und Bauch weißlich; die Schwungfedern braun; der Schwanz gleich, und rostigroth, die Endspitzen der Federn braun.

Sie ist auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause.

18. Der schwarzköpfige Sänger. (Black-headed W.)

Muscicapa Ruticilla. L. I. 2. p. 935. No. 10. *q*)
Le Gobe-mouche d'Amerique. Briss. orn. II. p. 383. No. 14. — Pl. enlum 566. f. 1. 2. *r*).
Le petit Noir-Aurore. Buff. ois. IV. p. 546.
Small black- and orange-coloured Bird. Ray Syn. p. 188. No. 5. — Sloane Jam. p. 312. No. 50.
Small American Redstart. Edw. pl. 80. *s*). — Catesby Carol. I. pl. 67. (das Männchen.)
Yellow-tailled Flycatcher. Edw. pl. 257. *s*). (das Weibchen.) *t*)
Black-headed Warbler. Arct. Zool. *u*)
Br. Mus. Lev. Mus. *v*).

dern, wie der sonst so genaue Latham, diesen Vogel hat verkennen können. Er muß in in England gar selten seyn. B.

p) Latham Ind. orn. II. p. 514. n. 22. B.

q) Muscicapa ruticilla Latham Ind. orn. II. p. 473. n. 73. Hier führt Hr. Latham diese Vögel auch unter den Fliegenfängern auf, wohin sie ihn nach seiner Vermuthung in der Note zugehören scheinen. Er sagt, das Männchen ist von den Fliegenfängern mit dem gelbrothen After (Muscicapa rufiventris L. s. oben B. II. Abh. 1. S. 326. Nr. 17.) bloß durch den weißen Bauch verschieden; die Brust, ein Fleck auf den Flügeln, und die Wurzeln der Schwungfedern und Seitenschwanzfedern sind rostgelb. B.

r) Uebers. XIV. S. 73. B.

s) Ich habe große Vermuthung, daß diese beyden Vögeln zur Gattung Fliegenfänger gehören, und, das Geschlecht ausgenommen, einer und eben derselbe seyn; wenn dieß der Fall ist, so wäre es freylich schicklicher gewesen, sie unter jener Gattung aufzuführen, als uns unter der gegenwärtigen. Ich habe blos die aus der Hudsons-Bay untersucht, die mir wahre Fliegenfänger zu seyn schienen; und es bleibt noch ungewiß, ob Catesby's und Sloane's Vogel einer und eben derselbe seyen, da einer, der mir für das Weibchen des lezten gezeigt wurde, den Schnabel eines Sängers (Warbler) hatte.

t) Seligmanns Vögel III. Taf. 34. IV. Taf. 55. Männchen. VII. Taf. 47. f. 1. Weibchen. B.

u) Arct. Zool. II. n. 282. mas et n. 301. femina. Uebers. II. S. 370. Nr. 199. und S. 379. Nr. 218. B.

v) Pallas (N. G. merkwürd. Thiere VI. S. 20.) will diesen Vogel gar unter die Plattschnäbel verwiesen wissen. Er sagt: „Eine fünfte aus Maryland in Nordamerika überschickte, sehr schöne Gattung von Plattschnäbeln sahe ich im Jahr 1762 zu London, in der Sammlung des Herrn Backer, und Edwards, hat

Sie hat die Größe der Gartengrasmücke (No. 3), und ihre Länge iſt vier und drey Viertels Zoll. Ihr Schnabel iſt ſchwärzlich, die Wurzel mit einigen wenigen Borſten beſetzt; der Kopf, der Hals und die obern Theile ſind ſchwarz; die Flügel auch ſchwarz; mit einem dunkel orangefarbenem Streifen quer über ihre Mitte; die Seiten des Körpers ſind orangefarben; der Bauch, die Schenkel und der After hellorangefarben; der Schwanz orangefarben, und ein Drittheil ſeiner Endhälfte ſchwarz, die zwey mittlern Federn aber ganz ſchwarz.

Beym Weibchen ſind die obern Theile bräunlichaſchfarben; die untern weiß; der Schwanz, die Flügel und die Seiten des Körpers eben ſo, wie beym Männchen, aber gelb, ſtatt orangefarben; die Füße bey beyden braun.

Edwards's Vogel iſt kleiner, als Catesby's ſeiner.

Sie ſind im Sommer in den ſchattigen Wäldern von Nordamerika, bis zur Hudſon's-bay, zu Hauſe; im Winter ziehen ſie weg, und ſollen ſich dann in Jamaika und den benachbarten Inſeln einfinden.

19. Die gemeine Grasmücke. (Das Weißkehlchen. White-Throat.)

Motacilla Sylvia. L. I, 2. p. 956. No. 9. *w*) — Faun. Suec. No. 250. — Brünn. orn. p. 71. No. 275. Müller Zool. p. 92. No. 269.

La Fauvette grise, ou la grisette. Briss. orn. III. p. 376. No. 4. pl. 21. f. 1. — Buff. ois. V. p. 132. *x*) — Pl. enlum 579. f. 3.

La Mesange cendrée. Briss. orn. III. p. 549. No. 4. — Buff. ois. V. p. 409. 3. *y*)

Le Vitrec à menton blanc. Salern. orn. p. 226. 6.

Stoparola. Ray Syn. 77. A. 6

White Throat. ibid. A. 1. — Will. orn. p. 210? 236. — Br. Zool. I. No. 160. *z*) — Arct. Zool. II. p. 422. S. *a*)

Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre

hat ſie in ſeinem zweyten Theil des Werks auf der 80 Platte abgebildet, ohne jedoch die Geſtalt des Schnabels genau auszudrücken. Sie iſt nicht größer, als eine gemeine Meiſe, und hat einen mittelmäßigen, minder, als bey der vorigen, breiten, aber gegen das Grundſtück zu etwas abnehmenden, und alſo recht lanzenförmigen Schnabel, und häufige Borſten an den Mundwinkeln. Am Leibe iſt ſie ſchwarz bis auf den Bauch, und unterm Schwanz, wo die Federn weiß ſind. Die Unterſeite der Flügel iſt hochfeuergelb, und alle Schwungfedern haben gleich an der Poſe ein breites, feuergelbes Querband. Der Schwanz iſt länger als der Rumpf, von gleich langen Federn, deren die mittlern ganz, die übrigen am Ende ſchwarz, und übrigens feuergelb ſind.

Auch Catesby beſchreibt dieſen Vogel im erſten Theil ſeines Werks, Seite und Platte 67. aber ebenfalls ohne den Schnabel recht auszudrücken; daher hat Herr von Linné denſelben unter die Fliegenſtecher gezählt, und in ſeinem Syſtem unter den Namen Muscicapa Ruticilla angeführt. Hätte ich nicht den Vogel ſelbſt geſehn, ſo würde ich den Abbildungen nach eben ſo gedacht haben." B.

w) Motacilla cinerea. Latham Ind. orn. II. p. 514. n. 23. β. B.

x) Ueberſ. XV. S. 91. Nr. 6. Hier beſchreibt Büffon wider das Müllerchen oder die geſchwätzige Grasmücke Nr. 6. B.

y) Ueberſ. XVII. S. 70. Nr. 3. Dieß ſcheint eher die Beſchreibung der gemeinen Grasmücke zu ſagen. B.

z) Ueberſ. 117. Taf. 53. f. 4. B.

a) Ueberſ. II. S. 394. und dieß Synonym beſchreibt

Ihre Länge ist über sechsthalb Zoll. Der Schnabel ist schwarz, an der Wurzel weißlich; der Augenstern kastanienbraun [b]); der Kopf bräunlichaschfarben; der Rücken röthlich; die kleinern Deckfedern der Flügel hellbraun, die größern braun, mit röthlichten Rändern; die Kehle weiß; Brust und Bauch röthlichweiß; Schwungfedern und Schwanz dunkelfarbig, mit hellbraunen Rändern; die äußerste Feder ausgenommen, bey der die äußere Fahne ganz weiß, und die innere, zur Hälfte von der Wurzel an eben so ist; die Füße hellbraun.

Das Weibchen unterscheidet sich dadurch, daß es eine ganz weiße Brust und dergleichen Bauch hat [b]).

Dieß ist ein Zugvogel, der uns im Frühjahr besucht, im Herbst wieder verläßt, und nicht selten in England angetroffen wird. Er hält sich in Hecken auf, und macht ein Nest, zwey oder drey Fuß hoch vom Boden, das aus Moos und dürren Pflanzenstengeln besteht. Der Eyer sind fünf, grünlichgrau mit gelbrothen und braunen [c]) Flecken bezeichnet.

Man kennt ihn auch in Frankreich, und in vielen andern Gegenden des festen Landes von Europa, und die Einwohner von Provence nennen ihn: Le Passerine.

Bey uns, glaube ich, lebt er hauptsächlich von Insekten; Büffon aber sagt, er fresse auch Feigen und Oliven.

schreibt den Vogel richtig, und dieß ist auch die Beschreibung die bey unsern Verfasser zum Grunde liegt. Man vergleiche auch meine N. G. der Stubenvögel S. 410. Nr. 94. N. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 535. Nr. 5. und N. G. Deutschlands. IV. Taf. 15. B.

b) Obgleich Latham im Ind. orn. unter den Hauptnamen der aschgrauen Grasmücke (Motacilla cinerea), die Größe zu 6 Zoll angiebt, so scheint er doch das Müllerchen zu beschreiben, und wider zu verwirren, was er in der Synopsis gut getrennt hat. Er sagt: „die Länge ist 6 Zoll; der Schnabel schwärzlich unten weiß; der Augenstern weißbraun; der Oberleib aschgrau röthlich; der der Unterleib weiß röthlich; der Kopf aschfarben; die Kehle weiß; der untere Theil des Halses röthlichweiß; die äußerste Schwanzfeder der Länge nach, die Hälfte weiß, die andern an der Spitze weiß; die Füße braungelblich oder bleyfarben. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch eine fast ganz weiße Brust.

Ich will hier diesen Vogel noch einmal treu nach der Natur beschreiben: Den Namen Grasmücke verdient er um so mehr, da er unter allen am meisten im Gras und niedern Gebüsche herumkriecht. Er ist 5 1/2 Zoll lang, sehr schlank und schön gewachsen; der Schwanz mißt 2 3/4 Zoll; der Schnabel 5 Linien, ist oben schwärzlich, unten graulich, mit gelben Ecken und Rachen; der Augenstern graubraun; die Füße bräunlichfleischfarben; die Schienbeine 10 Linien hoch; der Kopf aschgrau; die Wangen, der Hals, Rücken, Bürzel, die Deckfedern des Schwanzes und die kleinern der Flügel sind aschgrau, bräunlich überlaufen, am Rücken am stärksten; die Kehle und der Bauch schön weiß; die Brust, die Seiten und die Steißfedern weiß, röthlichfleischfarben überzogen; die Flügel dunkelbraun, die hintern so wie die großen Deckfedern der Flügel mit breiter rostfarbiger Einfassung, daher die Flügel zusammengelegt rostfarben aussehen; der Schwanz dunkelbraun, die äußerste Feder mit einem großen weißen keilförmigen Fleck, die folgende mit einer kleinern und die dritte nur mit einer weißen Spitze.

Das Weibchen ist etwas kleiner, auf den Flügeln schwächer rostfarben und hat nicht die schöne weiße Kehle. B.

bb) Zuweilen gelblich nußbraun.

c) Schwarzen. Willughby.

19. Var. A. Motacilla Sylvia. L. I. 2. p. 956. No. 9. β.
La Bouscade de Provence. Buff. ois. V. p. 134. c). — Pl. enlum 655. f. 2.

Diese hat die nämliche Größe mit der vorigen, und ist ist ihr sehr ähnlich; sie unterscheidet sich blos dadurch, daß sie durchaus sehr ins Rothe spielt, da hingegen die andere einen Anstrich von Grauem hat, sie kann daher blos als eine Spielart betrachtet werden d).

Diese wurde in der Provence gefangen. In den Pl. enlum scheinen alle Schwanzfedern von einer Farbe zu seyn.

20. Die Pieplerche. (Grasshopper W.)

Alauda trivialis. L. I. 2. p. 796. No. 5. e)
L'Alouette de Buisson. Briss. orn. III. p. 347.
— Pipi. Buff. ois. V. p. 39. pl. 4. f) — Pl. enlum 661. f. 2.
Piep-Lerche. Frisch tab. 16.
Pipit Lark. Albin. I. pl. 44?
Grasshopper Lark. Ray Syn. p. 70. — Will. orn. p. 206. — Br. Zool. No. 156. g). — Arct. Zool. II. p. 419. L. h).
Lev. Mus.

Sie ist nicht groß, und zwischen fünf und sechs Zoll lang. Ihr Schnabel ist dunkelfarbig; die Stelle zwischen dem Schnabel und den Augen weiß; die Farbe der obern Theile des Körpers ist grünlichbraun, und jede Feder in ihrer Mitte dunkelfarbig; die untern Theile sind gelblichweiß, mit einem dunkelfarbigen Anstrich an der Brust; der Schwanz keilförmig, ziemlich lang, die äußersten Spitzen der Federn sehr blaß; die Füße dunkelfarbigweiß; die hintere Klaue hinlänglich gekrümmt, um zu beweisen, daß der Vogel nicht zur Lerchengattung gehört, mit welcher er von allen Schriftstern vor Pennant vereinigt worden ist i).

Diese Beschreibung ist nach einem Exemplar im Leverschen Museum gemacht k). Es scheint

cc) Uebers. B. XV. S. 91. B.
d) Es ist dieß weiter nichts als die rostgraue Grasmücke (Motacilla fruticeti mihi. Motacilla Sylviella Lath.) Nr. 152. B.
e) Alauda trivialis Latham Ind. orn. II. p. 493. n. 6. Motacilla Locustella Ind. orn. II. p. 513. n. 25. Hierbey citirt Hr. Latham die Grillenlerche des Büffons (Büffon V. p. 42.) Uebers XIV. S. 254. B.
f) Uebers. XIV. S. 218. B.
g) Uebers. S. 103. Taf. 50. Fig. 4. B.
h) Uebers. II. S. 392. L. Vergl. auch Zorns Pethinsth. II. S. 298. Nr. 5. Meine N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 496. Nr. 4. N. G. der Stubenvögel S. 146. Nr. 36. B.
i) Er ist zeither auch mit einem gleichen Schwanze abgebildet worden; wenn aber der Vogel anderer Schriftsteller einen gleichen Schwanz hat, so muß es eine andere Art seyn; die hintere Klaue ist in ihren Figuren auch zu gerade. (Allerdings hat dieser Vogel viel Aehnlichkeit mit den Sängerarten. Allein selbst Latham setzt ihn in den Ind. orn. wieder unter die Lerchen. Es ist, wie wir sehen, ein Bindeglied. Diese Zweydeutigkeit der Gattungscharaktere ist aber mit Ursach, daß man diesen Vogel unter so vielerley Gestalten bald als Lerche bald als Motacilla in den Büchern antrifft. B.
k) Da sich Hr. Latham, der die Pieplerche nicht ganz zu kennen scheint, durch die Auctoritäten anderer Schriftsteller hat irre führen lassen,

und

scheint nicht, als wenn dieß ein gemeiner Vogel wäre, da der obige, der einzige ist, der mir zu Gesichte gekommen. Herr Pennant sagt, er sey ein sehr listiger (artfull) Vogel, der sich in die dicksten Stellen der Hecken und Berge aufhalte, so daß er nur mit großer Mühe daraus hervorgenöthigt werden kann *l*). Seine Stimme ist der einer Heuschrecke so ähnlich, daß man sie damit verwechseln kann *m*).

21. Der Rohrsänger. (Sedge W.)

Notacilla Salicaria. L. I. 2. p. 955. No. 8. *n*).
La Fauvette de roseaux Briss. orn. III. p. 378. No. 5. — Buff. ois. V. p. 142 *o*) pl. enlum 581. f. 2.
Avis consimilis stoparolae et magnanimae. Ray Syn. p. 816.
Salicaria. ibid. II. — Will. orn. p. 217.
Lesser Reed Sparrow. ibid. p. 144.
Junco minor. Sepp. Voy. pl. in p. 99?
Redge bird. Albin. III. pl. 60. — Br. Zool. I. No. 155.
Sedge Warbler. Arct. Zool. II. p. 419. M. *p*).
Lev. Mus.

Er hat die Größe des Mönchs (Nr. 5), ist aber schlanker. Sein Schnabel ist schwarz; der Kopf braun, mit dunkelfarbigen Streifen bezeichnet; die Wangen braun; über jedem Auge ist eine weiße Linie, und über dieser eine schwarze; der obere Theil des Halses und Rückens ist röthlichbraun, letzter mit Schwarz bezeichnet; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern sind dunkelfarbig, erstere hellbraun gerändert; die untern Theile sind weiß, Brust und Bauch aber haben einen gelben Anstrich; der Schwanz ist braun, und stark abgerundet, die Deckfedern desselben lohgelb; die Füße dunkelfarbig *q*).

Die

und diesen Vogel in seinen Ind. orn. einmal unter die Lerchen und zum zweytenmal unter den Sängern aufstellt, so kann man noch einmal die nach der Natur gemachte Beschreibung, wie ich den Vogel den ganzen Sommer hindurch zu beobachten Gelegenheit habe, vergleichen s. oben S. Nr. 28. B.

l) Hier verwechselt Hr. Pennant zuversichtlich diesen Vogel mit der Braunelle; denn die Piepierche versteckt sich nie in die Hecken. B.

m) Das letztre wohl nicht, denn sie klingt viel feiner und stärker. B.

n) Latham Ind. orn. II. p. 516. n. 26. B.

o) Uebers. XV. S. 112. n. 9. B.

p) Uebers. II. p. 392 M. S. auch meine N. G. der Stubenvögel S. und N. G. Deutschlands IV. Taf 26. B.

q) Der Rohrsänger, den ich kenne, und der sich so dicht im Rohr aufhält, daß man ihn selten zu sehen bekömmt, auch so singt wie er hier beschrieben wird, und sein Nest zwischen Schilfstengel, auch zuweilen in dichtes darneben stehendes Gebüsche macht, und oft den Kukuk ausbrüten muß, sieht aus, wie ihn Büffon beschreibt, und wenn hier Hr. Latham so wie Pennant die gestreiften Farben des Kopfs zu hell aufgetragen hat, so beschreiben sie einen jungen Vogel, sonst beschrieben sie einen andern Vogel, den ich nicht kenne, denn der, welchen ich kenne, sieht wie Büffon ihn beschreibt aus, und ist kleiner, und heller als die Bastardnachtigall, sonst ihr im Gesang und Betragen ähnlich. Er ist bey uns häufig. Ich will also eine kurze Beschreibung beyfügen: Er ist 5 Zoll lang, wovon der Schwanz 2 Zoll wegnimmt. Der Schnabel ist 7 Linien lang, dünne, und braun; der Augenstern kastanienbraun; die Füße aschgraubraun; die Schienbeine

Dieser Vogel ist gemein in England und hält sich an Orten auf, wo Rohr und Schilf wächst, unter welche er sein Nest machen soll, obschon man bemerkt hat, daß er dieses an die untersten Zweige der Bäume befestigt *r*). Das Nest selbst besteht aus Halmen und dürren Pflanzenfasern mit Haaren ausgelegt. Der Eyer sind fünf an der Zahl, schmutzigweiß, mit Braun marmorirt.

Man hat bemerkt, daß er die Stimme der Schwalbe, der Feldlerche, des Haussperlings und anderer Vögel auf eine angenehme, aber übereilte (hurrying) Art nachahmt, und die ganze Nacht hindurch singt *s*). Ob er im Winter von uns wegzieht, ist nicht ganz gewiß.

Der *t*) bey Sepp abgebildete Vogel ist dem Weidenzeisig so ähnlich, daß ich ihn für eine und eben dieselbe Art halte. Sein Nest ist kleiner als das des Rohr-Zaunkönigs (Reed Wreen) des Herrn Lightfoot's, aber so ziemlich aus einerley Stoff verfertigt, obschon nicht so tief. Es ist nicht an das Schilfrohr befestigt, wie das des Rohr-Zaunkönigs, sondern die ganzen Seiten des Nestes hüllen das Rohr ein, das das Nest unterstützt. Der Eyer sind drey an der Zahl, von hell gelblichbrauner Farbe.

Bey eben diesem Schriftsteller, finde ich einen Vogel, unter dem Namen; Arundinacea minima, aber keinen andern Schriftsteller dabey angeführt. Das Nest dieses Vogels ist um drey Gabeln von Zweigen herum befestigt, und von pflaumenartigen Gewebe. Der Eyer sind fünf, denen des Junco minor gleich, aber mit kleinern, braunen Flecken gesprenkelt *u*).

22. Der Weidenzeisig, oder der gelbrothe Sänger. (Rufous W.)

Motacilla rufa. L. I. 2. p. 955. No. 63. *v*)
La Fauvette rousse. Briss. orn. III. p. 387. No. 8. — Buff. ois. V. p. 146. *w*) Pl. enlum. 581. 1.
Kleinste Grasmücke. Frisch tab. 24. *x*).

Sie

beine 8 Linien hoch. Die langgestreckte Stirn ist gelbgrüngrau; der übrige Oberleib ist aschgrau und zeißiggrün überlaufen; der Steiß heller; über die Augen läuft eine gelblichweißliche Linie; die Wangen sind olivenbraun; der Unterleib ist weiß mit durchschimmernder grauen Farbe und grüngelben Anflug auf der Brust; die Kniee sind olivengrau; die vordern Schwungfedern schwärzlich, die hintern dunkelbraun, alle grünlich eingefaßt; die Deckfedern sind wie der Rücken; die Schwanzfedern wie die Schwungfedern aber mit breiterer grünlicher Einfassung.

Das Weibchen ist nicht merklich verschieden. Der Kopf ist hellbraun; eine weiße Linie geht über die Mitte des Auges; der ganze Oberleib ist röthlichgrau, mit Olivengrün überlaufen; die Kehle weiß; Brust und Bauch weißgrau, gelb überlaufen; die Schwungfedern dunkelbrauner als die Schwanzfedern, mit olivengrauen Rändern. B.

r) Hist. des Ois.
s) Arct. Zool. (Nur des Abends und sehr früh singt er, so viel ich gehört habe. B.)
t) Zus. a. d. Suppl. S. 150. Uebers.
u) Dieß ist unser Vogel. B.
v) Latham Ind. orn. II. p. 516. N. 27. B.
w) Uebers. B. XV. S. 118. Nr. 10. B.
x) Diese Abbildung gehört nicht hierher; denn dieß ist ein Fitis (s. unten). Man vergleiche noch Zorns Pethinoth. II. S. 391. und 154. Dieß ist auch der Vogel, den Hasselquist Reise S. 337. beschreibt. B.

Er ist kleiner als der vorige, denn er hat keine vier und drey Viertel Zoll in der Länge *y*.) Der Schnabel ist graubraun; die obern Theile des Körpers sind gelbrothgrau; die untern hellgelbroth *z*), zu beyden Seiten des Kopfs ist ein länglicher Streifen von der nämlichen Farbe über den Augen; die Schwungfedern sind gelbrothgrau, mit hell gelbrothen Rändern; der Schwanz eben so *a*); die Füße braun.

Diesen Vogel sieht man in England nicht, aber in Frankreich und Deutschland hält er sich in den Gärten auf, und macht sein Nest auf ein niedriges Gebüsch oder Gewächs, und legt es mit Haaren aus *b*). Er legt fünf Eyer, von grünlich weißer Farbe, mit dunklern Flecken.

23. Der Feigenfresser. (Epicourean W.)

Motacilla Ficedula. L. l. 2. p. 957. No. 10. *c*) — Faun. Suec. No. 251. — Müller Zool. p. 35. No. 271. — Frisch tab 22. (das Männchen.) *d*).

Le Becfique. Buff. ois. III. p. 369. No. 1. — Buff. ois. V. p. 187. *e*). — Pl. enlum. 668. f. 1.

Beccafico. Olin. uccell. p. 11. — Russel. Alepp. p. 64. — Ray Syn. p. 81. No. 12. — Will. orn. p. 227.

Ein kleiner Vogel, viel kleiner, als unser aschgrauer Fliegenfänger, und fünf Zoll lang. Der Schnabel ist schwärzlich; die obern Theile sind graubraun; die Augenkreise gelbroth-weiß; die untern Theile graulichweiß, mit einem braunen Auftriche an der Brust; die kleinern Deckfedern graubraun, die größern aschbraun, mit weißen Spitzen, und dieß bildet ein Band über die Flügel; die Schwungfedern aschbraun mit graulichbraunen Rändern, aber die drey zunächst am Körper stehenden, mit weißen; der Schwanz dunkelbraun, mit graubraunen Rändern; die äußerste Feder, an der äußern Fahne, ihrer ganzen Länge nach, weiß, und die nächste *f*) zwey Drittheile ihrer Länge eben so; die Füße schwärzlich.

Das

y) In den Pl. enlum ist er wenigstens fünf und drey Viertel Zoll lang.

z) Zuweilen weiß.

a) In den Pl. enlum ist die äußerste Schwanzfeder weiß, und die nächste an ihr hat eine weiße Spitze; die Füße sind gelb. Ich vermuthe, es sey dies der oben beschriebene Vogel nicht, obgleich Büffon ihn citirt.

b) Es ist ungegründet, daß er auf Büsche baut. Er nistet an der Erde, in einem alten Maulwurfsloche, oder im Moos, oder zwischen Baumwurzeln. Frisch hat Unrecht, wenn er es von seinem Weidenzeisig sagt; denn weder der Weidenzeisig noch Fitis nisten erhaben in Büschen. Es ist ein in Thüringen sehr gemeiner Vogel, der in allen Laubhölzern angetroffen wird, und als Zugvogel schon in der Mitte des Märzes bey uns wieder antrifft. B.

c) Latham Ind. orn. II. 517. n. 25. B.

d) Dieß ist nach meiner Ueberzeugung der schwarzgraue Fliegenfänger. Man sehe was ich auch oben B. II Th. 1. S. 319. über diesen Vogel gesagt habe. B.

e) Uebers. XV. S. 196. Nr. 12. B.

f) Hier steht im Text ein Druckfehler the neck st. the next. B.

Das Weibchen ist viel blässer als das Männchen g).

Dieser Vogel wird auf dem festen Lande, seines wohlschmeckenden Fleisches wegen, sehr geschätzt. In England findet er sich nicht, wohl aber in den meisten zwischen Schweden und Griechenland gelegenen Ländern; doch ist er überall nur ein Sommergast, der sich wahrscheinlich, bey Annäherung des Winters, weiter nach Süden zurück zieht. Auf den Inseln Cyprus und Candia ist er in so großer Menge, daß er ein Handlungszweig geworden ist h); und die Italiäner lieben ihn noch heutiges Tages so sehr, als ihre Vorfahren in ältern Zeiten.

Seine vorzüglichste Nahrung sind Insekten, außer im Herbst, wo er großen Schaden unter den Feigen und Weintrauben anrichtet; woher vermuthlich sein Wohlgeschmack einigermaßen rührt. Ich finde nirgends eine Beschreibung seines Nestes; man sagt, es sey schwer zu finden. Das Männchen hat wenig, oder gar keinen Gesang.

20. Der gefleckte Feigenfresser. (Figeater.)

Motacilla naevia. L. l. 2. p. 957. No. 64. *i*).
La Fauvette tachetée. Briss. orn. III. p. 389. No. 9. — Buff. ois. V. p. 149. k). Pl. enlum 581 f. 3.
Le Bouvier. Salerne orn. p. 226. No. 7.
Boarina. Xay Syn. p. 77. 7. — Will. orn. p. 217. — Aldrov. Av. II. p. 734.
Fig-eater. Albin. III. pl. 26.

Die Länge ist sechsthalb Zoll. Der Schnabel röthlichbraun; die obern Theile des Körpers und die Flügel gelbrothbraun, gelblich und aschfarben gemischt; die untern Theile weiß; die Brust gelblich, mit schwarzen Flecken, die Schwungfedern schwärzlich, mit weißen Rändern; der Schwanz eben so, seine zwey mittlern Federn kürzer, als die übrigen; die Füße röthlich; die Klauen schwarz.

Dieser Vogel ist in Italien, besonders um Bologna gemein, und man sieht ihn vorzüglich auf Viehweiden *l*). Sein Nest baut er ohngefähr einen Fuß hoch vom Boden, an ein Gebüsch oder an eine starke Pflanze; man kann ihn nicht leicht vom Neste verjagen, und er giebt eher sein Leben Preiß, ehe er seine Jungen beschädigen läßt *m*).

25. Die

g) Ich bin fest überzeugt, daß dieß keine eigene Motacillen-Art, sondern der oben beschriebene Fliegenfänger ist. Alles stimmt überein. B.

h) Sie werden in großer Menge aufgekauft, und in andere Länder verführt." Willaughby. — Vielleicht meynt er, in Töpfen, wie unsre großen Steinschmätzer (Wheat-ears) Sie werden auch in Gefäßen, die mit Weinessig und wohlriechenden Kräutern angefüllt sind, verführt; und die Insel Cyprus allein sammelt jährlich 1,000, oder 1,200 solche Töpfe voll. Dapper desc. des Isles d'Archipel. p. 51.

i) Latham Ind. orn. I. p. 517. n. 29. B.

k) Uebers. XV S. 126. Nr. 11. B.

l) A persequendo boves, vulgo, Boarulam, seu Boarinam nuncupatur. Aldrov.

m) Hist. des Ois.

25. Die Alpengrasmücke. (Der Alpensänger. Alpine W.)

Motacilla alpina. L. l. 2. p. 957. No. 75. *n*).

La Fauvette des Alpes. Buff. ois V. p. 156. pl. 10. *o*). — Pl. enlum 668. f. 2.

Sie hat die Größe des Gerstenammers, und ist sieben Zoll lang. Ihr Schnabel ist schwärzlich, die Wurzel der untern Kinnlade gelb; der obere Theil des Kopfs und Halses ist aschgrau; der Rücken eben so mit braun gemischt; die Deckfedern der Flügel sind schwärzlich mit weißen Spitzen, die kürzern Schwungfedern braun, mit hell gelbrothen äußern Rändern, die großen eben so mit weißlichen Rändern; die obern Deckfedern des Schwanzes braun, mit grünlichgrauen Rändern, und gegen die Spitze hin hellgelbroth; der Schwanz selbst ist etwas gabelförmig, und alle seine Federn sind an der innern Seite, an der Spitze, mit einem hellgelbrothen Flecken bezeichnet; die Kehle ist weiß, mit braunen Flecken; die Brust aschgrau; und die übrigen untern Theile grau, mit einer Mischung von Gelbrothem und Weißem; die Füße gelblich.

Diese Art ist auf den Alpen und den hohen Gebirgen von Auvergne und Dauphines zu Hause, und vorher noch nicht beschrieben *p*). Sie hält sich immer innerhalb dieser Gränzen auf, außer wenn sie der stärkste Schnee daraus vertreibt. Man sieht sie mehrentheils auf dem Boden, oder auf einem Stein, selten auf einem Baum sitzen, und sie ist ein sehr scheuer Vogel.

n) Sturnus collaris Latham Ind. orn. I. p. 323. n. 5. Dort führt Latham diesen Vogel nur einmal auf. Allein wer den Vogel lebendig oder auch nur todt gesehen hat, der wird finden, daß er unter den Staaren allerdings am unrechten Orte steht. Hier hat er eine bessere Stelle, ob er gleich auch nicht recht unter die Motacillen paßt. Ich stelle ihn daher in einer eignen Familie unter den Sängern auf, die ich charakterisire: Sänger mit zur Seite eingedruckten Kinnladen. (s. N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 546. Nr. 27. N. G. der Stubenvögel. S. und N. G. Deutschlands IV. Taf. 31. Man vergl. auch Andrä Briefe aus der Schweiz. S. 102. Taf. 12.) B.

o) Uebers. XV, S. 141. B.

p) Ja! S. oben II. 1. S. 7. Nr. 5. der Staar mit dem Halsbande. Ich will sie hier auch noch einmal etwas genauer beschreiben. Dieser Vogel hat die Größe einer Feldlerche. Die Länge ist 62/3 Zoll und der Schwanz mißt fast 3 Zoll. Der Schnabel ist 6 Linien lang, oben dunkelbraun, unten orangengelb, und hat an den Seiten eingedruckte Kinnladen; der Augenstern ist dunkelgelb; die Füße sind hellbraun; die Schienbeine 1 Zoll hoch. Kopf, Ober- und Seitenhals, auch der Rücken sind hellaschgrau, oder vielmehr weißgrau, ersterer blaßbraun, und lezterer dunkelbraun gefleckt und die Seiten des Rückens noch überdieß mit rostfarben Flecken; der Steiß röthlichgrau; die Kehle weiß mit kleinen dunkelbraunen Muschelflecken und nach der Brust zu mit einer dunkelbraunen Linie eingefaßt; die Gurgel und Brust weißgrau; die Seiten der Brust und der Bauchs und unter den Flügeln schön braunroth; der Bauch graulichweiß mit verloschnen dunkelgrauen Wellenlinien; der After dunkelbraun; die kleinen Deckfedern der Flügel grau ins grünliche schimmernd, die zwey großen Reihen und der Afterflügel braunschwarz mit weißen Spitzen, daher auf den Flügeln 2 parallele Reihen weißer Flecken stehen; die Schwungfedern braungrau, hell gesäumt; die Schwanzfedern dunkelbraun, an der Spitze auf der innern Fahne mit einen rostgelben Fleck ersehen.

Das Weibchen und die Jungen sind am Bauch und an der Brust dunkelbraun bunt; auch an den Seiten dunkler, und die schöne Kehle ist wie verloschen. B.

26. Der Patagoniſche Sänger. (Patagonian W.)

Motacilla patagonica. L. l. 2. p. 957. No. 65. *q*).
Lev. Mus.

Dieß iſt ein großer Vogel, und neun Zoll lang. Der Schnabel iſt einen und ein Viertel Zoll lang, und an der Spitze etwas gebogen, von Farbe ſchwarz, mit aſchgrauen Rändern; die obern Theile des Körpers und der Schwanz ſind aſchgrau; die untern heller, und mit weißen Streifen bezeichnet; Kinn und Kehle ganz weiß; über den Augen ein Streifen von der nämlichen Farbe, der zu beyden Seiten faſt bis an den Hinterkopf reicht; die Flügel ſind dunkelaſchfarben, mit Hellbraun bezeichnet, und mit einem Streifen von der nämlichen Farbe queer über die Deckfedern; die Schwungfedern haben braune Ränder; die äußern Schwanzfedern ſind weiß; die Füße ſchwarz; die Zehen lang; die hintere Zehe und Klaue lang und ſtark.

Das Weibchen, oder was man dafür hält, hat weniger weiße Streifen an der Bruſt.

Er iſt in Patagonien und auf Terra del Fuego zu Hauſe, und pflegt ſowohl an Größe als Länge des Schnabels zu variiren. Man trifft ihn an der Seeküſte an, und vermuthet, daß er von Schellfiſchen oder Seewürmern lebe.

27. Der Dartforder Sänger. (Dartford W.)

Motacilla provincialis. L. l. 2. p. 938. No. 67. *r*).
Le Pitchou de Provence. Buff. ois. V. 158 *s*). Pl. enlum 656. f. 1.
Dartford Warbler. Br. Zool. I. No. 161. pl. 56. — Arct. Zool. *t*).
Lev. Mus.

Dieſer iſt kaum größer, als ein Zaunkönig, da aber der Schwanz die Hälfte der ganzen Länge ausmacht, ſo mißt er doch über fünf Zoll. Der Schnabel iſt ſchwarz, mit einer weißen Wurzel, und die obere Kinnlade an der Spitze ein wenig gekrümmt; der Augenſtern iſt nußbraun; die Augenlieder ſind dunkel karmoiſinroth; die obern Theile des Kopfs, des Halſes und des Körpers dunkel röthlichbraun; Bruſt und Bauch dunkel roſtigroth, die Mitte des Bauchs weiß; die Schwungfedern dunkelbraun, mit weißen Rändern; die Afterflügel weiß; die äußere Fahne der äußerſten Schwanzfedern weiß, die übrigen dunkelbraun, und halb ſo lang, als der Vogel ſelbſt; die Füße gelb *u*).

Das Vaterland dieſes Vogels iſt Provence, in Frankreich, wo er ſich beym Kohl aufhält, zwiſchen deſſen Blättern er ſeine Nahrung, Inſekten, ſucht. Er ſchlägt auch ſein Nachtquartier unter dem Schirm der Kohlblätter auf.

die

q) Latham Ind. orn. II. p. 517. n. 308. B.
r) Latham Ind. orn. II. p. 517. n. 31. B.
s) Ueberſ. XV. S. 145. Nr. 14. B.
t) Hier finde ich ihn nicht. B.
u) Wort für Wort iſt dieß die Beſchreibung von jungen braunkehligen Steinſchmätzer. Auch die Einjährigen, vorzüglich wenn ſie aus dem lezten Gehecke ſind, ſehen ſo aus, beſonders die Weibchen. Auch ſein Aufenthalt zeigt dieß an. In Thüringen iſt dieſer Vogel außerordentlich häufig und im Auguſt ſieht man Heerden in Kohlfeldern von dieſen Vögeln, die grade ſo ausſehen, wie der hier beſchriebene. B.

Man findet ihn aber auch in England. Es wurde mir ein Paar gebracht, das einer meiner Freunde von Bexley Heath bey Dortford am 10ten April 1773 geſchoſſen, und das auf einen Ginſterſtrauch geſeſſen hatte. Sie fraßen Fliegen, indem ſie, wenn ſie eine die ſie erreichen konnten, ausſpäheten, vom Buſche weghüpften, und zu wiederhohlten Mahlen wieder auf die nämliche Stelle zurückkehrten; und hierin ahmten ſie dem aſchgrauen Fliegenfänger nach.

Ich weiß, daß dieſe Art das ganze Jahr hindurch bey uns bleibt; denn im letzten Winter ſind verſchiedene bey Wandsworth in Surrey geſchoſſen worden, die jetzt im Leverſchen Muſeum ſtehen.

Herr v) Green, ein geſchickter Beobachter Engliſcher Vögel, hat mir geſagt, er habe dieſen Vogel bloß im Winter in der Nähe von London angetroffen, und noch vor Ausgang des Aprils verſchwindet er wieder. Wenn dieß durchgängig der Fall iſt, ſo kann ich auf keine Art den Umſtand damit vereinigen, daß er in Frankreich brüten ſoll w), da alle Zugvögel nach Norden wandern, um zu brüten, und nicht in ein wärmeres Clima, daher glaube ich eher, daß er, wenn er England im Sommer nicht verläßt, ſich hernach in den nördlichen Gegenden dieſes Landes aufhalte, wie man es bey der grauen Bachſtelze bemerkt hat.

28. Der Afrikaniſche Sänger. (African W.)

Motacilla africana. L. l. 2. p. 958. No. 68. x).
La Fauvette tachetée du Cap de bonne Esperance. Briss. orn. III. p. 390. No. 10. pl. 22. f. 2. — Buff. ois. V. p. 160. y).

Er hat die Größe des Bergfinken, und iſt ſieben und ein Viertel Zoll lang. Der Schnabel iſt hornfarben; der Scheitel gelbroth, mit ſchwärzlichen Streifen; der Hinterhals, Rücken und die Schulterfedern ſind ſchwarz, mit gelbrothgrauen Rändern; der untere Theil des Rückens, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes eben ſo, die Ränder aber mehr gelbroth; die untern Theile ſchmutzig gelbrothweiß, bey einigen an den Seiten ſchwarz geſtreift; zu beyden Seiten der Kehle iſt ein länglicher, ſchwarzer Streifen; die Schwungfedern ſind braun, mit gelbrothen Rändern; der Schwanz hat ſehr lockere Fahnen (looſely webbed), und iſt etwas keilförmig, ſeine vier mittlern Federn ſind braun, mit gelbrothen Rändern, die vier äuſern zu beyden Seiten auswärts gelbroth, und an den Schäften herab braun; die Füße graubraun.

Er iſt auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hauſe.

29. Der Neuyorker Sänger. (New York W.)

Motacilia noveboracensis. L. l. 2 p. 958. No. 69. z).
La Fauvette tachetée de la Louisiane. Buff. ois. V. p. 161. a) — Pl. enlum. 752. f. 1.

v) Zuſ. a. d. Suppl. S. 181. Ueberſ.
w) Hist. des Ois. v. p. 158.
x) Latham Ind. orn. II. p. 515. n. 32. B.
y) Ueberſ. XV. S. 147. Nr. 1. B.
z) Latham Ind. orn. II. p. 518. n. 33. B.
a) Ueberſ. B. XV. S. 150. Nr. 3. B.

Dieſer Vogel hat die Größe der Wieſenlerche, und ihre Länge iſt fünf und drey Viertel Zoll. Ihr Schnabel iſt ſchwarz, und gegen die Spitze hin etwas gebogen; alle obern Theile, vom Kopf bis zum Schwanz, ſind aſchgrau und dunkelbraun gemiſcht; über den Augen, von den Naſenlöchern an, iſt ein weißer Streifen; die untern Theile ſind gelblich, mit ſchwarzen Streifen; dieſe Streifen ſind an den Seiten und an der Bruſt am breiteſten, und faſt wie bey der Wieſenlerche *b*); die Füße hell röthlichbraun.

Er wird in Louiſiana gefunden, man trifft ihn aber auch in den Hecken um Neuyork an. Niemals ſieht man ihn aber in großen Flügen.

30. Der ockergelbe Sänger. (Vmbrose W.)

Motacilla umbria. L. I. 2. p. 959. No. 70. *c*).
La Fauvette ombrée de la Louisiane. Buff. ois. V. p. 162.
La Fauvette tachetée de la Louisiane. Pl. enlum. 709. 1. *d*).

Er hat die Größe des letzten, und iſt ohngefähr ſechsthalb Zoll lang. Sein Schnabel iſt kleiner und ſchwarz; die obern Theile ſind graulichbraun, am Rücken undeutlich ſchwarz gefleckt; die Seiten und der Steiß gelblich angeflogen; die Deckfedern der Flügel, die obern Deckfedern des Schwanzes und der Schwanz ſelbſt dunkelbraun, mit weißen Rändern; die großen Schwungfedern dunkelbraun; die untern Theile weiß, ſparſam mit kleinen, ſchwarzen Flecken bezeichnet; die Füße dunkelbraun.

Er iſt mit letzterm in Louiſiana zu Hauſe.

Büffon ſcheint beyde für verwandt zu halten; aber ſie weichen zu ſehr in der Stärke und Größe des Schnabels von einander ab, wie oben bemerkt worden iſt; und dieß iſt hinlänglich, um auch die bloße Möglichkeit irgend einer Verwandſchaft zu vertilgen *e*).

31. Das Gelbkehlchen. (Der gelbkehlige Sänger. Yellow-throated W.)

Motacilla flavicollis. L. I. 2. p. 959. No. 71. *f*).
La Mesange grise de la Caroline. Briss. orn. III. p. 563. No. 10.
La Mesange grise à gorge jaune. Buff. ois. V. p. 454. *g*).
Yellow-throated Creeper. Catesby Carol. I. pl. 62. *gg*). — Arct. Zool. II. No. 286. *h*).

Von der Größe des Stieglitzes, und fünf und ein Viertel Zoll lang. Der Schnabel iſt einen halben Zoll lang, und ſchwarz; die Stirn ſchwarz; zu beyden Seiten der Wurzel des Schnabels iſt ein gelber Fleck; Kehle und Vorderhals ſind lebhaft gelb, und dieß iſt zu beyden Seiten des Halſes mit einem ſchwarzen Band eingefaßt, das an den Mundwinkeln anfängt, und zwiſchen den Augen durchgeht; die obern Theile des Kopfs, des Halſes und des Körpers

b) Tit-Lark. ſ. oben, die 39ſte Gattung No. 5. Alauda pratensis L. Ueberſ.
c) Latham Ind. orn. II. p. 518. n. 33. B.
d) Ueberſ. B. XV. S. 150. 151. Nr. 3. B.
e) In den Pl. enlum iſt der Scheitel hellgelb.
f) Latham Ind. orn. II. p. 618. n. 35. B.
g) Ueberſ. B. XVII. S. 150. Nr. 4. B.
gg) Seligmanns Vögel III. Taf. 24. B.
h) Ueberſ. II. S. 372. Nr. 203. B.

pers ſind ſehr ſchön grau; die untern Theile von der Kehle an weiß, an den Seiten ſchwarz gefleckt; die Deckfedern der Flügel ſpielen ins Braune, und ſind mit zwey weißen Streifen durchzogen; die Schwungfedern ſind wie die Deckfedern, aber einfärbig; der Schwanz iſt etwas gabelförmig und ſchwarz, alle ſeine Federn, die zwey mittlern ausgenommen, an den innern Fahnen weißlich; die Füße braun.

Das Weibchen iſt weder mit Schwarz, noch mit Gelb bezeichnet; wodurch ſich das Männchen ſo vorzüglich auszeichnet.

Sie iſt in Carolina in Menge einheimiſch.

In dem Muſeum des Herrn Tunſtalls, Eſqr. habe ich eine Spielart von dieſem Vogel bemerkt. Der Schnabel iſt einfarbig hornfarben; das Gelbe an der Kehle nicht mit Schwarz eingefaßt; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern weiß geändert; der Bauch weiß; der Schwanz gleich und einfarbig. — Wahrſcheinlich iſt dieß ein junges Männchen, das ſein volles Gefieder noch nicht hat *i*).

32. Der gelbbrüſtige Sänger. (Yellow-breasted W.)

Turdus Trichas. L. I. 2. p. 811. No. 6. *k*).
Le Figuier de Maryland. Briss. orn. III. p. 506. Mo. 58.
Le Figuier aux joues noires. Buff. ois. V. p. 292. *l*).
Maryland Yellow-Throat. Edw. pl. 237. *m*) — Petifer. Gazo Myl. pl. 6. f. 1.
Yellow-breasted Warbler. Arct. Zool. II. No. 283. *n*).
Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß iſt eine kleine Art, die nur fünf Zoll lang iſt. Der Schnabel iſt braun; zu beyden Seiten an der Wurzel ſtehen einige wenige, zerſtreute Barthaare; die obern Theile ſind dunkelolivenbraun; die Stirn iſt ſchwarz, und dieß vereinigt ſich mit einem breiten Flecken von der nämlichen Farbe an beyden Seiten des Kopfs, in deſſen Mitte die Augen liegen; der Scheitel iſt röthlichbraun; Kehle und Bruſt ſind lebhaft gelb; Bauch und After gelblichweiß, letzter ſtark ans Gelbe gränzend; Schwungfedern und Schwanz haben gelblich-olivenfarbene Ränder; die Füße ſind matt fleiſchfarben.

Er iſt in Carolina, Maryland und Penſylvanien zu Hauſe, wo er ſich in feuchten Wäldern aufhält, aber nur im Sommer angetroffen wird.

32. Var. A. La Fauvette à poitrine jaune de la Louisiane. Buff. ois. V. p. 162. *o*).
— Pl. enlum. 709. 2. *p*)
Lev. Mus.?

Die

i) Dieß wird dadurch beſtätigt, daß Hr. Latham dieſe Varietät nicht in Ind. angeführt hat. B.
k) Latham Ind. orn II. p. 519. n. 36. B.
l) Ueberſ. B. XVI. S. 106. Nr. 9. B.
m) Seligmanns Vögel VII. Taf. 25. B.
n) Ueberſ. II.
o) Ueberſ. B. XV. S. 152. Nr. 4. B.
p) Arct. Zool. II. p. 284. Ueberſ. II. S. 371. B. 201. Von Pennant wird er hier als eine beſondere Species aufgeſtellt, ſo wie von Büffon. B.

Die Länge dieſer Varietät iſt ſechsthalb Zoll. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; die Stirn bis mitten auf den Scheitel ſchwarz, und dieß läuft zwiſchen den Augen und dem Schnabel fort, geht unter den Augen weg, und endigt ſich hinter denſelben in einen breiten Flecken; queer über den Scheitel, von einem Auge zum andern, iſt ein weißes Band; die obern Theile des Körpers ſind olivenfarbig; die untern gelb, an den Seiten ins Orangefarbne ſpielend; der Schwanz abgerundet *q*); die Füße röthlich.

Sie iſt in Louiſiana zu Hauſe, und ein ungemein ſchöner Vogel.

33. Der rothſchwänzige Sänger. (Rufous-tailed W.)

Motacilla ruficauda. L. I. 2. p. 959. No. 72. *r*).
La Fauvette de Cayenne à queue rousse. Buff. ois. V. p. 163. *s*).

Seine Länge iſt fünf und ein Viertel Zoll. Die obern Theile bis zum Steiß ſind braun, auf dem Rücken gelbroth überlaufen; die Deckfedern der Flügel und der Schwanz gelbroth; die Schwungfedern gelbroth geändert; die Kehle weiß, hell gelbroth eingefaßt, und braun getüpfelt; die Bruſt lichtbraun; die übrigen untern Theile weiß, mit einem gelbrothen Anſtrich an den untern Deckfedern des Schwanzes.

Er hält ſich in Cayenne auf.

34. Der gelbbäuchige Sänger. (Yellow-bellied W.)

Motacilla fuscicollis. L. I. 2. p. 959. No. 73. *t*).
La Fauvette de Cayenne à gorge brune et ventre jaune. Buff. ois. V. p. 163. *u*).

Er hat die Größe des Weidenzeiſigs *v*). Der Schnabel iſt breit und platt an der Wurzel, faſt wie bey den Fliegenfängern; die obern Theile des Kopfs und des Körpers ſind grünlichbraun; die Kehle eben ſo; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern braun, mit hellgelbrothen Rändern; die Deckfedern des Schwanzes grünlich; Bruſt und Bauch gelb, mit einem gelben Anſtrich.

Sie iſt in Cayenne zu Hauſe.

35. Der blaugraue Sänger. (Blue-grey W.)

Motacilla caerulescens. L. I. 2. p. 960. No. 71. *w*)
La Fauvette bleuâtre de St. Domingue. Buff. ois. V. p. 164. *x*).

Dieß iſt eine kleine Art, die nur fünfthalb Zoll in der Länge mißt. Das Gefieder an den obern Theilen iſt aſchgraulichblau; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern ſind braun, an

q) Sollte ſie nicht der abgerundete Schwanz zu einer beſondern Art machen? Sonſt wäre ſie vielleicht der höhern Farbe halber das Männchen. B.
r) Latham Ind. orn. II. p. 519. B.
s) Ueberſ. XV. 154. Nr. 5. B.
t) Latham Ind. orn. II. p. 520. n. 38. B.
u) Ueberſ. B. XV. S. 155. Nr. 6. B.
v) Yellow-Wren. ſ. unten No. 147. M. Trochilus L. Ueberſ.
w) Latham Ind. orn. II. p. 520. n. 39. B.
x) Ueberſ. B. XV. S. 156. Nr. 7. B.

an jenen iſt ein weißer Fleck, und dieſe haben aſchgraulichblaue Ränder; die Kehle iſt ſchwarz, und die übrigen untern Theile ſind weiß.

Er bewohnt St. Domingo.

36. Der gelbrückige Sänger. (Yellow-backed W.)

Motacilla americana. L. I. 2. p. 960. y). No. 75.
Lev. Mus.

Der Schnabel iſt blaß; der Kopf, der Hinterhals, der Rücken und der Schwanz ſind aſchgraulichblau; zwiſchen den Schultern iſt die Farbe olivengelb; Kehle und Bruſt ſind gelb; der Bauch weiß; die Spitzen der Deckfedern der Flügel eben ſo, und dieß bildet einen Streifen; das Ende des Schwanzes ſehr blaß; die Füße hellbraun.

Er iſt in Amerika zu Hauſe.

37. Der künſtliche Sänger. (Pensile W.)

Motacilla pensilis. L. I. 2. p. 960. No. 76. z).
Le Cou-jaune. Buff. ois. p. 165. a) — Pl. enlum. 686. f. 1.

Er hat die Größe der Gartengrasmücke (No. 3.), und iſt vier und drey Viertel lang. Sein Schnabel iſt dunkelbraun; der Kopf grünlichſchwarz, das gegen den Hinterhals hin heller wird, welcher letzte nebſt dem Rücken dunkelgrau iſt; über den Augen, und um dieſelben herum iſt ein weißer Streifen; und zwiſchen den Augen und dem Schnabel eine Reihe gelber Tüpfeln, die ſich mit dieſem vereinigt; die Deckfedern der Flügel ſind bandartig weiß und ſchwarz; die Schwungfedern grau eingefaßt; Kehle, Hals und Bruſt gelb; die Seiten des Halſes mit ſchwarzen Flecken bezeichnet; der Bauch weiß; die Seiten ſchwarz getüpfelt; Schwungfedern und Schwanz dunkelgrau, und die vier äußern Federn des letztern mit großen, weißen Flecken bezeichnet; die Füße grünlichgrau.

Dieß iſt ein ungemein ſchöner, kleiner Vogel und ſeine Kunſttriebe (manners) ſind eben ſo auszeichnend als ſeine Schönheit. Er befindet ſich auf St. Domingo, und macht ein Hang-Neſt von wunderbarer Bauart. Es beſteht aus kleinen, dürren Pflanzenfaſern, kleinen Wurzeln und abgefallenem Laube, hängt an dem Rücken an, und iſt ein Spiel jedes Windſtoßes. Die Oeffnung iſt an dem untern Theile, durch welche der Vogel über eine Art von Scheidewand (partition) ein klein wenig in die Höhe, und dann wieder in den Grund hinabſteigt, wo er ſeine Eyer auf einen weichen, flaumartigen, daſelbſt ausgebreiteten Stoff legt, und ſeine Jungen in vollkommener Sicherheit ausbrütet. Er legt nur drey bis vier Eyer, aber öfter als einmal des

y) Latham Ind. orn. II. p. 520. n. 20. Figuier cendré de la Caroline Büff. V. p. 301. Ueberſ. XVI. S. 124. Nr. 16. Planch. enl. 731. Fig. 1. Seligmanns Vögel III. Taf. 28. Parus americanus Linné Syst. XII. I. p. 341. n. 4. B.

z) Latham Ind. orn. II. p. 520. n. 41. B.

a) Ueberſ. B. XV. S. 155. Nr. 8. B.

des Jahrs; denn man hat Junge im Junius, auch im März, und zu Ende des Augusts oder Anfang des Septembers gesehen.

Er pflegt besonders gern sein Nest an solche Zweige (withs) aufzuhängen, die von einem Baum zum andern herüber reichen, und vorzüglich an diejenigen, die übers Wassers hängen, wodurch der Zweck der Sicherheit noch gewisser erreicht wird.

Uebrigens haben diese Art Vögel einen sehr sanften Gesang, den sie das ganze Jahr hindurch hören lassen, obschon sie zu einer Zeit besser singen, als zur andern. Sogar das Weibchen hat seinen Gesang, der aber dem des Männchens weit nachsteht.

Ihre Nahrung besteht wohl vorzüglich in Insekten, wenn sie gleich auch zuweilen süße Früchte angehen; ob sie aber dieselben nicht bloß der Insekten halber anfressen, weiß man nicht.

36. Das Rothkehlchen. (Red-breast.)

Motacilla Rubecula. L. I. 2. p. 993. *b*). No. 45. — Faun. Suec. No. 260. — Scop. ann. I. No. 231. *c*). — Kram. elench. p. 376. No. 13. — Brünn. orn. No. 283. — Müller Zool. No. 276. — Frisch tab. 19. — Olin. uccell. pl. in p. 16.

Le Rouge gorge. Briss. orn. III. p. 418. No. 21. Buff. ois. V. p. 196. pl. 11. *d*). Pl. enlum. 361. f. 1.

Robin Red-breast, or Ruddock. Ray Syn. p. 78. A. 3. — Will. orn. p. 219. pl. 39. — Albin. I. pl. 51. — Br. Zool. I. No. 147. *e*). — Arct. Zool. II. p. 417. D. *f*).

Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß bedarf nur eine kurze Beschreibung; denn es ist genug, wenn ich sage, daß die obern Theile grünlich aschfarben; die Stirn, die Kehle, der Hals und die Brust gelbroth orangefarben; Bauch und After weißlich, und Schnabel, Füße und Seiten des Körpers dunkelfarbig sind.

Es ist ein beständiger Bewohner unsrer Königreiche, so wie des ganzen festen Landes von Europa, von Schweden bis nach Italien; und wird von einigen für einen Zugvogel ausgegeben, wenigstens der größere Theil derselben. In großer Menge findet er sich in Burgund und Lothringen, wo man sehr viele für die Tafel fängt, und sie vortrefflich findet *g*).

Die Wanderung dieses Vogels ist, wie Büffon bemerkt, nicht so sichtbar, wie bey andern Zugvögeln, denn er pflegt sich nicht in ganze Flüge zu vereinigen, sondern jeder Vogel geht allein. Wie dieser Umstand sich in Rücksicht Englands verhalte, darüber kann ich noch nicht entscheiden *h*); inzwischen glaube ich Büffon beystimmen zu müssen; und Skopoli *i*) erwähnt

b) Latham Ind. orn. II. p. 520. n. 42. B.

c) Uebers. S. 191. Nr. 231. B.

d) Uebers. XV. S. 209. Nr. 16. B.

f) Uebers. II. S. 389. und Vergl. auch Zorns Pethinoth. II. S. 388. Meine N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 537. Nr. 10. und N. G. der Stubenvögel. S. 423. Nr. 97. B.

g) So auch in Thüringen. B.

h) Daß er in Gesellschaft ziehen müsse, wird daraus klar, daß im Frühjahr in Thüringen in einem Morgen alle Hecken voll Rothkehlchen sind, so auch im Herbst, und daß sie auch so plötzlich wieder verschwinden. Daß sie des Nachts ziehen müssen, und oft in der dunkelsten Nacht, ist auch gewiß. B.

i) Circa aequinoctium venit, migrat, etsi aliquae hyemem ferant.

wähnt seiner, als eines Zugvogels in Krayn. Dem sey, wie ihm wolle, so ist gewiß, daß man im Winter mehrere sieht, als im Sommer, weil sie sich dann an bewohnten Plätzen aufhalten; bey welchen man im Sommer nur sehr wenige bemerkt, weil sie sich größtentheils in die Wälder zurückziehen, um zu nisten.

Ihr Nest besteht aus dürrem Laub, mit Haaren und Moos vermischt, und mit Federn ausgelegt. Die Eyer sind von dunkel weißer Farbe, mit unregelmäßigen, röthlichen Flecken; und fünf bis sieben an der Zahl. Sie bauen nicht weit vom Boden, wenn sie in einem Busche nisten, doch befestigen sie ihr Nest zuweilen an ein Hinterhaus, oder an einen versteckten Theil eines alten Gebäudes [k]).

Wenn die jungen Vögel ihr volles Gefieder haben, so könnte man sie für eine verschiedene Art halten, denn sie sind über und über gefleckt. Die ersten Spuren vom Rothen kommen an der Brust, um den Ausgang des Augusts, zum Vorschein; es dauert aber bis zu Ende des Septembers, ehe sie ihre vollständige Farbe bekommen.

Kein Vogel ist so zahm und zutraulich, als dieser; er folgt dem Gärtner der Würmer wegen dicht auf den Fersen nach, wenn sich dieser mit den Spaten beschäfftigt, im Winter kommt er oft in die Häuser, wenn ein Fenster offen steht, und pickt die Brodkrumen vom Tische weg, während die Familie ihre Mahlzeit hält.

Insekten sind sein gewöhnliches Futter, doch frißt er in Ermangelung derselben, auch viele andre Dinge [l]).

Seine Zutraulichkeit ist Ursache, daß man ihm in verschiedenen Ländern einen Spitznamen (pettyname) gegeben hat. Das Volk in Bornholm nennt ihn Tommiliden; in Norwegen, Peter Ronsmad; die Deutschen, Thomas Gierdet; und wir Rothbrüstchen (Robin Red-breast).

Ein ganz weißer ist in der Sammlung des Herrn Tunstall's, Esq.

38. Var. A. Motacilla Rubecula. L. I. 2. p. 993. No. 45. β.
Rouge-gorge de Bologne. Briss. orn. III. p. 322. No. 22.
Spipola prima. Aldrov. Ray. Syn. p. 80. No. 5. — Will. orn. p. 210.

Größer, als das Rothkehlchen. Der Schnabel braun; Kopf, Hinterhals und Rücken aschfarben; die Kehle weiß; Vorderhals und Brust gelbroth geschäckt; die Schwungfedern schwarz, mit weißen Rändern, und die kürzern mit gelbrothen; der Schwanz wie großen Schwungfedern; die Füße gelb; die Klauen schwarz [m]).

k) Im Thüringer Wald nisten sie in großer Menge. Allzeit an der Erde im Moos, in einem alten Maulwurfsloch, oder unter einem alten Stock. B.

l) Im Herbst rothe und schwarze Hollunderbeeren. B.

m) Ich führe noch an: Var. B. Das weiße Rothkehlchen.
Mot. R. alba. Es ist, wie Latham oben sagt, ganz weiß.
Var. C. Das weißbrüstige Rothkehlchen.
M. R. leucothorax.

Schna-

Es findet ſich zu Bologna, und ſcheint der vorige Vogel zu ſeyn, der ſein volles Gefieder noch nicht bekommen hat *n*).

39. Das Blaukehlchen. (Blue-throated W.)

Motacilla suecica. L. I. 2. p. 989. No. 37. *o*) — Faun. Suec. No. 259. — Georgi Reise. p. 174. — Frisch tab. 19. *p*).
Le Gorge-bleue. Briss. orn. III. p. 413. No. 19. — Buff. ois. V. p. 206. pl. 12. *q*).
Le Gorge-bleue à tache blanche. Pl. enlum. 361. f. 2. ohne weißen Fleck. 610. f. 1. (das Weibchen,) f. 2. — ein Junges. f. 3.
Gorge-bleue de Gibraltar. Briss. orn. III. p. 416. No. 20. (das Weibchen.)
Wegflecklin. Ray Syn p. 78. A. 5. No. 3. — Will. orn. p. 219.
Blue-throated Redstart. Edw. pl. 28. *r*). — Arct. Zool. II. p. 417. C. *s*). Lev. Mus.

Dieſes ſcheint ſehr nahe mit dem Rothkehlchen verwandt zu ſeyn, und hat faſt einerley Größe mit ihm. Die Farbe der obern Theile iſt faſt die nämliche; über den Augen iſt ein gelbröthlichweißer Streifen; Kehle und Vorderhals ſind lebhaft azurblau; unter dieſem iſt ein ſchwarzer Saum; und unter dieſem iſt die Bruſt roth; Bauch, Schenkel und After ſind dunkelfarbigweiß; der Schwanz braun, wie die obern Theile des Vogels; aber die Endhälfte aller Schwanzfedern, die zwey mittlern ausgenommen, iſt orangeroth.

Dieß iſt die Beſchreibung des Männchens, wovon einige Spielarten einen ſchönen, ſilberweißen Flecken, von der Größe eines Silberpfennigs, in der Mitte des Blauen am Vorderhalſe haben *t*).

Das

Schnabel und Füße ſind aſchgrau; Stirn, Kehle, Bruſt und Bauch weiß; um die Augen gelblichweiß; der Oberleib aſchgrau grünlich überlaufen; die Schwingen und der Schwanz gelblich weiß, am leztern die äußern Federn graulich.

Ich hätte es für einen andern Vogel gehalten, wenn nicht Stellung und Stimme mir des Rothkehlchen deutlich beſtimmt hätten.

Var. D. Das bunte Rothkehlchen. M. R. varia.

Es hat unordentliche weiße Flecken auf verſchiednen Theilen des Körpers. Zuweilen habe ich auch weißſchwingige und weißſchwänzige ſelbſt gemacht, indem ich denſelben einigemal hinter einander in der Stube die Schwung- und Schwanzfedern auszog. B.

n) Ray vermuthet, es ſey das Müllerchen (ſ. oben No. 19.)

o) Latham Ind. orn. II. p. 521. n. 43. B.

p) Taf. XIX. Fig. 2. a. Ein Männchen. b. Ein junges Männchen; auch die Weibchen ſehen nach der zweyten Mauſerung ſo aus. Taf. XX. Fig. 1. b. Ein Weibchen vom Blaukehlchen. B.

q) Ueberſ. XV. S. 225. Nr. 16. B.

r) Seligmanns Vögel II. Taf. 55. B.

s) Ueberſ. S. 389. C. Vergl. auch Zorns Pethinoth. II. S. 430. Meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 538. Nr. 11. Getreue Abbildung darzu. Taf. IX. Fig. 1. 2. Männchen und Weibchen. N. G. der Stubenvögel. S. 429. Nr. 91. B.

t) Wahrſcheinlich ſind die mit den weißen Flecken alte Vögel, weil man bemerkt hat, daß das blaue an der Bruſt bey ihnen von dunklerer Farbe iſt. (Es iſt grade umgekehrt. So wie der Vogel älter wird, wird auch der weiße

Fleck

Das Weibchen hat an den obern Theilen einerley Farbe mit dem Männchen, unterſcheidet ſich aber durch die untern. Bey ihm iſt die Kehle weiß; über den Hals geht ein blaues Band, das unten mit einem andern, ſchwarzen eingefaßt iſt; die übrigen untern Theile ſind dunkelfarbig weiß.

Dieſe Vögel finden ſich in vielen Gegenden Europens, doch nirgends ſo häufig, als das Rothkehlchen. Den oben angeführten Schriftſtellern zu Folge, findet man ſie in verſchiedenen Ländern zwiſchen Schweden und Gribaltar. Sie halten ſich nicht in Wäldern auf, wie das Rothkehlchen, ſondern am Waſſer, unter Schilfrohr u. d. gl. und ihr Neſt machen ſie häufig auf die Weidenbäume, aus Gras u. ſ. w [u]).

Die Schriftſteller bemerken, daß ſie einen angenehmen Geſang hätten, und einige behaupten, ſie ſängen bey der Nacht [v]).

Die Jungen bekommen ihre Farbe an der Bruſt erſt nach einiger Zeit, wie die letzte Art, und ſind vorher, wie jene, auf dieſer Stelle nur braun gefleckt.

Man hat bemerkt, daß die ſchöne, blaue Farbe verlohren geht, wenn der Vogel im Käfig gehalten wird, und daß er ſie nicht wieder bekommt, bis nach dem erſten Mauſern [w]).

Im Elſaß ſind ſie ſehr gemein, ſie werden daſelbſt für eine ſehr gute Speiſe gehalten, und ihrer zu gewißen Zeiten viele für die Tafel gefangen [x]).

40. Der blaue Sänger. (Blue W.)

Motacilla Sialis. L. I. 2. p. 986. No. 38. y)!
Le Rouge-gorge bleue de la Caroline. Briss. orn. III. p. 423. No. 23. — Buff. ois. V. p. 212. z). — Pl. enlum. 390. f. 1. 2.
Blue Red-breast. Edw. pl. 24.
Blue-Bird. Catesby Carol. I. pl. 47. a). — Arct. Zool. II. No. 281. b). Br. Mus. Lev. Mus.

Dieſer iſt größer, als unſer Rothkehlchen und fünf und drey Viertel Zoll lang. Der Schnabel iſt ſchwärzlich; die obern Theile des Gefieders ſind ſehr ſchön blau; die Kehle, der Vorderhals, die Bruſt und die Seiten ſchön gelbroth; der Bauch und die untern Deckfedern des Schwanzes weiß; die Füße ſchwarz. Einige Vögel haben eine Miſchung von Blauem an der Bruſt.

Fleck, deren ſie auch zwey und drey haben, kleiner, und verliert ſich zuletzt ganz. Daher auch die mit ganz blauen Vorderhals ſelten ſind. B.

u) Sie niſten in Erdlöcher, am Ufer der Teiche und Flüſſe. B.

v) Frtſch. — Beydes iſt wahr. Es iſt ein ſehr angenehmer Stubenvogel, muß aber wie die Nachtigall gehalten werden. B.

w) Das Blaue wird nach und nach bläſſer, doch bleibt es immer ſchön glänzend. B.

x) Bey uns ſieht man ſie beſonders häufig im April auf ihren Wiederzuge an Teichen und Bächen, und vom Auguſt an in den Kohlfeldern, wo ſie ſich wie die braunkehligen Steinſchmätzer aufhalten, denen ſie auch in ihrem Betragen gleichen. B.

y) Latham Ind. orn. II. p. 522. n. 44. B.

z) Ueberſ XV. S. 235. Nr. 1. B.

a) Seligmanns Vögel I. Taf. 47. II. S. 94. B.

b) Ueberſ. II. S. 370. B.

Das Weibchen ist nicht sehr verschieden; aber seine Farben sind nicht ganz so lebhaft; das Blaue ist mit einer dunklen Farbe vermischt, und die kürzern Schwungfedern haben weiße Ränder.

Diese Art ist ein Zugvogel, die sehr zeitig im Frühjahr nach Carolina, Virginien, Jersey und Neuyork kommt, zuweilen gar schon, wenn der Schnee noch liegt. Vermuthlich kommt sie in ganzen Flügen an, weil eine große Menge zu gleicher Zeit erscheint. Sie nährt sich von dem frühen Uferaas (Ephemera) im März; besucht die Felder, auf denen Türkischer Waizen und Wollkraut wächst, und sitzt auf den Halmen, um die Fliegen wegzufangen. Man sieht sie auch oft auf Schranken (rails), und sie springt nach Fliegen, die sie erreichen kann, wie ein Fliegenfänger. Niemals bemerkt man sie auf Bäumen, ob sie gleich ihr Nest in die Löcher derselben bauen soll. Sie fliegt schnell, und hat eine klägliche Stimme, aber nichts, was man einen Gesang nennen könnte.

Sie wird auch auf den Bermudischen Inseln angetroffen.

41. Die weißbrüstige Grasmücke. (White-breasted W.)

Motacilla dumetorum. L. I. 2. p. 985. N. 31. — Kram. elench. p. 377. No. 19. — Georgi Reise. p. 174.

Die obern Theile des Körpers sind aschbraun; der Kopf bläulich; Kehle und Brust weiß *c*).

Sie ist in Rußland zu Hause.

42. Der zimmetbraune Sänger. (Cinnamon W.)

Motacilla cinnamomea. L. I. 2. p. 985. No. 32.

Er ist dem Rothschwänzchen sehr ähnlich. Die obern Theile des Körpers sind schimmelgrau; die Kehle schwarz; Brust, Bauch und Steiß karmoisinroth; die Schwungfedern schwarz; die vier ersten an der Wurzel roth, und dieß bildet bey Einem Geschlecht einen rothen Flecken an diesem Theil; der Schwanz schwarz; seine vier mittlern Federn schief gelbroth an den Seiten.

Sie ist auf Zeylan zu Hause.

43. Der schwarzschnäblige Sänger. (Black-jawed W.)

Motacilla nigrirostris. L. I. 2. p. 986. No. 155. *d*).

Seine Länge ist sieben Zoll. Der Schnabel schwarz, und an der Wurzel blaß; das Gefieder an den obern Theilen olivenbraun; die Mitte jeder Feder am dunkelsten; von der Wurzel des Schnabels bis zu den Augen ist die Farbe röthlichgelb (rufous yellow); die Kehle eben so; zu beyden Seiten des Schnabels ist ein schwärzlicher Streifen; die Brust gelbroth, der Länge nach schwärzlich gestreift; der Bauch weiß; die Seiten dunkel olivenbraun, mit röthlichweißen Spiz-

c) Dieß ist das Müllerchen Nr. 6. besonders das Weibchen und die Jungen. B.

d) Latham Ind. orn. II. p. 522. n. 46. B.

Spitzen; die Schwungfedern noch dunkler, mit gelblichen Rändern; der Schwanz gleich, ſeine Federn aber an den Enden zugeſpitzt, die äußerſte Feder weiß; das Ende der zweyten eben ſo, die übrigen braun; die Füße hell gelbbraun.

In der Sammlung des Sire Joſ. Banks.

44. Der roſtköpfige Sänger. (Rusty-headed W.)

Motacilla borealis. L. I. 2. p. 986. No. 157 *e*).

Er iſt fünf Zoll lang. Sein Schnabel iſt blaß; Stirn, Kehle und Seiten des Kopfs ſind roſtigroth, die zwey erſtern ſehr blaß; die obern Theile des Körpers grün, die untern gelb, beyde ins Olivenfarbne ſpielend; der Schwanz abgerundet, die Spitzen aller ſeiner Federn, die zwey mittlern ausgenommen, beynahe weiß; die Füße dunkelfarbig.

Er iſt in Kamtſcharka zu Hauſe.

45. Der Sänger mit gelblichem Geſichte. (Buff-faced W.)

Motacilla lutescens. L. I. 2. p. 986. No. 156. *f*).

Seine Länge iſt ſechs Zoll. Der Schnabel iſt dunkelfarbig; Stirn und Kinn ſind dunkelſohlenlederfarbig; an den Ohren iſt ein dunkelrother Fleck; die obern Theile des Körpers und die Deckfedern des Schwanzes ſind roſtigbraun; die untern Theile röthlichweiß, über die Bruſt herüber dunkelfarbig geſprenkelt; die Füße hellbraun.

In der Sammlung des Sire Joſ. Banks. Das Vaterland iſt unbekannt.

46. Der ſchwarzkehlige Steinſchmätzer oder der Steinpicker. (Stone-Chat.)

Motacilla Rubicula. L. I. 2. p. 969. No. 17. *g*). — Scop. ann. I. No. 236. *h*). Kram. elench. p. 375. No. 6. — Georgi Reise. p. 173.

Le Traquet. Briss. orn. III. p. 328. No. 25. pl. 23. f. 1. (das Männchen.) — Buff. ois. V. p. 215. pl. 13. *i*) — Pl. enlum. 678. f. 1. — Salerne. orn. p. 224.

Tschekantschiki. Lepechin in Nov. Comment. Acad. Petrop. Vol. XV. p. 488. tab. 25. Fig. 3.

Stone Smith, Stone-chatter, Moor Titling. Ray Syn. p. 76. A. 5. — Will. orn. p. 235. pl. 41. — Albin. I. pl. 42. — Br. Zool. I. No. 159. k). — Arct. Zool. *l*).

Lev. Mus.

Er

e) Latham Ind. orn. II. p. 522. n. 47. B.
f) Latham Ind. orn. II. p. 522. n. 48. B.
g) Latham Ind. orn. II. p. 523. n. 49. B.
h) Ueberſ. S. 194. Nr. 236. B.
i) Ueberſ. B. XV. Nr. 2. B.
k) Ueberſ. S. 118. Taf. 55. Fig. 5. 6. Männchen und Weibchen. B.
l) Hier finde ich ihn nicht. Vergl. meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 542. Nr. 19. N. G. Deutſchlands IV. Taf. 23. B.

Er hat über vier, und drey Viertel Zoll in der Länge. Sein Schnabel iſt ſchwarz. Beym **Männchen** ſind die obern Theile des Körpers ſchwärzlich und hellgelbroth gemiſcht; die Federn mit letzterer Farbe geändert; der Kopf, der Hals und die Kehle aber ſind faſt ſchwarz; zu beyden Seiten des Halſes iſt ein weißer Streifen, die Bruſt iſt röthlichgelb; der Bauch heller, der After faſt weiß; der Steiß ganz weiß; die äußern Ränder und die Endſpitzen der zwey äußerſten Schwanzfedern hell roſtigroth, die übrigen ſchwarz; die Schwungfedern dunkelfarbig, mit roſtigrothen Rändern, die zunächſt am Körper ſtehenden ſind an der Wurzel (bottom) mit einem weißen Flecken bezeichnet; an den Deckfedern der Flügel iſt ein anderer von eben dieſer Farbe; die Füße ſind ſchwarz.

Das **Weibchen** hat ungleich weniger lebhafte Farben; der Scheitel iſt wie die obern Theile und nicht ſchwarz; Seiten und Kehle am hellſten; das Weiße an den Seiten des Halſes iſt nicht ſo ſichtbar, und Bruſt und Bauch ſind viel bläſſer; der weiße Fleck an den Flügeln iſt der nämliche; aber der am Steiß fehlt ganz.

Dieſe Vögel halten ſich bey uns gröſtentheils an trocknen Plätzen, als Heiden und Gemeinde triften (commons) auf, und leben von Inſekten aller Art. Sie machen ihr Neſt zeitig an den Fuß eines niedern Gebüſches, oder unter einen Stein. Der Eyer ſind fünf bis ſechs an der Zahl, von bläulichgrüner Farbe, mit matt gelbrothen Flecken ſparſam bezeichnet. Sie ſind ſo liſtig, daß ſie den Platz, wo ihr Neſt angebracht iſt, nicht verrathen; denn ſie nähern ſich ihm immer nur bis auf eine gewiſſe Entfernung, und kriechen dann vollends auf dem Boden auf eine äußerſt verſtohlene Weiſe, zu demſelben; daher man es nicht anders, als durch bloßen Zufall, finden kann.

Es ſind unruhige Vögel, die unaufhörlich von Buſch zu Buſch fliegen. Bey uns ſind ſie keine Zugvögel [m]); doch ſieht man ſie oft im Winter auf feuchten Plätzen, wenn das Futter auf den trocknen ſelten zu werden anfängt.

Ich finde nicht, daß man irgendwo eines Geſangs von ihnen gedacht hätte. **Büffon** vergleicht ihre Stimme mit dem oft wiederholten Worte **quiſtrata**; ich dächte aber eher, ſie ſey vollkommen dem Klappern zweyer Steine, wovon in jeder Hand einer gehalten wird, ähnlich. Wenn andere das Nämliche fanden, ſo iſt leicht zu erklären, warum man dieſen Vogel **Steinſchmätzer** (Stone-Chatter) genannt hat.

47. Der Madagaskariſche Steinſchmätzer. (Sybill W.)

Motacilla Sibilla. L. I. 2. p. 992. No. 44. *n*).

Le Traquet de Madagascar. Briss. orn. III. p. 439. No. 28. pl. 24. f. 4. — Buff. ois. V. p. 231. *o*).

Lev. Mus.

Er

m) In **Frankreich** ſollen ſie im September die mehr nördlich gelegenen Gegenden verlaſſen. Hist. des Ois. — (Bey uns ebenfalls, und kommen im May wieder. **B.**)

n) Latham Ind. orn. II. p. 523. n. 50. **B.**

o) Ueberſ. XV. S. 268. n. 5. **B.**

Er ist sehr nahe mit den letzten verwandt, aber etwas größer. Der Kopf, der Hals und die obern Theile des Körpers sind schwarz; die Federn auf dem Rücken aber, und die Deckfedern der Flügel haben lohgelbe Ränder; er hat den weißen Fleck an den Flügeln, wie die letzte, hingegen fehlt ihm der am Steiß; die Schwanzfedern sind ganz schwarz; die untern Theile sind weiß, und dieß zieht sich nach hinten zu beyden Seiten nach dem untern Theil des Halses hin, wie ein halbes Halsband; die Brust ist gelbroth. Beym ersten Anblick könnte man ihn für die letzte Art halten.

Er wird auf Madagaskar gefunden, wo er Fitert heißt. Er soll gut singen.

47. Var. A. Der Cafferſche Steinschmätzer.

Motacilla sperata. Latham. Ind. orn. II. p. 529. No. 51. *p*).
Le Traquet du Cap de bonne Esperance. Buff. ois. V. p. 233 *q*).

Seine Länge ist sechs Zoll. Der Schnabel schwarz; die obern Theile des Kopfs, des Halses und des Körpers sind dunkel grünlichbraun; die untern Theile grau, mit einem gelbrothen Anstrich; und der Steiß hat auch diese letzte Farbe; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern sind braun, mit heller braunen Rändern; der Schwanz ein wenig gabelförmig, seine zwey mittlern Federn schwärzlichbraun, die andern nach einer schiefen Richtung braun und rothgelb.

Ein diesem ähnlicher Vogel, der von dem nämlichen Orte kam, und das Weibchen zu seyn schien, war an allen obern Theile schwärzlichbraun, die Kehle weiß, und die Brust gelbroth.

Beyde wurden vom Vorgebirge der guten Hoffnung geschickt.

48. Der Lüçoner Steinschmätzer. (Luzonian W.)

Motacilla caprata. L. l. 2. p. 986. No. 33. *r*)
Le Traquet de l'isle de Luçon. Briss. orn. III. p. 442. No. 30. pl. 24. f. 2. 3. — Buff. ois. V. p. 229. *s*). — Pl. enlum. 235. f. 1. 2.

Er hat die Größe des schwarzkehligen Steinschmätzers. Der Schnabel ist dunkelfarbig; der ganze Vogel ist schwärzlichbraun, die kleinern zunächst am Körper stehenden Deckfedern der Flügel, und den After ausgenommen, die weiß sind; bey einigen Vögeln ist auch der Steiß weiß; die Füße sind schwarzbraun.

Das Weibchen ist oben braun, unten gelbrothbraun; die Kehle weißlich; der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes hell gelbroth; die untern schmutzig gelbröthlichweiß; der Schwanz braun.

Er ist auf der Insel Lüçon zu Hause, wo er Maria-capra genannt wird.

Auf

p) Hier steht dieser Vogel, wie beym Büffon, als besondre Art aufgeführt. B.
q) Uebers. XV. S. 272. Nr. 7. B.
r) Latham Ind. orn. II. p. 524. n. 52. B.
s) Uebers. XV. S. 262. Nr. 2.

Auf einigen Chineſiſchen Gemälden habe ich einen Vogel angetroffen, der dieſem Steinſchmätzer ähnlich war. Der Kopf, der Hals und die obern Theile waren blauſchwarz; die untern röthlichweiß; die größern Deckfedern der Flügel hatten weiße Spitzen; und dieß bildete einen unregelmäßigen, weißen Streifen; Schnabel und Füße waren hellroth.

49. Der rußfarbige Steinſchmätzer. (Sooty W.)

Motacilla fulicata. L. l. 2. p. 990. No. 39. *t*)
Le Traquet des Philippines. Briss. orn. III. p. 444. No. 31. pl. 23. f. 2. — Buff. ois. V. p. 230. *u*) — Pl. enlum. 185. f.

Er hat die Größe der letztern, aber einen längern Schwanz, und ſeine ganze Länge iſt ſechs, und ein Viertel Zoll; die Hauptfarbe iſt mehr oder weniger violetſchwarz; die untern Deckfedern des Schwanzes ſind hell kaſtanienbraun; an den Deckfedern der Flügel iſt ein langes, weißes Zeichen; Schnabel und Füße ſind braun.

Man hat ihn auf den Philippinen angetroffen.

Büffon giebt die Farbe der untern Deckfedern des Schwanzes nicht an. In der Pl. enlum. iſt ſie von der Farbe des übrigen Gefieders nicht verſchieden.

50. Der Brillen-Steinſchmätzer. (Spectacle W.)

Motacilla perspicillata. L. l. 2. p. 969. No. 103. *v*).
Le Chignot, ou le Traquet à lunettes. Buff. ois. V. p. 234. *w*).

Er hat die Größe des Stieglitzes, und iſt von ſchöner, ſchwarzer Farbe, die Deckfedern der Flügel ausgenommen, an welchen ein weißer Fleck iſt. Bey einigen Vögeln ſind die untern Deckfedern des Schwanzes auch weiß; was aber den Vogel charakteriſirt, iſt eine kahle, runzliche, gelbe Haut *ww*), die das Auge rings umgiebt, und wodurch er das Anſehen bekommt, als trüge er Brillen; der Augenſtern iſt gelb, und die Pupille blau; der Schwanz am Ende gleich, und wenn er ausgebreitet iſt, ſo macht er ein faſt gleichſeitiges Dreyeck *x*)

Er iſt in der Nachbarſchaft des Plata-Stroms in Südamerika zu Hauſe, beſonders um Montroideo.

51. Der Coromandelſche Steinſchmätzer. (Coromandel W.)

Motacilla coromandelica. L. I. 2. p. 968. No. 102. *x*).
Le petit Traquet des Indes. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 207.

Er hat die Größe unſrer Meiſe Der Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern röthlichgelb; der Kopf, Hals, die Bruſt und die kleinern Deckfedern der Flügel ſind ſchwarz, an jeder Feder iſt

t) Latham Ind. orn. II. p. 524. n. 53. B.
u) Ueberſ. XV. S. 264. Nr. 3. B.
v) Latham Ind. orn. II. p. 524. n. 54. B.
w) Ueberſ. XV. S. 274. Nr. 8. B.
ww) Dieſe Haut ſoll der gelben Flechte (Lichen), die ſich an den Dachziegeln anſezt, ſehr ähnlich ſeyn.
x) Er ſoll nur aus acht Federn beſtehn; zuverläßig aber ſind vier verloren gegangen, da alle bisher bekannte Arten dieſer Gattung zwölf haben.
xx) Latham Ind. orn. II. p. 124. n. 55. B.

ist ein gelblicher Fleck; die übrigen Deckfedern sind gelb gerändert, und in der Mitte derselben ist ein weißer Fleck; Schwungfedern und Schwanz sind schwarz; der Steiß hell gelbroth; der Bauch eben so, und mit unregelmäßigen, schwarzen Bandstreifen durchzogen; die Füße schwarz.

Er ist auf der Küste von Coromandel zu Hause.

52. Der Philippinische Steinschmätzer. (Philippine W.)

Motacilla philippensis. L. I. 2. p. 968. No. 101. *y*)
Le grand Traquet des Philippines. Briss. orn. III. p. 446. No. 32. pl. 22. f. 3. — Buff. ois. V. p. 30. *z*) Pl. enlum. 185. f. 2.
Traquet de Manille. Salerne orn. p. 225.

Seine Länge ist sechs und ein Viertel Zoll. Der Schnabel schmutziggelb; der Kopf röthlichweiß, an einigen Stellen ins Gelbe spielend; der Hals schmutzigroth; über die Brust geht ein bläuliches Band; Bauch und After sind röthlichweiß; Rücken, Flügel und Schwanz violetschwarz; über die Mitte der Deckfedern der Flügel läuft eine lange, weiße Zeichnung; am äußern Rande der Flügel, unter diesem, ist eine andere; und da einige der größern Deckfedern der Flügel weiße Ränder haben, so macht dieß eine dritte in der Mitte der Flügel; die äußerste Schwanzfeder ist an ihrer äußern Fahne gelbröthlichweiß gerändert; die Füße sind rostroth.

Er bewohnt die Philippinen.

53. Der braune Steinschmätzer. (Der dunkle Sänger. Dark W.)

Motacilla magna. L. I. 2. p. 968. No. 100. *a*)
Le grand Traquet. Buff. ois. V. p. 232 *b*).

Dieser hat achthalb Zoll Länge. Der Schnabel ist einen Zoll lang; der Kopf braun, mit dunklerm Braun gemischt; der obere Theil des Halses und des Körpers hellbraun; die Kehle weißlich, mit Braun vermischt; die Brust braun; die Deckfedern der Flügel, und der äußere Rand der Schwungfedern eben so; der innere halb braun, halb gelbroth; auch der Schwanz hat diese zwey letzten Farben, und seine zwey äußersten Federn sind an den äußern Fahnen weiß; der untere Theil des Körpers ist gelbroth.

Ihr Vaterland ist unbekannt.

54. Der braunkehlige Steinschmätzer, oder das Kohlvögelchen. (Whin-Chat.)

Motacilla Rubetra. L. I. 2. p. 967. No. 16. *c*) — Faun. Suec. No. 255. — Scop. ann. I. No. 237. *d*) — Brünn. orn. No. 277. — Müller Zool. No. 275. — Kram. elench. p. 385. No. 5. — Frisch tab. 22.

y) Latham Ind. orn. II. p. 525. n. 56. B.
z) Uebers. XV. S. 266. Nr. 4. B.
a) Latham Ind. orn. II. p. 525. n. 37. B.
b) Uebers. XV. S. 270. Nr. 6. B.
c) Latham Ind. orn. II. p. 515. n. 58. B.
d) Uebers. S. 195. Nr. 237. Ein Männchen S. 194. Nr. 235. Ein Weibchen oder auch ein junges nach der ersten Mauser. B.

Le grand Traquet, ou le Tarier. Briss. orn. III. p. 432. No. 26. pl. 24. f. 1. — Buff. ois. V. p. 234 e) — Pl. enlum. 678. f. 2.
Whin-Chat. Ray Syn. p. 76. A. 3. — Will. orn. p. 234. — Br. Zool. I. No. 158. f). — Arct. Zool. II. p. 421. R. g).
Br. Mus. Lev. Mus.

Er ist etwas größer, als der schwarzkehlige. Der Schnabel ist schwarz; der Augenstern nußbraun; die obern Theile des Kopfs, der Hals, der Rücken und der Steiß sind schwärzlich, mit gelbrothen Rändern; am Schnabel entsteht ein weißer Streifen, der über die Augen zu beyden Seiten hinweg fast bis zum Hinterkopf hingeht; die Wangen unter diesem sind schwärzlich; das Kinn ist weiß; die übrigen untern Theile sind gelbröthlichweiß, am hellsten am Bauch, und an der Brust ins Röthliche spielend; am Flügel, nahe an der Schulter ist ein querstehendes weißes Zeichen, und ein anderes, kleineres am Afterflügel, am äußern Rande; der Schwanz ist zwey Drittheile seiner Länge von der Wurzel an weiß, das übrige schwärzlich, die zwey mittlern Federn ausgenommen, die ganz diese letzte Farbe haben; die Füße sind schwarz.

Das Weibchen unterscheidet sich dadurch, daß es blässer ist, und die weißen Flecken an den Flügeln ungleich weniger bemerkbar sind; die weiße Spur über den Augen ist auch minder sichtbar, und die Seiten des Kopfs sind statt schwarz, von einerley Farbe mit den übrigen Theilen desselben.

Diese Art ist nicht selten in England, und läßt sich, mit dem schwarzkehligen Steinschmätzer, in den Sommermonaten auf den Heiden sehen, wo sie brütet, und ihr Nest nach Art dieses Vogels bereitet. Sie legt fünf schmutzigweiße Eyer k). Sie scheint nicht so gemein zu seyn, als die schwarzkehlige, und in den nördlichen Theilen von England verschwindet, sie im Winter l). In Kent habe ich sie das ganze Jahr hindurch gesehen. Sie ist auch auf dem festen Lande Europens, in Frankreich, Italien, Deutschland, und in den gemäßigtern Gegenden Rußlands m) gemein; doch nicht so häufig, als der sogenannte Steinpicker.

Ihr Futter sind hauptsächlich Insekten, und wenn sie fett, und wohl bey Leibe sind, so sollen sie so gut schmecken, wie der Ortolan.

Im Leverschen Museum sind zwey kleine Spielarten; die erste, von der gewöhnlichen Farbe, den Bauch ausgenommen, der stark mit Weiß melirt ist; die andere mit einer beträchtlichen Mischung von Hellgrauem an den obern Theilen, und die Spitzen der Schwanzfedern von der nämlichen Farbe n).

55. Der

e) Uebers. XV. S. 252. Nr. 3. B.
f) Uebers. S. 116. Taf. 55. Fig. 3. 4. B.
g) Uebers. B. II. S. 394. R. Vergl. ferner
b) Zorns Pethinoth. II. S. 609. n. 16. Meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 541. Nr. 13. N. G. Deutschlandes. IV. Taf. 22. Fig. 1. 2. N. G. der Stubenvögel. Nr. 105. B.

i) Salerne sagt blau.

k) Die Eyer sind weißgrün, am stumpfen Ende bläulich gefleckt. B.
l) In Thüringen sind sie außerordentlich gemein, aber Zugvögel. Im Julius und August sind die Felder voll; fast auf jeder erhabnen Kohlstaude, oder andern hohen Gewächsen im Getreide sitzt ein junger Vogel. B.
m) Nach Linné, bis Spitzbergen.
n) Es sind wohl junge Weibchen. B.

55. Der gelbrothe Steinſchmätzer. (Sultry W.)

Motacilla fervida. L. I. 2. p. 968. No. 98. *o*).
Le Traquet de Senegal. Buff. ois. V. p. 228. *p*). — Pl. enlum. 583. f. 1.

Er hat die Größe des letztern. Der Schnabel iſt ſchwarz; die obern Theile des Kopfs, Halſes, Körpers und die Flügel ſind dunkelbraun, die Ränder der Federn gelbroth; an den Flügeln ſind zwey weiße Flecken, wie bey der letztern Art; die untern Theile ſind gelblichweiß, an der Bruſt ins Gelbrothe ſpielend; der Schwanz iſt dunkelfarbig, mit blaſſen Rändern; die Füße ſind ſchwarz.

Sie iſt im Senegal zu Hauſe.

56. Der Sibiriſche Steinſchmätzer. (Sibirian W.)

Motacilla Montanella. L. I. 2. p. 968. No. 99. *q*)
— — Pallas's Trav. Vol. III. p. 695. No. 12.

Er iſt etwas größer, als das Kohlvögelchen. (No 54.). Der Scheitel iſt braunſchwarz; über den Augen iſt ein gelblicher Streifen; das Kinn iſt von der nämlichen Farbe, doch ſind bey einigen Vögeln beyde weiß; die Ohren ſchwarz, und liegen in einem Felde von grauen Federn; der Rücken iſt ziegelfarbig, mit braunen Flecken; die untern Theile ſind hellgelb ocherfarben; die Federn an der Kehle an ihren Wurzeln braun; die Flügel braun, die groſſen Schwungfedern mit grauen, und die kürzern mit weißen Rändern; der Schwanz etwas lang, und hellaſchfarben, ſeine zwey mittlern Federn, und die äußerſte kürzer, als die übrigen.

Dieſer Vogel kommt im Februar nach Daurien, zugleich mit den Flügen der Kernbeiſſer.

57. Der Senegalſche Steinſchmätzer. (Senegal W.)

Motacilla senegalensis. L. I. 2. p. 974. No. 22. *r*).
Le Traquet du Senegal. Briss. orn. III. p. 441. No. 29.

Seine Länge iſt fünf und ein Viertel Zoll. Der Schnabel iſt braun; die Hauptfarbe des Gefieders eben ſo; die Schwungfedern ſind gelbroth, und braun geändert; der Schwanz ſchwarz und alle ſeine Federn, die zwey mittlern ausgenommen, haben weiße Spitzen.

Er wohnt in Senegal. Ein Vogel dieſer Art beſitzt Carl Boddam, Eſqr. Er ſagte mir, wo ich nicht irre, er käme vom Vorgebirge der guten Hoffnung. Er hat volle ſechs Zoll in der Länge.

58. Der weißbunte Sänger. (Leucomele W.)

Motacilla leucomela. L. I. 2. p. 974. No. 117
— — Pallas's in Nov. Comment. Acad. Petrop. Vol. XIV. p. 584. tab. 22. f. 3.
— Pleschanka, Lepechin. ibid. p. 503. tab. 14. f. 2.

o) Latham Ind. orn. II. p. 525. n. 59. B.
p) Uebers. XV. S. 260. Nr. 1. B.
q) Latham Ind. orn. II. p. 526. n. 60. B.
r) Latham Ind. orn. II. p. 526. n. 61. B.

Er ist etwas größer, als das gemeine Rothschwänzchen, und sechs Zoll, zwey Linien lang. Der Schnabel ist dunkelfarbig; der Augenstern eben so; die Stirn, der Scheitel, der Nacken, der untere Theil der Brust, der Bauch, der Steiß und der größte Theil des Schwanzes sind weiß; die übrigen Theile schwarz; die zwey mittlern Federn des Schwanzes sind schwarz, die andern weiß, mit einem breiten, schwarzen Bande am Ende; die Klauen schwarz.

Beym Weibchen sind die obern Theile dunkel- oder aschbraun; Kopf und Hals am hellsten; die untern Theile ins Aschfarbene spielend; Kehle und Vorderhals aschgrau; über den Augen ein weißer Streifen; der Schwanz wie beym Männchen.

Diese Art bewohnt die felsigen ausgehöhlten Orte um Sawatow, und anderere Gegenden der Wolga, wo sie, wie die Uferschwalbe, Höhlen in die Ufer gräbt, um ihr Nest darin anzubringen. Diese Höhlen sind horizontal, tief, und das Nest besteht aus dürren Halmen u. d. gl. Der Jungen sind zehn an der Zahl.

Es ist ein kühner Vogel, der in die Dörfer kommt, sich auf Steinen und Baumstrünken niederläßt, und fast wie eine Schwalbe zwitschert. Vermuthlich nährt er sich von Würmern und Käfern, weil man die Ueberbleibsel derselben bey der Zergliederung in seinem Magen gefunden hat.

59. Der schwarz- und weiße Sänger. (Black and white W.)

Muscicapa melanoleuca. L. I. 2. p. 948. No. 58.
— — Gueldenstadt in Nov. Comment. Acad. Petrop. Vol. XIX. p. 468. tab. 15.

Den vorigen nicht unähnlich; sein Schnabel aber an der Spitze etwas gebogen; dieser und der Augenstern sind schwarz; der ganze Rücken ist weiß; alle Schwanzfedern weiß, ausgenommen an den Spitzen, ohngefähr ein Drittheil der Endhälfte der zwey mittlern schwarz, und von hier an nimmt das Schwarze ab, so wie die Federn mehr nach außen stehn; die Schenkel sind braun und weiß geringelt.

Das Weibchen ist da braun und schmutzigaschfarben, wo das Männchen rein schwarz und weiß ist.

Diese Art soll ein Zugvogel seyn, und wird den ganzen Sommer durch um Teflis und Cyrus, in Georgien, angetroffen. Sie lebt von Insekten, hält sich an den Ufern der Flüße auf, und wird unter dem Gesträuche gesehen.

60. Der Maurische Steinschmätzer. (Moor W.)

Motacilla maura. L. I. 2. p. 975. No. 119. s).
— — Palla's Trav. Vol. II. p. 708. No. 17.

Er hat die Größe des braunkehligen Steinschmätzers, mit dem er einige Aehnlichkeit besitzt. Kopf und Hals sind schwarz, die Ränder der Federn blaß; der Rücken und die Wurzel

s) Latham Ind. orn. II. p. 526. n. 62. B.

zel der Flügel ſchwarz, letztere grau geändert; die Seiten des Halſes, und alle untern Theile weiß; die Kehle dunkel roſtigroth; die Flügel braun; an den Deckfedern iſt ein ſchiefſtehender, gelblichweißer Fleck; der Schwanz gleich, und ſchwarz; der Steiß und die obere Hälfte (baſe half) des Schwanzes weiß.

Das Weibchen und die jungen Vögel haben einen grauen Kopf, mit braunem Gewölke; der Rücken iſt dem einer Schnepfe nicht unähnlich; das übrige des Körpers iſt mehr verſchoſſen obſolete) *t*).

Dieſe Art iſt in Rußland zu Hauſe, und hält ſich auf den Birken, die hier und da in den Wäldern des Urals zerſtreut ſind, ſo wie auf den Feldern zwiſchen den Flüßen Tobol und Irtiſch, die mit dieſen Bäumen beſetzt ſind, auf, und fliegt Paarweiſe. Sie lebt von Inſekten, und macht ihr Neſt in die Löcher der Baumſtämme, welche die Mäuſe oder andere kleine vierfüßige Thiere ausgegraben haben.

60. Var. A. Motacilla maura. L. I. 2. p. 975. No. 116. *u*).

Die Länge iſt ſechs Zoll. Der Schnabel ſchwarz; das Gefieder oben gelbrothbraun; unten gelbrothweiß; über den Augen ein gelbrother Streifen; die Ränder der Deckfedern der Flügel gelbroth; die Schwungfedern ſchwarz, mit blaſſen Rändern; die kürzern mit gelbrothen; der Steiß weiß; die obere Hälfte des Schwanzes weiß, von da an bis zum Ende ſchwarz, die zwey mittlern Federn ausgenommen, die ganz ſchwarz ſind; die Füße ſchwarz. Ein Exemplar dieſer Art iſt in der Sammlung des Sire Joſ. Banks. Es wurde unter dem Eis zwiſchen Aſien und Amerika gefunden.

61. Der Sänger mit gelben Augenbraunen. (Yellow-browned W.)

Motacilla superciliosa. L. I. 2. p. 975. No. 120. *v*).

Oben grünlich; unten blaß; am Scheitel ein blaſſer Streifen; über den Augen ein gelber.

Er bewohnt Rußland *w*).

62. Das Goldkehlchen. (Gilt-throat W.)

Motacilla ferruginea. L. I. 2. p. 976. No. 121. *x*).

Oben aſchgrau, unten weißlich; Kehle und Hals roſtigroth.

Es iſt in Rußland zu Hauſe, vorzüglich um den Tunguska-Strom *y*).

63. Der

t) Dieß würde ich in der That für keinen andern Vogel als den braunkehligen Steinſchmätzer halten, wenn nicht die folgende Beſchreibung der Lebensart ſo ſehr verſchieden angegeben würde. B.

u) Latham l. c. β.

v) Latham Ind. orn. II. p. 526. n. 63. B.

w) Hr. Pennant.

x) Latham Ind. orn. II. p. 526. Nr. 64. B.

y) Herr Pennant.

63. Der blauschwänzige Sänger. (Blue-tailed W.)

Motacilla cyanura. L. l. 2. p. 976. z).
— — Pallas's Trav. Vol. II. p. 709. No. 18.

Von der Größe des Rothkehlchens. Die obern Theile sind aschgräulichgelb, mit Grün überzogen; der Steiß bläulich; über den Augen, an der Kehle und an dem untern Theile ist die Farbe gelblichweiß; die Seiten der Brust, zunächst an den Flügeln sind orangefarben; der Schwanz gleich, seine Federn etwas zugespitzt; die Farbe aller braun, äußerlich hellblau geändert, und wenn sie zusammen gelegt sind, scheinen sie ganz blau zu seyn; die Flügel braun; der äußere Rand der Schwungfedern gräulichgelb, der innere gelb.

Man findet sie häufig in den Wäldern, die um die kleinen Bäche, in den südlichen Gegenden am Jenisey herumstehen, und von hier aus durch den ganzen östlichen Theil von Sibirien immer zu Anfang des Winters.

64. Der Daurische Sänger. (Daurian W.)

Motacilla aurorea. L. l. 2. p. 966. No. 123. a).
— — Pallas's Trav. Vol. III. p. 695. No. 15.

Er hat die Größe des gemeinen Rothschwänzchens. Scheitel und Nacken sind schimmelgrau; Kehle und Vorderhals schwarz; Rücken und Flügel eben so, und mit einem dreyeckigen, weißen Fleck bezeichnet; die untern Theile des Körpers dunkelgelb; der Schwanz gelb, die zwey mittlern Federn ausgenommen, die schwarz sind.

Er wohnt in der Nachbarschaft des Flußes Selinga in Sibirien, und hält sich auf den Weiden auf.

65. Der schwarzkappige Sänger. (Black-poll W.)

Motacilla striata. L. l. 2. p. 976. No. 124 b).
Black-poll Warbler. Arct. Zool. II. No. 290. c).

Der Scheitel ist schwarz, die Wangen sind weiß; der obere Theil des Gefieders aschfarben, mit schwarzen Streifen; die Deckfedern und die großen Schwungfedern dunkelfarbig; erstere mit zwey weißen Streifen bezeichnet; die kürzern Schwungfedern weiß geändert; der Schwanz dunkelbraun, am Ende der zwey äußern Federn ein weißer Fleck; die Kehle weiß, zu beyden Seiten schwarz gestreift; Brust und Bauch schmutzig weiß, abwärts schwarz gestreift; die Füße weißlich.

Er hat sich in Neuyork und Neufundland gefunden; in lezterm Lande im Sommer.

66. Der grauköpfige Sänger. (Grey-poll W.)

Motacilla incana. L. l. 2. p. 976. No. 125. d)
Grey-poll Warbler. Arct. Zool. II. No. 291. e).

Kopf

z) Latham Ind. orn. II. p. 527. n. 65. B.
a) Latham Ind. orn. II. p. 527. n. 66. B.
b) Latham Ind. orn. II. p. 527. n. 67. B.
c) Uebers. II. S. 373. Nr. 207. B.
d) Latham Ind. orn. II. p. 527. n. 68. B.
e) Uebers. II. S. 374. Nr. 208. B.

Der Kopf, die Seite des Halſes und obern Deckfedern des Schwanzes ſind ſchön grau; die Deckfedern der Flügel mit zwey weißen Streifen durchzogen; die großen Schwungfedern und der Schwanz dunkelbraun, mit grauen Rändern; die Kehle orangefarben; Kinn und Bruſt ſchön gelb; der Bauch weißlichaſchfarben.

Er iſt in Neuyork zu Hauſe.

67. Der gelbſtirnige Sänger. (Yellow-fronted W.)

Motacilla flavifrons. L. l. 2. p. 976. No. 126. *f*)
Yellow-fronted Warbler. Arct. Zool. II. No. 296. *g*).

Stirn und Scheitel ſind lebhaft gelb; vom Schnabel an geht zwiſchen den Augen hindurch ein ſchwarzes Band, das zu beyden Seiten weiß eingefaßt iſt; Kinn, Kehle und Vorderhals ſind ſchwarz; Bruſt und Bauch weiß; Hinterhals, Rücken, Steiß und kleinere Deckfedern der Flügel lichtbläulichgrau; die größern Deckfedern, und die untere Reihe der kleinern lebhaft gelb, und dieß bildet einen breiten Flecken; die großen Schwungfedern und der Schwanz ſind dunkelaſchfarben, die Fahnen der äußern Schwanzfedern weiß gefleckt.

Er wird in Penſylvanien angetroffen.

67. * Der Blackburniſche Sänger. (Blackburnian W.)

Motacilla Blackburniae. L. l. 2. p. 977 No. 127. *h*)
Blackburnian Warbler. Arct. Zool. II. No. 317. *i*).

Der Scheitel iſt tief ſchwarz, und durch eine hochgelbe Linie getheilt; an dem Winkel der obern Kinnlade entſteht eine zweyte von der nämlichen Farbe; zwiſchen den Augen iſt eine ſchwarze, die über ſie hinaus reicht, und mit einer ſchmalen, gelben Linie begränzt iſt; die Seiten des Halſes, die Kehle und die Mitte der Bruſt ſind gelb; die Seiten ſchwarz gefleckt; After und Schenkel weiß; die kleinern Deckfedern der Flügel ſchwarz, die größern weiß; die großen Schwungfedern dunkelbraun; die mittlern Schwanzfedern eben ſo, die drey äußern zu beyden Seiten weiß.

Sie iſt in Neuyork zu Hauſe.

68. Der Sänger mit dem Hute. (Hooded W.)

Motacilla mitrata. L. l. 2. p. 977. No. 125. *k*)
Le Mesange à collier de la Caroline. Briss. orn. III. p. 578. No. 16. — Buff. ois. V. p. 452. *l*).
Hooded Titmouse. Catesby Carol. I. pl. 60. *m*)
— Warbler. Arct. Zool. II. No. 387. *n*)

Von

f) Latham Ind. orn. II p. 527. n. 69. B.
g) Ueberſ. II. S. 376. Nr. 213. B.
h) Latham Ind. orn. II. p. 5. 27. n. 70. B.
i) Ueberſ. II. S. 384. Nr. 234. B.
k) Latham Ind. orn. II. p. 528. n. 71. B.
l) Ueberſ. XVII. S. 146. Nr. 2. B.
m) Seligmanns Vögel. III. Taf. 20. B.
n) Ueberſ. II. S. 372. Nr. 204. B.

Von der Größe eines Stieglitzes, und fünf Zoll lang. Der Schnabel ist schwarz; der vordere Theil des Kopfes und die Kehle gelb; der hintere Theil des Kopfs schwarz, und dieß läuft zu beyden Seiten nach dem Vorderhalse hin, und bildet ein Halsband; die obern Theile des Körpers sind olivengrün; die untern gelb; die Füße braun.

68. Var. A. Motacilla mitrata. L. I. 2. p. 977. No. 128. β. o)
Le Gobe-mouche citrin de la Louisiane. Buff. ois. IV. p. 538. p) — Pl. enlum. 666. f. 2.
Citrine Flycatcher. Arct. Zool.?

Die Stirn, und von hier an um die Augen herum und die Wangen sind schön gelb; der übrige Kopf, das Kinn und der Vorderhals sammtschwarz; von hier an alle untern Theile gelb; die obern grünlichgrau.

Die erste ist in Carolina, die zweyte in Louisiana zu Hause. Ich bin geneigt, sie für bloße Spielarten, wo nicht gar für bloße Geschlechtsverschiedenheiten zu halten. Beyde sind sehr schöne Vögel. Catesby's Vogel soll sich an schattigen Orten in unbewohnten Gegenden aufhalten.

69. Das Rubinkehlchen. (Ruby-throat.)

Motacilla Calliope. L. I. 2. p. 977. No. 129. q)
— — Pallas's Trav. Vol. III. p. 697. No. 17.
Ruby-throat. Arct. Zool. II. p. 343. D. r)

(S. die erste Figur der vier und funfzigsten Kupfertafel.)

Es hat die Größe des Rothschwänzchens. Das Gefieder an den obern Theilen hat die Farbe der Nachtigall; das an den untern ist weiß; die Kehle ist cochenillenroth; zu beyden Seiten mit einem schwarz und weißen Streifen eingefaßt, der am Schnabel entspringt; die Stelle zwischen Schnabel und Augen ist schwarz; über den Augen ein weißer Streifen; der Schwanz abgerundet, und von der Rückenfarbe.

Es ist im östlichen Sibirien zu Hause, und wurde zuerst am Ufer des Jenisey angetroffen. Man sieht es meistentheils auf den Gipfeln der Bäume. Es ist ein vortrefflicher Sänger, besonders in der Mitte der Nacht.

70. Der

o) Latham l. c. β. B.
p) Uebers. B. XIV. S. 56. B.
q) Turdus Calliope. Latham Ind. orn. II. p. 331. n. 14. B.
r) Uebers. II. S. 319. Vergl. auch oben B. II. Th. I. S. 24. Nr. 14. Die buntschäckische Drossel. Da Herr Latham diesen Vogel in seiner spätern Schrift dem Ind. orn. unter den Drosseln aufführt, so möchte er wohl mit mehr Recht dorthin gehören. Nach der Abbildung zu urtheilen, sollte man freylich glauben, er müßte unter den Sängern stehen. B.

2. Der Stachelschwænzige Sænger. 1. Das Rubinkehlchen.

NEW MUSEUM
ZOOLOGY
NATURAL HISTORY

70. Der mausfarbige Sänger. (Murine W.)

Motacilla murina. L. l. 2. p. 978. No. 135. *s*)

Von der Größe eines Hausſperlings. Kopf und Hals ſind ſchwarz; Körper und Flügel mausfarbig; vom Schnabel an läuft zwiſchen den Augen hindurch ein weißer Streifen, an beyden Seiten des Halſes hinab; der Bauch iſt weiß, die Mitte ausgenommen, die ſchwarz iſt; der Schwanz ſchwarz, die äußerſte Feder die kürzeſte, und weiß eingefaßt.

In dem Muſeum Carl Boddam's, Eſqr.; woher er aber gekommen, iſt unbekannt.

71. Der ſpitzſchwänzige Sänger. (Thorn-tailed W.)

Motacilla spinicauda. L. l. 2. p. 978. No. 136. *t*)

(ſ. die zweyte Figur der vier und funfzigſten Kupfertafel.)

Von der Größe eines Hausſperlings. Die Länge (den Anſatz des Schwanzes mit eingerechnet) beträgt über ſechs Zoll. Der Schnabel iſt drey Viertels Zoll lang, gerade, die eigentliche Spitze ausgenommen, die Wurzel der untern Kinnlade weiß; der Kopf und die obern Theile des Körpers dunkelröthlichbraun, am Scheitel gelb geſprenkelt; die Stelle zwiſchen Schnabel und Augen gelb, und dieß läuft in einem Streifen nach dem Hinterkopf hin, wo die Farbe gelbroth iſt; die Deckfedern der Flügel gelbroth, mit Braun untermiſcht, die Schultern ausgenommen, die weiß ſind; die untern Theile des Körpers, vom Kinn bis zum After auch weiß; die großen Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern braun, mit blaßen Rändern; der Schwanz keilförmig, und von ſehr ſonderbarem Baue, denn das Ende jeder Feder, ohngefähr ein Drittheil ſeiner Länge, iſt faſt fahnenlos, und endigt ſich in eine Spitze, die vier mittlern Federn ſind roſtigroth, die andern röthlichbraun, mit weißen Enden; die Füße braun, und einen Zoll lang.

Er iſt auf Terra del Fuego zu Hauſe. In Sire Joſ. Banks Sammlung.

72. Der Magellaniſche Sänger. (Magellanic W.)

Motacilla Magellanica. L. l. 2. p. 979. No. 137. *u*)

Seine Länge iſt fünfthalb Zoll. Der Schnabel einen halben Zoll lang; das Geſicht (vilage) etwas verlängert; der Augenſtern röthlich; die obern Theile des Körpers gelbbraun, mit ſchwarzen Wellenlinien und mit einer Miſchung von Rothem, beſonders an den Seiten über den Flügeln; die untern Theile aſchgraulichgelb, mit ſchwärzlichen Streifen durchzogen; der Schwanz keilförmig, gelblichbraun, mit Roth untermiſcht, und mit ſchwarzen Linien geſtreift, ſehr kurz, und ſeine längſte Feder nur einen Zoll lang; die Füße ſind drey Viertel Zoll lang, aber ſtark, und von gelber Farbe.

Er bewohnt Terra del Fuego.

s) Latham Ind. orn. II. p. 528. n. 73. B.
t) Latham Ind. orn. II. p. 528. n. 74. B.
u) Latham Ind. orn. II. p. 528. n. 75. B.

73. Der citronengelbe Sänger. (Citrine W.)

Motacilla citrina. L. I. 2. p. 979. No. 138. *v*)

Von der Größe eines Zaunkönigs, und einen halben Zoll lang. Der Schnabel ist drey Viertel Zoll lang, gerade, und schwarz; der Augenstern sehr hellblau; das Gefieder an den obern Theilen gelb, mit dunkeln Streifen; die Seiten des Kopfs, unter den Augen, der Vorderhals und die Brust weiß; Bauch, Schenkel, After und Steiß gelb; der Schwanz kurz, nur einen halben Zoll lang, seine Federn schwarz, mit mattgelben Endspitzen; die Füße einen halben Zoll lang, und dunkelfarbig; die Klauen groß.

Er ist in Dusky-Bay in Neuseeland zu Hause.

74. Der langbeinige Sänger. (Long-legged W.)

Motacilla longipes. L. I. 2. p. 979. No. 139. *w*)

Seine Länge ist fünfthalb Zoll. Sein Schnabel ist drey Viertel Zoll lang, gerade, und schwarz; der Augenstern bläulichaschfarben; die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz sehr schön hellgrün; die Stirn, die Seiten des Kopfs, unter den Augen und die Seiten des Halses aschfarben; über den Augen ist ein halbcirkelförmiges, weißes Zeichen; die untern Theile sind sehr hell aschfarben; Schenkel und After grünlich; der Schwanz nicht länger, als bey der letzten Art, die Füße über einen Zoll lang, und fleischfarbig; Zehen und Klauen etwas kurz.

Er ist in Dusky-Bay in Neuseeland zu Hause, wo er E Teetre tee poinom genannt wird. Die drey letzten sind aus Sire Jos. Banks Gemälden.

Diese *x*) Art variirt: Zuweilen ist ist ihre Farbe braun, statt grün. Was ihre Schwere anbelangt, so muß sie außerordentlich gering seyn, denn eine, die Herr Anderson wog, hatte nicht mehr als 120 Grane *y*).

74. Var. A. *z*)

Er ist sehr klein, und drey Zoll lang. Schnabel und Füße sind gelblich; die Hauptfarbe bräunlich; die untern Theile des Körpers sind dunkelweiß.

Er ist in Van Diemen's Land zu Hause, und vermuthlich eine Spielart des langbeinigen.

75. Der große Steinschmätzer oder der Weißschwanz. (Wheat-Ear.)

Motacilla Oenanthe. L. I. 2. p. 966. No. 15. *a*). — Faun. Suec. No. 254. — Faun.

v) Latham Ind. orn. II. p. 529. n. 76. B.
w) Latham Ind. orn. II. p. 529. n. 77. D.
x) Zus. a. d. Suppl. S. 181. Uebers.
y) Ms. bey Sire Jos. Banks.
z) A. d. Suppl. a. a. O. Im Ind. orn. II. p. 529. n. 78. macht sie Hr. Latham mit den Namen Sylvia minima zu einer besondern Art; fügt aber doch am Ende hinzu, ob sie etwa eine Varietät von jener sey. B.
a) Latham Ind. orn. II. p. 529. n. 79. B

Faun. Groenl. p. 122. No. 84. — Scop. ann. I. No. 230. *b*). — Brünn. orn. No. 276. — Müller Zool. p. 33. No. 274. — Kram. elench. p. 374. No. 4. — Sepp. Voy. pl. in p. 163.

Le Cul-blanc. ou Vitrec, ou Motteux. Briss. orn. III. p. 449. No. 33. — Buff. ois. V. p. 237. *c*). Pl. enlum. 554. f. 1. 2.

Wheat-Ear, Fallow-Smith, White-Tail. Ray Syn. p. 75. A. 1. — Will. orn. p. 233. pl. 41. — Albin. Vol. I. pl. 55. (das Männchen.) Vol. III. pl. 54. (das Weibchen.) — Br. Zool. I. No. 157. *d*) — Arct. Zool. II. p. 420. P. *e*)

Br. Mus. Lev. Mus.

Die Länge dieses Vogels ist sechsthalb Zoll. Sein Schnabel ist schwarz; der Augenstern nußbraun; der Scheitel, Hinterhals und Rücken bläulichgrau; über den Augen ist ein weißer Streifen, zwischen den Augen ein zweyter, schwarzer, der sich hinter denselben in einen breiten Flecken erweitert; die Schwungfedern sind schwarz, mit lohgelben Rändern; der Steiß, die obern Deckfedern des Schwanzes, und die obere Hälfte des Schwanzes weiß, die Endhälfte schwarz; die untere Theile des Körpers gelblichweiß, das am After in reines Weiß übergeht; die Brust roth überzogen; die Füße schwarz.

Beym Weibchen ist der Streifen über den Augen bleicher; und statt der schwarzen Zeichung unter denselben, hat es einen braunen Flecken; der Schwanz ist nicht so tief hinein mit Weiß bezeichnet *f*).

Dieser Vogel besucht England jährlich in der Mitte des Märzes und verläßt es wieder im September; die Weibchen kommen zuerst, ohngefähr vierzehn Tage vor den Männchen, und man sieht ihrer noch fort (they keep coming) bis in die Mitte des Mays ankommen. In einigen Gegenden Englands sind sie in großer Menge, und werden sehr geschäzt. Um Eastburn in Sussex fängt man sie in Schlingen von Roßhaaren, die unter einen langen Rasen gelegt werden; da sie sehr furchtsame Vögel sind, so treibt sie die Bewegung einer Wolke, oder die Aussicht eines Habichts an, unter diesen Fallen Schutz zu suchen, und auf diese Art werden sie gefangen. Die Zahl der jährlich blos in diesem Distrikt gefangenen Vögel beläuft sich auf 1,840 Dutzend, die gewöhnlich das Dutzend für sechs Pfennige verkauft werden *g*). Eine Menge derselben wird gleich auf der Stelle von den benachbarten Einwohnern gegessen, andere werden gerupft (spicked) und den Vogelhändlern in London geschickt, und viele werden in Töpfe eingemacht, weil man sie in England so hochschäzt, als auf dem festen Lande den Ortolan.

Ihre Nahrung sind bloß Insecten; doch fressen sie in nassen Sommern auch viele Erdwürmer *h*), daher sie in solchen Jahreszeiten am fettesten sind *i*).

b) Uebers. S. 190. Nr. 230. B.

c) Uebers. XVI. S. 5. B.

d) Uebers. S. 115. Taf. 54. f. 5. 6. B.

e) Uebers. S. 393. P. Vergl. meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 541. Nr. 17. N. G. der Stubenvögel. Nr. 104. und Zorns Pethinotologie II. S. 378. 3. 1. B.

f) Der Rücken ist rothgrau, und der Unterleib dunkler als am Männchen. B.

g) Br. Zool.

h) Ich habe sie der Würmer wegen dem Pflug folgen sehen.

i) Pennant sagt, der Grund, warum sie um Eastb

Man trifft diese Art in den meisten Ländern Europens, sogar bis Grönland an, und auch aus Ostindien werden sie nach England geschickt, wie ich dergleichen Exemplare gesehen habe.

Sie halten sich vorzüglich auf Heiden auf, doch, einige ausgezeichnete Gegenden ausgenommen, wie vorhin erwähnt worden, sieht man nur hier und da wenige zerstreute Paare. Ihr Nest ist gewöhnlich unter dem Schirm eines Rasens, einer Erdscholle, eines Steins oder dergleichen angebracht, immer auf dem Boden, und nicht selten in einem verlassenen Kaninchenbau *l*). Es besteht aus Heu oder Moos, mit Wolle, Kaninchenhaaren u. s. w. untermischt, oder mit Haaren und Federn ausgelegt. Der Eyer sind fünf bis acht an der Zahl, lichtblau, mit einem Kreise von dunkelblauer Farbe an dem breiten Ende *m*). Die Jungen werden in der Mitte des Mays ausgeheckt.

Man *n*) trifft sie auch auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung an *o*). Die Vögel, die wir in unserm Clima sehen, sind wahrscheinlich auf ihrem Zuge nach den Ländern, wo sie brüten, begriffen. Man sieht sie zuerst auf unsern Ebenen und Gemeintriften (downs et commons), in kleiner Zahl, um die Mitte des Aprils, nachdem sie vierzehn Tage oder länger da geblieben, ziehen sie anders wohin, und man sieht sie nicht eher wieder, als bey ihrer Rückkehr im August. Ich kann nicht sagen, daß ich sie bey ihrer Rückkehr öfter, als einmal oder zweymal auf der nämlichen Stelle angetroffen hätte, ob ich sie gleich alle Jahre bey ihrer Ankunft beobachtet habe; aber Herr Boys sagt mir, er habe sie in Menge um Sandwich, am zehnten August gesehen. Man hat mir erzählt, daß wenn sie in Kaninchenbaue nisten, was nicht selten geschieht, ihr Nest so tief inwendig angebracht ist, daß kaum ein Mannsarm es erreichen kann *p*).

75. Var. A. *q*) Motacilla Oenanthe. L. l. 2. p. 966. No. 15. β. *r*)
Le Cul-blanc gris. Briss. orn. III. 452. No. 34. pl. 21. f. 2. — Buff. ois. V. p. 244. *s*)
Grey Wheat-Ear. Br. Zool. App. *t*)

Diese

Eaßburn in so großer Menge seyn, wäre, weil eine gewisse Fliege sich häufig auf den benachbarten Hügeln aufhalte, die sich von den wilden Thymian nähre.

k) s. Eduards Vorrede S. 12.

l) Bey uns gewöhnlich in Steinbrüchen in den Ritzen. B.

m) Hist. des ois.

n) Zus. a. d. Suppl. S. 184, Uebers.

o) Herr Pennant.

p) Herr Green.

q) Die Varietät, welche Beseke in der N. G. der Vögel Curlands S. 81. Nr. 182. angiebt, wo der Kopf schwarz und braun gestreift, der Oberleib schwarz und braun länglich gefleckt und der Unterleib gelblich braun ist, gehört wohl nicht hierher, sondern zum braunkehligen Steinschmätzer Nr. 54. womit die Beschreibung übereinstimmt. B.

r) Latham l. c. B.

s) Uebers. XVI. S. 15. B.

t) Bey Herrn Pennant's Vogel, der bey Uxbridge geschossen wurde, waren die obern Theile lohgelb; der Vorderhals matt bräunlichgelb; vom Schnabel zu den Augen lief eine verlöschene, dunkelfarbige Linie; die großen und die kürzern Schwungfedern waren schwarz,

Dieſe Spielart unterſcheidet ſich durch eine Miſchung von Weißlichen und Rothgelben an den obern Theilen, und durch ſehr kleine, graue Flecken am untern Theil des Halſes; die zwey mittlern Schwanzfedern ſind ganz ſchwarz, die andern, wie beym gemeinen Weißſchwanz, und hell gelbroth eingefaßt; Schnabel und Füße braun *).

75. Var. B. Motacilla Oenanthe. L. l. 2. p. 966. No. 15. γ. *v*)
Le Cul-blanc cendrée. Briss. orn. III. p. 454. No. 3. pl. 21. f. 3. Buff. ois. V. p. 245. *w*)

Bey dieſer iſt die Stirn weiß; die obern Theile des Körpers ſind aſchfarben, unregelmäſſig mit Graubraun untermiſcht; der Steiß hat dieſe letzte Farbe. Außerdem iſt ſie der zuerſt beſchriebenen nicht unähnlich *).

75. Var. C. Motacilla Oenanthe. L. I. 2. p. 966. No. 15. δ.

Skopoli bemerkt eine dritte Spielart, die man um Tybein vorgefunden hat, und die oben weiß iſt; die Kehle, die Flügel und faſt die ganzen zwey mittlern Schwanzfedern ſind ſchwarz, und an den andern zwey ſchwarze Flecken.

76. Der röthliche Steinſchmätzer. (Russet W. E.)

Motacilla Stapazina. L. l. 2. p. 966. No. 14. γ)
Le Cul-blanc roux. Briss. orn. III. p. 459. No. 37. — Buff. ois. V. p. 246. *z*)
Oenanthe altera. Ray Syn. p. 76. No. 2. — Will. orn. p. 233.
Red or Russet-coloured Wheat-Ear. Edw. pl. 31. *a*)
Stapazina. Arct. Zool. II. p. 241. Q. *b*)
Lev. Mus.

Er hat die Größe der vorhergehenden. Beym Männchen ſind Kopf, Hals, Rücken und Bruſt ſchmutzig, matt (faint) orangenfarben, dunkler am Rücken, und matter an der Bruſt; über den untern Theil des Rückens läuft ein halber Mond von ſchwarzen Flecken; Kinn, Wangen und Kehle ſind ſchwarz; der Steiß, der untere Theil des Bauchs, und die obern Deckfedern des Schwanzes weiß; die Flügel dicht braun; die zwey mittlern Schwanzfedern ſchwarz; die übrigen weiß mit einem ſchmalen, ſchwarzen Saum; Schnabel und Füße ſchwarz.

Das Weibchen iſt wie das Männchen, außer daß das ſchwarze Zeichen nur um die Augen herum, und hinter denſelben iſt, und nicht unter der Kehle, die weiß iſt.

Man findet ſie in Gibraltar; auch trifft man ſie um Bologna, in Italien an, wo ſie aber nicht gemein ſind.

76. Var.

ſchwarz, mit lohgelben und weißen Rändern; der Schwanz wie beym gemeinen Weißſchwanz mit helllohgelben Rändern.

w) Es iſt, wie der Augenſchein lehret, ein junger Vogel. B.

v) Latham l. c. B.

w) Ueberſ. XVI. S. 17. B.

x) Es iſt ein altes Männchen. B.

y) Latham Ind. orn. II. p. 530. n. 80. B.

z) Ueberſ. B XV. S. 18. B.

a) Seligmanns Vögel. II. Taf. 61. B.

b) Ueberſ. II. S. 394. Q. B.

76. Var. A. Motacilla Stapazina. L. I. 2. p. 966. No. 14. q. *c*)
Le Cul blanc-roussatre. Briss. orn. III. p. 475. pl. 25. f. 4. — Buff. ois. V. 245. *d*).
Stapazina. Ray Syn. p. 81. No. 13. — Will. orn. p. 233.

Dieſe, ſagt Willughby, hat einen unterhalb weißen Steiß, eben ſo iſt faſt der ganze Schwanz; Kopf und Rücken ſind roſtgelb; die Flügelfedern halb ſchwarz, halb gelb; der Schnabel iſt mittelmäßig (indifferently) lang, und von dunkler Farbe; Kehle, Bruſt und Bauch weiß, ganz gering gelb gefleckt; der Schwanz iſt gegen den Körper hin gelb, außerdem ſchwarz.

Dieſen Vogel trifft man bey Niſmes und um Bologna an. Linné hat ihn für eine Spielart von den letzten gehalten, worin auch ich ſeiner Meynung bin. Und in der That, die Wahrheit zu geſtehen, ſo glaube ich alle oben erwähnten Weißſchwänze (Wheat-ears) ſind bloß zufällige Spielarten, vom Alter, vom Geſchlechte oder von irgend einem Umſtand ſonſt.

77. Der röthlichbraune Steinſchmätzer. (Rufous W. E.)

Motacilla leucorrhoa. L. I. 2. p. 966. No. 97. *e*)
Le Motteux du Senegal. Buff. ois. V. p. 249 *f*).
Cul-blanc du Senegal. Pl. enlum 583. f. 2.

Größer, als der große Steinſchmätzer, und ſieben Zoll lang. Der Schnabel iſt ſchwarz; die obern Theile ſind gelbrothbraun; die Deckfedern der Flügel braun, mit gelbrothen Rändern; die Schwungfedern eben ſo; die untern Theile des Körpers gelblichweiß, an der Bruſt ins Röthliche ſpielend; der Steiß, die obern und untern Deckfedern des Schwanzes, und die Wurzel deſſelben weiß, das Uebrige, wie die Schwungfedern; die Füße ſchwarz.

Er iſt in Senegal zu Hauſe.

78. Der Capſche Steinſchmätzer. (Cape W. C.)

Motacilla hottentotta. L. I. 2. p. 965. No. 96. *g*)
Le grand Motteux, ou Cul-blanc du Cap de bonne Esperance. Buff. ois. V. p. 248. *h*).
Lev. Mus.

Er iſt größer, als die große Art, und acht Zoll lang. Der Schnabel mißt zehn Linien; der Scheitel und die Bruſt ſind unregelmäßig, mit dunklerm und hellerm Braun bezeichnet; die übrigen obern Theile, bis zum Steiß rothgelbbraun; am Steiß iſt ein hell rothgelbes Band; die Kehle iſt ſchmutzigweiß, mit Braun überlaufen; der obere Theil des Bauchs und die Seiten ſind rothgelb; der untere Theil des Bauchs ſchmutzigweiß; die untern Deckfedern des Schwanzes gelblich, die obern weiß; die obern Hälfte des Schwanzes weiß, das übrige ſchwarz; die

c) Latham l. c.
d) Ueberſ. l. c.
e) Latham Ind. orn. II. p. 531. n. 81. **B.**
f) Ueberſ. XVI. S. 25. III. **B.**
g) Latham Ind. orn. II. p. 531. n. 82. **B.**
h) Ueberſ. XVI. S. 21. I. **B.**

die Spitze schmutzigweiß, die zwey mittlern Federn ausgenommen, die schwarz sind, und rothgelbe Spitzen haben; die Flügel braun, und die Ränder gelblich eingefaßt.

Es ist auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause.

79. Der orangenbrüstige Steinschmätzer. (Orange-breasted W. E.)

Motacilla aurantia. L. I. 2. p. 965. No. 95. *i*).
Le Motteux ou Cul-blanc brun verdatre. Buff. ois. V. p. 248. *k*)

Kleiner, als der letzte, und sechs Zoll lang. Die obern Theile sind schwarzbraun und grünlichbraun gemischt; die kleinern Deckfedern der Flügel eben so, die größern weiß; die Kehle schmutzigweiß; der Vorderhals eben so, mit Schwarz untermischt; die Brust orangefarben, am hellsten gegen den Bauch hin; die obern und untern Deckfedern des Schwanzes weiß; die Schwanzfedern selbst braun, und alle, die zwey mittlern ausgenommen, mit weißen Endspitzen.

Er ist mit dem letztern auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause.

80. Der schwarzköpfige Steinschmätzer. (Black-hooded W. E.)

Motacilla pileata. L. I. 2. p. 965. No. 94. *l*).

Er hat die Größe des großen Steinschmätzers (No. 75), und ist sechs Zoll lang. Sein Schnabel ist schwarz; der Kopf schwarz, und dieß vereinigt sich zu beyden Seiten des Halses mit einem tiefen halben Mond von der nämlichen Farbe; über den Augen ist ein weißer Streifen; Stirn und Kinn sind weiß; Rücken und Flügel röthlichbraun; Steiß und Bauch weiß; der Schwanz weiß, die zwey mittlern Federn und die Endspitzen aller übrigen ausgenommen, die schwarz sind.

In der Sammlung Carl Boddam's, Esqr. Er kömmt vom Vorgebirge der guten Hoffnung, wo er Schaap Wagter genannt wird. Ich habe ihn auch auf Chinesischen Gemälden gesehen, und dieß scheint zu beweisen, daß er in China ebenfalls zu Hause sey.

81. Der Provencer Steinschmätzer. (Provence W. E.)

Motacilla massiliensis. L. I. 2. p. 965. No. 93. *m*).
Le Fist de Provence. Buff. ois. V. p. 194. *n*). — Pl. enlum. 654. f. 1.

Er hat die Größe der Wiesenlerche, und seine Länge ist sieben Zoll. Der Schnabel ist drey Viertel Zoll lang, und dunkelbraun; der Scheitel und der Hinterhals sind gelbrothbraun, die Federn an den Enden schwärzlich geändert; der obere Theil des Rückens gelbroth; die kleinern

i) Latham Ind. orn. II. p. 531. n. 83. B.
k) Uebers. XVI. S. 23 II. B.
l) Latham Ind. orn. II. p. 531. n. 84. B.
m) Latham Ind. orn. II. p. 531. n. 84. B.
n) Uebers. XV. S. 207. Nr. 13. B.

nern Deckfedern der Flügel schwarz, mit gelbrothen Rändern, und die Schwungfedern eben so, einige an den äußern aber gelbröthlichweiß geändert, besonders an den Enden; unter den Augen ist ein gelbröthlichweißer Streifen; die untern Theile des Körpers sind röthlichweiß, mit kleinen schwärzlichen Flecken um den Hals und die Brust herum; der Schwanz ist etwas gabelförmig, seine Federn dunkelschwarz, die zwey mittlern gelbroth, die vier nächsten zu beyden Seiten weiß geändert, die zwey äußersten ganz weiß; die Füße gelblich, die hintere Zehe ziemlich lang, die Klaue derselben aber nicht länger, als die andern.

Dieser wird in Provence, in Frankreich angetroffen, wo er Fist genannt wird, weil sein Geschrey diesem Worte gleicht. Wenn er aufgestört wird, so drückt er sich, statt davon zu fliegen, unter einen Stein, oder in einen andern Winkel, bis alles wieder ruhig ist.

82. Der gefleckte Weißschwanz. (Spotted W. E.)

Motacilla maculata. L. I. 2. p. 963. No. 92. *o*)
La Piute Ortolane. Buff. ois. V. p. 195. *p*). — Pl. enlum 654. f. 2.

Er hat die Größe des letztern, und ist ihm auch nicht unähnlich. Seine ganze Oberfläche ist braun, mit dunkelschwarzen Flecken; der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes einfärbig braun; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern schwarz, mit dunkelweißen Rändern; die großen Schwungfedern schwarz; die Augenkreise gelblichweiß; die untern Theile dunkelweiß, mit schwarzen Flecken am Hals und Brust, und mit eben solchen Streifen an den Seiten; der Schwanz an der Wurzel weiß, das übrige oben schwarz, unten dunkelfarbig; die zwey äußern Federn an den äußern Fahnen und an den Spitzen beyder Fahnen weiß; die Füße wie bey der vorigen Art, und die hintere Klaue eben so lang.

Er ist mit dem letzten in Provence zu Hause, wo beyde Feigenfresser (Becfigues) genannt werden. Der letzte begleitet den Ortolan, und wird häufig mit ihm gefangen.

83. Der weißköpfige Sänger. (White-crowned W.)

Motacilla albicapilla. L. I. 2. p. 974. No. 90.

Er ist sieben Zoll lang. Sein Schnabel ist schwarz; an allen obern Theilen hat das Gefieder eben diese Farbe; an den untern ist es dunkelweiß; das Kinn ist rein weiß; am Scheitel ist ein weißer Fleck, und hinter dem Auge ein zweyter; die Füße sind schwarz.

Er ist in China anzutreffen.

84. Der graue Sänger. (Grisly W.)

Motacilla grisea. L. I. 2. p. 964. No. 91.
Le Grisin de Cayenne. Buff. ois. III. p. 408. — Pl. enlum. 643. f. 1. 2.

Von

o) Latham Ind. orn. II. p. 532. n. 86. B. *p*) Uebers. XV. S. 208. Nr. 14. B.

Von der Größe der Gartengrasmücke (No. 3), und fünfthalb Zoll lang. Der Schnabel iſt ſchwarz; der Scheitel dunkelſchwarz; Kehle, Vorderhals und Bruſt ſchwarz; zwiſchen den Augen ein weißer Streifen; die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz aſchgrau; die Federn jener mit grauen Einfaſſungen, und dieſes mit weißen Spitzen; Bauch, Schenkel und After weiß; die Füße aſchgrau.

Beym Weibchen ſind die obern Theile mehr aſchfarben, als beym Männchen, und die ſchwarzen Theile nicht ſo tief ſchwarz.

Sie ſind in Cayenne zu Hauſe.

85. Der rothe Sänger. (Pink-coloured W.)

Motacilla caryophyllacea. L. I. 2. p. 964. No. 89. *q*)

Er hat die Größe des Weidenzeiſigs *r*). Der Schnabel iſt röthlich; die Hauptfarbe des Gefieders hellroth (pale pink); Flügel und Schwanz ſpielen ins Dunkelfarbige; die Füße ſind roth.

Er bewohnt Zeylan.

86. Der olivenfarbene Sänger. (Olive W.)

Motacilla oliacea. L. I. 2. p. 964. No. 88. *s*).
Olive-coloured Warbler. Brown's illustr. p. 33. pl. 14.

Von der Größe einer Braunelle. Der Schnabel iſt weißlich, mit hellgelben Federn beſetzt; der Kopf, die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz olivenfarben; Bruſt und Bauch weiß.

Auch dieſer iſt in Zeylan zu Hauſe. Er wirft ſeinen Schwanz ſo hoch auf, daß er einen ſpizzigen Winkel macht.

87. Der Zeylaniſche Sänger. (Ceylan W.) *t*)

Motacilla zeylonica. L. I. 2. p. 964. *u*)
Ceylon Black-cap. Brown's illustr. p. 36. t. 15.

q) Latham Ind. orn. II. p. 532. n. 89. B.
r) Willow-Wren. ſ. unten No. 147. M. Trochilus L. Ueberſ.
s) Latham Ind. orn. II. p. 532. n. 90. B.
t) In Suppl. S. 182. iſt der Green Indian Warbler ſ. unten No. 90. citirt, mit dem Zuſatze: Man hat mir geſagt, daß dieſe beyden Vögel blos im Geſchlechte verſchieden wären. (Dieß hier iſt das Männchen. Edw. t. 15. B.)
u) Latham Ind. orn. II. p. 532. n. 91. Hier hat Hr. Latham das, was er im Suppl. Band ſagt, beſtätigt und alle Synonymen hiers bey angeführt. B.

Er ist fünfthalb Zoll lang. Ihr Schnabel ist ein wenig gebogen, und von bläulichgrauer Farbe; Scheitel und Nacken sind schwarz; der Rücken grün; alle untern Theile lichtgelb; die Flügel schwarz, mit zwey weißen Streifen durchzogen.

Ebenfalls in Zeylan.

88. Der schillergrüne Sänger. (Cingalese W.)

Motacilla singalensis. L. I. 2. p. 964. No. 86. *v*)
Green Warbler. Brown's illustr. p. 82. pl. 32.

Fünfthalb Zoll lang. Der Schnabel braun; das Gefieder an den obern Theilen schillergrün; unter dem Halse (beneath the nack) orangefarben; Brust und Bauch gelb.

Auch in Zeylan.

89. Der Chinesische Sänger. (China W.)

Motacilla sinensis. L. I. 2. p. 963. No. 85. *w*).

Sechs Zoll lang. Der Schnabel ist dunkelhellroth; die Hauptfarbe grün; vom Auge bis zum Nacken geht ein blaßer Streifen; am Ohr ist ein blaßer Fleck; die untern Theile des Körpers sind fleischfarbig; der Schwanz zugespitzt; die Füße dunkelfarbig.

Er wohnt in China.

90. Der grüne Indianische oder Zeylanische Sänger. (Green Indian W.) *)

Motacilla Tiphia. L I. 2. 963. No. 13. *y*).
Le Figuier de Bengale. Briss. orn. III. p. 484 No. 47.
— — vert et jaune. Buff ois. V. p. 278 *z*).
Green Indian Flycatcher. Edw pl. 79. *a*).
Br. Mus.

Von der Größe der Gartengrasmücke (No. 3.) Sein Schnabel ist schwärzlich, an der Wurzel aber gelb; die obern Theile des Gefieders sind olivengrün, am hellsten am Steiß; die Wangen und die untern Theile grünlichgelb; die kleinern Deckfedern der Flügel dunkelbraun; die andern eben so, mit weißen Spitzen, und dieß bildet zwey Streifen an den Flügeln; Schwungfedern und Schwanz schwärzlich, mit gelben Rändern; die Füße schwärzlich *b*).

Sie ist in Bengalen zu Hause.

91. Der

v) Latham Ind. orn. II. p. 533. n. 92. B.
w) Latham Ind. orn. II. p. 533. n. 93. B.
x) s. die Note t) a. d. Suppl. auf der vorigen Seite. B.
y) Sylvia Zeylonica Latham Ind. orn. II. p. 532. n. 91. B.
z) Uebers. XVI. S. 78. I. B.
a) Seligmanns Vögel IV. Taf. 53 (Weibchen.) B.
b) Dieß ist das Weibchen wovon No. 87. das Männchen ist. B.

91. Der weißäugige Sänger. (White-eyed W.)

Motacilla maderaspatana. L. I. 2. p. 981. No. 28. *c*)
Le petit Figuier de Madagascar. Briss. orn. III. p. 498. No. 54. pl. 28. f. 2.
Le Cheric. Buff. ois. V. p. 279. *d*)

Von der Größe des Weidenzeisigs, und kaum drey und ein Viertel Zoll lang. Der Schnabel ist graubraun; die Augenkreise sind weiß; der Kopf und die obern Theile olivengrün; Kehle und After gelb; die dazwischen liegenden Theile weißlich; die Schwungfedern hellbraun, mit olivenfarbnen Rändern; die Füße aschgrau.

Man findet ihn auf Madras, Madagaskar und Isle de France. Es ist ein kühner Vogel, ob man ihn schon nicht oft bey bewohnten Plätzen antrifft. Er fliegt in großen Flügen, und lebt von Insekten. Auf Madagaskar wird er Tcheric, und auf Isle de France Weißling genannt.

92. Der Bourbonische Sänger. (Bourbon W.)

Motacilla borbonica. L. I. 2. p. 981. No. 140. *e*).
Le Figuier de l'isle de Bourbon. Briss. orn. III. p. 510. No. 60. pl. 28. f. 3.
— Pl. enlum. 705. No. 5.
Le petit Simon. Buff. ois. V. p. 280. *f*).

Er hat die Größe des letztern. Der Schnabel und die obern Theile sind graubraun; die untern schmutzig gelblichgrau; Schwungfedern und Schwanz braun, mit graubraunen Rändern; die Füße von letzter Farbe.

Er ist auf den Inseln Madagaskar und Bourbon zu Hause. Hier wird er kleiner Simon genannt. Er macht sein Nest im September, und legt gewöhnlich drey blaue Eyer. Das Nest besteht aus trocknen Kräutern, ist mit Haaren ausgelegt, und gewöhnlich an solchen Bäumen angebracht, die einzeln stehen, wie in Obstgärten. Er hält sich immer in ganzen Flügen zusammen, und lebt von Insekten und zarten Früchten. Wenn er irgend etwas über den Boden laufen sieht, so erhebt er ein besonderes Geschrey; daher hilft er dem Jäger in Rücksicht des Wildes auf die Spur, das sonst seinem Blick entgehen würde.

93. Der St. Mauritius-Sänger. (Maurica W.)

Motacilla mauritiana. L. I. 2. p. 981. No. 141. *g*)
Le Figuier bleu. Buff. ois. V. p. 282. *h*)
— — de l'isle de France. Pl. enlum. 705. f. 1.

Er hat die Größe der zwey letztern, und seine Länge ist drey und drey Viertel Zoll. Sein

c) Sylvia madagascariensis. Latham Ind. orn. II. p. 533. n. 94. B.
d) Uebers. XVI. S. 80. B.
e) Latham Ind. orn. II. p. 533. n. 95. B.
f) Uebers. XVI. S. 80. B.
g) Latham Ind. orn. II. p. 534. n. 96. B.
h) Uebers. XVI. S. 84. B.

Schnabel iſt ſchwärzlich; die obern Theile des Körpers ſind blaugrau; die untern weiß; Schwungfedern und Schwanz ſchwarz, mit weißen Rändern; die Füße bläulich.

Er bewohnt Isle de France.

94. Der Madagaskariſche Sänger. (Madagascar W.)

Motacilla livida. L. I. 2. p. 982. No. 142. *i*)
Le Figuier bleu de Madagascar. Pl. enlum. 703. f. 3. k)

Er hat die Größe der letzten, und iſt fünfthalb Zoll lang. Die obern Theile ſind dunkel blaugrau; die untern eben ſo, aber heller, und am Steiß ins Weiße ſpielend; die Schwungfedern ſchwärzlich, mit weißen Rändern; der Schwanz über anderthalb Zoll lang, und ſchwarz, die zwey äußern Federn ausgenommen, die weiß ſind; Schnabel und Füße hell bleyfarben.

Dieß ſoll das Männchen der letzten Art ſeyn, wer aber die Beſchreibung vergleichen, und zugleich die Verſchiedenheit der Länge und Zeichnung des Schwanzes in Erwägung ziehen will, (wenn anders die Pl. enlum. getreu ſind), der wird mit mir anderer Meynung ſeyn.

95. Der citronbäuchige Sänger. (Citron-bellied W.)

Motacilla flavescens. L. I. 2. p. 992. No. 143. *l*).
Le Figuier du Senegal. Buff. ois. V. p. 282. *m*) — Pl. enlum. 582. f. 1.
Le Figuier à ventre jaune du Senegal. Pl. enlum. 582. f. 3.

Der erſte von dieſen iſt vier und ein Viertel Zoll lang. Der obere Theil des Kopfs und Körpers iſt braun; die Schwungfedern ſind dunkelbraun, die Federn gelbrothbraun geändert; die untern Theile des Körpers hellgelb, die Seiten des Kopfs beynahe weiß; der Schwanz am Ende gleich, und wie die Schwungfedern bezeichnet; Schnabel und Füße dunkelfarbig.

Die zweyte *n*) mißt nur drey und drey Viertel Zoll, und hat beynahe das nämliche Colorit, außer daß die untern Theile einen röthlichen Anſtrich haben.

96. Der gewellte Sänger. (Vndated W.)

Motacilla undata. L. I. 2. p. 982. No. 144. *o*)
Figuier tacheté du Senegal. Pl. enlum. 582. f. 2 *p*)

Er

i) Latham Ind. orn. II. p. 534. n. 97. B.
k) Ueberſ. XVI. S. 84. B.
l) Latham Ind. orn. II. p. 534. n. 98. B.
m) Ueberſ. XVI. S. 55. B.
n) Dieſen zweyten Vogel macht Latham im Ind. orn. II. p. 534. n. 99. unter den Namen rothgelbbäuchiger Sänger (Sylvia ruſigastra) zu einer beſondern Art und citirt dabey Büffons Figuier du Seregal. Pl. enl. 582. fig. 1. ſo daß für den erſten Vogel fig. 3. bleibt. (Man ſ. Ueberſ. l. c.) der Oberleib iſt olivenbraun; der Unterleib gelblich mit gelbrothen Anſtrich; die Schwung- und Schwanzfedern dunkelbraun; letzterer kürzer. B.
o) Latham Ind. orn. II. p. 477. n. 106. B.
p) Ueberſ. XVI. S. 95. B.

Er iſt ohngefähr vier Zoll lang. Sein Schnabel iſt ſchwarz; die obern Theile des Kopfs, der Hals, der Rücken und die Deckfedern der Flügel ſind ſchwarz, mit gelbrothen Rändern; der Steiß dunkel gelbroth; die untern Theile weiß; die Schwungfedern braun, der Schwanz eben ſo, zwey Zoll lang und ſtark keilförmig, beyde, dieſer und die Schwungfedern gelbröthlichweiß geändert *q*); die Füße dunkelfarbig.

Büffon iſt geneigt, dieſe für das Männchen des Citronbäuchigen zu halten; aber Länge und Form des Schwanzes ſind ſicher gegen dieſe Vermuthung.

97. Der dunkelfarbige Sänger. (Dusky W.)

Motacilla fuscata. L. I. 2. p. 982. No. 145. *r*)
Figuier brun du Senegal. Pl. enlum. 584. f. 1. *s*)

Von der Größe der Gartengrasmücke (Nr. 9). Der Schnabel iſt dünn und dunkelfarbig; die obern Theile des Gefieders ſind braun; die untern grau, mit einem röthlichen Anſtrich an den Seiten; Schwungfedern und Schwanz dunkler, als die übrigen Theile, und letzter ziemlich lang, und am Ende gleich; die Füße gelb.

98. Der blonde Sänger. (Flaxen W.)

Motacilla subflava. L. I. 2. p. 982. No. 146. *t*)
Figuier blond du Senegal. Pl. enlum. 584. f. 2.
— à ventre gris du Senegal. IBID. f. 3.

Viel kleiner, als der letzte, vier und drey Viertel Zoll lang. Der Schnabel iſt dunkelfarbig; die Farbe ſo ziemlich die nämliche, wie beym vorigen, ſcheint aber am Steiß heller; der Schwanz keilförmig, und nicht ſo lang in Verhältniß; die Seiten des Körpers haben einen ſehr leichten, rothen Anſtrich.

Bey Fig. 3. der Pl. enlum. kömmt Größe und Farbe gleichfalls überein, die untern Theile aber ſind grau, ſtatt weiß; der Schwanz iſt ebenfalls keilförmig, und ſein unterer Theil grau; die Füße bey beyden gelb.

Büffon *u*) glaubt, die drey letzten ſeyen eine und eben dieſelbe Art, und ich würde dieß nicht läugnen, wenn die Größe der einzige Unterſchied wäre; daß aber die Form der Schwänze nicht das nämliche iſt, dieß iſt meiner Meynung nach ein unwiederlegbarer Einwurf. Was die zwey letzten betrifft, ſo halte ich ſie wirklich für Geſchlechtsverſchiedenheiten, oder für Spielarten eines und eben deſſelben Vogels.

Sie ſind alle in Senegal zu Hauſe.

q) Die Spitzen ſind in den Pl. enlum weiß.
r) Latham Ind. orn. II. p. 535. n. 101. B.
s) Ueberſ. XVI. S. 35. B.
t) Latham Ind. orn. II. p. 535. n. 102. B.
u) Hist. des Ois. V. p. 284.

99. Der rothköpfige Sänger. (Red-headed W.)

Motacilla Petechia. L. I. 2. p. 983. No. 30. *v*)
Le Figuier à tête rouge de Pensylvanie. Briss. orn. III. p. 488. No. 49. Buff. ois. V. p. 286. *w*).
Yellow Redpole. Edw. pl. 256. *x*)
Red-headed Warbler. Arct. Zool. II. No. 289.

Von der Größe des Mönchs (Nr. 5). Der Schnabel ist schwarz; der Scheitel roth; die obern Theile des Körpers olivengrün; die untern lebhaft gelb, an Brust und Bauch roth gefleckt; Flügel und Schwanz dunkelfarbig, mit gelben Rändern; die Füße dunkelfarbig.

Das Weibchen unterscheidet sich durch bläßere Farben.

Dieß sind Zugvögel, die aber einsam leben. In Pensylvanien kommen sie im März an, brüten aber nicht daselbst. Sie halten sich in niedern Gebüschen auf. Selten sitzen sie auf schlanken Bäumen. Sie leben von Insekten.

100. Der weißliche Sänger. (St. Domingo W.)

Motacilla albicollis. L. I. 2. p. 983. No. 147. *z*)
Le Figuier de St. Domingue. Briss. orn III. p. 494. No. 52, pl. 26. f. 5.
Figuier à gorge blanche. Buff. ois. V. p. 287. *a*)

Von der Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3.), und fast fünf Zoll lang. Sein Schnabel ist hornfarben; die obern Theile des Körpers sind olivengrün; die Seiten des Kopfs, und alle untern Theile hellgelb; der Vorderhals aber, und die Brust sind schmutzig gelblichweiß, mit länglichen, röthlichen Flecken bezeichnet; Schwungfedern und Schwanz braun, mit grünlichgelben Rändern; die Seitenfedern des Schwanzes sind an den innern Fahnen gelblich; die Füße graubraun.

Das Weibchen ist am Hinterhalse grünlichaschfarben, statt olivenfarben.

Sie sind auf St. Domingo zu Hause.

101. Der Louisianische Sänger. (Louisiana W.)

Motacilla ludoviciana. L. I. 2. p. 983. No. 148.
Le Figuier de la Louisiane. Briss. orn. III. p. 500. No. 55. pl. 26. f. 4.
Figuier à gorge jaune. Buff. ois. V. p. 288. *c*)
Louisiane Warbler. Arct. Zool. II. p. 303. *d*).

Er

v) Latham Ind. orn. II. p. 535. n. 163. B.
w) Uebers. XVI. S. 91. B.
x) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 46. B.
z) Latham Ind. orn. II. p. 535. n. 104. B.
a) Uebers. XVI. S. 94. B.
b) Latham Ind. orn. II. p. 535. n. 105. B.
c) Uebers. XVI. S. 96. B.
d) Büffon rechnet Edwards Tannenläufer Tab. 277 (Seligmanns Vögel VIII. Taf. 67.) hierher; und diesen Vogel rechnet Linné zu seinen Tannenbaumläufer (Certhia Pinus). Allein Büffon so wie Latham machen ihn zu einen besondern Sänger s. Nr. 107. Der Fichtensänger. B.

Er iſt nicht viel größer, als ein Zaunkönig, vier und ein Viertel Zoll lang. Der Schnabel iſt braun, unten grau; die obern Theile des Gefieders ſind olivengrün; Vorderhals und Bruſt ſchön gelb, letztere rothgefleckt; die übrigen untern Theile gelblichweiß; quer über die Flügel laufen zwey weiße Binden; die Schwungfedern ſind ſchwärzlichgrau, mit blaugrauen Rändern; die innern Fahnen weiß; die zwey äußern Schwanzfedern ſind inwendig an den Spitzen weiß, und die dritte hat einen runden, weißen Fleck an der nämlichen Stelle; die Füße ſind aſchgrau.

Dem Weibchen fehlen die rothen Flecken an der Bruſt.

Sie bewohnen Louiſiana und St. Domingo.

102. Der grün und weiße Sänger. (Green et white W.)

Motacilla chloroleuca. L. I. 2. p. 984. No. 149. *e*)
Le petit Figuier de St. Domingue. Briss. orn. III. p. 496. No. 53. pl. 26. f. 3.
Le Figuier vert et blanc. Buff. ois p. 289. *f*)

Kleiner, als die Gartengrasmücke (Nr. 3), und fünfthalb Zoll lang. Der Schnabel iſt hornfarben; der Kopf und der obere Theil des Halſes ſind aſchgrau, mit Olivenfarb untermiſcht; die obern Theile des Körpers olivengrün, die untern gelblichweiß; die größern Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern braun, mit gelblichgrünen Rändern; der Schwanz etwas gabelförmig und dunkelolivenfarbig, die innern Fahnen aller Schwanzfedern, die zwey mittlern ausgenommen, mit Gelb bezeichnet, das den breitern Raum einnimmt, ſo wie die Federn mehr auswärts ſtehen; die Füße graubraun.

Das Weibchen unterſcheidet ſich bloß durch bläßere Farben.

Sie ſind auf St. Domingo zu Hauſe.

103. Der orangekehlige Sänger. (Orange-throated W.)

Motacilla auricollis. L. I. 2. p. 984. No. 150. *g*).
Le grand Figuier de Canada. Briss. orn. III. p. 508. No. 59. pl. 26. f. 1.
Le Figuier à gorge orangée. Buff. ois. V. p. 290. *h*).
Orange-throated Warbler. Arct. Zool. II. p. 304. *i*)

Von der Größe des Mönchs (Nr. 5.), und über fünf Zoll lang. Die obere Kinnlade iſt braun, die untere weißlich; die obern Theile ſind olivengrün, am Steiß ins Aſchfarbne ſpielend; Kehle, Vorderhals und Bruſt orangefarben; der Bauch hellgelb; After und Schenkel beynahe weiß; die größern Deckfedern der Flügel aſchfarben; die Schwungfedern braun, mit aſchfarbnen Rändern; die zwey mittlern Schwanzfedern von letzterer Farbe, die andern an der Außenſeite und an den Spitzen ſchwarz, und an der innern Seite weiß; die Füße grau.

Beym

e) Latham Ind. orn. II. p. 536. n. 106. B.
f) Ueberſ. XVI. S. 98. B.
g) Latham Ind. orn. II. p. 536. n. 101. B.
h) Ueberſ. XVI. S. 100. B.
i) Ueberſ. II. S. 380. Nr. 221. B.

Beym Weibchen ist die Orangefarbe an der Brust minder lebhaft.
Sie sind in Canada zu Hause.

104. Der Sänger mit gelbem Steiße. (Yellow-rumped W.)

Motacilla maculosa. L. I. 2. p. 984. No. 151. k).
Le Figuier tachcté de Pensylvanie. Briss. orn. III. p. 502. No. 56.
Le Figuier à tête cendrée. Buff. ois. V. p. 291. *l*).
Yellow-rumped Flycatcher. Edw. pl. 255. *m*).
— Warbler. Arct. Zool. II. No. 286. *n*)

Sie hat die Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3). Ihr Schnabel ist braun; der Scheitel und die Seiten des Kopfs sind aschfarben; Hinterhals und Rücken olivengrün, mit schwarzen Flecken; Kehle, Brust und Steiß schön gelb, mit länglichen, schwarzen Flecken an der Brust; Bauch und After weiß; über den Deckfedern der Flügel laufen zwey weiße Streifen weg; die Schwungfedern sind dunkel aschfarben, mit weißen Rändern; die zwey mittlern Schwanzfedern schwarz, die übrigen schwärzlich, mit einem weißen Fleck in der Mitte der innern Fahnen; die Füße braun.

Sie ist in Pensylvanien zu Hause.

Eine Spielart *o*).

Ein, diesem ähnlicher, wo nicht der nämliche Vogel, läßt sich des Sommers in der Hudson's Bay sehen. Seine Länge ist fünf Zoll, seine Breite siebenthalb, und sein Gewicht fünf Quentchen. Der Augenstern ist blau; die Augenkreiße sind weiß; Zügel und Ohren schwarz; zu beyden Seiten des Kopfs ist ein weißer Streifen; Kehle und Bauch sind lichtgelb; Brust und Schenkel nach der Länge schwarz und gelb gestreift; der After weiß; der Rücken schwarz, mit matttgrünen Streifen; die Schwungfedern grün und taubenfarbig (dove colour); die kleinen Deckfedern der Flügel grau, die größern weiß, mit schwarzen Längsstreifen; die Schwungfedern schwarz, mit grauen Rändern; die Deckfedern des Schwanzes gelb, zunächst am Schwanze mit schwarzen Spitzen; die Schwanzfedern schwarz, mit weißen Rändern, alle, die zwey mittlern ausgenommen, mit einem breiten, weißen Flecken an der innern Fahne bezeichnet; die Füße schwarz.

Dieser Vogel kommt im Sommer nach der Hudson's Bay, macht in die Weidenbäume ein Nest aus Gras und Federn, und legt vier Eyer. Die Jungen werden im Julius ausgebrütet. Er lebt von Fliegen, schreyt bey Annäherung des Regenwetters, oder hat doch einen durchdringenden (shrill) Gesang, den er beträchtlich verlängert, wenn Regen einfallen will; weßwegen ihm die Eingebohrnen den Namen Kimmewan apaykuteſisch geben *p*).

105. Der

k) Latham Ind. orn. II. p. 536. n. 108. B.
l) Uebers. XVI. S. 102. B.
m) Seligmanns Vögel VII. Taf. 45. B.
n) Uebers. II. S. 373. Nr. 205. B.
o) A. d. Suppl. S. 182. 81. Im Ind. orn. wird sie nicht besonders angegeben. B.
p) Herr Hutchins.

105. Der braunkehlige Sänger. (Brown-throated W.)

Motacilla fuscescens. L. I. 2. p. 983. No 152. *q*).
Le Figuier de la Jamaique. Briss. orn. III. p. 512. No. 61.
Le Figuier brun. Buff. ois. V. p. 292. *r*)
Worm-eater. Sloan. Jam. p. 310. No. 65. pl. 265. f. 2. — Ray Syn. p. 186. No. 38.

Er hat die Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3.), und fünf Zoll Länge. Sein Schnabel ist braun; das Gefieder an den obern Theilen hellbraun; an den untern aus Schwärzlich und Gelbrothgrau gemischt, fast wie bey einer Lerche, die Kehle ausgenommen, die einfärbig mattbraun ist, und zwischen den Augen ist ein Streifen von eben dieser Farbe; Schwungfedern und Schwanz sind hellbraun.

Er bewohnt Jamaika.

106. Der gelbgefleckte Sänger. (Spotted-yellow W.)

Motacilla tigrina. L. I. 2. p. 985. No. 135. *s*)
Le Figuier brun de Canada. Briss. orn. III. p. 515. No. 63. pl. 27. f. 4.
Le Figuier tacheté de jaune. Buff. ois. V. p. 293. *t*)
Spotted-yellow Flycatcher. Edw. pl. 257. *u*)
— — Warbler. Arct. Zool. II. No. 301. *v*)

Er hat die Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3), und ist fünfthalb Zoll lang. Der Schnabel ist dunkelfarbig; die Federn an den obern Theilen sind braun, mit olivengrünen Rändern; hinter jedem Auge ist ein breiter, gelbrother Fleck; die untern Theile bis zum Bauch, die Seiten und der Steiß sind gelb, mit kleinen, schwärzlichen Flecken an Hals und Brust; der untere Theil des Bauchs, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes sind schmutziggelblichweiß; queer über die größern Deckfedern der Flügel geht ein weißes Band; Schwungfedern und Schwanz sind olivengrün eingefaßt, letzterer ist etwas gabelförmig, und seine zwey mittlern Federn sind an den innern Fahnen bey den Spitzen weißlich; die Füße braun.

106. Var. A. Motacilla tigrina. L. I. 2. p. 985. No. 135. *β*. *w*)
Le Figuier de St. Dominigue. Briss. orn. III. p. 513. No. 62. pl. 28. f. 1.

Dieser Vogel ist wie der letzte, aber blässer; die untern Theile sind weißlich, und die Brust ist braun gefleckt; auch fehlt das weiße Band an den Deckfedern der Flügel.

Der erste soll in Canada, der zweyte in St. Domingo zu Hause seyn; da aber beyde am Bord eines Schiffes zwischen diesen Orten gefangen worden sind, so ist es wahrscheinlich, daß sie wechselsweise von einem nach dem andern ziehen.

q) Latham Ind. orn. II. p. 537. n. 109. B.
r) Uebers. XVI. S. 105. B.
s) Latham Ind. orn. II. p. 538. n. 110. B.
t) Uebers. XVI. S. 108. B.
u) Seligmanns Vögel. VII. Taf. 47. fig. 2. B.
v) Uebers. II. S. 379 n. 219. B.
w) Latham l. c. *β*. B.

107. Der Fichten-Sänger. (Pine W.)

Certhia Pinus. L. I. 2. p. 478. No. 16 *x*)
Le Mesange d'Amerique. Briss. orn. III. p. 576. No. 15.
Le Figuier de la Louisiane. ibid. Suppl. p. 99. No. 55.
Le Figuier de Sapins. Buff. ois. V. p. 296. *y*)
Pine-creeper. Catesby Carol. I. p. 46. — Edw. pl. 277. *z*) — Arct. Zool. II. No. 318. *a*).

Seine Länge iſt faſt vier und drey Viertel Zoll. Der Schnabel iſt braun; beym Männchen, Kopf, Hinterhals, Rücken und Steiß olivenfarben; zwiſchen den Augen ein ſchwarzer Streifen; Kehle, Hals und Bruſt gelb; Bauch und After weiß; die obern Deckfedern der Flügel braun, am Ende mit einem weißen Flecken bezeichnet, und dieß bildet zwey Bänder an den Flügeln; die Schwungedern braun, der Schwanz etwas gabelförmig, ſeine Farbe braun, die äußern Fahnen der äußern Federn weiß; die Füße braun.

Das Weibchen iſt ganz braun *b*).

Er hält ſich im Sommer in Carolina auf, kommt im April nach Penſylvanien, und zieht im Herbſt wieder weg. Er hat die Lebensart der Baumläufer, und läuft die abgeſtandenen (decayed) Bäume auf und ab, um Inſekten zu ſuchen, von welchen er ſich nährt. Man vermuthet, er brüte daſelbſt, ob man gleich ſein Neſt noch nicht hinlänglich kennt. Am häufigſten findet er ſich in Schwarzwäldern.

108. Der grüne Sänger. (Green W.)

Motacilla virens. L. I. 2. p. 985. No. 154. *c*)
Le Figuier à gorge noire de la Pensylvanie. Briss. orn. Suppl. 104. No. 77.
Le Figuier à cravate noire. Buff. ois. V. p. 298. *d*).
Black-throated green Flycatcher. Edw. pl. 300. *e*)
Green Warbler. Arct. Zool. II. No. 297. *f*).

Von der Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3). Sein Schnabel iſt ſchwarz; das Gefieder an den obern Theilen olivengrün; die Seiten des Kopfs und Halſes lebhaft gelb; Kehle und Vorderhals ſchwarz; der obere Theil der Bruſt gelb; der untere Theil, der Bauch und der Af-

x) Latham Ind. orn. II. p. 537. n. 111. B.
y) Ueberſ. XVI. S. 114. B.
z) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 67. fig. 2. B.
a) Ueberſ. II. S. 385. n. 235. Dieß iſt wohl kein anderer Vogel als der oben angeführte gelbbrüſtige Sänger. Nr. 36. Büffon führt bey ſeiner Amerikaniſchen Meiſe des Catesby Stelle, und bey dem Louiſianiſchen Feigenfreſſer die Edwardſche Taf. 277. an. Büffon unterſcheidet zuerſt, daß der Louiſianiſche Feigenfreſſer mit Edwards Taf. 277. und Catesby p.. 46. hierher gehöre, und daß Briſſons Meiſe und Feigenfreſſer ein und eben derſelbe Vogel ſey. B.
b) Iſt von bräunlicher Farbe, ſagt Pennant. B.
c) Latham Ind. orn. II. p. 537. n. 112. B.
d) Ueberſ. XVI. S. 117. B.
e) Seligmanns Vögel. VIII. Taf 95. fig. 1. B.
f) Ueberſ. II. S. 377. Nr. 214. B.

After weiß; die Seiten ſchwarz und weiß; die kleinern Deckfedern der Flügel olivenfarben; die mittlern und die größern, zunächſt am Körper ſtehenden dunkel aſchfarben, mit weißen Spitzen, und dieß bildet zwey Bänder über die Flügel; die äußern Deckfedern und die Schwungfedern aſchfarben, letztere weiß geändert; der Schwanz dunkel aſchfarben, und ſeine drey äußern Federn an den innern Fahnen mit Weiß bezeichnet; die Füße braun.

Er iſt in Penſylvanien zu Hauſe, wo er um den Aprilmonat ankommt. Er hält ſich aber nicht lange da auf, weil er bloß auf ſeinem Zuge nach den nördlichen Gegenden begriffen iſt, kömmt aber im September wieder zurück. Seine Nahrung machen Inſekten aus.

109. Der Sänger von Quebec. (Quebec W.)

Motacilla icterocephala. L. I. 2. p. 980. No. 25. g)
Le Figuier à tête jaune de Canada. Briss. orn. III. p. 517. No. 64. pl. 27. f. 2. — Buff. ois. V. p. 299. h)
Le Figuier de Mississippi. Pl. enlum. 731. f. 2.
Quebec Warbler. Arct. Zool. II. No. 305. i)

Kleiner, als die Gartengrasmücke (Nr. 3), und vier und ein Drittel Zoll lang. Der Schnabel iſt dunkelfarbig; der Scheitel gelb; zwiſchen den Schnabel und den Augen iſt ein breiter, dreyeckiger, ſchwarzer Fleck; unter den Augen ein weißes Zeichen; der Hinterhals und alle obern Theile ſind ſchwarz, mit gelblichgrünen Rändern; die Kehle, die untern Theile weißlich; über die Flügel laufen zwey gelbliche Streifen; Schwungfedern und Schwanz ſind dunkelbraun, mit olivengrünen und weißlichen Rändern; die innern Fahnen der drey äußern Schwanzfedern gelblichweiß, von der Mitte bis zum Ende; die Füße dunkelfarbig.

In der Abbildung in den Pl. enlum. fehlt das Schwarze an den Seiten des Kopfs, und auch außerdem iſt der Vogel viel bläßer von Farbe. Wahrſcheinlich iſt es ein Weibchen, oder ein junger Vogel.

Dieſe Art iſt in Canada und den nördlichen Theilen von Nordamerika zu Hauſe, in welche ſie zu Anfang des Aprils zieht. Sie hält ſich in niedrigen Gebüſchen und auf den untern Zweigen der rothen Cedern auf, und zieht im Herbſt wieder weg.

110. Der Jamaikaiſche Sänger. (Jamaica W.)

Motacilla dominica. L. I. 2. p. 980. No. 26. k)
Le Figuier cendré de St. Domingue. Briss. orn. III. p. 520. No. 65. pl. 27. f. 3.
Le Figuier cendré à gorge jaune. Buff. ois. V. p 300. l)
Muscicapa e coeruleo, cinereo, fusco et luteo varia. Ray Syn. p. 186. No. 37.
Blue-ashcoloured Muscicapa. Sloan. Jam. II. p. 310. No 44.

g) Latham Ind. orn. II. p. 538. n. 113. B.
h) Ueberſ. XVI. S. 119. B.
i) Ueberſ. II. S. 380. Nr. 222. B.
k) Latham Ind. orn. II. p. 538. n. 114. B.
l) Ueberſ. XVI. S. 122. B.

Seine Länge ist fünfthalb Zoll. Der Schnabel ist braun; die obern Theile des Vogels sind aschfarben; die Kehle *m*) und der Vorderhals gelb; von hier an bis zum After ist die Farbe weiß; zwischen dem Schnabel und den Augen ist ein gelber Streifen; unter den Augen ein breiter, schwarzer Fleck, und hinter denselben ein weißer; die Seiten der Brust sind mit kleinen, schwarzen Flecken bezeichnet; die Deckfedern der Flügel braun, und mit zwey weißen Bändern durchzogen; Schwungfedern und Schwanz aschbraun, mit grauen Rändern, die zwey äußern Schwanzfedern haben an der innern Seite, nahe an den Spitzen, einen weißen Fleck; die Füße sind braun.

Man findet ihn in Jamaika und St. Domingo.

111. Der goldköpfige Sänger. (Golden-crowned W.)

Motacilla coronata. L. I. 2. p. 974. No. 21. *n*)
Le Figuier cendré tacheté de Pensylvanie. Briss. orn. Suppl. 110. No. 81.
Le Figuier couronné d'or. Buff. ois. V. p. 312. *o*).
Golden crowned Flycatcher. Edw. pl. 298. *p*)
— — Warbler. Arct. Zool. II. No. 29. *q*)

Von der Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3). Der Schnabel ist dunkelfarbig; das Gefieder an den obern Theilen aschblau, mit länglichen, schwarzen Flecken; Scheitel und Steiß gelb*qq*); die Seiten des Kopfs und die Kehle weißlich; vom Schnabel durch die Augen geht ein schwarzes Band; der Vorderhals und der obere Theil der Brust sind schwarz, mit Aschblau gemischt; die Seiten der Brust gelb, mit schwarzen Flecken; die übrigen untern Theile weiß; die Seiten aber haben einige wenige schwarze Flecken; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern schwarz, über jene laufen zwey weiße Bänder, diese sind grau geändet; der Schwanz ist eben so, die innern Fahnen der drey äußern Federn aber sind mit einem weißen Fleck bezeichnet; die Füße sind schwärzlich.

Das Weibchen ist oben gelbrothbraun; es fehlt ihm das schwarze Zeichen zwischen den Augen, und es hat keine schwarze Flecken an der Brust.

Sie sind in Pensylvanien zu Hause; und ziehen im Herbst nach Süden.

112. Der begürtete Sänger. (Belted W.)

Motacilla cincta. L. I. 2. p. 980. No. 27. *r*)
— canadensis. ibid. Ed. 12. I. p. 334. No. 27.

Le

m) Linne' sagt, die Kehle sey schwarz, dieß erhellt aber aus Brisson's Figur nicht. Vielleicht vereinigt sich das Schwarze bey einigen Vögeln unter dem Kinn, bey andern aber nicht.

n) Latham Ind. orn. II. p. 538. n. 115. B.

o) Uebers. XVI. S. 147. B.

p) Seligmanns Vögel. VIII. Taf. 88. fig. 1 und 2. B.

q) Uebers. II. S. 375. Nr. 211. B.

qq) Pennant sagt: der Scheitel ist goldgelb, an allen Seiten mit bläulicher Schieferfarbe eingefaßt. B.

r) Latham Ind. orn. II. p. 539. n. 116. B.

Le Figuier cendrè de Canada. Briss. orn. III. p. 324. No. 67. pl. 27. f. 1.
— — à centure. Buff. ois. V. p. 303. *s*)
Belted Warbler. Arct. Zool. II. No. 306. *t*)

Von der Größe des Mönchs (Nr. 5.), und fünf Zoll lang. Der Schnabel iſt ſchwarz, das Gefieder an den obern Theilen dunkel aſchblau, faſt ſchwarz; in der Mitte des Scheitels ein gelber Fleck; über den Augen ein weißer Streifen; die Augenkreiſe ebenfalls weiß; quer über die Deckfedern der Flügel laufen zwey weiße Binden; die untern Theile des Körpers ſind weiß, der untere Theil des Halſes und der Bruſt aber hat ſchwärzliche Flecken, und quer über die Bruſt lauft ein gelbes, keinen Viertel Zoll breites Band *u*); die obern Deckfedern des Schwanzes ſind von letzter Farbe; die Schwungfedern braun, mit grauen Rändern; der Schwanz etwas gabelförmig, ſchwärzlich, mit aſchfarbnen Rändern; die äußerſte Feder inwendig, nahe an der Spitze, mit Weiß bezeichnet; die Füße braun.

Beym Weibchen ſind die obern Theile braun, und die obern Deckfedern des Schwanzes nicht gelb.

Sie werden in Canada gefunden.

114. Der ſchwarzkehlige Sänger. (Black-throated W.)

Motacilla canadensis. L. l. 2. p. 991. No. 42. *v*)
Le petit Figuier cendré de Canada. Briss. orn. III. p. 527. No. 68. pl. 27. f. 6. — Pl. enlum 685. f. 2.
Le Figuier bleu. Buff. ois. V. p. 354. *w*)
Blue Flycatcher. Edw. pl. 252. *x*)
— throated Warbler. Arct. Zool. II. No. 285. *y*)

Etwas kleiner, als die letzte, und fünfthalb Zoll lang. Der Schnabel iſt ſchwarz; die obern Theile von der nämlichen Farbe, wie bey dem letzten Vogel; die Seiten des Kopfs aber, die Kehle und der Vorderhals ſind ſchwarz; die Seiten haben Flecken von eben dieſer Farbe; der Bauch und die untern Theile ſind weißlich; die Schwungfedern dunkel ſchwarz; an der Aufſenſeite der großen, an den Afterflügeln iſt ein weißer Fleck; der Schwanz iſt etwas gabelförmig, ſeine Federn ſind aſchblau, drey der äußern inwendig an der Wurzel und an den Spitzen weiß, und die zwey nächſten inwendig an der Spitze weißlich; die Füße braun *z*).

Ein ſolcher Vogel wurde bey einer Windſtille (in a calm), auf der See gefangen, acht oder zehn Meilen von St. Domingo; und ein anderer wurde Herrn Edwards aus Penſylvanien geſchickt, wo dieſe Vögel im April ankommen *a*), ihr Neſt bauen, und im Herbſt nach Süden wandern.

114. Der

s) Ueberſ. XVI. S. 127. B.
t) Ueberſ. II S. 381. B.
u) Pennant ſagt: zwiſchen der Bruſt und dem Bauche geht ein gelber Gürtel quer durch. B.
v) Latham Ind. orn. II. p. 539. n. 117. B.
w) Ueberſ. B. XVI. S. 130. B.
x) Seligmanns Vögel. VII. Taf. 42. B.
y) Ueberſ. II. S. 372. Nr. 202. B.
z) In den Pl. enlum. ſind ſie gelb, und der Schwanz ſcheint ganz ſchwarz zu ſeyn.
a) Sie gehen im Winter nach den Antillen. Pennant. B.

114. Der weißkappige Sänger. (White-poll W.)

Motacilla varia. L. l. 2. p. 979 No. 23. *b)*
Le Figuier varié de St. Domingue. Briss. orn. III. p. 529. No. 69. pl. 27. f. 5. Buff. ois. V. p. 305. *c)*
Small black et white Bird. Ray Syn. p. 186. No. 36. — Sloan. Jam. II. p. 309. pl. 265. f. 1.
Black et white Creeper. Edw. pl 300. *d)*
White-poll Warbler. Arct. Zool. II. No. 293. *e)*

Er hat die Größe des letztern, und ſeine Länge iſt vier und drey Viertel Zoll. Der Schnabel iſt dunkelfarbig; der Scheitel weiß; die Seiten des Kopfs ſchwarz, mit zwey weißen Streifen bezeichnet; Rücken, Steiß und Kehle weiß, mit breiten, ſchwarzen Flecken; Bruſt und Bauch weiß, mit ſchwarzen Flecken an Bruſt und Seiten; die Deckfedern der Flügel ſchwarz, mit zwey weißen Bändern durchzogen; die Schwungfedern ſchwärzlich, mit grauen Rändern; und einige von denen, die zunächſt am Körper ſtehen, faſt ganz graulich, oder weiß; der Schwanz etwas gabelförmig, von Farbe ſchwärzlich, auswärts grau gerändert, alle äußern Federn an der innern Seite weißlich; die Füße grünlichbraun; die Klauen gelblich.

Man trifft ihn den ganzen Sommer hindurch in Penſylvanien an; er kommt im April, und zieht im Herbſt wieder weg. Er wird auch in Jamaika, St. Domingo und andern Orten angetroffen. Um Neuyork hat man ihn unter den Maßholderbäumen (Maples) den ganzen Sommer hindurch geſehen, wo er am Ende des Märzmonats ankommt.

115. Der rothſeitige Sänger. (Bloody-Side W.)

Motacilla ruficapilla. L. l. 2. p. 971. No. 106. *f)*
Le Figuier de la Martinique. Briss. orn. III. p. 490. No. 50. pl. 22. f. 4.
Le Figuier à tête rousse. Buff. ois. V. p. 306. *g)*
Bloody-side Warbler. Arct. Zool. *h)*

Von der Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3.), und nicht ganz vier und ein Viertel Zoll lang. Der Schnabel iſt braun; der Scheitel gelbroth; die obern Theile des Halſes und Körpers olivengrün; Kehle, Vorderhals und Bruſt gelb, mit gelbrothen Längsflecken bezeichnet; Bauch und After einfärbig gelb; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern braun, mit olivengrünen Rändern; der Schwanz wie die Schwungfedern, ſeine zwey äußern Federn aber inwendig gelblich; die Füße grau.

Er wohnt auf Martinik. Er ſoll beſtändig in Bewegung ſeyn, und einen geringen (triffling), aber ſehr melodiſchen Geſang haben.

116. Der

b) Latham Ind. orn. II. p. 375. n. 118. B.
c) Ueberſ. XVI. S. 133. B.
d) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 90. fig. 2. B.
e) Ueberſ. II. S. 375. Nr. 210. B.
f) Latham Ind. orn. II. p. 540. n. 119. B.
g) Ueberſ. XVI. S. 137. B.
h) Hier ſind ich ihn nicht. B.

116. Der rothkehlige Sänger. (Red-throated W.)

Motacilla pensylvanica. L. I. 2. p. 976. No. 19. *i*)
Le Figuier à tête jaune de Pensylvanie. Briss orn. Suppl. p. 105. No. 78.
Le Figuier à poitrine rouge. Buff. ois. V. p. 308. *k*)
Red-throated Flycatcher. Edw. pl. 301 *l*).

Er hat die Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3). Sein Schnabel iſt ſchwarz; die obern Theile des Körpers ſind olivengrün, mit ſchwarzen Flecken; der Scheitel gelb; der Hinterkopf ſchwarz; unter den Augen iſt ein breites Band von der nämlichen Farbe; die Seiten des Kopfs und die untern Theile des Körpers ſind weiß; der obere Theil der Bruſt und die Seiten dunkelroth; die Deckfedern der Flügel dunkelbraun, mit zwey weißlichen Streifen durchzogen; die Schwungfedern dunkelbraun, einige der innern mit olivengrünen Rändern und Spitzen; der Schwanz dunkelbraun, ſeine äußern Federn inwendig weiß gefleckt; die Füße ſchwarz.

Dem Weibchen fehlt das Schwarze am Hinterkopfe; der Rücken iſt ungefleckt, und die Seiten ſind nur ſehr ſparſam mit Roth bezeichnet.

Man ſieht ſie im Frühjahr in Penſylvanien auf ihrem Zuge nach Norden, wo ſie brüten und den Sommer zubringen. Ihr Futter beſteht in Inſekten, Spinnen u. d. gl.

117. Der himmelblaue Sänger. (Caerulean W.)

Motacilla caerulea. L. I. 2. p. 992. No. 46. *m*).
Le Figuier cendré de Pensylvanie. Briss. orn. Suppl. p. 107. No. 79.
Le Figuier gris de fer. Buff. ois. V. p. 309. *n*).
Little blue-grey Flycatcher. Edw. pl. 302. *o*)
Caerulean Warbler. Arct. Zool. II. No. 298. *p*).

Kleiner, als die Gartengrasmücke (Nr. 3). Der Schnabel ſchwarz; die Wurzel der untern Kinnlade röthlich; der Kopf und die obern Theile des Körpers blaugrau; die Augenlieder weiß; vom Schnabel nach dem Hinterkopfe geht ein ſchwarzer Streifen; die untern Theile ſind weiß; die Flügel aſchbraun; die Schwungfedern inwendig weißlich gerändert, aber auch die äußern Ränder und die Spitzen einiger von den innern ſind weißlich; der Schwanz iſt etwas lang, ſeine acht mittlern Federn aſchblau, und die äußerſte derſelben an der Spitze weiß, die zwey äußerſten zu beyden Seiten aber ganz weiß; die Füße ſchwarz.

Das Weibchen hat den ſchwarzen Streifen über den Augen nicht, und ſeine acht mittlern Schwanzfedern ſind aſchbraun; die übrigen Theile wie beym Männchen.

Sie

i) Latham Ind. orn. II. p. 540. n. 120. B.
k) Ueberſ. B. XVI. S. 140. B.
l) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 91. B.
m) Latham Ind. orn. II. p. 540. n. 121. B.
n) Ueberſ. XVI. S. 142. B.
o) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 92. B.
p) Ueberſ. II. S. 378. Nr. 216. B.

Sie sind in Pensylvanien zu Hause, wo sie zeitig im Frühjahr ankommen, und im Herbst wieder wegziehen. Ihr Nest ist von sonderbarer Struktur, und Edwards hat eine gute Abbildung davon gegeben. Es besteht aus einer zarten, dunenartigen Materie. Die Außenseite ist von Moos und Leberkraut, und inwendig ist es mit Pferdehaaren ausgelegt. Die Form desselben ist cylindrisch; es ist zwischen den Gabeln der Baumzweige angebracht, an der Spitze (top) offen.

117. Var. A. Motacilla caerulea. L. I. 2. p. 992. No. 43. β. *q*)
Le Figuier à tête noire de Cayenne. Pl. enlum 704 f. 1. *r*)

Dieser Vogel ist dem letztern sehr ähnlich, aber der ganze obere Theil des Kopfs über den Augen ist schwarz; die großen Schwungfedern sind ganz schwarz; eben so die sechs mittlern Schwanzfedern, die andern weiß.

Eine bloße Spielart des letztern, die aus Cayenne kommt.

118. Der goldfarbige Sänger. (Gold-winged W.)

Motacilla chrysoptera. L. I. 2. p. 971. No. 20. *s*)
Le Figuier cendré à gorge noir de Pensilvanie. Briss. orn. Suppl. p. 109 No. 80.
Le Figuier aux ailes dorées. Buff. ois. V. p. 34.
Golden-winged Flycatcher. Edw. pl. 297. *u*)
— — Warbler. Arct. Zool. II. No. 295. *v*)

Von der Größe des letztern. Der Schnabel ist schwarz; der Scheitel gelb; die Seite des Kopfs weiß; zwischen den Augen ist ein schwarzer Streifen; die obern Theile des Körpers sind dunkelaschfarben; Kehle und Vorderhals schwarz; die übrigen untern Theile weiß; an den Deckfedern der Flügel ein gelber Fleck; die äußern Schwanzfedern haben an den innern Fahnen einen weißen Fleck; die Füße sind schwarz.

Man trifft ihn im April in Pensylvanien an, wo er auf seinem Zuge nach Norden, um zu brüten, begriffen ist. Er kehrt im Herbst wieder nach Süden zurück.

119. Der orangenköpfige Sänger. (Orange-headed W.)

Motacilla chrysocephala. L. I. 2. p. 971. No. 107. *w*).
Le Figuier orangé. Buff. ois. V. p. 312. *x*)
— etranger. Pl. enlum 58. f. 3.

Der Schnabel ist schwarz; der Scheitel, der vordere Theil und die Seiten des Halses sind schön orangefarben; über den Augen ist ein braunes Band; unter demselben ist ein zweytes, aber

q) Latham l. c. β.
r) Uebers. a. a. O.
s) Latham Ind. orn. II. p. 541. n. 123. B.
t) Uebers. XVI. S. 145. B.
u) Seligmanns Vögel. VIII. Taf. 89. 1. B.
v) Uebers. II. S. 376. Nr. 212. B.
w) Latham Ind. orn. II. p. 541. n. 124. B.
x) Uebers. XVI. S. 150. B.

aber helleres; die obern Theile des Körpers und die Schwungfedern sind röthlichbraun; die Deckfedern der Flügel schwarz und weiß; Brust und Bauch hellgelb; der Schwanz schwarz, mit hellgelben Rändern; die Füße gelb.

Aus Guiana. Ich habe nur von diesem einzigen Exemplare gehört.

120. Der gehäubte Sänger. (Crested W.)

Motacilla cristata. L. I. 2. p. 972. No. 108. *y*)
Le Figuier huppé de Cayenne. Pl. enlum. 391. f. 1. — Buff. ois. V. p. 314. *z*)

Seine Länge ist vier Zoll. Der Schnabel ist dunkelbraun *a*); die obern Theile des Körpers sind bräunlichgrün; die untern grünlichgrau; die Federn auf dem ganzen Scheitel sind lang genug, um einen Federbusch zu bilden, der schwärzlichbraun und weiß gerändert ist, und nach Willkühr aufgerichtet werden kann; die Füße sind gelblichbraun.

Er befindet sich in Guiana, wo man ihn das ganze Jahr hindurch antreffen kann. Sein Aufenthalt sind offne Plätze, und seine Nahrung Insekten.

121. Der gelbrothe und schwarze Sänger. (Rufous et black W.)

Motacilla multicolor. L. I. 2. p. 972. No. 109. *b*)
Le Figuier noir. Buff. ois. V. p. 314. *c*)
— — et jaune de Cayenne. Pl. enlum. 491. f. 2.

Seine Länge ist fünf Zoll. Der Schnabel ist braun; der ganze Kopf, die Kehle und die obern Theile des Körpers nebst den Flügeln sind schwarz, die Spitzen der großen Deckfedern ausgenommen, die dunkel gelbroth sind, und ein Band an den Flügeln bilden; die Seiten des Halses und der Brust haben auch diese letzte Farbe; die Mitte der Brust aber, der Bauch und der After sind weiß; der Schwanz ist zur Hälfte dunkel gelbroth, die Endhälfte schwarz; die Füße braun.

Diesen Vogel hat man in Cayenne angetroffen; er ist aber selten.

122. Der hellgelbe Sänger. (Der Sänger vom Aequator. Equatorial W.)

Motacilla aequinoctialis. L. I. 2. p. 972. No. 110. *d*)
Le Figuier olive de Cayenne. Pl. enlum 685. f. 1. — Buff. ois. V. p. 315. *e*)

Etwas kleiner, als der letzte. Sein Schnabel ist schwarz; die obern Theile des Gefieders

y) Latham Ind. orn. II. p. 541. n. 125. B.
z) Uebers. B. XVI. S. 151. B.
a) Nach Büffon so wie die Füße gelbbraun. B.
b) Latham Ind. orn. II. p. 541. n. 126. B.
c) Uebers. XVI. S. 152. B.
d) Latham Ind. orn. II. p. 542. n. 127. B.
e) Uebers. XVI. S. 153. B.

ſind grünlichbraun *f*); die untern gelblichweiß; Kehle und Bruſt hellgelb; Schwungfedern und Schwanz ſchwärzlichbraun; die Füße braun.

Er iſt mit dem letztern in Cayenne zu Hauſe, wo man ihn zu jeder Jahrszeit antrifft.

123. Der Protonotar. (Prothonorary W.)

Mutacilla Protonotarius. L. I. 2. p. 972. No. 111. *g*)
Le Figuier Protonotaire. Buff. ois. Z. p. 316. *h*).
— — à ventre et tete jaunes. Pl. enlum. 704. f. 2.
Prothonotary Warbler. Arct. Zool.

Von der Größe des letzten. Sein Schnabel aber iſt länger, und der Schwanz kürzer; jener dunkelfarbig; Kopf, Hals, Bruſt und Bauch ſchön jonquillengelb; der Rücken eben ſo, mit einem olivenfarbnen Anſtrich; der Steiß aſchfarben; der After weiß; Schwungfedern und Schwanz ſchwärzlich und aſchfarben *i*); die Füße ſchwarz.

Er iſt in Louiſiana zu Hauſe, wo er den Namen Protonotarius erhalten hat.

124. Der Sänger mit dem halben Halsbande. (Half-collar W.)

Motacilla semitorquata. L. I. 2. p. 972. No. 112. *k*)
Le Figuier à demi-collier. Buff. ois. V. p. 316. *l*)
Half-collar Warbler. Arct. Zool. II. No. 311. *m*)

Seine Länge iſt fünfthalb Zoll. Der Schnabel iſt oben ſchwärzlich, und unten weißlich; der Scheitel gelblicholivenfarben; hinter den Augen iſt ein aſchgrauer Streifen; die Deckfedern der Flügel ſind braun, mit gelber Einfaſſung; die großen Schwungfedern braun, mit weißlicher Einfaſſung, die kürzern eben ſo, aber mit olivenfarbner Einfaſſung und weißen Spitzen; die untern Theile des Körpers hellaſchfarben, am Bauch ins Gelbe ſpielend; um den untern Theil des Halſes geht ein gelblicher Streifen, oder vielmehr ein halber Halskragen; die Schwanzfedern ſind an den Enden zugeſpitzt und aſchfarben, die zwey mittlern einfärbig, die vier andern zu beyden Seiten *n*) inwendig weiß; die Füße ſchwärzlich.

Er iſt in Louiſiana zu Hauſe.

125. Der

f) Olivengrün, auf einem blauen Grunde. B.
g) Latham Ind. orn. II. p. 542. n. 125. B.
h) Ueberſ. XVI. S. 154. B.
i) So ſagt Büffon. In den Pl. enlum ſcheinen die Schwanzfedern weiß zu ſeyn mit ſchmutzigen Rändern.
k) Latham Ind. orn. II. p. 542. n. 129. B.
l) Ueberſ. XVI. S. 156. B.
m) Ueberſ. II. S. 382. Nr. 228. B.
n) Das macht nur zehn in Allen. Büffon ſagt: „toutes sont pointues par le bout“ — Ich kenne keinen Vogel dieſer Gattung, der ihrer weniger, als zwölfe hätte. — (Ich rechne ſo: die zwey mittlern auf jeder Seite (4) und die 4 Seitenfedern auf jeder Seite (8); dieß macht 12. So hat es wohl Büffon gemeynt; der es mit dem Syſtem und der Terminologie nicht ſo genau nimmt. B.

125. Der orangenbäuchige Sänger. (Orange-bellied W.)

Motacilla fulva. L. I. 2. p. 973. No. 113. *o*)
Le Figuier à gorge jaune. Buff. ois. V. p. 317. *p*)
Orange-bellied Warbler. Arct. Zool. II. n. 312. *q*)

Der Schnabel iſt braun, unten am hellſten; der Kopf und die obern Theile ſind olivenbraun; die untern, bis zur Bruſt gelb, letztere ſpielt ins Braune; die übrigen untern Theile gelbroth, vom After ins Gelbe ſpielend; die untern Deckfedern der Flügel gelb, braun gemiſcht; die Schwungfedern braun, die kürzern mit olivenfarbnen, die größern mit hellgrauen Rändern, und dieſe Farbe wird immer heller, je weiter die Federn auswärts ſtehn, ſo daß die äußerſte ganz weiß iſt; die Schwanzfedern braun; mit olivenfarbnen Rändern; die Füße gelblichbraun.

Auch aus Louiſiana.

126. Der olivenbraune Sänger. (Olive-brown W.)

Motacilla fusca. L. I. 2. p. 973. No. 114. *r*)
Le Figuier brun-olive. Buff. ois. V. p. 318. *s*)
Olive-brown Warbler. Arct. Zool. II. No. 313. *t*)

Der Schnabel iſt wie bey dem vorigen; die obern Theile des Gefieders ſind olivenbraun; Kehle, Vorderhals und Seiten weißlich, mit Grau gemiſcht; der Bauch gelblichweiß; die untern Deckfedern des Schwanzes gelb; die Flügel braun; die Deckfedern und die kürzern Schwungfedern mit hellerm Braun eingefaßt; der Schwanz braun, mit Grau eingefaßt, ſeine zwey mittlern Federn mit einem gelben Anſtrich, die zwey äußern inwendig, an den Spitzen ſchwarz gefleckt, ſind die äußerſte von allen weiß eingefaßt; die Füße braun.

Ebenfalls in Louiſiana.

127. Der fette Sänger. (Grasset W.)

Motacilla pinguis. L. I. 2. p. 973. No. 115. *u*)
Le Figuier Grasset. Buff. ois. V. p. 319.
Grasset Warbler. Arct. Zool.

Ihr Schnabel iſt ſchwarz; die obern Theile des Körpers ſind grünlicholivenfarben; am Kopf iſt ein gelber Fleck; am Körper ſind einige ſchwarze Streifen; der Steiß iſt gelb; Kehle und Vorderhals hell gelbroth, mit einer Miſchung von Aſchfarbnem; die übrigen untern Theile weißlich; die großen Schwungfedern braun, außen mit grauen, und inwendig mit weißlichen Rändern; die kürzern ſchwärzlich, mit grauen Rändern und Spitzen; der Schwanz ſchwarz,

o) Latham Ind. orn. II. p. 542. n. 130. B.
p) Ueberſ. XVI. S. 158.
q) Ueberſ. II. S. 383. Nr. 229. B.
r) Latham Ind. orn. II. p. 543. n. 131. B.
s) Ueberſ. XVI. S. 159. B.
t) Ueberſ. II. S. 303. Nr. 230. B.
u) Latham Ind. orn. II. p. 543. n. 132. B.

mit grauen Rändern; seine vier äußern Federn haben einen weißen Fleck an den innern Fahnen, unweit der Spitze; die Füße sind schwarz.

Er ist in Louisiana zu Hause.

128. Der graukehlige Sänger. (Grey-throated W.)

Motacilla cana. L. I. 2. p. 973. No. 116. *v*)
Le Figuier cendré à gorge cendrée. Buff. ois. V. p. 319. *w*)
Grey-throated Warbler. Arct. Zool. II. No. 313. *x*)

Sein Schnabel ist schwarz, unten grau; die Hauptfarbe des Gefieders ist aschgrau, der Kopf und die obern Theile aber sind viel dunkler, als die übrigen; die Schwungfedern haben weißliche Ränder; der Schwanz ist schwarz, seine äußere Feder fast ganz weiß, die nächste an der Endhälfte eben so, die dritte hat bloß eine weiße Spitze.

Die beyden letzten Vögel werden in Louisiana Grasset genannt, in Rücksicht ihrer außerordentlichen Fettigkeit. Sie halten sich auf den Tulpenbäumen und Magnolien auf, besonders der letzte.

129. Der Hangnest-Sänger. (Hang-nest W.)

Motacilla calidris. L. I. 2. p. 950. No. 2. *y*)
Le grand Figuier de la Jamaique. Briss. orn. Suppl. p. 101. — Buff. ois. V. p. 320. *z*)
Watchy Picket, Spanish Nightingale, or American Hang-nest. Sloan. Jam. II. p. 299? — Ray Syn. p. 184. No. 27?
American Nighthingale. Edw. pl. 121. f. 2. *a*)

Er hat die Größe des Rothkehlchens. Sein Schnabel ist stark und schwärzlich, die untere Kinnlade fleischfarben; die obern Theile des Vogels sind grünlichbraun, am hellsten am Steiß und den Enden einiger Schwanzfedern, die alle, die zwey mittlern ausgenommen, inwendig gelbroth sind; die Seiten des Kopfs und die untern Theile des Körpers sind schmutzig orangefarben; durch die Augen geht eine dunkelbraune Linie, und eine andere unter den Augen weg, die abwärts gekehrt ist; die Deckfedern der Flügel haben gelbliche Ränder, und die meisten Schwungfedern sind an den innern Fahnen gelbroth; die Füße schwärzlich.

Er ist in Jamaika zu Hause.

Edwards ist geneigt, diesen Vogel für Sloane's Watchy picket, der oben angeführt worden, zu halten. Ist dieß, so baut er ein sonderbares hängendes Nest, das größtentheils aus Altmannsbart (Old manns beard) verfertigt ist *b*).

130. Der

v) Latham Ind. orn. II. p. 543. n. 133. B.
w) Uebers. XVI. S. 162. Nr. 8. B.
x) Uebers. II. S. 383. Nr. 232. B.
y) Latham Ind. orn. II. p. 543. n. 155. B.
z) Uebers. XVI. S. 163. B.
a) Seligmanns Vögel V. Taf. 16. fig. 1. B.
b) S. den Hangnest, Pirol. I. B. 2. Th. S. 360. No. 23.

130. Der weißkinnige Sänger. (White-chinned W.)

Motacilla bonariensis. L. I. 2. p. 951. No. 52. *c*)
Le Demi-fin noir et roux. Buff. ois. V. p. 328, *d*)

Er iſt von der Größe des Hänflings, fünf und drey Viertel Zoll lang. Der Schnabel iſt ſchwärzlich, und ziemlich dünn (slender); der Augenſtern kaſtanienbraun; die obern Theile des Kopfs und des Körpers, die Flügel und der Schwanz tief ſchwarz; die Kehle, der Vorderhals und die Seiten des Körpers roſtigroth; die Stelle zwiſchen dem Schnabel und den Augen weiß; das Kinn, die Mitte des Bauchs und die äußern Schwanzfedern auch weiß; die hintere Klaue groß.

Er iſt auf Buenos Ayres zu Hauſe.

131. Der Palmen-Sänger. (Palm W.)

Motacilla palmarum. L. I. 2. p. 951. No. 53. *e*)
Le Bimbelé, ou la fausse Linotte. Buff. ois. V. 330. *f*)

Seine Länge iſt fünf Zoll. Der Schnabel iſt ſcharf geſpitzt; der Augenſtern hellbraun; das Gefieder an den obern Theilen braun, am dunkelſten am Kopf; der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes olivengrün; Flügel und Schwanz braun, mit hellern Rändern; ſeine zwey äußern Federn haben ein weißes Band an den innern Fahnen, nahe an der Spitze; die untern Theile des Körpers ſind bis an den Bauch ſchmutzig gelblichweiß, und von hier an hellgelb.

Er hält ſich in St. Domingo auf. Er lebt ſowohl von Inſekten, als von Früchten, und man trifft ihn immer in der Nähe der Palmbäume an, auf welche er auch niſtet. Er legt zwey bis drey Eyer. Sein Geſang beſteht nur aus vier oder fünf Tönen, ohne alle Abwechſelung und Stärke (striking), aber doch nicht unangenehm, ſondern ſanft und leiſe. Die Neger nennen ihn Bimbele.

132. Der Piſang-Sänger. (Banana W.)

Motacilla bananivora. L. I. 2. p. 951. No. 54. *g*)
Le Bananiste. Buff. ois. V. p. 232. *h*)

Er iſt drey und drey Viertel Zoll lang. Sein Schnabel iſt ſchwarz, ſpitzig, von mittlerer Größe, und ein wenig gebogen; die obern Theile des Vogels ſind dunkelgrau, faſt ſchwarz; an den Deckfedern der Flügel und am Schwanz ins Braune fallend; letzterer hat eine weiße Spitze, und erſterer einen weißen Flecken; die Schultern ſind gelb; gerade über den Augen iſt ein weißer Streifen, und ein ſchwarzer läuft von der Wurzel des Schnabels bis zum Hinterkopf hin; die Kehle iſt graulichaſchfarben; Bruſt, Bauch und Steiß ſind hellgelb und grau gemiſcht; die Füße ſchieferfarben.

Er

c) Latham Ind. orn. II. p. 543. n. 135. B.
d) Ueberſ. XVI. S. 174. B.
e) Latham Ind. orn. II. p. 544. n. 136. B.
f) Ueberſ. XVI. S. 176.
g) Latham Ind. orn. II. p. 554. n. 137. B.
h) Ueberſ. XVI. S. 179. B.

Er iſt auf St. Domingo zu Hauſe. Sein Neſt macht er auf die Weiden, die ſich um die Bäume herumwinden (on the withs which entwine among the trees), und läßt ſich oft bey den Piſangbäumen ſehen, von denen er ſich vermuthlich nährt, ſo wie von Pomeranzen, Feigen (Papaws), und andern Früchten; doch ſoll er auch Saamen und Inſekten freſſen. Man findet ihn oft unter dem Gebüſche auf ungepflügten (untiled) Boden; er fliegt ſtoßweiſe (byjecks), aber geſchwind, und läßt zugleich einen kleinen Laut hören. Sein Geſang iſt wenig abwechſelnd und nicht bewerkenswerth. In ſeinem Vaterlande kennt man ihn unter dem Namen: Bananiſt.

133. Der Wurmfreſſer. (Wurm-eater)

Mntacilla vermicora. L. l. 2. p. 951. No. 65. k)
Le Figuier de Pensilvanie. Briss. oru. VI. Suppl. p. 102. No. 76.
Le Demi-fin mangans de vers. Buff. ois. V. p. 325. l)
Worm-eater. Edw. pl. 305 m) — Arct. Zool. II. No. 300. n)

Er hat die Größe der Braunelle. Sein Schnabel iſt dunkelbraun, unten fleiſchfarbig; von den Mundwinkeln zwiſchen den Augen hindurch geht eine ſchmale, ſchwarze Linie; gerade über jedem Auge iſt eine gelbliche; und über dieſer ein ſchwarzer Bogen; das Uebrige des Kopfs, die Kehle und die Bruſt ſind röthlichgelb, das gegen den Schwanz hin nach und nach weiß wird; die ganze obere Seite (upper ſide), die Flügel und der Schwanz ſind dunkelolivengrün; die innern Deckfedern der Flügel und der Schwanz von unten aſchfarben; die Füße fleiſchfarben.

Dieſer Vogel iſt in Penſylvanien zu Hauſe, wo er ein Zugvogel iſt, der im Julius ankommt, und nach Norden zieht. Auf ſeiner Rückkehr im Herbſt ſpricht er aber nicht ein.

134. Der einfarbige Sänger. (Simple W.)

Motacilla campestris. L. l. 2. p. 953. No. 5. o)
Fauvette de Haye de la Jamaique. Briss. orn. Suppl. p. 100.
L'Habit-uni. Buff. ois. V. p. 336. p)
American Hedge Sparrow. Edw. pl. 122. f. 1.

Von der Größe der Braunelle. Sein Schnabel aber iſt ſtärker, und ſchwarz. Kopf und Hals ſind grünlichaſchfarben; die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz gelbrothbraun; die untern Theile bräunlichweiß; die Füße braun.

Aus Jamaika.

135. Die großſchwänzige Grasmücke. (Great-tailed W.)

Motacilla macroura. L. l. 2. p. 955. No. 59. r)
La petite Fauvette tachetée du Cap de bonne Esperance. Buff. ois. V. p. 161. — Pl. enlum. 752. f. 2.

i) Carica Papaya Linné. B.
k) Latham Ind. orn. II. p. 544. n. 138. B.
l) Ueberſ. XVI. S. 169. B.
m) Seligmanns Vögel. VIII. Taf. 91. f. 1. B.
n) Ueberſ. II. S. 378. Nr. 217. B.
o) Latham Ind. orn. II. p. 544. n. 139. B.
p) Ueberſ. XVI. B. 185.
q) Seligmanns Vögel V. Taf. 17. fig. 2. B.
r) Latham Ind. orn. II. p. 545. n. 140. B.

Klei-

Der prächtige Sänger.

Kleiner, als die geſchwätzige Grasmücke, und ſechs Zoll lang. Ihr Schnabel iſt braun; alle obern Theile des Körpers braun, die untern gelblichweiß, mit ſchwärzlichen Streifen an der Bruſt und an den Seiten, und einigen kleinen an der Kehle und am Kinn; von den Naſenlöchern geht eine weiße Linie über die Augen weg; der Schwanz iſt keilförmig, und beträgt über die Hälfte der Länge des Vogels; die Füße ſind röthlich.

Vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

136 Der langſchwänzige Sänger. (Long-tailed W.)

Motacilla longicauda. L. I. 2. p. 954. No. 60. *t*)
Le petit Figuier à longue queue de la Chine. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 206.

Der Scheitel iſt hellgelbroth; der Hinterhals, der Rücken, der Steiß, die Deckfedern der Flügel und der Schwanz hell olivengrün; die Schwungfedern olivenbraun; der Schwanz lang und dünne, (slender), und beſteht aus ſehr ſchmalen Federn, die zwey mittlern ſind ſo lang, als der Körper.

Er iſt in China zu Hauſe, hält ſich häufig in den Bäumen auf, mit denen die Chineſer die Höfe um ihre Häuſer herum zu zieren pflegen, und iſt ſehr zahm. Er hat eine angenehme Stimme.

137. Der prächtige Sänger. (Superb W.)

(ſ. die fünf und funfzigſten Kupfertafel.)

Motacilla cyanea. L. I. 2. p. 991. No. 165. *u*)
— — — Ellis's Narrat. p. 22. *v*)
Lev. Mus.

Die Länge dieſer ſchönen Art iſt ſechsthalb Zoll. Der Schnabel iſt ſchwarz; die Federn auf dem Kopfe ſind lang, und ſtehn aufgerichtet, wie ein vollkommener Federbuſch; von der Stirn bis zum Scheitel ſind ſie lebhaft blau; von hier an bis zum Nacken ſchwarz, gleich Sammet; vom Schnabel zwiſchen den Augen hindurch läuft ein ſchwarzes Band; unter den Augen entſteht ein Büſchel von den nämlichen blauen Federn; unter dieſem, und am Kinn iſt die Farbe dunkelblau, faſt ſchwarz, und fühlt ſich wie Sammet an; an den Ohren iſt ein anderer blauer Fleck, und über den Hinterkopf läuft ein Band von der nämlichen Farbe *w*); dieß alles zuſammen giebt den Kopf ein größeres Anſehen, als er von Natur hat; der Hinterhals und die obern Thei-

s) Ueberſ. XV. S. 149. B.
t) Latham Ind. orn. II. p. 545. n. 141. B.
u) Latham Ind. orn. II. p. 545. n. 142. B.
v) Phillip Bot. Bay. t. p. 157 p. 159. (das Männchen und das Weibchen.) White Voy. t. p. 256. Meyers Zoologiſche Entdeckungen. S. 54. Nr. 2. B.
w) Bey einigen Exemplaren laufen die blauen Flecken unter den Augen und am Ohr in einander, und vereinigen ſich mit dem Band am Nacken, wie auf der beygefügte Kupfertafel.

Theile des Körpers nebſt dem Schwanze ſind dunkelblauſchwarz, die untern rein weiß; die Flügel dunkelfarbig, die Schäfte der Schwungfedern kaſtanienbraun; der Schwanz zwey und ein Viertel Zoll lang, und keilförmig, ſeine zwey äußern Federn ſehr kurz; die Füße dunkelbraun; die Klauen ſchwarz.

Er iſt in Van Diemen's Land, dem ſüdlichſten Theile von Neuholland zu Hauſe.

In Sire Joſ. Banks Sammlung ſind einige Vögel dieſer Art, von denen einer von obigen abweicht; die Schäfte der Schwungfedern ſind ſchwärzlich; die untern Theile des Körpers dunkelfarbig; und ſtatt der blauen Queerlinie am Hinterkopf, hat er einen breiten, dreyeckigen Flecken, von eben dieſer Farbe, mit abwärts gekehrter Spitze. Dieſer Unterſchied hat ſeinen Urſprung ohne Zweifel im Geſchlecht *).

137. Var. A. Motacilla cyanea. L. I. 2. p. 991. No. 165. β. γ)
Gobe-mouche à tête bleue de l'Isle de Luçon. Sonn. Voy. p. 58. pl. 27. f. 1.

Dieſer Vogel hat Größe und Wuchs der Schwanzmeiſe z). Der Schnabel iſt ſchwärzlich; der Augenſtern hellroth; Kopf, Kehle und Hinterhals dunkelblau; Hals, Rücken, Bruſt und Bauch ſchiefergrau; die Deckfedern der Flügel ſind braun und haben das Anſehen eines breiten Flecken; Schwungfedern und Schwanz ſchwarz, die zwey mittlern Schwanzfedern um die Hälfte länger, als die andern; die Füße ſchwärzlich a).

Er iſt auf der Inſel Manilla zu Hauſe.

138. Der

*) Dieß iſt nach den Ind. orn. l. c. des Weibchen. B

γ) Latham l. c. β. B.

z) Long-tailed Titmouse. ſ. die 43ſte Gatt. No. 18. Parus caudatus L. Ueberſ.

a) White erwähnt zweyer Varietäten dieſes Vogels, einer größern und eine kleinern. Die größere Varietät iſt um den Kopf herum ziemlich blau, doch nicht ſo blau als die kleinere, außerdem hat ſie, auf jeder Seite des Rückens, einen glänzend blauen Fleck, und in der Gegend der Schultern ein röthlich braunes, oder orangenfarbnes Zeichen.

Die kleinere Varietät iſt immer blauer um den Kopf als die große. Schnabel und Beine ſind verhältnißmäßig dünner und dunkler gefärbt, auch ſind letztere immer ſchwarz. Auf dem Kopf iſt ein kleiner Azurfarbner Buſch; Wangen und Obertheile des Rückens ſind eben ſo gefärbt, auch die Flügel; die untern Theile des Rückens und der Flügel aber ſind braun. Die äußern Flügelfedern ſind weißlicht, nahe an den Schultern braun gezeichnet. Kopf, Nacken und Bruſt ſind dunkelſchwarz; der Unterleib weiß, hin und wieder etwas trübeweiß. Der Schwanz iſt ſchwarz, keilförmig, und ſteht in die Höhe. Das Blau dieſer Varietät iſt ſehr glänzend, doch fehlt ihr durchaus das licht veilchenfarbne Schulterband, was die größere Varietät hat. Beine, Füße und Klauen ſind ſchwarz und ausnehmend zart.

Phillip macht folgende Bemerkungen. Faſt alle Individua dieſer Art unterſcheiden ſich durch die Vertheilung der blauen Farben an ihrem Körper. Bey einer Varietät iſt der ganze Kopf in Blau eingehüllt, was ſich in eine irreguläre Wellenlinie endigt, und unter den Augen fortſatzartig als ein breites Band wegläuft, deſſen Konten gleichfalls wellenförmig ſind; endlich wird dieß Band an jeder Seite, am Ende des Nackens, wo es abbricht, zu einem kleinen Punkt. Aber dieſes Band iſt,

bey

138. Der Cayenniſche Sänger. (Cayenne W.)

Motacilla cayana. L. l. 2. p. 990. No. 40. *b*)
Le Pipit bleu de Cayenne. Briss. orn III. p. 534 No. 72. pl. 27. f. 1. — Buff. ois. V. p. 359. *c*) — Pl. enlum. 669. f. 2.

Seine Länge iſt vier und drey Viertel Zoll. Der Schnabel ſchwärzlich; die Stirn und die Seiten des Kopfs, der vordere Theil des Rückens, die Flügel und der Schwanz ſind alle ſchön ſchwarz; das übrige Gefieder blau; die Füße grau.

138. Var. A. Motacilla cayana. L. l. 2. p. 990. No. 40. . *d*)
Blue Manakin. Edw. pl. 263. *e*)
Br. Mus.

Dieſer Vogel unterſcheidet ſich dadurch, daß er blos eine ſchwarze Kehle hat; der Kopf iſt ganz blau; Flügel, Schwanz und Körper, wie bey dem erſten.

138. Var. B. Motacilla cayana. L. l. 2. p. 990. No. 40. γ. *f*)
Le Pitpit bleu de Cayenne. Pl. enlum. 669. f. 1. *g*)
Br. Mus.

Dieſe Spielart kommt an Körper, Flügeln und Schwanz vollkommen mit den andern überein; ihr Kopf aber iſt von einfacher, blauer Farbe.

Sie werden alle in Guiana angetroffen. Briſſon vermuthet, ſein Vogel ſey der Elolotol *h*) des Fernandez.

139. Der blauköpfige Sänger. (Blue-headed W.)

Motacilla cyanocephala. L. l. 2. p. 990. No. 163. *i*)
Le Pitpit verd. Briss. orn. III. p. 531. No. 70. pl. 28. f. 4. = Buff. ois. V. p. 338. *k*)

Er hat die Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3.), und iſt vier und drey Viertel Zoll lang. Sein Schnabel iſt braun; der Kopf und die obern Deckfedern der Flügel ſind blau; die Kehle

bey Herrn Lathams Varietät weit dunkler, und läuft rund um den Nacken herum. Einige ſehr glänzende orangefarbne Federn liegen unmittelbar unter dieſem Blauen über den Flügeln.

Beym Weibchen ſcheint der azurfarbne Ring um die Augen, faſt blos auf der Haut des Vogels herzugehn, alles obere Gefieder deſſelben iſt braun, Kehle und Bauch weiß. Nur Größe und Form laſſen vermuthen, daß dieſes ungeſchmückte Thier das Weibchen eines ſo ſchönen Männchens iſt. B.

b) Latham Ind. orn. II. p. 545. n. 143. B.
c) Ueberſ. XVI. S. 191. Nr. 2. B.
d) Latham l. c. B.
e) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 53. fig. 2. B.
f) Latham l. c. γ.
g) Ueberſ. a. a. O.
h) Von dieſem wird bloß geſagt, er habe die Größe eines gemeinen Finken, ſey von weißer oder blauer Farbe und ſein Schwanz ganz ſchwarz. Raii Syn. p. 170. No. 4.
i) Latham Ind. orn. II p. 546. n. 144. B.
k) Ueberſ. XVI. S. 189. Nr. 1. B.

se bläulichgrau; der übrige Körper, nebst den größern Deckfedern lebhaft grün; die Schwungfedern braun, mit grünen Rändern; die Füße grau.

Er ist in Cayenne zu Hause.

140. Der blaugestreifte Sänger. (Blue-striped W.)

Motacilla lineata. L. I. 2. p. 995. No. 164. *l*)
Le Pitpit à coiffe bleue. Buff. ois. III. p. 344. *m*).

Der Schnabel ist schwarz; auf dem Scheitel ist ein blauer Längsfleck; die Stirn ist lebhaft dunkelblau und dieß zieht sich über die Augen weg bis zur Mitte des Rückens hin; an der Brust entsteht ein weißer Streifen, der bis zum After reicht, und breiter wird, so wie er nach hinten zu kommt; die übrigen untern Theile sind blau; die Füße schwarz.

Er findet sich nebst der letzten in Cayenne.

141. Der rothbäuchige Sänger. (Red-bellied W.)

Motacilla Velia. L. I. 2. p. 991. No. 41. *n*)
Le Pipit bleu de Surinam. Buss. orn. III. p. 533 No. 73. — Pl. enlum 669. f. 3.
Le Pitpit varié. Buff. ois. V. p. 341. *o*)
Rouge-gorge. Fermin's Descr. Surin. Vol. II. p. 194?
Red-bellied blue Bird. Edw. pl. 22. *p*)
— — — Bancr Guian p. 182? *q*)

Von der Größe der Gartengrasmücke (Nr. 3). Sein Schnabel ist bleyfarben, unten weißlich; die Stirn bläulichgrün; der Steiß goldgrün; die obern Theile des Kopfs, Halses und Rückens sind schön schwarz, mit Blaugrün untermischt; die Kehle violet; der Vorderhals eben so, mit Braun untermischt; die übrigen untern Theile gelbroth; die größern Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern und der Schwanz schwarz, mit blauen Rändern; die Füße aschgrau.

Ich sollte fast glauben, dieser Vogel variire, wie die letzte Art. Nach Brisson's Beschreibung sind Stirn und Steiß beyde goldfarbig; die untern Theile hellblau; der unterste Theil des Bauchs kastanienbraun.

Der bey Bancroft soll blau seyn, der Bauch und die hintern Theile ausgenommen, die röthlich sind. Dieß stimmt auch mit Edward's Beschreibung überein.

Fermin's Vogel hat einen mattbraunen ins Schwarze spielenden Rücken; Brust und Bauch sind scharlachroth, am hellsten beym Weibchen. Ob diese Vögel dem Alter oder Geschlecht nach verschieden, oder ob sie wirklich nur ein und eben derselbe Vogel sind, erhellt nicht deutlich; da die Be-

l) Latham Ind. orn. II p. 546. n. 145. B.
m) Uebers. XVI S. 197. B.
n) Latham Ind. orn. II. p. 546. n. 146. B.
o) Uebers. XVI S. 195. Nr. 3. B.
p) Seligmanns Vögel I. S. Taf. 43. B.
q) Uebers. Bankrofts Guiana S. 110. B.

Beſchreibungen der zwey letzten allzu kurz ſind, als daß man mit Gewißheit hierüber etwas beſtimmen könnte.

Man ſagt, dieſe Art ſey ſo wohlſchmeckend, als der **Ortolan.**

Man findet ſie auf **Surinam, Guiana** und **Cayenne.**

142. Der Guira-Sänger. (Gnira W.)

Motacilla Guira. L. I. 2. p. 988. No. 36. *qq*)
Le Pitpit verd du Bresil. Briss. orn. III. p. 533. No. 71.
Guira-beraba. Buff. ois. p. 342. *r*)
Guira guackberaba. Ray. Syn. p. 83. No. 100. — Will. orn. p. 239. pl. 41. Edw. pl. 351. f. 2, *s*)

Er hat die Größe eines Stieglitzes. Sein Schnabel iſt dunkelfarbig, unten fleiſchfarben; die Farbe um die Wurzel deſſelben herum ſchwarz, und dieß erſtreckt ſich auch um die Augen herum, nach den Ohren und nach der Kehle hin; über die Augen läuft eine gelbe Linie, die zu beyden Seiten des Halſes herabgeht; die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz ſind olivengrün; die untern Theile, von der Kehle bis zur Bruſt, ſchön orangefarben; von hier an bis zum After gelb, in welche Farbe ſie ſtufenweiſe übergeht; die obern Deckfedern des Schwanzes von letzter Farbe, der Steiß aber ſchön orangefarben; die Spitzen der Schwungfedern braun; die Füße eben ſo.

Er iſt in **Braſilien** zu Hauſe *t*).

143. Der Zaunkönig. (Wren.)

Motacilla Troglodytes. L. I. 2. p. 993. No. 46. *u*) — Faun. Suec. No. 261. — Scop. ann. I. No. 239. *v*). — Kram. elench. p. 378. No. 20. — Brünn. orn. p. 82. No. 184. — Müller Zool. p. 33. No. 279. — Geolgi Reiſe p. 175. — Frisch tab. 24. — Olina uccell. pl. in p. 6.
Le Roitelet. Briss. orn. III. p. 425. No. 24.
— — Pl. enlum. 751. No. 2.
Le Troglodyte. Buff. ois. V. p. 352. pl. 1. *w*)

qq) Sylvia Guira. Latham Ind. orn. II. p. 547. n. 147. et Tanagra nigri collis Gm. ſil. Lyp. 1. p. 894. B.

r) Ueberſ. XVI. S. 198. Nr. 5. Tangara à gorge noir. Buff. IV. p. 283. — Pl. enl. 720. f. 1. Ueberſ. XII. S. 93. B.

s) Seligmanns Vögel IX. Taf. 41. Vergl. auch Arct. Zool. II. n. 316. Ueberſ. II. S. 384. Nr. 233. Latham giebt in Ind. orn. hiervey die Synonymen von der oben B. II. Theil I. S. 233. Nr. 33. beſchriebnen ſchwarzkehligen Merle an, und bey genauer Vergleichung findet ſich dann auch, daß beydes ein und eben derſelbe Vogel iſt. Die ſchwarzkehlige Merle fiel alſo weg. B.

t) Und nach obigen (ſ. ſchwarzkehlige Merle) alſo auch in Guiana. B.

u) Latham Ind. orn. II. p. 547. n. 148. B.

v) Ueberſ. S. 196. Nr. 239. B.

w) Ueberſ. XVI. S. 215. B.

The Wren. Ray Syn. p. 80. A. 11. — Will. orn. p. 229. pl. 42. — Albin. I. pl. 53. B. — Br. Zool. I. No. 154. x). — Arct. Zool. II. No. 322. y) Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß ist eine sehr kleine Art, die nur drey und drey Viertel Zoll in die Länge hält, obschon ich einige gesehen habe, die vier Zoll maßen. Der Schnabel ist sehr dünn und dunkelbraun; der Augenstern nußbraun; Kopf, Hals und Rücken röthlichbraun; letzter, so wie die Deckfedern der Flügel und des Schwanzes mit unscheinlichen, schwärzlichen Linien durchzogen; die Wangen schmutzigweiß, mit Gelbroth gemischt; über jedem Auge ein blasser, röthlichweißer Streifen; die untern Theile bis zur Brust, von letzter Farbe; das Uebrige mehr ins Braune spielend, und mit braunen Linien durchzogen; die Schwungfedern abwechselnd, röthlich und schwarz gestreift; die Füße hellbraun z).

Das Nest ist von sonderbarem Bau, beynahe eyförmig, und nur mit einem kleinen Eingang versehen; es besteht hauptsächlich aus Moos, das gut mit Federn ausgelegt ist. Hierin legt das Weibchen zehn bis funfzehn, auch achtzehn Eyer, die fast weiß sind, mit röthlichen Fleckchen am breiten Ende. Sie nisten zweymal des Jahrs, im April und im Junius. Man findet das Nest oft in dem Winkel eines Nebengebäudes (outhouse), in einem Holzhaufen (stack of wood), Mauerloche, oder dergl. wenn es nämlich nahe an den Wohnungen angebracht ist; im Walde hingegen oft in einem Gebüsche nahe am Boden, in einem Baumstrunk, oder auch auf dem Boden selbst.

Dieser kleine Vogel findet sich durch ganz Europa vor. In England trotzt er unsern strengsten Wintern. In kältern Gegenden ist er weniger gemein. Gegen Norden trifft man ihn sowohl in Schweden, als in Rußland an, und unsre letzten Weltumsegler haben ihn auch auf Analaschka gesehen. Sein weitester Wohnort gegen Süden ist Aleppo a), in Asien.

Sein Gesang wird sehr geschätzt, denn er ist, obschon ein kurzes, doch ein angenehmes Zwitschern, und viel lauter, als man es von der Größe dieses Vogels erwarten sollte; er es das ganze Jahr hindurch wiederholt. Ich habe diesen kleinen Vogel während des Schneyens unbekümmert singen gesehen, er singt auch sehr spät des Abends, obschon nicht nach der Dämmerung, wie die Nachtigall. Seinen Schwanz trägt er gewöhnlich aufrecht.

143. Var.

x) Uebers. S. 114. B.

y) Uebers. II. S. 389. Nr. 239. Vergl. auch Zorns Pethinoth. I. S. 322. II. 154. 393. 704. Meine N. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 546. Nr. 26. N. G. der Stubenvögel Nr. 109. B.

z) Pennant sagt in der Amerikanischen Zoologie, daß der Amerikanische Zaunkönig, den er eben so wie den Europäischen beschreibt, noch einmal so groß sey als dieser, und eine Ausnahme von der Bemerkung mache, daß Thiere von einerley Art in der neuen Welt kleiner als in der Alten wären. Dieser erscheint in der Provinz Neuyork im May, brütet im Junius, baut sein Nest in Baumhöhlen aus Wurzelfasern und Reisern, füttert es mit Haaren und Federn aus, und legt 7 bis 9 weiße, verlohren rothgefleckte Eyer. Seine Manieren sind denen des Europäischen ähnlich, sein Gesang aber verschieden. Er zieht im August gegen Süden. — Vielleicht ist dieß die Varietät β. unsers Verfassers. B.

a) Russel Alepp. p. 71.

143. Var. A. Motacilla Troglodytes. L. I. 2. p. 993. No. 27. β. *b*)
Le Roitelet de Buenos-Ayres. Buff. ois. V. p. 361. *c*) — Pl. enlum. 830. f. 2.

Dieser scheint einerley Größe mit dem gemeinen zu haben, sein Schwanz aber ist etwas länger; die Farben sind abstechender, als bey unserm Vogel, und die untern Theile heller; auch fehlt ihm der Streifen über den Augen. Ich nehme dieß alles aus der Betrachtung der Pl. enlum. ab, denn den Vogel selbst habe ich nicht gesehen.

Er findet sich in der Nachbarschaft des Plata-Stroms in Südamerika *d*).

143. Var. B. Motacilla Troglodytes. L. I. 2. p. 993. No. 46. γ. *f*)
Le Troglodyte pe la Louisiane. Buff. ois. V. p. 361. *g*)
Le Roitelet de la Louisiane. Pl. enlum. 730. f. 1.
Br. Mus. Lev. Mus.

Dieser ist viel größer, als die andern, und fünf Zoll lang. Sein Schnabel ist dunkelfarbig; die obern Theile sind röthlichbraun, mit schwärzlichen Streifen durchzogen, wie beym gemeinen Zaunkönig; über den Augen ist ein blasser Streifen, der eine gute Strecke an die Seite des Halses hinreicht; die Wangen sind dunkelfarbig und weißlich gesprenkelt; die untern Theile hell rothgelb (rufous yellow), am hellsten an der Kehle und an den Seiten des Körpers; die Füße hellbraun.

Dieser ist in Louisiana, und andern Ländern von Nordamerika zu Hause. Wenn er einerley Vogel mit dem ist, von welchem Charlevoix in seiner Reise spricht, so soll er sehr angenehm singen.

144. Der braune Sänger. (Brown W.)

Motacilla furva. L. I. 2. p. 994. No. 168. *h*)
Brown Warbler. Brown. illustr. p. 68. pl. 18.
Le Roitelet de Surinam. Ferm. Descr. Surin. Vol. II. p. 201?

Seine Länge ist fünfthalb Zoll. Der Schnabel ist ein wenig gebogen, und von gelblichbrauner Farbe; die Hauptfarbe des Gefieders ist braun, am hellsten am Bauch, und am Rucken, an den Flügeln und am Schwanze mit dunkelfarbigen Streifen bezeichnet; die Füße sind gelbbraun.

Wenn

b) Der Zaunkönig vom Platastrom. Sylvia platensis Latham Ind. orn. p. 548. n. 149. Hr. Latham sieht ihn hier als eine besondere Art an. B.

c) Uebers. XVI. S. 231. Nr. 1. B.

d) Herr Commerson, der ihm zu Buenos Ayres gesehen hat, sagt weiter nichts von ihm, als daß man ihn an beyden Ufern des Platastroms antreffe, wo er sogar bis auf die Schiffe komme und die Fliegen wegfange. Büffon a. a. O. B.

f) Der Louisianische Zaunkönig. Sylvia Ludovociana Latham Ind. orn. II. p. 548. n. 150. Auch dieser wird von Latham als eine besondere Art aufgeführt, ob er es gleich noch nicht mit Gewißheit behauptet. B.

g) Uebers. XVI. S. 232. Nr. 2. B.

h) Latham Ind. orn. II. p. 548. n. 151. B.

Wenn dieß der, von Fermin erwähnte Vogel ist, wie ich sehr vermuthe, so soll er ungemein angenehm singen, so daß er in Surinam, wo er zu Hause ist, Nachtigall genannt wird.

145. Das Goldhähnchen. (Gold-crested Wren.)

Motacilla Regulus. L. I. 2. p. 995. No. 48. *i*) — Faun. Suec. No. 262. — Sdop. ann. I. No. 230. — Kram. elench. p. 368. No. 21. — Brünn. orn. No. 285. — Müller Zool. p. 33. No. 280. — Georgi Reise p. 175. — Frisch tab. 24. — Olin. uccell. pl. in p. 6.

Le Poul ou Souci; Roitelet huppé. Briss. orn. p. 575. No. 17. — Pl. enlum 651. f. 3.

Le Roitelet. Buff. ois. V. p. 363. pl. 16. f. 2. *k*)

Golden-crowned Wren. Ray Syn. p. 79. A. 9. — Will. orn. p. 227. pl. 42. Albin. I. pl. 53 A. — Edw. pl. 254. 1. — Catesby Carol. App. p. 36. 37. — Br. Zool. I. No. 153. — Arct. Zool. II. No. 321. *m*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß ist, wie ich glaube, die kleinste Vogelart auf unsern Inseln, wo nicht in ganz Europa; er ist nur vierthalb Zoll lang, und sechs und siebenzig Gran schwer. Sein Schnabel ist sehr zart, und schwarz; der Augenstern nußbraun; die Federn auf dem Scheitel sind orangefarben, und zu beyden Seiten schwarz eingefaßt; das Gefieder an den obern Theilen ist gelblichgrün, am hellsten am Steiß; die untern Theile sind gelbröthlichweiß, mit einem grünlichen Anstrich an den Seiten; die Deckfedern der Flügel dunkelbraun, mit weißen Bandstreifen durchzogen; Schwungfedern und Schwanz dunkelbraun, mit hellgrünen Rändern, und einige der innern Federn mit schwärzlichen; die Füße gelblich.

Das Weibchen hat blässere Farben, und der Scheitel ist gelb, statt orangefarben.

Dieser niedliche Vogel ist in England zu Hause, wo er unsern Winter verträgt; außerdem findet man ihn auch in ganz Europa, so wie in den drey andern Welttheilen, mit einer sehr

i) Latham Ind. orn. II. p. 548. n. 152. B.
k) Uebers. S. 197 Nr. 240. B.
l) Uebers. XVI. S. 234. B.

m) Uebers. II. S. 386. Nr. 238. Vergl. auch Zorns Pethinoth. I. S. 150. Hier giebt Zorn das Nest falsch an, wenn er sagt, daß das Goldhähnchen dasselben unter dicken Fichtenbüschlein auf den Erdboden mache. Das runde, ballförmige schöne Nest, das bald die Oeffnung zur Seite, bald oben hat, findet man vorzüglich in den Schwarzwäldern, bald hoch bald tief unten an dem äußersten Ende der Zweige befestigt. Es ist sammetweich anzufühlen, besteht auswendig aus sehr klar gebissenen Spitzen von Erdmoos, weiter innen aus Puppenhülsen und Distelsaamenkronen und inwendig aus Federn. Die 3 bis 6 Eyer, die das Weibchen legt, sind stumpf, wie Zuckererbsen groß, sehr blaß fleischfarben und mit einer etwas höhern Fleischfarbe gewässert. Den Jungen fehlt vor den ersten Mausern der gelbe gefärbte Scheitel ganz, und sie sind mehr grau als grün. Auch die Männchen haben nach den Mausern bis zum zweyten Jahre nur einen goldgelben Scheitel, der, wenn man ihn aufhebt, safrangelb gefleckt ist. — Man vergl. ferner meine N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 544. Nr. 26. N. G. der Stubenvögel. B.

mm) Die Nasenlöcher sind oval und eingeschlossen, (was bey andern Vögeln nicht ist,) mit einer steifen, auf beyden Seiten zerschlissenen Feder bedeckt. B.

ſehr geringen Abänderung. Er wird ferner als eines Ruſſiſchen *n*), Schwediſchen und Norwegiſchen Vogels erwähnt; er iſt in Frankreich, Oeſtreich und Italien zu Hauſe, auch auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, und ohne Zweifel in den dazwiſchen liegenden Ländern; er iſt auch ein Bewohner von Nordamerika, Penſylvanien, *o*), und Neuyork *p*), und ich habe erſt neuerlich ein Exemplar geſehen, das aus Cayenne kam *q*); und da dieß iſt, warum ſollte er nicht auch in den dazwiſchen liegenden Ländern zu Hauſe ſeyn? Man hat ihn gegen Norden bis Schottland geſehen, hier aber verſchwindet er vor Annäherung des Winters wieder, und dieß ſoll er auch in den mehr nördlich gelegenen Ländern thun, überall aber die Kälte bis zur Bewunderung vertragen *r*).

Auf Eichen ſcheint er ſich vorzugsweiſe aufzuhalten *s*). Ich habe öfter als Einmal die Brut dieſer Vögel auf einer großen Eiche in der Mitte einer weiten Ebene (lawn) geſehen, und die ganze Familie war, ſo bald ſie nur dazu fähig wurde, in beſtändiger Bewegung, und machte den Zuſchauern großes Vergnügen. Die Zahl der Jungen iſt ſechs bis acht. Einer machte auch einmal ſein Neſt in einen Garten, auf einem Förenbaum; es beſtund aus Moos, die Oeffnung war nur auf einer Seite, die Form rundlich; es war mit einer pflaumartigen Materie, mit kleinen Fäden *t*) untermengt, ausgelegt.

Dieſer Vogel ſoll ſehr melodiſch ſingen, und ſein Geſang dem des gemeinen Zaunkönigs gleichen, aber ſanfter (weaker) ſeyn *u*).

145. Var. A. Motacilla Regulus. L. I. 2. p. 995. No. 48. *β. v*)
Le Roitelet mesange. Buff. ois. V. p. 375. *w*)
Mesange huppée de Cayenne. Pl. enlnm. 708. f. 2.

Dieſer iſt noch kleiner, als der letzte, und unterſcheidet ſich durch den Schnabel, der viel kürzer und kleiner iſt; das Gelbe iſt nicht in der Mitte des Scheitels, ſondern queer über den Hinterkopf, oder vielmehr über den hintern Theil des Federbuſches, der Jonquillegelb iſt; die obern Theile des Körpers ſind grünlich; der Kopf ſpielt ins Braune; Flügel und Schwanz ſind dunkelgrün, über jene laufen zwey blaſſe Streifen, die kürzern Schwungfedern haben eben ſolche

n) Georgi.
o) Edwards.
p) Major Davies.
q) Das Exemplar aus Cayenes, das ich geſehen habe, hatte ſchwarze Füße.
r) Vielleicht geſchieht es mehr aus Mangel an Inſekten, als der bloßen Kälte wegen, daß dieſer Vogel ſeinen Platz verändern muß. B.
s) In Schwarzwäldern. Es iſt daher auf den Thüringerwald außerordentlich häufig. Nur im Herbſt und Winter geht es in die Hecken. Es ſcheint als wenn es in Norden ein Zugvogel wäre, denn im Frühjahr trifft man ihn bey uns ſo häufig in den Hecken an, wenn die einheimiſchen ſchon wieder die Wälder bezogen haben, als irgend einen andern Zugvogel. B.
t) Vielleicht Spinngewebe. Hist. des Ois v. p. 367.
u) Br. Zool. — Er ſingt zwey leiſe ziſchende Strophen, die wenig oder gar nichts melodiſches haben. B.
v) Das Meiſengoldhähnchen.
Sylvia elata Latham Ind. orn. II. p. 549. n. 159.
Hier macht Hr. Latham wie Büffon eine beſondere Species daraus, und mir deucht mit Recht. B.
w) Ueberſ. B. XVI. S. 255. B.

che, Ränder, und der Schwanz seine zwey mittlern Federn ausgenommen, dergleichen Spitzen; der Vorderhals ist hellaschfarben; Brust und Bauch grünlich; gegen den After hin, und an den Seiten, ist die Farbe hellgelb; die Füße sind dunkelbraun.

Er ist in Cayenne zu Hause, wo er sich blos im Winter sehen läßt, und sich auf niedern Bäumen und Gebüschen auf den Heiden, die nicht überschwemmt (ocer wet) werden, aufhält. Er hat viele Aehnlichkeit mit der letzten Art.

146. Der rubinköpfige Zaunkönig. (Ruby-crowned Wren.)

Motacilla Calendula. L. I. 2. p. 994. No. 47. *x*)
Le Poul, ou Souci de Pensilvanie. Briss. orn. III. p. 584. No. 18.
Le Roitelet rubis. Buff. ois. p. 373. *y*)
Ruby-crowned Wren. Edw. pl. 254. f. 2. *z*) — Arct. Zool. II. No. 320. *a*) Br. Mus. Lev. Mus.

Dieser ist viel größer, als der letzte, und um einen Zoll länger. Sein Schnabel ist einen halben Zoll lang und dunkelbraun; am Scheitel ist ein Fleck von rubinrother Farbe, der nicht schwarz eingefaßt ist, wie beym letzten; die obern Theile sind olivenfarben, haben aber einen Anstrich von Braunem; am hellsten ist die Farbe am Steiß; die untern Theile sind gelblichweiß, an der Brust stark ins Gelbe spielend; queer über die Flügel laufen zwey gelbliche Binden; Schwungfedern und Schwanz sind so ziemlich wie bey der letzten Art.

Das Weibchen hat nichts Rothes am Kopf. Sie sind in Nordamerika zu Hause, leben von den Insekten, die sich auf den Fichtenbäumen *b*) aufhalten, und laufen an den Bäumen hinauf, wie die Meisen.

Büffon erwähnt eines Vogels, der ihn aus Louisiana gesandt worden, und hält ihn für eine Spielart; er unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, daß sein Hinterkopf mit einer karmoisinrothen Krone umgeben ist *c*).

Auch Kolbe gedenkt eines rothköpfigen Zaunkönigs auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung. Dieser sagt, er ist größer, als die Blaumeise, hat schwarze Flügel und röthliche Füße. Da aber dieß alles ist, was er sagt, so bleibt es ungewiß, ob er eine Spielart vom vorhergehenden, oder eine besondere Art sey.

Es giebt auch eine Meise, mit scharlachrothen Federbusch, die Herrn Müller aus Grönland geschickt wurde; was dieß aber eigentlich für ein Vogel sey, kann aus dem bloßen Namen nicht bestimmt werden *d*).

147. Der

x) Latham Ind. orn. II. p. 549. n. 154. B.
y) Uebers. B. XVI. S. 249. Nr. 1. B.
z) Seligmanns Vögel. VII. Taf. 44. fig. 2. B.
a) Uebers. II. S. 386 Nr. 237. B.
b) Spruce-trees. „insecta in Pinum truncis venans“ Syst. nat. l. c.
c) N. calend. β. L. l. c.
d) Zool. Dan. Prodr. No. 204. Sehr wahrscheinlich ist dies eher mein rothhaubiger Fink (1. B. 2. Th. S. 253. No. 11.), als irgend ein anderer.

147. Der Weidenzeiſig. (Der gelbe Zaunkönig. Yellow Wren.)

Motacilla Trochilus. L. l. 2. p. 995. No. 49. *e*) — Faun. Suec. No. 264. — Scop. ann. I. No 238. *f*) — Kram. elench. p. 378. No. 22. — Brünn orn. No. 286. — Müller Zool. No. 281. — Frisch tab. 24. f. 2. *g*)
Motacilla hispanica. Hasselq. Voy. p. 287. No. 52.
Le Pouillot, ou Chantre. Briss. orn. III. p. 279. No. 45. — Buff. ois. V. p 344. *h*) — Pl. Snlum. 651. f. 1.
Small yellow Bird. Ray Syn. p. 80. A. 10. — Will. orn. p. 228.
Green Wren. Albin. II. pl. 86. f. 6.
Yellow Wren. Br. Zool. No. 151. *i*) — Arct. Zool. II. p, 519. k) Br. Mus. Lev. Mus.

Dieſe Art iſt nur ſehr wenig größer, als der Zaunkönig, und ihre Länge vier und drey Viertel Zoll. Die obern Theile ſind hell olivengrün, die untern hellgelb, und ein Streifen von letzter Farbe über den Augen; Flügel und Schwanz braun, mit gelblichgrünen Rändern; die Füße gelblich *l*).

Das Weibchen iſt bläſſer, und ſpielt am Aſter ſehr ins Weiße; überhaupt variiren beyde Männchen und Weibchen ſehr in der Farbe *m*).

Dieſer kleine Vogel iſt ſehr gemein bey uns in England, wie auch in vielen andern Ländern Europens *n*), wo er ſich hauptſächlich an ſolchen Orten aufhält, wo Weiden wachſen; er iſt ein Zugvogel, kommt aber ſehr frühzeitig an. Sein Neſt macht er in die Höhlen der Baumwurzeln, in die Löcher der trocknen Ufer und an ähnliche Stellen; es iſt rund, dem des Zaunkönigs nicht unähnlich, beſteht aus Moos, mit einer Fütterung von Wolle, Haaren und Federn. Die Eyer ſind ſchmutzigweiß, mit röthlichen Flecken bezeichnet, und fünf an der Zahl. Seine Stimme iſt unbedeutend, kaum mehr als Twit, twit! das er hören läßt, wenn er an den Baumzweigen auf- und abläuft, um Inſekten zu haſchen, von denen er lebt; man ſagt aber das Männchen habe während des Bebrütens einen Geſang, der nichts weniger, als unangenehm und ſanft, aber ſchwach ſey *o*).

147. Var. A. Motacilla Trochilus. L. l. 2. p. 995. No. 49. *β*.
— — Acredula. ibid. ed. XII. p. 538. No. 49. *β*. *p*)
Le Figuier de la Caroline. Briss. orn. III. p. 486. No. 48.

e) Latham Ind. orn. II. p. 550. n. 155. B.
f) Ueberſ. S. 195. Nr. 238. Iſt der Fitis gemeynt. B.
g) Iſt der Fitis gemeynt. B.
h) Auch hier iſt der Fitis gemeynt. B.
i) Ueberſ. S. 114. Taf. 53. f. 2. und 55. f. 1.
k) Ueberſ. II. S. 355. Nr. 236. Vergl. auch meine N. G. des In- und Auslands I. 1. und S. 543 und 544. Nr. 23. 24. 25. N. G. Deutſchlands IV. Taf. 28. Der Fitis. 29. Der Weidenzeiſig 30. Das Laubvögelchen.
l) Dieß iſt mein Laubvögelchen. Motacilla Sibilatrix. B.
m) Dieß iſt mein Fitis (Motacilla Fitis.) B.
n) Ich habe ihn auf Chineſiſchen Gemälden angetroffen.
o) Von den beſondern Eigenſchaften dieſer Vögel, ſiehe unten Note *yy*) in der beſondern Geſchichte derſelben. B.
p) Latham l. c. *β*.

Le Figuier brun et jaune. Buff. ois. V. p. 295. *q*)
Oenanthe fusco-lutea minor. Ray Syn. p. 186. No. 39. — Sloan. Jam. II. 310. No. 46.
Yellow Titmouse. Catesby Cajol. I. pl. 63.
— Wren. Edw. pl. 278. f. 2. *r*)
Scotch Wren. Br. Zool. I. p. 379? *s*)
Br. Mus.

Dieß scheint eine bloße Spielart zu seyn, die sich dadurch unterscheidet, daß sie an den obern Theilen mehr ins Braune, als ins Grüne, und an den untern mehr ins Gelbe spielt.

Sie findet sich in Jamaika, Carolina und andern Ländern von Amerika. Sloans bemerkt, im erst benannten Lande lebe sie von Wanzen, kleinen Käfern u. d. gl. In großer Menge ist sie um die Stadt St. Jago de la Vega.

Brisson's Vogel scheint etwas größer zu seyn; die obern Theile sind olivengrün; die untern gelb, und das Weibchen ist von minder lebhaftem Colorit. Er soll sich im Sommer sowohl in Jamaika, als in Carolina vorfinden, und scheint eine bloße Spielart, wo nicht der nämliche Vogel, zu seyn.

147. Var. B. *t*)

Büffon erwähnt auch noch einer Spielart, die sich in Lothringen vorfindet, und nur ein Viertheil kleiner ist. Die Kehle und ein Streifen über den Augen sind weiß; Brust und Bauch gelbröthlichweiß, und an den obern Theilen des Körpers eine schwärzliche Mischung *u*).

147. Var. C. Motacilla Trochilus. L. I. 2. p. 995. No. 209. *γ*.
Le grand Pouillot. Briss. orn. III. p. 482. A. — Buff. ois. V. p. 351.
Greater not-crested Regulus. Will. orn. p. 228.

Dieser gleicht dem gemeinen, ist aber zweimal so groß. Er soll die Stimme der Feldgrylle haben. Ob er eine Spielart sey, oder nicht, mag ich nicht bestimmen, weil die Größe dawider ist; da er aber ein Vogel ist, der sich in allen Welttheilen vorfindet, und selbst in Europa an Größe sowohl, als an Farbe variirt, so ist das Factum möglich *v*).

147. Var. D. Motacilla Trochilus. L. I. 2. p. 995. No. 49. *δ*.
— corpore et fusco viridescente, pectore ferrugineo. Hasselq. Voy. 286. p. 51.

Er

q) Ueberſ. XVI. S. 111. B.
r) Seligmanns Vögel VIII Taf. 68. f. 2. B.
s) Diesen Vogel hat mir E. S. Fraſer Esq. gegeben, und geſagt, er ſey in den Schottiſchen Hochländern geſchoſſen worden.
t) Dieſe Spielart iſt im Syſtem nicht bemerkt, ſcheint aber unter der folgenden (Var. c.) mit begriffen zu ſeyn Ueberſ.
u) Dieß iſt mein Weidenzeiſig. (Motacilla rufa Lin.) B.
v) Ueberſ. B. XVI. S. 203. B.
w) Dieſer größere Vogel iſt wohl blos eine junge Baſtardnachtigall. B.

Er hat die Größe des Weidenzeiſigs. Sein Schnabel iſt zugeſpizt, gerade, die obere Kinnlade iſt an der Spitze ein wenig gebogen; die Farben ſehen hell roſtigroth; der Kopf und die obern Theile ſind grünlichbraun; der Vorderhals und die Bruſt rothgelb; unter den Schultern, und an den obern Deckfedern der Flügel, ſpielt die Farbe ins Roſtigrothe *).

Dieſer flog an den Bord eines Schiffes im Mittelländiſchen Meere, nahe an der Spaniſchen Küſte **).

*) Hr. Latham macht im Ind. orn. II. p. 551. n. 156. eine beſondere Art daraus, unter dem Namen: der Mittelländiſche Sänger. Sylvia mediterranea. Es iſt auch wohl nichts anders als ein Weidenzeiſig. B.

**) Da ſich in der Geſchichte dieſer Vogelart ſo viel Verwirrungen finden, die daher entſtehen, daß ſich dieſe Vögel ſo ſehr ähnlich ſind; ſo will ich hier die beſondere Geſchichte derſelben nach vieljährigen Beobachtungen in der Natur ſelbſt beyfügen. Ich kenne nämlich dreyerley Vögel, die hier verwirrt werden.

1. Das Laubvögelchen.
Motacilla Sibilatrix.
Motacilla Trochilus. (mas) Lin.
Pouillot ou chantre. Buff.
Yellow Wren. Lath. (mas.)
Scotch Wren. Pen.

Kennzeichen der Art.

Die Stirn iſt geſtreckt; über die Augen läuft ein gelber Streifen; der Körper iſt oben zeiſiggrün, unten lichtgelb.

Beſchreibung.

Dieß ſchöne Vögelchen wohnet im Thüringerwalde, ſowohl in Nadel- als Laubholz, in den tiefen Gebirgen häufiger, als in den Vorderbergen. Wegen ſeiner Geſtalt und Farbe kann man es leicht mit der Baſtardnachtigall und dem Fitis verwechſeln; denn es hat ganz den Kopf und Schnabel der Baſtardnachtigall, und faſt die Farbe und Größe des Fitis und ganz ſeinen Ruf: Fid! Fid! Doch unterſcheidet es ſich von beyden durch viele, ſehr bemerkliche Kennzeichen, vorzüglich aber durch ſeinen auffallenden, nicht unangenehmen Geſang, welcher aus folgenden Strophen beſteht: Sſſ ſſ, rrrr, fid fid, fid fid! Die beyden erſten klingen leiſe ziſchend und ſchnurrend (daher der lateiniſche Name,) die leztere aber hell und ſtark, wie ein Menſch pfeift. Es läßt dieſen Geſang im May und Junius oft hören, ſo wohl ſizend als im Fluge, wenn es ſich von einem Baume zum andern begiebt. Es fliegt dabey ſehr langſam und mit einer zitternden und ſehr behaglichen Bewegung der Flügel.

Seine Länge iſt 41/2 Zoll, und die Breite der Flügel 83/4 Zoll. Der Schwanz iſt faſt 2 Zoll lang und die Flügel bedecken 11/2 Zoll deſſelben.

Der Schnabel iſt 6 Linien lang, grade, rund, von der Mitte bis zur Spitze faſt gleich dick, an der Wurzel platt und breit, daher das Maul weit wird, der Oberkiefer unmerklich eingeſchnitten und übergehend, ſchwärzlich, der Unterkiefer und die Schnabelwinkel gelblich, der Rachen gelb, mit einzelnen herabhängenden ſchwarzen Baarthaaren beſezt; die Naſenlöcher groß, eyrund, und der obere häutige Rand etwas hervorſtehend; die Augen ſchwarzbraun; die Füße gelb mit ſchwarz überlaufen, die Zehen unten hellgelb; die Beine 3/4 Zoll hoch und die Mittezehe und die hintern 6 Linien lang.

Der längliche Kopf, der Rücken, Bürzel und die obern Deckfedern der Flügel und des Schwanzes ſind zeiſiggrün, oder hellolivenfarbig, am Kopf und auf dem Schwanz am hellſten, auf dem Rücken am dunkelſten; über die Augen läuft von den Naſenlöchern an ein gelber Streifen, der vor den Augen goldgelb, hinter denſelben aber hellgelb iſt; durch die Augen geht ein brauner; die Backen, die Kehle, der Hals, die inwendigen Achſelfedern ſind lichtgelb; die Bruſt, der Bauch, die Seiten weiß, verlohren gelb beſpritzt; die untern Deckfedern des Schwanzes ſchön weiß; die

Knies

148. Der gelbköpfige Sänger. (Yellow-poll W.)

Motacilla aestiva. L. I. 2. p. 996. No. 119. z)

Le

z) Latham Ind. orn. II. p. 551. n. 157. B.

Knie grün; die großen Deckfedern und die Schwungfedern schwärzlich (vielmehr schwarzgrau) ſtark zeiſiggrün geändert; der Schwanz etwas gespalten, breit, schwärzlich, die äuſſerſte Feder weißlicht eingefaßt, die übrigen zeiſiggrün. Bey gefalteten Flügeln ſieht daher der ganze Oberleib grün aus.

Das Weibchen hat einen blaßgelben Streif über den Augen, und der Rücken fällt etwas mehr ins grüne. Haſſelquiſt p. 336. Motacilla hispanica.

In der lezten Hälfte des Aprils, wenn die Bäume zu grünen anfangen, kömmt dieſer Vogel zu uns, hält ſich etliche Tage in den Feldhölzern auf, und beſucht dann die Berge, wenn das Wetter auf denſelben milder geworden iſt. In der erſten Hälfte des Septembers verläßt er uns wieder. Er ſchwimmt beſtändig durch Hülfe ſeines ſtarken Schwanzes langſam durch die Luft, ſetzt ſich in hohen Fichten auf die untern dürren Zweige, fliegt beſtändig von einem Baume zum andern in dem kleinen Bezirke, den er eingenommen hat, paßt den Fliegen, Mücken, Bremſen, und Bremen auf, und fängt ſie im Fluge, wobey ihm ſein weites Maul ſehr gut zu ſtatten kommt.

Sein Neſt legt er im May in die ausgehöhlte Baumwurzeln, oder abgehauene Strünke an. Es iſt aus Moos und Haaren ſchlecht zuſammengebaut, und enthält 4—6 kleine weiße rothbraun punktirte und geſtrichelte Eyer, die in 14 Tagen von beyden Gatten ausgebrütet werden. Nur ſo lange die Brütezeit dauert, ſingt das Männchen, alsdenn vergißt es über der ſorgfältigen Verpflegung der Jungen ſein Lied. Da dieſe Vögel nur einmal niſten, und ihre Brut oft ein Raub der Wieſeln, Waldmarder und Füchſe wird, ſo bleiben ſie immer ſelten.

2. Der Fitis.

Motacilla Fitis.

The Yellow Wren, (femina) Latham.

Kennzeichen der Art.

Ueber die Augen läuft ein weißgelber Streifen, die Wangen ſind gelblicht, und die innern Deckfedern der Flügel ſind ſchön gelb.

Beſchreibung. Der Fitis iſt kein ſeltner Vogel, wenigſtens in Thüringen. Er unterſcheidet ſich nicht nur von andern ihm ähnlichen Vögeln durch ſeinen hellen Laut: Fit! den er beſtändig hören läßt, ſondern vorzüglich durch ſeinen Geſang, den man in den Feldhölzern, und beſonders in den jungen Schlägen der Vorhölzer, die an Bächen liegen, von der Mitte des Aprils bis in Auguſt hören läßt, und welches folgende von einer Quinte ſecundenweis herabfallende, traurige, abnehmende Töne ſind: Didi, dühü, dehi, zia, zia! Seine Länge beträgt 41/4 Zoll, und die Breite der Flügel 71/2 Zoll. Der Schwanz mißt 2 Zoll und die Flügel reichen zuſammengelegt bis über die Mitte deſſelben.

Der Schnabel iſt 1/2 Zoll lang, ſehr ſpitzig, der Oberkiefer ſchlägt merklich über den untern her und hat 2 deutliche Einſchnitte, iſt braun, und der untere und der Rachen gelb; die Naſenlöcher ſind länglicht eyrund; die Augen dunkelbraun; die Zehen gelb, die Beine gelb fleiſchfarben, 3/4 Zoll hoch, die Mittelzehe 6 und die hintere 5 Linien lang, die Klauen braun.

Der Kopf iſt faſt ein längliches Viereck, und der ganze Obertheil des Körpers mit den kleinern Flügeldeckfedern tief olivenfarbig, am Kopf und Rücken am dunkelſten, am Hals und Bürzel am hellſten. Von den Naſenlöchern läuft über die Augen ein weißgelber Streif, durch die Augen ein faſt unmerklich brauner; die Wangen ſind gelblicht; die Kehle und Bruſt weißgelb mit höhern Gelb beſpritzt; Bauch und Afterfedern weiß, leztere mit einigen gelben Federn; die untern Deckfedern der Flügel gelb, die Achſeln, Knie, und Augenlieder am ſchönſten. Die Flügel ſind ſchwarzgrau, ſchmal grünlich weiß eingefaßt und die leztern Schwungfedern haben weiße Spitzchen.

Der

Le Figuier de Canada. Briss orn. 3. p. 492. No. 21. pl. 26. f. 3. — Pl. enlum. 58. f. 2.

Le

Der Schwanz ist etwas gespalten, schwarzgrau, kaum merklich grünlich eingefaßt.

Das Weibchen ist etwas blässer am Unterleibe und unter den Flügeln, als das Männchen.

Es ist ein unruhiges, hurtiges und lustiges Vögelchen, das beständig in Büschen herum kriecht, und lockt oder singt. Es kommt als Zugvogel in der Mitte des Aprils an, und zieht die schattigen Laubhölzer den Nadelhölzern vor, ob es gleich, wie wohl seltner, auch in diesen angetroffen wird. Von August an findet man es allenthalben besonders auf den Weiden herumspringen, und in der lezte Hälfte des Septembers verläßt es unsere Gegenden wieder.

Seinen Unterhalt nimmt es vorzüglich von Mücken, Schnaken, Fliegen, Räupchen und allerhand kleinen Insekten, die sich ans Laub ansetzen; daher es auch beständig die Büsche und Bäume durchsucht. Im Herbst frißt es auch Hollunderbeeren.

Es nistet in Gebüsche an der Erde, oder auch, wie wohl seltner eine Spanne hoch über derselben. Das Nest ist zugewölbt wie ein Backofen, hat einen runden Eingang, und steht am öftersten in tiefem Moos. Die Unterlage sind dürre Grashalmen, und die dicke Ausfütterung und Auswölbung ist ein Gemische von großen und kleinen Pflaumfedern, der Raben, Rebhüner ꝛc. In demselben liegen 6—7 rundliche weiße, violett gesprengte Eyerchen weich und warm, und werden von den beyden Eltern in 13 Tagen ausgebrütet. Oft werden sie aber von einem Kukukswеibchen, das das seinige dafür einschiebt, herausgeworfen, und zerstöhrt. Die Jungen verlassen das Nest bald, weil sie in demselben den Verfolgungen so vieler Feinde ausgesetzt sind.

3. Der Weidenzeisig.

Motacilla rufa et Lotharingica. Lin.
Motacilla acredela?
Fouvette rousse. Buff.
Rufous Wreen. Latham.

Kennzeichen der Art.

Er ist grünlichtgrau, hat bräunliche Wangen, über den Augen einen schmuzziggelben Streif und die untern Deckfedern der Flügel sind strohgelb.

Beschreibung. Dieß ist nebst den Goldhähnchen der kleinste Vogel in Europa. Er verträgt fast alle Climate, Ostindien, so wie das rauhe Kamtschatka, und soll auch in den nördlichen Amerika angetroffen werden. In Deutschland ist er nicht selten, und in Thüringen, besonders in den Vorhölzern häufig. Je schwerer er durch seine Farben von der vorigen Art zu unterscheiden ist, desto leichter ist er es durch seinen einförmigen Gesang, der in folgenden 6—8 Sylben besteht: Zip zap zop zip zap zap! Seine Lockstimme aber ist fast der vorigen Art gleich und schallt hoch: Trhoid!

Seine Länge ist 41/4 Zoll, die Länge des Schwanzes 2 fast Zoll und die Breite der ausgedehnten Flügel 63/4 Zoll. Zusammengelegt reichen die Flügel bis zur Mitte des Schwanzes.

Der Schnabel ist 4 Linien lang, spizig, oben etwas übergehend und ausgeschnitten, mit länglichten Nasenlöchern, vielen schwarzen Barthaaren, schwarzbraun, inwendig gelb; die Augen dunkelbraun; die Füße schwarzbraun; die Beine 10 Linien hoch; die Mittelzehe 7 und die hintern 6 Linien lang, die Nägel lang und scharf.

Der längliche Kopf, der Rücken und Bürzel ist dunkelgrau mit grün überlaufen, der Kopf ist am dunkelsten, der Bürzel am hellsten und grünlichsten. Von den Nasenlöchern geht über die Augen weg ein schmuzig strohgelber Streif; die Backen sind bräunlich; die Seiten des Halses und der Brust grau ins röthliche spielend; der Unterleib schmuzig weiß mit einzelnen strohgelben Fleckchen bespritzt; die Knie grünlichgrau; die Flügel schwarzgrau, die vordern Schwungfedern schmal weißlich und die hintern grünlich eingefaßt; die Deckfedern der Unterflügel röthlichgelb; der

Schwanz

Le Figuier tacheté. Buff. ois. V. p. 283. *a*).
— de Caroline. Pl. enlum. 58. f. 1. — Eine Spielart. 58. f. 2.

Yel-

a) Ueberſ. XVI. S. 89. B.

Schwanz faſt grade, ſchwarzgrau nach der Wurzel grünlich und nach der Spitze zu kaum merklich weiß eingefaßt. Haſſelqviſt p. 337.

Das Weibchen iſt faſt durch gar nichts vom Männchen verſchieden, außer daß der Oberleib röthlichtgrau und der Unterleib noch ſparſamer gelb beſpritzt iſt.

Der Weidenzeiſig iſt ein munterer, lebhafter, luſtiger, kecker und ſchneller Vogel, und ſo klein er iſt, ſo zänkiſch iſt er, und ſo ſtark fühlt er ſich, daß er ſogar alle Vögel, die mit ihm ziehen, auch große, als Droſſeln u. d. g. neckt, anfällt, und verfolgt und wenn ſie ſich ihm entgegen ſtellen wollen ſich in die Büſche verkriegt, und triumphirend ſein Hoid Hoid! ruft. Eben ſo unfriedfertig bezeigt er ſich auch gegen ſeine Kameraden, mit denen er ſich unaufhörlich herumbeißt, wenn ſie ſeinem Stande, von welchem er einmal Beſitz genommen hat, zu nahe kommen. Seiner Munterkeit halber möchte es wohl angenehm ſeyn, ihn ein Zimmer zu halten; allein er läßt ſich nach vielfältigen Erfahrungen an keine andere Nahrungsmittel gewöhnen, als die ihn in der Natur angewieſen ſind, und ſtirbt ſogleich, wenn er keine Fliegen mehr bekommt.

Ohngeachtet er der kleinſte Zugvogel iſt, ſo hält er doch faſt am längſten bey uns aus, und kömmt auch früh wieder an. Die Urſachen davon liegen theils in ſeine Bedeckung, da er wirklich mit mehrere Dunen übergangen iſt, als andere Wanderer, theils in ſeiner Nahrung, da er ſich mehrentheils von Fliegen und Mücken nährt, die ſo bald und ſo lange es Sonnenblicke giebt, da ſind. Er kömmt mit dem Rothkehlchen nach der Mitte des Märzes, alſo unter ſeinen nächſten Verwandten zuerſt an, und zieht zu Ende des Octobers wieder weg Wenn er ankommt, kriecht er in den Gärten und Feldhölzern in allen Gebüſchen herum und wenn er wegzieht, thut er ein gleiches. Zu Ende des Julius federt er ſich, und ſchon zu Ende des Auguſts verläßt er ſeinen eigentlichen Stand, fliegt in die Gebüſche und Bäume, und am öfterſten ſieht man ihn alsdann in den Weidenbäumen, die an Gewäſſern ſtehen, wo die Mücken in Menge ſpielen, und ſich an die Zweige derſelben ſetzen. Im October zieht er Familienweiſe weg. Zu ſeinen Stand wählt er zum Unterſchied der vorigen Art mehr die Nadel- als Laubhölzer, und in leztern trift man ihn alſo höchſt ſelten an.

Daß ſeine Nahrung vorzüglich Spinnen, Mücken und Fliegen ſind, iſt ſchon oben erwähnt worden. Er nährt ſich aber auch noch von mehrern Arten Inſekten, und findet dann, wenn nach ſeiner Ankunft noch rauhe Witterung einfällt, immer unter dem Laube in den Hecken, die er durchkriecht, und in dem Mooſe, das er durchſucht, Blattläuſe, Räupchen und Püppchen, die ihm das Leben erhalten. Auch wird er dadurch ſehr nützlich, daß er die kleinen Spann- und andern Raupen aus den Knoſpen der Obſtbäume hervorſucht, ehe die Blüten aufbrechen. Er iſt daher auch immer luſtig. Im Herbſt frißt er, wenn die ſtarken Fröſte die Inſekten erſtarren machen, Hollunderbeeren.

Auch dieſe kleine Motacille baut ihr Neſt auf die Erde zwiſchen abgefallenes Laub, in eine alte Maulwurfshöhle, unter ein altes überhängendes Fahrgeleiſe und zwiſchen vom Waſſer ausgeſchwemmte Wurzeln.

Es ſteht mehr über der Erde als bey den andern kleinen, ihm ähnlichen Vögeln, iſt groß und hat eine kurze cylinderförmige Geſtalt. Die Oeffnung geht an der Seite heraus, doch mehr noch oben und iſt auch größer als bey dem Fitis, ſo daß man die Eyerchen drin liegen ſehen kann. Es beſteht aus Grashalmen inwendig aber aus Wolle, Haaren und Federn, und iſt ſchlecht zuſammengewebt.

Das Weibchen legt ein auch zweymal des Jahrs 4 bis 5 Eyer, die ſehr klein, oben ſtark abgeſtumpft, einen ſchneeweißen Grund haben,

und

Yellow-Poll. Arct. Zool. II. No. 292. *b*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Etwas kleiner, als die Gartengrasmücke (Nr. 3), und fünfthalb Zoll lang. Der Schnabel ist schwarz; der Kopf und alle untern Theile schön gelb, an der Brust, am Halse und an den Seiten mit röthlichen Längsflecken bezeichnet; die obern Theile und die Ränder der Schwungfedern olivengrün; die Schwungfedern selbst braun; der Schwanz ist wie die Schwungfedern gezeichnet, seine zwey mittlern Federn aber durchaus dunkelbraun, die innern Fahnen der Seitenfedern gelb; die Füße schwarz.

Diese Art wird in Amerika angetroffen, und ist ein Zugvogel. In Canada sieht man sie den Sommer über; ihr vorzüglicher Aufenthaltsort aber ist Guiana, und die angränzenden Länder, wo sie nistet. Ihre Stimme soll sehr angenehm, und der des Hänflings nicht unähnlich seyn.

Der zweyte von diesen Vögeln, ist dem ersten nicht unähnlich, alle obern Theile aber sind bey ihm braun, die Stirn gerade über dem Schnabel ausgenommen, die nebst den untern Theilen, gelb und ungefleckt ist. Ohne Zweifel eine bloße Spielart *c*).

Herr *d*) Pennant vermuthet, die zwey unter diesem Titel beschriebnen Vögel seyen verschiedene Arten, und erwähnt des zweyten unter dem Namen des olivenfarbnen Sängers *e*). Herr Hutchins sagt mir, der gelbköpfige käme im Junius nach der Hudson's Bay, und sein Augenstern sehr blau. Man sieht ihn vorzüglich unter den Weiden in Wäldern, er fliegt beständig von Baum zu Baum, und läßt einen zarten Laut hören. Sein Nest scheint gut gebaut zu seyn, und besteht aus Moos, Gras, Haaren und Federn, die unter einander gewürkt sind; zuweilen ist es etwas hoch auf einen Baume angebracht, zur andern Zeit wieder nahe am Boden. Er legt drey bis fünf weiße, mit rostfarbnen Flecken bezeichnete Eyer. In der Hudson's Bay wird er Somow petaisisch genannt.

149. Der

am stumpfen Ende, übrigens überaus einzelne mit klaren schiefen Purpurpünktchen besetzt sind. Sie werden in 13 Tagen ausgebrütet, und die Jungen mit Spinnen, Mücken, Fliegen und kleinen Räupchen, ernährt. Wenn man bey ein Nest kommt, wo das Weibchen brütet und es stöhret, so wird es so betrübt, fliegt ohnmächtig an die Erde hin, ruft ängstlich Hoid, Hoid und kann sich in langer Zeit nicht wieder erholen. B.

b) Uebers. II. S. 374. Nr. 209. B.

c) In dem Ind. orn. II. p. 551. n. 158. hat Hr. Latham diese Meynung geändert, und noch seinem Vorgänger Pennant, wie er auch im Zusatze sagt, eine besondere Art aus diesem Vogel gemacht.

Der Carolinische Sänger.
Sylvia carolinensis.
Motacilla aestiva Gmelin. β.

Kopf, Obertheil des Körpers und Deckfedern der Flügel sind olivengrün; vordere Schwungfedern und Schwanz braun, erstere grün, letztern gelb eingefaßt; die untern Seiten des Körpers blaßgelb.

Bewohnt die Hudsonsbay und Carolina. B.

d) Zus. a. d. Suppl. S. 183. 84. Uebers.

e) Olive Warbler. Arct. Zool. No. 307.

149. Der Schneidervogel. (Tailor W.)

Motacilla sutoria. L. I. 2. p. 997. No. 170. *f*)
— — Zool. Ind. p. 17. pl. 8.
Tailor Bird. Ind. Zool. p. 7. pl. 8. *g*)

Dieß iſt eine kleine Art, die nur drey Zoll Länge, und nicht mehr, als neunzig Gran Gewicht hat; ihre Farbe iſt durchaus lichtgelb.

Sie iſt in Indien zu Hauſe, und hauptſächlich ihres Neſtes wegen merkwürdig, das auf eine ſonderbare Art gebaut iſt, und aus zwey Blättern beſteht, einem abgeſtorbenen, das ſie an dem Ende eines Zweiges an die Seite eines grünen befeſtigt, indem ſie beyde nach Art eines Beutels oder einer Taſche zuſammennäht, und an der Spitze (top) offen läßt. Die innere Seite legt ſie mit zarten Dunen aus. Auf dieſe Art iſt ihre Brut vor den Nachſtellungen der Schlangen und Affen geſichert, denen ſie außerdem zur Beute werden würde. Die Eyer ſind weiß.

150. *h*) Der Sänger von Awatcha. (Awatcha W.)

Motacilla Awatcha. L. I. 2. p. 986. No. 159. *i*)
Awatcha Warbler. Arct. Zool. II. p. 422. T. *k*)

Der Scheitel dieſes Vogels, der obere Theil des Halſes und des Körpers ſind dunkelbraun; die großen Schwungfedern weiß gerändert; der untere Theil der fünf äußerſten Schwanzfedern dunkel orangefarben, die Endſpitzen braun, die zwey mittlern Federn ganz braun; Kehle und Bruſt weiß, die Seiten der erſtern, und die ganze Bruſt ſchwarz gefleckt; von der obern Kinnlade bis zu jedem Auge läuft ein ſchiefer, weißer Strich; die Seiten ſind hell roſtfarben; die Mitte des Bauchs weiß.

Er iſt in Kamtſchatka zu Hauſe.

151. Der Rohrkönig. (Reed-Wreen.)

Motacilla arundinacea. L. I. 2. p. 992. No. 167. *l*)
— — Phil. Transact. Vol. LXXV. p. 8. pl. 1.

Er hat die Größe des Rohrſängers, und wiegt ſieben Pfennig Gewichte, und neun Gran. Die Länge des Männchens iſt achthalb, die des Weibchens ſechs und drey Viertel Zoll. Der Schna-

f) Latham Ind. orn. II. p. 551. n. 159. B.
g) Hr. Forſter ſetzt in der Indiſchen Zoologie (Ueberſ.) hinzu, daß die Eyer nicht viel größer wären als Ameiſeneyer. An einigen Orten Indiens heiße der Vogel Tati oder Bremſenvogel B.
h) Die folgenden Vögel bis Nr. 156. ſind in den Suppl. S. 184 — 188. hinzugekommen. Ueberſ.
i) Latham Ind. orn. II. p. 553. n. 167. B.
k) Ueberſ. II. S. 395. T. B.
l) Latham Ind orn. II. p 510. n. 12. Gent Mag. IV. 462. t. p. 640. B.

Die roſtfarbene Grasmücke.

MUSEUM
NATURAL HISTORY

Schnabel iſt einen halben Zoll lang, und dunkel hornfarben; die untere Kinnlade fleiſchfarben; die untere Seite des Mundes orangefarben; der Augenſtern olivenbraun; die Augenkreiße (eyelaſhes) ſchmuzigweiß; von dem Schnabel bis zu den Augen läuft ein breiter, lohgelblichweißer Streifen; die Hauptfarbe des Gefieders iſt grünlicholivenbraun; Schwungfedern und Schwanz braun, mit hellern Rändern, letzter etwas keilförmig; das Kinn weiß; die übrigen untern Theile lohgelblichweiß; die Wurzel aller Federn ſchwarz; die Füße lichtolivenfarben; die Fußſolen lebhaft grünlichgelb. Männchen und Weibchen ſind ſich ſehr ähnlich *m*).

Das Neſt beſteht äußerlich aus dürren Grashalmen, die mehrentheils mit den Blüthenbüſcheln des gemeinen Schilfrohrs ausgefüttert ſind; zuweilen aber mit abgeſtorbenen Gräſern, und einigen wenigen ſchwarzen Roßhaaren, um dieſe zu bedecken. Gewöhnlich iſt es nach Art einer Hangmotte, zwiſchen drey oder vier Schilfrohrſtengel, mittelſt dürren Graſes u. d. gl. aufgehängt oder befeſtigt; doch ſchränkt ſich der Vogel nicht immer auf das Schilfrohr ein, denn man weiß Beyſpiele, daß das Neſt an die Zweige einer Waſſerklette (Water-dock) befeſtigt war; oder, was der Fall bey dem Vogel war, von dem die Zeichnung genommen iſt, in einem dreygabligen Zweige eines Strauſes am Waſſer. Der Eyer ſind gemeiniglich vier, ſchmuzigweiß, über und über mit matt olivenfarbnen Flecken beſprengt, beſonders am breiten Ende, wo man gewöhnlich zwey oder drey kleine, unregelmäßige, ſchwarze Striche (Scratches) bemerkt.

Obiger Vogel hält ſich am Fluße Coln, in Buckinghomſhire auf, und ohne Zweifel auch an andern Flüßen und waſſerreichen Plätzen, wo Schilf wächſt. Er iſt ein ziemlich ſcheuer Vogel, und wird ſelten gefangen, ob man gleich ſein Neſt oft findet. Man kan ihn leicht mit dem Rohrſänger (Nr. 21) verwechſeln, er iſt aber zuverläſſig eine beſondere Art. Schon der einzige Umſtand, daß die Wurzel des Schnabels bey ihm viel breiter iſt, als beym Rohrſänger, iſt hinlänglich, wenn auch noch Charaktere vorhanden wären, die den Unterſchied zwiſchen bey den beſtimmten.

152. Die roſtgraue Grasmücke. (Lesser White-throat.)

(ſ. die ſechs und funfzigſten Kupfertafel.)

Motacilla Sylvia. L. l. 2. p. 956. No. 9? *n*) Faun. Suec. No. 250?

Sie hat die Größe des Rohrſängers, und den nämlichen ſchlanken Wuchs, ihre Länge iſt kaum vier Zoll. Ihr Schnabel iſt einen halben Zoll, dünn, und dunkelfarbig; die Wurzel der untern Kinnlade hellgelb; der Augenſtern dunkelfarbig; die obern Theile des Gefieders überhaupt aſchbraun, am Scheitel etwas dunkler; die untern Theile, vom Kinn bis zum Aſter, ſchmuzigweiß; der Schwanz zwey Zoll lang, von einerley Farbe mit dem Körper, die äußere Feder ausgenommen, die an der äußern Fahne bläſſer iſt, die zwey mittlern Federn ſind ein klein wenig kürzer, als die übrigen, wodurch der Schwanz, wenn er ausgebreitet iſt, ein etwas ga-

m) Dieß iſt kein anderer Vogel, als die Rohrdroſſel. Vergl. oben B. II. Th 1. S. 28. Nr. 28 Mete r. B.

n) Sylvia Sylviella. Latham Ind. orn. II. p. 515. n. 24. Ich nenne ſie Motacilla fruticeti. Vergl. N. G. der Stu[illegible]vögel. Nr. 93. und N. G. Deutſchlands IV. Taf. 14. B.

belförmiges Ansehen bekommt; die Flügel reichen, wenn sie zusammengelegt sind, etwas über ein Drittheil über ihn hinaus; die Füße sind dunkelbraun.

Männchen und Weibchen sind einander sehr ähnlich.

Mit diesem wurde ich zuerst durch Herrn Lightfoot bekannt gemacht, der mir sagte, er fände sich im May und Junius bey Bulstrode, in Buckinghomshire, vor, und nistе im Brombeer- und andere niedere Gesträuche. Sein Nest besteht aus dürren Binsen, mit Wolle vermischt, und ist inwendig mit Binsen von zärterm Gewebe, und hier und da mit einigen wenigen, weißen Roß- oder Kuhhaaren ausgelegt, aber doch nicht genug, um ein eigentliches Futter auszumachen. Die Eyer o) sind weiß, mit kleinen, braunen Punkten bezeichnet, und mit größern, unregelmäßigen Flecken von der nämlichen Farbe gegen das breitere Ende hin, so auch mit einigen andern Flecken von hellerm Braun, die unter letztere gemischt sind, das spitzige Ende ist ganz einfärbig.

Ich habe gute Gründe zu glauben, daß obige Art von den Schriftstellern nicht unter den Brittischen Vögeln beschrieben worden sey; und vermuthe sehr, sie sey nur sehr wenig vom Linne's Motacilla sylvia verschieden, wenn sie nicht der nämliche Vogel ist p). Daß Linne's Vogel meine gemeine Grasmücke q) sey, erhellt, glaube ich offenbar, sowohl aus der Größe als aus der Farbe. Linne' sagt ausdrücklich, er überträfe an Größe kaum den Weidenzeisig r), und habe große Aehnlichkeit mit dem Rohrsänger s). Daß aber der Vogel, von dem hier die Rede ist, weder der Weidenzeisig, noch der Rohrsänger sey, davon bin ich überzeugt, weil ich alle drey jetzt vor mir habe t).

153. Der

o) In dem Neste, das nur zu Gesichte kam, waren nur drey.

p) So viel ich sehe, ist ers nicht. B.

q) White-throat. s. oben No. 19. Uebers.

r) „Vix Motacilla Trochilo major.“

s) Er sagt vom Weidenich (Salicaria). „Avis valde affinis Sylviae, modo non sexu tantum distincta.“ Faun. suec. No. 249.

t) Da dieser Vogel hier von Latham zum erstenmal beschrieben wird, so will ich auch seine Beschreibung nochmals mittheilen, besonders da sie in etwas abweicht, ob ich gleich überzeugt bin, daß mein Vogel derselbe ist.

Seine Länge ist 4 3/4 Zoll und die Breite 8 Zoll. Der Schwanz ist 2 1/4 Zoll lang und die Flügel bedecken fast zwey Drittheile desselben.

Der Schnabel ist 4 Linien lang, oben ausgeschnitten, übergekrümmt und spitzig, der Oberkiefer hornbraun mit einer gelblich weißen Kante, der Unterkiefer gelblichweiß; die Nasenlöcher eyrund mit einzelnen schwarzen Barthorsten, die bis an den Mundwinkel laufen, überhangen; die Augen dunkelbraun, die Ränder derselben weiß; die Füße bleyfahl, gelblich überlaufen, die Zehe auf der untern Seite gelb, die Beine 10 Linien hoch, die Mittelzehe 8 Linien und die hintern 6 Linien lang.

Der ganze Oberleib mit den Deckfedern der Flügel ist schmutzig rostgrau, auf dem Kopf am dunkelsten und am Steiß am hellsten; bis zu den Augen läuft von den Nasenlöchern an ein schmutzig weißgelber Strich; die Kehle, ein Strich der Länge nach über den Bauch und der After sind weiß; der übrige Unterleib ist röthlichgrau, an den Seiten am dunkelsten, und nach der Mitte zu ins weiße übergehend; die Schwungfedern sind dunkelbraun, röthlich grau gerändert, die hintersten auch an den Spitzen weißgrau kantirt, die Schwanzfedern sind

153. Der Van Diemens-Sänger. (Van Diemen's W.) *t*)

Seine Länge ist siebenthalb Zoll. Der Schnabel hat die Länge des Kopfs, und ist schwarz; die Stirn ist mit weißen Streifen bezeichnet; die Stelle über den Augen, und die Wangen sind weißlich; der Rücken braun, mit Weiß gemischt; die Flügel hellbraun; die Ränder der weißen Flügelfedern außerhalb rothgelb, und dieß bildet einen Flecken von der nämlichen Farbe an den Flügeln; der Schwanz ist kürzer, als der Körper, und etwas keilförmig, der äußere Rand der Federn zur Hälfte von der Wurzel an, hell rothgelb, die zwey äußern zu beyden Seiten sind inwendig an den Spitzen, mit einem weißen Flecken bezeichnet; die untern Theile des Körpers weiß; Brust und After nach der Länge weiß gestreift; die Füße schwarz.

Er ist in Van Diemen's Lande zu Hause. — Aus den Papieren des Herrn Anderson's beschrieben.

154. Der mitternächtliche Sänger. (Equinoctial W.) *u*)

An Größe kommt er fast dem Haussperling gleich. Sein Schnabel ist dunkelfarbig; die Hauptfarbe muschelfärbigbraun, am hellsten am Steiß; die untern Theile des Körpers weiß; Schwungfedeern und Schwanz braun; letzterer ein wenig abgerundet, und mit verblichenen Streifen durchzogen.

Er ist auf der Weynachts Insel zu Hause, und singt mit einem kurzen Zwitschern, das nicht unangenehm ist, und einigermaßen dem der Grasmücke gleicht. Aus den nämlichen Papieren.

155. Der schwarzhälsige Sänger. (Black-necked W.) *w*)

Sein Schnabel ist gelb, die Wurzel blau; der Scheitel und der Hinterhals schwarz, und die Federn ziemlich lang, so daß sie nach der Willkühr des Vogels einen Federbusch bilden; die Seiten des Halses, die Brust und der Bauch röthlichweiß; der Rücken und die Deckfedern der Flügel lichtgrau; die großen Schwungfedern und der Schwanz schwarz; die Füße gelb.

Er ist in Indien zu Hause.

sind hellbraun, die äußersten die hellsten, alle aber an den dreyeckigen Spitzen weißgrau eingefaßt.

Ich habe zwischen Männchen und Weibchen auch nicht den geringsten Unterschied bemerken können.

Es ist ein vortrefflicher Sänger, der zwar nicht den reinen flötenden Ton des Mönchs hat, aber dafür seine schmatzende (schnalzende) Lockstimme mit in seinen Gesang einmischt, und ihn dadurch auf eine sehr angenehme Weise melodisch auszeichnet. B.

t) Sylvia canescens Latham Ind. orn. II. p. 553. n. 168. B.

u) Sylvia aequinoctialis Latham Ind. orn. II. p. 553. n. 169. B.

w) Sylvia nigricollis Latham Ind. orn. II. p. 559. n. 170. B.

156. Der bleyfarbige Sänger. (Plumbeous W.) *)

Lev. Mus.

Er ist nicht groß, und drey Viertel Zoll lang; sein Schnabel ist kurz, und dunkelbraun; das Gefieder an den obern Theilen dunkel bleyfarbig, fast schwarz; an den untern hell aschfarben; Schwungfedern und Schwanz dunkelbraan; die Füße schwarzbraun.

Sein Vaterland ist unbekannt.

Ich füge hier noch folgende, seit der Herausgabe dieses Werks bekannt gewordene Arten bey:

157. Der schwarzbraune Sänger.

Sylvia cambajensis. Latham Ind. orn. II. p. 554. No. 172.
Brit. Mus.

Er hat die Größe einer Nachtigall, und ist sechs Zoll lang, wovon der an der Spitze ungetheilte Schwanz drey Zoll einnimmt. Der Oberleib ist schwarzbraun; der Unterleib glänzend schwarz, unten am Bauch und After rostroth; die Deckfedern der Flügel weiß; die Füße dunkelbraun.

Sie hält sich im Indischen Reich Guzurat auf.

158. Der Guzuratische Sänger.

Sylvia guzurata. Latham. Ind. orn. II. p. 554. No. 173.
Brit. Mus.

An Größe gleicht er dem Weidenzeisig, und ist vier und einen halben Zoll lang. Der Schnabel und die Füße sind blaßbraun; der Oberleib ist dunkelgrün; der Scheitel rothbraun; der Unterleib weiß; die Schwung- und Schwanzfedern dunkelbraun am Rande grün; der Schwanz abgerundet.

Er bewohnt das Königreich Guzurat.

159. Der Asiatische Sänger.

Sylvia asiatica. Latham Ind. orn. II. p. 554. No. 174.
Brit. Mus.

Dieser Vogel hat die Größe einer Nachtigall, und gränzt seinem Ansehen nach an die Fliegenfänger. Der Schnabel ist schwärzlich, an der Wurzel mit einzeln Borsten besetzt; Kopf und

*) Sylvia plumbea Latham Ind. orn. II. p. 553. n. 171. B.

und Hals ſind ſchwarz; Zügel und Kehle weiß; der Oberleib dunkelbraun; der Unterleib gelblich; die Bruſt mit etlichen weißen Flecken beſetzt; der Schwanz drey und einen halben Zoll lang, keilförmig, die äußern Federn von der Mitte bis zur Spitze blaß.

Er hält ſich in Guzurat auf.

Var. A. Latham. I. c. β.

Dieſe Varietät, die mit dem vorhergehenden Vogel einerley Heymath hat, iſt dunkelbraun, an der Stirn, den Augenbraunen und dem Unterleibe weiß; eben ſo ſind auch die äußern Schwanzfedern die Hälfte weiß.

160. Der Südamerikaniſche Sänger.

Motacilla gularis. L. I. 2. p. 997. No. 171.
— — J. F. Miller or var. Subj. tab. 30. C.
Sylvia gularis. Latham Ind. orn. II. p. 592. No. 160.

Dieſer Vogel iſt oben roſtfarben; unten weiß; Kehle, Flügel und Schwanz ſind ſchwarz.

Er hält ſich in Südamerika auf.

161. Der Tſchekantſchiſche Sänger.

Motacilla tſchecantschia. L. I. 2. p. 997. No. 173.
Sylvia tschecantschia. Latham. Ind. orn. II. p. 552. No. 161.
Lepechin. It. II. p. 186.

Er iſt oben ſchwärzlich; unten roſtfarben; der Kopf ſchwarz; der Nacken weißlich; ein Halsband und ein länglicher Fleck auf den Flügeln weiß; der Rücken ſchwarz.

Man trifft ihn in Sibirien an.

162. Der Spitzkopf.

Motacilla Camtschatkénsis. L. I. 2. p. 997. No. 174.
Sylvia Kamtschatkensis. Latham. Ind. orn. II. p. 552. No. 162.
Longbilled Warbler. Arct. Zool. II. p. 420. O. Ueberſ. II. S. 393. O.
Meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 543. No. 21.
— — — Deutſchlands. IV. Taf. 25.

Pennant und Latham beſchreiben dieſen Vogel ſo. Er iſt kleiner als die Baſtardnachtigall. Der dünne Schnabel iſt ſehr lang; Stirn, Wangen und Kinn blaßroſtfarben; der Obertheil des Körpers und der Schwanz braun, olivenfarbig überlaufen; der Untertheil des Körpers von eben der Farbe, aber heller; der Bauch in der Mitte weiß. — Bewohnt Kamtſchatka.

Ich

Ich kenne diesen Vogel auch als einen Thüringischen, und darnach weiß ich denn, daß dieß das Weibchen ist.

Am Männchen ist der Oberleib schmutzigrostbraun, nach dem Steiße zu am hellsten und nach der spitzigen langen Stirn zu ins rostfarbige übergehend; von den Nasenlöchern bis zu den Augen geht ein schmutzigrothgelber Streifen; die Flügel sind dunkelbraun mit röthlichgrauer Einfassung; der Schwanz etwas spitzig, da alle Federn zugespitzt und die äußern etwas kürzer als die innern sind, dunkelbraun, am Ende am dunkelsten und auf den Mittelfedern am hellsten, alle Federn röthlichgrau eingefaßt; bey zusammengelegten Flügeln hat der ganze Oberleib die Rückenfarbe; der Unterleib ist schmutzigweiß, an der Brust, den Seiten und dem After rostgelb überzogen; die Füße sind schmutzig bleyfarben.

Ich kenne auch eine Varietät von diesem Vogel, die etwas kleiner ist, gerade die Farbe hat, nur mitten über den Schwanz eine röthlichgelbe Queerbinde. Sollte es eine besondere Art seyn, so würde ich sie Motacilla fasciata: Sänger mit der Schwanzbinde, nennen.

163. Der Uferfänger.

Motacilla littorea. L. I. 2. p. 977. No. 130. — S. G. Gmelin. It. III. p. 98. t. 19. f. 1.
Sylvia littorea. Latham Ind. orn. II. p. 552. No. 163.

Dieser Vogel ist oben dunkelgrün, unten ockerweiß; Schwung- und Schwanzfedern sind schwärzlich. Er bewohnt die Ufer des Caspischen Meeres, nährt sich von Würmern und singt schön.

164. Der langschnäblige Sänger.

Motacilla longirostris. L. I. 2. p. 978. No. 131. — S. G. Gmelin It. III. p 100. t. 19 f. 2.
Sylvia longirostris. Latham Ind. orn. II. p. 552. No. 164.

Dieser Vogel ist aschgrau; der Unterleib schwarz; der Schnabel lang.

Er wird auf den Bergen angetroffen, die ans Caspische Meer gränzen.

165. Der ockerschwänzige Sänger.

Motacilla ochrura. L. I. 2. p. 978. No. 132. — S. G. Gmelin It. III. p. 101. t. 19. fig. 3.
Sylvia ochrura. Latham Ind. orn. II. p. 552. No. 165.

Der Kopf ist aschfarben; Genick und Rücken vorn schwarz; die Kehle und Brust glänzend schwarz; der Schwanz rothgelb.

Er bewohnt die Persischen Gebirge.

Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Wistling. (Nr. 16.)

166. Der

166. Der finſtere Sänger.

Motacilla obscura. L. I. 2. p. 978. No. 133. Hablizl apud S. G. Gmelin. It. IV. p. 178. und Pallas N. Nord. Beytr. 4. S. 56. y)

Er hat die Größe der Nachtigall; der Schnabel iſt dunkelbraun; die Augenlieder ſind faſt nackt; der Scheitel und Nacken graulichbraun; der Oberleib hat Federn, die an der Wurzel aſchgrau, in der Mitte rothbraun und an der Spitze ſchwärzlich ſind; der Unterleib iſt aſchgrau; Steiß und After ſind weiß und aſchgraubunt; Schwung- und Schwanzfedern ſind ſchwärzlich, am äußern Rande rötlich; Füße und Nägel ſchwärzlich.

Er hält ſich auf dem Sunamiſiſchen Gebirgen in Perſien auf.

167. Der Sunamſiſche Sänger.

Motacilla sunamisica. L. I. 2. p. 978. No. 34. — S. G. Gmelin. It. IV. p. 181. 182. — Pallas N. Nord. Beytr. IV. S. 60.

Er hat die Größe des Blaukehlchens. Schnabel und Füße ſind ſchwarz; der Oberleib iſt röthlichaſchgrau; Kinn und Kehle ſind ſchwarz; Bruſt und Bauch röthlich, die Federn an den Spitzen weiß; der After weiß, eine weiße Linie geht vom Schnabel über die Augen weg bis in Nacken; die zwey mittlern Schwanzfedern ſind dunkelbraun, die an den Seiten rothgelb; die Deckfedern der Flügel und des Schwanzes haben weiße Ränder und Spitzen.

Dieſer Vogel bewohnt die ſteinigen Sunamiſiſchen Gebirge in Perſien.

Ich halte ihn für ein junges gemauſertes, auch wohl einjähriges Rothſchwänzchen-Männchen. Alles ſtimmt überein.

168. Der ſchöne Sänger.

Motacilla Cyana. L. I. 2. p. 992. No. 166.
Sylvia Cyane. Latham Ind. orn. II. p. 541. No. 122. — Pallas Reiſe III. S. 697. 18.

Der Oberleib iſt ſchön blau, der Unterleib ſchneeweiß; vom Schnabel bis zu den Flügeln geht ein ſchwarzer Streifen. Er hat die Größe und das Anſehen des Müllerchens, kommt aber dem himmelblauen Sänger ſehr nahe, außer daß er ſich durch den ſchwarzen Augenſtreifen, und die Seitenfedern des Schwanzes unterſcheidet.

Er hält ſich in den Dauriſchen Feldern zwiſchen dem On und Argun auf.

169. Der

y) Nach dem Hr. Latham beym vorigen Vogel in ſeinem Ind. orn. die ſpecifiſchen Merkmale angegeben hat, ſo führt er die ganze Geſchichte dieſes finſtern Sängers aus Gmelins Linneiſchen N. S. an. Dieß iſt doch allem Vermuthen nach ein Verſehen, da beyde Vögel gar nicht ſo ähnlich ſehen, daß ſie einerley Species ausmachen könnten. B.

169. Der Sänger mit der Kappe.

Sylvia cucullata. Latham Ind. orn. II. p. 528. No. 72.

Er hat die Größe des Sängers mit dem Hute Nr. 68., wovon er auch vielleicht bloß eine Varietät ist. Der Oberleib ist grünlich; der Unterleib gelb; Stirn und Wangen sind schwarz; der Schwanz keilförmig.

Er befindet sich in D. Parkinson's Museum, woher er kommt, ist nicht bekannt.

170. Der Schwarzkopf.

Motacilla melanocephala. L. I. 2. p. 920.
Sylvia atricapilla. Latham Ind. orn. II. p. 509. No. 7. — Cetti uc. Sard. p. 215. Uebers. II. S. 215.

Dieser Vogel ist kleiner als der Mönch (Nr. 5.), sonst ihm aber gleich, außer daß er einen rothen Bogen, um die Augen hat.

In Sardinien. Er kömmt von Seiten des Gesangs in gar keine Betrachtung, und obgleich dieser Vogel häufig in Sardinien angetroffen wird, so hat man doch in der Sardinischen Sprache keinen Namen für denselben.

171. Der rothkappige Sänger.

Motacilla moschita. L. I. 2. p. 970. No. 104. — Cetti uc. Sard. p. 215. Uebers. II. S. 215.
Sylvia moschita. Latham Ind. orn. p. 509. No. 8.

Er ist fünf Zoll lang; bleyfarbig und hat eine röthliche Haube.

Seine Heymath ist in Sardinien. Er soll oft ein Kuckucksey ausbrüten. Es ist dieß aller Wahrscheinlichkeit nach kein anderer Vogel als das Weibchen des Mönchs (Nr. 5.).

172. Der feuerfarbene Sänger.

Motacilla flammea. Mus. Carls. IV. No. 98.

Er hat die Größe des Goldhähnchens, und ist drey und ein halben Zoll lang. Der Schnabel ist pfriemenförmig, rundlich, grade, und so lang als der Kopf; die Nasenlöcher sind länglich und an der Wurzel des Schnabels; die Zunge gespalten; die Augen ganz schwarz; der vordern Schwungfedern sind sieben, der hintern neun; der Schwanz ist ganz und besteht aus zehn Federn; die hintere Zehe mit dem Nagel ist stärker als die übrigen; Kopf, Kehle, Hals und Rücken sind schön feuerfarben; Schnabel, Flügel, Füße und Schwanz sind schwarz; der Bauch ist grau.

Er wohnt in Java auf den Palmbäumen.

173. Der kleine Sänger.

Motacilla pusilla. White t. p. 257.
Meyers Zool. Entdeckungen. S. 56. No. 3.

Er ist oben dunkelbraun, unten blaß; der grade Schwanz hat nahe an der Spitze eine braune Binde.

In Neusüdwallis.

174. Die gesperberte Grasmücke.

Motacilla nisoria. Meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 537. No. 9.
N. G. Deutschlands. IV. Taf. 17.
Motacilla Ficedula. Faun. Suec. 2. p. 251.
Martini Naturlexicon. V. S. 54.

Sie hat die Größe eines Goldammers, und ist sechs und ein Viertel Zoll lang; der Schnabel ist oben hornbraun, unten schmutzigweiß; der Augenstern schön goldgelb; die starken Füße grau; der Oberleib aschgrau, bräunlich überlaufen; der Unterleib schmutzigweiß, mit vielen aschgraubraunen, wellenförmigen Queerlinien, die an der Kehle am dichtesten stehen, und am After große Flecken bilden; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern graubraun, grau röthlich geründet, die hintern Schwungfedern überdieß noch mit graulichen Spitzen; die Schwanzfedern graubraun, aschgrau überduftet, die äußerste auf jeder Seiten mit einem weißlichen Rande, die zweyte bis fünfte an der Spitze und am innern Rande weißlich, die beyden mittelsten einfarbig. — Das Weibchen ist oben und unten etwas heller.

Sie bewohnt das mittlere und nördliche Deutschland, hält sich in dichten Feldhölzern auf, singt angenehm, frißt Insekten und Beeren, macht ihr Nest in einen dunkeln Busch, mit Grashalmen und Thierhaaren, legt fünf bis sechs weißliche, röthlichgrau marmorirte Eyer, kömmt zu Anfang des Mais an, und zieht zu Anfang des Septembers wieder weg.

175. Der schwarzstirnige Sänger.

(S. das Titelkupfer.)

Motacilla nigrifrons.
Meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 543. Nr. 22. a)
Meine N. G. Deutschlands. IV. Taf. 27.

Er hat die Größe der Bastardnachtigall, und ist fünf und ein Viertel Zoll lang; der Schnabel ist gerade, läuft mit der langen Stirn spitzig zu, ist oben grünbraun, und unten schmutzig gelblichweiß; die Füße sind schmutzig bleyfarben; der Oberleib ist dunkelzeisiggrün; der Unterleib gelblichweiß; vor dem Scheitel liegt ein breiter schwarzer Queerstreifen; die Schwungfedern dunkelbraun, alle heller eingefaßt; die Deckfedern der Flügel wie der Rücken; die Schwanzfedern grade, wie die vordern Schwungfedern gefärbt, mit breiter Einfassung.

a) Hier habe ich ihn aber fälschlich, als das Männchen des Rohrsängers angegeben.

Das Weibchen ist etwas heller, und an der Stirn rosiröthlich, olivenfarben überlaufen.

Dieser Vogel ist selten, und hält sich vor dem Thüringerwalde in dichten Gebüschen und Gärten auf, die an Teichen und Flüssen liegen. Er kömmt im Mai an, und zieht zu Ende des Augusts wieder weg. In seinem Neste, das aus Grashalmen und Würzelchen besteht, liegen fünf Junge. Die Eyer aber habe ich noch nicht gefunden. Die Jungen sehen dem Weibchen ähnlich. B.

Zwey und vierzigste Gattung. Manakin.

Der Schnabel ist kurz, stark, hart, (an der Wurzel fast dreyeckig), und an der Spitze sehr wenig gekrümmt; die Nasenlöcher sind nackt; die mittlere Zehe ist mit der äußern bis zum dritten Gelenke verbunden [a]); der Schwanz kurz.

Diese Gattung gleicht beym ersten Anblick sehr der folgenden, oder den Meisen [b]), und ist, wie man glaubt, blos in Südamerika zu Hause; ich habe aber mehr, als einen von den unten beschriebenen Vögeln gesehen, die aus andern Ländern kamen, und eben so augenscheinlich zu dieser Gattung gehörten, als jene.

1. Der Felsenhahn. (Rock-Manakin.)

Pipra Rupicola. L. I. 2. p. 998. No. c).
Le Coq de roche. Briss. orn. IV. p. 437. No. 1. pl. 34. f. 1. — Buff. ois. IV. p. 432. pl. 20 d) — Pl. enlum. 39. (das Männchen.) 747. (das Weibchen.) — Vosmaer tab. 6.
Hoepoe Hen. Edw. pl. 264. e)
Crested Manakin. Gen. of Bird. p. 64. pl. 10. f).
Br. Mus. Lev. Mus.

Er hat die Größe einer kleinen Taube g), und zehn bis zwölf Zoll Länge. Sein Schnabel ist fünf Viertel Zoll lang, und gelblich von Farbe; (der Augenstern hellroth;) der Kopf ist mit

a) Dieser Charakter muß mit einiger Einschränkung verstanden werden; denn einige unten erwähnte Arten weichen in diesem Stücke etwas ab.
b) Titmouse Parus L. Uebers.
c) Latham Ind. orn. II. p. 554. n. 1. B.
d) Uebers. XIII. S. 109. B.
e) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 54 f. 2. B.
f) Naturforscher St. XI. S. 5. Taf. 1. St. VI. S. 13. St. XIII. S. 11. St. XVII. S. 13. St. XIX. S. 78. B.
g) Im Naturforscher wird behauptet, daß dieser Vogel zwar kleiner sey als ein Haushuhn, aber auch größer als eine Taube. B.

mit einem doppelten, runden Federbusch versehen; die Hauptfarbe des Gefieders ist orangen, ins saffrangelbe spielend [h]); die Schwungfedern theils weiß, theils braun; der Schwanzfedern zwölf an der Zahl, die Wurzelhälfte der zehn mittlern orangengelb, von hier an bis zum Ende braun, die äußern Federn braun, mit einer orangelben Wurzelhälfte der innern Fahne, alle aber an den Enden mit der nämlichen Farbe eingefaßt; die obern Deckfedern des Schwanzes sehr lang, von lockern Fahnen, und an den Enden viereckig; Füße und Klauen gelb [i]).

Das Weibchen ist ganz braun (schwärzlichbraun), die untern Deckfedern der Flügel ausgenommen, die gelbrothorangefarben sind, und sein Federbusch ist weder so vollständig, noch so abgerundet, wie der des Männchens.

Beyde, Männchen und Weibchen, sind anfangs grau, oder blaßgelb, ins Braune spielend, und das Männchen bekommt seine Orangenfarbe, und das Weibchen sein dunkles Braun nicht vor dem zweyten Jahre [k]).

Diese schöne Art ist in verschiedenen Gegenden von Surinam, Cayenne und Guiana, an felsenreichen Plätzen, zu Hause, nirgends aber so häufig, als in dem Gebirge Luca, am Flusse Oyapoc, und im Gebirge Courouaye, am Flusse Aprounack, wo sie in ausgehölte Löcher, und in die verborgensten Schlupfwinkel brütet. Sie legt zwey runde, weiße Eyer, von der Größe der Taubeneyer, und macht ihr Nest aus einigen Stückchen dürrer Reiser. Es sind überhaupt sehr scheue Vögel, doch hat man sie oft gezähmt, so daß sie im Freyen unter dem Federvieh herumliefen. Man sagt, wenn das Weibchen einige Jahr hindurch Eyer gelegt hat, und nun damit aufhöre, so bekomme es beym folgenden Mausern die nämliche Farbe, wie das Männchen, und könne mit diesem verwechselt werden [l]), worinnen es die Weibchen verschiedener Arten von Hausvögeln, als des Fasanen u. s. w. nachahmt, wie am gehörigen Orte bemerkt werden soll.

Ein sehr vollständiges Paar ist im Leverschen Museum.

1. Var. A. Der Peruanische Felsenhahn. (Peruvian M.)

Pipra Rupicola. L. I. 2. p. 998. No. 1. β. *m*)

Le

h) Einige Exemplare sind orangengelb, oder orangenroth; welcher Unterschied vielleicht bloß im Alter seinen Grund hat. Auch läuft die Farbe allezeit an der Spitze des Federbusches roth aus, so daß dieser dadurch eine artige Einfassung erhält. B.

i) Nach Füße und Schnabel zu urtheilen, so wie auch überhaupt nach dem ganzen Betragen, so haben diejenigen Naturforscher gar nicht unrecht, welche bey diesem Vogel viel Aehnlichkeit mit den Hühnerarten finden. Wie Hr. Professor Otto in der oben angeführten Stelle bey Büffons Uebersetzung sagt, so wußte selbst Linne', der ein lebendes Exemplar in seiner Sammlung bekam, nicht, wo er ihn hinsetzen sollte. B.

k) Mem. sur Cayenne vol II. p. 256.

l) Salerne orn. p. 144.

m) Pipra peruviana Latham Ind. orn. III. p. 551. n. 2. Hier macht Hr. Latham diese Varietät zu einer besondern Species, das sie auch zu seyn scheint, da die Abweichungen zu wesentlich sind. Wir wollen daher statt dieser Varietät eine andre beyfügen, die sich in Geringischen Museum zu Frankfurt befindet,

Le Coq de roche de Perou. Buff. ois. IV. p. 457. *n*) — Pl. enlum. 745.

Dieſer Vogel iſt länger als der vorhergehende, beſonders am Schwanze, und die obern Deckfedern deſſelben ſind an den Enden nicht abgeſtumpft; die Deckfedern der Flügel ſind auch nicht gefranzt, wie beym gemeinen Felſenhahn, und der Federbuſch iſt nicht ſo ſchön geformt, wie bey dieſem Vogel *o*); die Hauptfarbe des Gefieders ſpielt ſehr ins Rothe (iſt gelbroth); die kleinern Deckfedern und der Steiß ſind aſchfarben; Flügel und Schwanz ſchwarz; Schnabel und Füße, wie beym vorigen.

Er iſt in der Gegend um Peru zu Hauſe.

2. Der blaurückige Manakin. (Blue-backed M.)

Pipra Pareola. L. l. 2. p. 999. No. 2. *p*)
Manacus superbus. Pallas spicil VI. p. 8. tab. 3. fig. 1. *q*)
Le Manakin noir huppé. Briss. orn. IV. p. 459. pl. 35. f. 1. Pl. enlum 687. f. 2.
Le Tije, ou grand Manakin. Buff. ois. IV. p. 411. pl. 19. f. 2. *r*)
Tijeguacu. Will. orn. p. 218.
Blue-back Manakin. Edw. pl. 261. f. 1. *s*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Er hat die Größe eines Hausſperlings, und iſt fünfthalb Zoll lang. Der Schnabel iſt ſchwärzlich; der Augenſtern ſaphirblau; die Hauptfarbe des Gefieders ſchwarz, der Rükken ausgenommen, und die kleinern Deckfedern der Flügel, die ſehr ſchön blau ſind; die Federn auf dem Scheitel ſind verlängert, und bilden einen Federbuſch, der oben flach, in der Mitte aber und am Hintertheil gezähnelt iſt und nach Willkühr des Vogels aufgerichtet werden kann; ſeine Farbe iſt glühend karmoiſinroth; die Füße ſind roth.

Die jungen Vögel ſind anfangs über und über grün, den Federbuſch ausgenommen, der karmoiſinroth iſt, aber minder lebhaft. Ich bin hiervon überzeugt worden, indem ich hier und da Vögel mit einer Miſchung aus blau, grün und ſchwarz, in den verſchiedenen Graden der Annäherung zu ihrem vollkommenen Zuſtande, angetroffen habe.

Man

findet, und die im Naturforſcher St. XIX. S. 78. beſchrieben iſt.

Der gelblichweiße Felſenhahn.
P. R. lutea.

Die Krone iſt gelblichweiß, doch mehr weiß als gelb; die obere dunklere Einfaſſung an derſelben iſt ganz fahl; nur um die Augen herum befindet ſich ein dunkler orangenbrauner Flekken, der ſich etwas nach hinten zieht; Kopf und Hals ſind gleichfalls gelblichweiß; die orangengelbe Farbe des Körpers iſt häufig mit Schwefelgelben untermiſcht, daß jenes nur hier und da hervorſchimmert; auch die Schwanzfedern ſind alle hell; die Schwungfedern ſind wie gewöhnlich.

Sollten nicht etwa die jungen Männchen ſo ausſehen, ehe ſie ſich zum erſtenmal ganz vermauſert haben? B.

n) Ueberſ. XIII. S. 115. B.

o) Und beſteht es aus einzelnen loſen, zurückgelegten Federn. B.

p) Latham Ind. orn. II. p. 555. n. 3. B.

q) Dieſer iſt im Syſtem, S. 999. Nr. 14 als eine eigne Art, unter dem Namen: Pipra superba aufgeführt. Eben ſo in Lathams Ind. orn. II. p. 556. n. 4. ſ. unten Nr. 26. ob er mir gleich derſelbe Vogel zu ſeyn ſcheint. B.

r) Ueberſ. XIII. S. 70. Nr. 1. B.

s) Seligmanns Vögel XIII. Taf. 51. fig. 1. B.

Man hat mir auch geſagt, die Weibchen wären ganz olivengrün *t*), und blieben ihre ganze Lebenszeit hindurch ſo, bekämen aber doch einen Federbuſch, wie die Männchen; indeß will ich dieß nicht für gewiß ausgeben.

Dieſe Vögel ſind in Braſilien und Cayenne zu Hauſe, und man hat ſie auch auf der Inſel Cuba angetroffen.

Beyde oben beſchriebene ſind im Leverſchen Muſeum *u*).

3. Der weißſtirnige Manakin. (White-fronted M.)

Pipra serena. L. I. 2. p. 1002. No. 11. *w*)
— — Nov. Comment. Acad. Petrop. Vol. XI. p. 433. tab. 15. f. 2.
Le Manakin à front blanc. Briss. orn. IV. p. 457. No. 9. pl. 36. f. 2. — Pl. enlum. 334. f. 2.
Le Manakin varié. Buff. ois. IV. p. 423. *w*).
Lev. Mus.

Er hat die Größe eines Zaunkönigs, und viertehalb Zoll Länge. Sein Schnabel iſt einen halben Zoll lang, und ſchwarz; die Stirn erſcheint weiß, die Federn aber ſind an ihrer Wurzel ſchwarz, hierauf blau, und an den Spitzen weiß; am Scheitel fehlen die ſilberweißen Spitzen, daher erſcheint er blau; der übrige Kopf, der Hals, die Bruſt, der Körper, die Flügel und der Schwanz ſind ſammetfarbig bläulich ſchwarz; der Steiß iſt blau; Bauch, Schenkel und After ſchön orangegelb; die Füße ſchwarz.

Er iſt in Cayenne und Guiana zu Hauſe, aber nicht gemein.

4. Der ſchwarzkappige Manakin. (Black-capped M.)

Pipra Manacus. L. I. 2. p. 1002. No. 12. *x*)
Le Manakin. Briss. orn. IV. p. 442. No. 1.
Le Casse-noisette. Buff. ois. IV. p. 413. *y*)
Manakin du Bresil. Pl. enlum 302. f. 1.
Black-capped Manakin. Edw. pl. 260. f. 1. *z*)
Br. Mus, Lev. Mus.

Seine Länge iſt vier und ein Viertel Zoll. Der Schnabel iſt einen halben Zoll lang, und ſchwarz; Scheitel und Hinterkopf ſind ſchwarz; des Kinn, der Vorderhals und die untern Theile

t) ſ. Pl. enlum. 303. f. 2.
u) Lichtenſtein in Hamburgiſchen Naturalienverzeichniß 1793. giebt S. 52. Nr. 494. unter dem Namen des ſchwärzlichgrauen Manakins (Pipra aegithalodes) einen Vogel an, den er wahrſcheinlich für eine Varietät oder junges von blaurückigen Manakin hält. Er iſt ſchwärzlichgrau mit rothem Federbuſch, und grünlichſchwarzem Rücken, und kommt aus Cayenne. Vergl. Buffon Pl. enl. n. 303. f. 2. B.
v) Latham Ind. orn. II. p. 555. B.
w) Ueberſ. XVIII. S. 91. Nr. 6. B.
x) Latham Ind. orn. II. p. 556. n. 6. B.
y) Ueberſ. XIII. S. 73. Nr. 2. B.
z) Seligmanns Vögel VII. Taf. 50. f. 1. B.

le des Körpers weiß; und dieſe Farbe zieht ſich um den untern Theil des Halſes herum, und bildet einen Ring; an den Flügeln iſt ein weißer Fleck; das übrige Gefieder iſt matt ſchwarz; die Füße ſind orangefarben.

4. Var. A. Pipra Manacus. L. l. 2. p. 1002. No. 12. β. *a*)
Manakin à tête noire de Cayenne. Pl. enlum. 303. f. 1. *b*).

Dieß iſt genau der nämliche, aber der weiße Fleck an den Flügeln fehlt ihm; die Füße ſind gelb. Sehr wahrſcheinlich eine Spielart, oder eine Geſchlechtsverſchiedenheit.

Dieſe Vögel ſind in Guinea, beſonders an der Gränze der Wälder, gemein; denn ſie lieben die offnen Plätze und feuchten Wieſen nicht, wie andere Manakins. Sie halten ſich in kleinen Haufen zuſammen, wie andre dieſer Gattung, vermiſchen ſich aber nicht unter einander. Man findet ſie oft auf dem Boden, hier und da auf niedern Baumzweigen, häufig in der Nachbarſchaft der Ameiſenhaufen, und man hat bemerkt, daß ſie oft aufſpringen, weil ſie vermuthlich von den Ameiſen in die Füße gebiſſen werden, wobey ſie zugleich ein Geſchrey aufſchlagen, das dem Aufknacken einer Nuß nicht unähnlich klingt, und ſehr oft wiederhohlt wird. Sie ſind ſehr lebhafte Vögel, ja von raſtloſer Natur, denn man ſieht ſie ſelten in einer ruhigen Lage, ob ſie gleich keine große Strecke auf einmal fliegen können.

5. Der goldköpfige Manakin. Gold-headed M.)
Pipra erythrocephala. L. l. 2. p. 1003. No. 6.
Le Manakin à tête d'or. Briss. orn. IV. p. 448. pl. 24. f. 2. — Buff. ois. IV. p. 418. *d*) — pl. enlum 34. f. 1.
Gold-head black Titmouse. Edw. pl. 21. *e*) — Gen. of Birds. p. 64. pl. 10. f. 2.

Seine Länge iſt drey und ein Viertel Zoll. Der Schnabel iſt fünf Linien lang, und mattgelb; der Scheitel, der Nacken und die Wangen ſind lebhaft golden orangefarben; der übrige Körper, die Flügel und der Schwanz purpurfarbig ſchwarz; das Knieband (garter) orangefarben; die Füße fleiſchfarben.

5. Var. A. Pipra erythrocephala. L. l. 2. p. 1003. No. 6. β. *f*)
Le Manakin à tete rouge. Briss. orn. IV. p. 450. No. 5. — Buff. ois. IV. p. 418. *g*)
Tangarae alia species. Ray Syn. p. 84. No. 14.
Second Kind of Tongara. Will. orn. p. 244.
Lev. Mus.

Er hat die Größe und Länge des letzten. Sein Schnabel iſt ſehr kurz, und gelblich; der Scheitel karmoiſinroth; das übrige des Körpers; die Flügel und der Schwanz ſind ſchwärzlich,

a) Latham l. c. β.
b) Ueberſ. a. a. O.
c) Latham Ind. orn. II. p. 556. n. 7. B.
d) Ueberſ. XIII. S. 82. Nr. 5. B.
e) Seligmanns Vögel I. Taf. 41. f. 2. B.
f) Latham l. c.
g) Ueberſ. a. a. O.

mit glänzend ſtahlſchwarzen Rändern; die Schenkel weiß; die Auſſenſeite aber am Gelenk oder Knieband karmoiſinroth; die Füße gelblich.

6. Der weißkappige Manakin. (White-capped M.)

Pipra leucocilla. L. I. 2. p. 1002. No. 9. *b*)
Le Manakin a tête blanche. Briss. orn. IV. p. 446. No. 3. pl. 35. f. 2. — Buff. ois. IV. p. 416. *i*) — Pl. enlum. 54. f. 2. *k*)
White-capped Manakin. Edw. pl. 260.
Br. Mus. Lev. Mus.

Etwas kleiner, als der letzte, und drey und ein Viertel Zoll lang. Sein Schnabel iſt fünftehalb Linien lang, und graubraun; der Scheitel weiß; das übrige des Körpers ſchön ſchwarz, gleich polirtem Stahl; Füße und Klauen röthlich.

Linné hält die zwey vorhin beſchriebenen Vögel für bloße Spielarten. Büffon iſt der nämlichen Meynung, indem er annimmt, alle drey ſeyen entweder dem Alter oder dem Geſchlecht nach verſchieden. Die ſchwarze Farbe iſt bey allen überein. Herr Manoncour *l*) hat auch bey dieſem Vogel das rothe Knieband beobachtet, das man bey den andern beyden wahrnimmt; er ſagt aber, man fände es nicht allzeit.

Alle ſind in Guiana, ſo wie in Braſilien und Mexiko zu Hauſe, und halten ſich zuſammen; mehrentheils leben ſie in Wäldern, und haben die nämliche zwitſchernde Stimme, die faſt allen aus dieſer Gattung eigen iſt; Linné aber bemerkt, der zuletzt beſchriebne ſinge ziemlich artig, und ſitze im Schilfe.

7. Der weißköpfige Manakin. (White-headed M.)

Pipra leucocephala. L. I. 2. p. 1001. No. 8. *m*)
— — Mus. Adolph. II. p. 33.

Dieſer hat die Größe einer Bachſtelze, aber einen ſtärkern Schnabel. Der ganze Kopf iſt weiß; der übrige Körper ſchwarz; um den Mund herum ſtehn verſchiedene, ziemlich ſtarke Borſten.

Er iſt in Surinam zu Hauſe.

8. Der weißkehlige Manakin. (White-throated M.)

Pipra gutturalis. L. I. 2. p. 1002. No. 10. *n*)

Le

b) Latham Ind. orn. II. p. 557. n. 8. B.
i) Ueve ſ. XIII. S. 86. B.
k) Seligmanns Vögel VII. Taf. 50. f. 2 B.
l) Hist. des Ois. IV. p. 420.
m) Latham Ind. orn. II. p. 557. n. 9. B.
n) Latham Ind. orn. II. p. 557. n. 10. B.

Le Manakin à gorge blanche. Briss. orn. IV. p. 444. No. 2. pl. 36. f. 1. — Buff. ois. IV. p. 421. o) — Pl. enlum. 324. f. 1.
Br. Mus.

Seine Länge ist drey Zoll, acht Linien; die obere Kinnlade schwärzlich, die untere weiß; der ganze Körper schön schwarz, gleich polirten Stahl, den Vorderhals und die Kehle ausgenommen, die weiß sind; einige der Schwungfedern sind auch mehr oder minder weiß an den innern Fahnen; Füße und Klauen roth.

Er bewohnt die Heißen Länder von Amerika.

9. Der roth und schwarze Manakin. (Red et black M.)

Pipra aureola. L. I. 2. p. 1001. No. 7.
Le Manakin rouge. Briss. orn. IV. p. 452. No. 6. pl. 34. f. 3. — Buff. ois. IV. p. 415. q) — Pl. enlum. 302. f. 2.
Red et black Manakin. Edw. pl. 261. f. 2. r)
Br. Mus.

Seine Länge ist drey und drey Viertel Zoll. Der Schnabel ist einen halben Zoll lang, und schwarz; die Wurzel rund herum orangefarbig eingefaßt; Kopf, Hals, Kehle und Brust karmoisinroth, bey einigen orangefarben; Rücken, Steiß, Schulterfedern, die obern Deckfedern die Flügel und des Schwanzes, der Bauch und die Seiten schwarz, mit polirten Stahlglanz, der Mitte des Bauchs spielt ins Rothe rr); die Schenkel sind grau; an den Flügeln ist ein weißer Fleck, und unter denselben ist die Farbe gelb; Füße und Klauen sind roth.

Beym Weibchen sind die obern Theile des Körpers olivenfarbig, mit einer bloßen Spur von Rothem, das den Kopf gleich einer Krone umgiebt; die untern Theile des Körpers olivengelb; das Uebrige wie beym Männchen. Bey jungen Vögeln ist der ganze Körper olivenfarbig, Kopf, Kehle, Brust und Bauch ausgenommen, die rothgefleckt sind.

Diese Art ist sehr gemein in Guiana, und überhaupt unter allen dieser Gattung die gemeinste.

9. Var. A. Pipra aureola. L. I. 2. p. 1001. No. 7. β. s)
Le Manakin orangé. Briss. orn. IV. p. 454. No. 7. — Buff. ois. IV. p. 417. t)
— Pl enlum. 502. f. 3
Black et yellow Manakin. Edw. pl. 83. f. 2.
Br. Mus.

Er hat die Größe des letzten. Kopf, Hals, Brust Bauch und Seiten sind orangefarben; das übrige Gefieder schwarz, die Schenkel ausgenommen, die orangefarben und schwarz gemischt sind;

o) Uebers. XIII. S. 89. B.
p) Latham Ind orn. II. p. 558. n. 11. B.
q) Uebers. XIII. S. 76. Nr. 3. B.
r) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 51. f. 2. B.
rr) In den Pl. enlum sind die Stirn, die Kehle, das Kinn und der Flügelrand gelb.
s) Latham l. c. β.
t) Uebers. XIII. S. 80. B.

1. Der gestreiftköpfige Manakin. 2. Die grosköpfige Meise.

ſind; der Flügel iſt ſchmutzig orangefarbig; und in der Mitte der Flügel iſt ein weißes Fleck; Füße und Klauen ſind braun.

Er iſt auch in Guiana zu Hauſe.

10. Der blaue Manakin. (Little M.)

Pipra minuta. L. I. 2. p. 1003. No. 13. *v*)
— — Mus. Adolph. Fried. p. 34.

Er hat die Größe eines Zaunkönigs. Sein Kopf iſt ſchwarz, mit runden, weißen Flekken bezeichnet, an jeder Feder iſt ein Fleck; Rücken und Flügel ſind grau; die Bruſt gelblich, mit ſchwarzen Querſtrichen durchzogen; der Schwanz braun, mit blaſſen Rändern.

Das Männchen hat fleiſchfarbne Streifen am Vorderkopf; der Hinterkopf iſt weiß punktirt.

Er iſt in Indien zu Hauſe *).

11. Der streifköpfige Manakin. (Striped-headed M.)

(ſ. die erſte Figur der ſieben und funfzigſten Kupfertafel.)

Pipra striata. L. I. 2. p. 1003. No. 17. *w*)

Seine Länge iſt fünfthalb Zoll. Der Schnabel iſt braun; Scheitel und Nacken ſind ſchwarz, mit einem weißen Streifen längs des Schafts jeder Feder herab; der Hinterhals und der Rücken bräunlichaſchfarben, am Steiß ins Olivenfarbige ſpielend; zwiſchen dem Schnabel und den Augen iſt ein dunkelgelber Fleck; die Deckfedern der Flügel ſind bräunlich; die Baſtardflügel haben weiße, und einige der äußern Deckfedern gelbe Spitzen, und dieß bildet ein ſchiefes Fleck am äußern Rand des Flügels; die Schwungfedern ſind dunkelbraun, die dritte iſt verhältnißmäßig kürzer, als die andern, denn ſie iſt um einen Viertel Zoll kürzer, als die zweyte, obgleich die andern alle von gewöhnlicher Länge ſind *); die untern Theile des Vogels ſind gelblich, das am After ſehr blaß wird; die untern Deckfedern des Schwanzes ſind ſohlenlederfarben; der Schwanz ſchwarz, ſehr kurz, und die äußerſte Feder mit einer weißen Spitze bezeichnet; die Füße ſind dunkelfarbig.

Dieſen Vogel beſitzt Sire Joſ. Banks.

v) Latham Ind. orn. II. p. 558. n. 12. S. auch Ueberſ. von Büffons Vögel XIII. S. 108. B

w) Latham Ind. orn. II. p. 556. n. 13. B.

x) Dies iſt ein charakteriſches Zeichen, denn ich habe es an beyden Flügeln bemerkt.

*) Büffon (Picus cayanensis minus: Briſson ornithol. Ed. in 8. tom. II. p. 64 n. 32.?) und Pallas (N. Nord. Beyträge III. S. 5. Taf. 1. f. 2.) bezeugen, daß dieſer Vogel zu den Spechten gehöre. (Picus minutissimus Pallas l. c.) B.

Bisher *y*) bin ich über den Wohnort dieſes Vogels ungewiß geweſen; aus Herrn Anderſon's Papieren aber, erſehe ich, daß er in Van Diemens Lande zu Hauſe iſt. Ich halte es für keine unwahrſcheinliche Vermuthung, daß der braune Würger *z*) das andere Geſchlecht dieſer Art ſeyn möchte *a*).

12. Der gefleckte Manakin. (Spotted M.)

Pipra naevia. L. I. 2. p. 1003. No. 18. *b*)
Fourmillier tacheté de Cayenne. Pl. enlum 823. f. 2. *c*)

Seine Länge iſt vier Zoll. Der Schnabel iſt dunkelbraun; die obern Theile des Körpers, die Schwungfedern und der Schwanz ſind braun, die Spitzen des letztern weiß; Kehle und Kinn ſchwarz; die Bruſt und der obere Theil des Bauchs weiß; queer über die Bruſt und die Seiten ſtehen ſchwarze Flecken; an den Flügeln ſind zwey weiße Streifen; die Federn am untern Theil des Rückens, und einige innern, kürzern Schwungfedern ſind an den äußern Fahnen mit Weiß bezeichnet; der untere Theil des Bauchs, die Schenkel und der After ſind orangenfarbig; die Füße hellbraun, die äußere Zehe mit der mittlern faſt bis an die Spitze vereinigt.

13. Der weißöhrige Manakin. (White-eared M.)

Pipra leucotis. L. l. 2. p. 1003. No. 19. *d*)
Le Fourmillier à oreilles blanches. Buff. ois. IV. p. 477. — Pl. enlum. 822. f. 1. 2.

Er iſt vier und drey Viertel Zoll lang. Der Scheitel iſt braun; die Seiten des Kopfs und die Kehle ſind ſchwarz; die obern Theile des Körpers olivenfarbig und hell gelbroth gemiſcht; die untern bis zur Bruſt gelbroth, das übrige grau; zu beyden Seiten des Halſes iſt ein Saum (list) von glänzend weißen Federn, die länger, als die übrigen ſind, und unter den Augen ihren Urſprung nehmen; die Füße ſind braun.

Beym Weibchen ſind Kinn und Kehle weiß; von der Wurzel des Schnabels, unter den Augen weg, läuft ein grüner Streifen an beyden Seiten des Halſes herunter, der mit einem weißen Saume umgeben iſt, wie beym Männchen, und das übrige Gefieder iſt nicht ſehr verſchieden *e*).

Sie ſind in Cayenne, Guiana und andern Ländern von Südamerika zu Hauſe.

14. Der

y) Zuſ. a. d. Suppl. S. 188. Ueberſ.
z) ſ. Allgem. Ueberſ. I. B. 1. Th. S. 170. No. 47.
a) Im Ind. orn. l. c. β. wird dieſer braune Würger als Varietät wirklich aufgeführt, und geſagt, daß er entweder das Weibchen oder eine Spielart ſey. B.

b) Latham Ind. orn. II. p. 559. n. 14. B.

c) Ueberſ. XIII. S. 192. Anhang. ſ. oben B. II. Th. 1. S. 29. b) B.
d) Ueberſ. XIII. S. 185. Nr. 6. B.
e) Latham führt dieſen Vogel in Ind. orn. nicht an, weil er ihn, wie ſchon oben B. II. Th. 1. S. 76. t) erwähnt wurde, für eine Droſſelart hält, die dort unter dem Namen der weißöhrigen Droſſel ſchon einmal beſchrieben iſt. B.

14. Der purpurfarbige Manakin. (Purple M.)

Pipra cristata. L. I. 2. p. 999. No. 3. *f*)
Le Manakin rouge huppé. Briss. orn. IV. p. 462. No. 12.
Picicitli. Seba thes. Vol. I. p. 99. tab. 59. f. 4? — Buff. ois. IV. p. 426. *g*)
Serin de Surinam. Ferm. Surin. Vol. II. p. 194.?

Seine Länge iſt vierthalb Zoll. Der Schnabel iſt roth; der Scheitel mit einem gelben Federbuſche geziert; das übrige des Körpers, und die Flügel ungemein prächtig purpurfarben; der Schwanz roth.

Büffon bemerkt, daß dieß der ſogenannte Picicitli nicht ſeyn könne, weil ein unter dieſem Namen von Fernandez angeführter Vogel anders beſchrieben wird; nämlich: Aſchfarben mit ſchwarzem Kopfe und Halſe, und einem weißen Flecken, der ſeine großen Augen umgiebt, und bis an die Bruſt hervorläuft *h*).

Er iſt in Mexiko und Braſilien zu Hauſe.

Ich halte ihn für den oben erwähnten, und von Fermin beſchriebenen Surinamſchen Finken. Fermin's Vogel hat einen golden orangenfarbigen Federbuſch; der Körper iſt violet, gleich Amathiſt. Er ſetzt noch hinzu, der Vogel ſey kleiner, als ein Sperling, und ſeine Stimme nichts weniger als angenehm.

15. Der gelbe Manakin. (Yellow M.)

Pipra Rubetra. L. I. 2. p. 1000. No. 4. *i*)
Le Manakin roux huppé. Briss. orn. IV. p. 461. No. 11.
Rubetra, ou Oiseau d'Amerique huppé. Buff. ois. IV. p. 425. k) — Seba thes. Vol. I. p. 160. tab. 102. f. 4.

Er iſt vier, und ein Viertel Zoll lang. Sein Schnabel iſt ſiebenthalb Linien lang, und gelb. Dieſer Vogel hat einen gelben Federbuſch; die Hauptfarbe des Gefieders iſt gelblich; die Kehle braun; Schwungfedern und Schwanz lebhaft blau.

Er iſt in Braſilien und Cayenne zu Hauſe.

16. Der Manakin mit dem Halsbande. (Collared M.)

Pipra torquata. L. I. 2. p. 1000. No. 15. *l*)
Manakin à collier. Briss. orn. IV. p. 456. No. 8.

f) Latham Ind. orn. II. p. 559. n. 15. B.
g) Ueberſ. XIII. S. 96 Nr. 3 B.
h) Im Ind. orn. iſt dieß eine beſondere Art. ſ. unten Nr. 28. B.
i) Latham Ind. orn. II. p. 559. n. 17. B.
k) Ueberſ. XIII. S. 94. 2. B.
l) Latham Ind. orn. II. p. 560. n. 18. B

Maizi de Miacatototl. *m*) Seba thes. Vol. I. p. 52. pl. 57. f. 3. — Buff. ois. IV. p. 424. *n*)

Er hat die Größe des goldköpfigen Manakins (Nr. 5), und seine Länge ist fast vierthalb Zoll. Sein Schnabel ist fünfthalb Linien lang, und gelblich; der Kopf lebhaft roth; die Kehle und der Vorderhals goldgelb, in Gestalt eines Halsbandes; der Hinterhals, der Rücken, der Steiß, die Brust und die übrigen untern Theile schwarz; die Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern dunkelblau; der Schwanz schwarz; die Füße hellgelb.

Er soll in Brasilien zu Hause seyn; Büffon aber bemerkt, der Name, den er führe, sey Mexikanisch, und bedeute Mays-Vogel.

17. Der graue Manakin. (Grey M.)

Pipra grisea. L. l. 2. p. 1000. No. No. 16. *o*)
Le Manakin gris huppé. Briss. orn. IV. p. 463. No. 13.
Coquantototl, avicula cristata, forma Passeris. Seba thes. Vol. II. p. 74. tab. 130. f. 7. — Buff. ois. IV. 427. *p*)

Dieser gleicht an Wuchs einem Haussperling, und ist drey und ein Viertel Zoll lang. Sein Schnabel ist vier Linien lang und gelb; an der Stirn ist ein gelber Fleck; Kopf, Hinterhals, Rücken und Steiß sind grau; die Federn am Hinterkopf sind länger, als die übrigen, und bilden einen kleinen Federbusch; Kehle und Vorderhals, bis zum Schwanze lichtgelb; die größern Deckfedern der Flügel roth; Schwungfedern und Schwanz aschgrau.

18. Der Manakin mit weißem Gesichte. (White-faced M.)

Pipra albifrons. L. l. 2. p. 1000. No. 5. *q*)
Le Demi-fin à huppe et gorge blanches. Buff. ois. V. p. 335. *r*)
White-faced Manakin. Edw. pl. 344. *s*)

Dieser Vogel ist fünf und ein Viertel Zoll lang. Sein Schnabel ist drey Viertel Zoll lang, schwarz, gerade und spitzig; der Kopf ist mit einem Federbusch geziert, der aus langen, spitzigen Federn besteht, die nach Willkühr aufgerichtet und niedergelassen werden können; dieser Federbusch, so wie die Kehle und die Stelle zwischen den Augen sind weiß; über den Augen geht ein weißer Streifen weg; das Weiße an der Kehle ist ringsherum, von einem Auge zum an-

m) Fernandez beschreibt einen andern Vogel unter dem Namen: Miacatototl, von dem er blos sagt: er sey klein, und man habe ihn auf den Spitzen des Mays sitzend gefunden; er habe einen blassen Bauch, der übrige Körper sey schwarz, an den Flügeln einige weiße Federn; unter dem Schwanz sey die Farbe aschgrau; er halte sich an kalten Plätzen auf, und sey gut zu essen. s. Hist. Nov. Hispan. p. 30. (Diesen führt Latham im Ind. orn. n. 19. als eine besondere Art auf. s. unten Nr. 28. B.)
n) Uebers. XIII. S. 93. B.
o) Latham Ind. orn. II. p. 560. n. 30. B.
p) Uebers. XIII. S. 98. B.
q) Latham Ind. orn. II. p. 560. n. 21. B.
r) Uebers. XVI. S. 183. B.
s) Seligmanns Vögel IX. Taf. 34. f. 1. B.

andern, mit einem schwarzen Saume eingefaßt; das übrige des Körpers und der Schwanz sind orangefarben, ins Zimmetbraune spielend; der Hinterhals aber, die Mitte des Rückens und die Flügel sind schwärzlich aschfarben; die Schenkel dunkelaschfarben; die Füße röthlichgelb; die äußere und die mittlere Zehe hängen tief hinein zusammen.

18. Var. A. Pipra albifrons. L. I. 2. p. 1000. No. 5. β. t)
Le Plumet blanc. Buff. ois. V. 429. u).
Le Manicoup de Cayenne. Pl. enlum. 707. f. 1.

Dieser Vogel ist sechs Zoll lang, und seines Federbusches wegen merkwürdig, der aus fliegenden (scattered), weißen Federn besteht, deren einige über einen Zoll lang sind, und dem Vogel ein auffallendes Ansehen geben. Der Schnabel ist schwarz, drey Viertel Zoll lang und an der Spitze etwas gekrümmt; die ganze Stirn bis an die Augen, das Kinn und die Kehle sind wie der Federbusch weiß; und alles dieses Weiße ist schwarz eingefaßt, und zwar am breitesten am Hinterkopfe; Rücken und Flügel sind dunkelschwarz; der übrige Körper und der Schwanz lebhaft Zimmetfarben, ins Rostigrothe spielend; die Füße röthlich, und die äußere Zehe mit der mittlern bis ans zweyte Gelenk vereinigt, wie bey den übrigen Arten dieser Gattung.

Büffon will diese beyden für verschiedene Vögel gehalten wißen. Der zuletzt beschriebene kommt aus Guiana, wo er selten seyn soll. Er scheint einen viel längern Federbusch zu haben, als Edwards Vogel, der in einem unregelmäßigen, langen Büschel zu beyden Seiten über die Augen herabhängt; da hingegen der, bey Edwards, vollkommen regelmäßig ist. Ueberdieß ist der Schnabel bey Büffon's Vogel an der Spitze ein wenig gekrümmt, da der bey Edwards gerade ist. Inzwischen kommen sowohl die Farben selbst, als auch die Vertheilung derselben bey beyden vollkommen überein; so sind auch die Zehen bey beyden auf die nämliche Art verbunden. Ich habe ein Exemplar von dem, in dem Pl. enlum. abgebildeten Vogel gesehen, und finde es genau copirt. Edwards Vogel ist mir aber noch nicht zu Gesichte gekommen. Zuverläßig sind sie nichts anders, als Männchen und Weibchen mit einer geringen Abänderung vom Clima.

Edwards Vogel kam aus Südamerika.

19. Der schwarzköpfige Manakin. (Black-crowned M.)
Pipra atricapilla. L. I. 2. p. 1003. No. 20. v)
L'Oiseau cendré de la Guiane. Buff. ois. IV. p. 430.
Manakin cendré de Cayenne. Pl. enlum. 687. f. 1.

Seine Länge ist sechs Zoll. Der Schnabel ist sieben Linien lang, und schwarz; der Scheitel ist schwarz; die obern Theile des Körpers und der Schwanz sind hellaschfarben; die Stirn, die Seiten des Kopfs unter den Augen und alle untern Theile graulichweiß; die größern Deckfedern der Flügel und die Schwungfedern dunkelschwarz, mit grauen Rändern; der Schwanz länger als bey der Gattung Manakin w), und etwas keilförmig; die Füße hellgrau; die äußere Zehe tief einwärts mit der mittlern vereinigt, wie bey der letzten Art.

Er ist in Guiana zu Hause, ist aber nicht gemein.

20. Der

t) Latham l. c. β.
u) Uebers. B. XIII. S. 100. B.
v) Latham Ind. orn. II. p. 561. n. 22. B.

20. Der Papuaniſche Manakin. (Papuan M.)

Pipra papuensis. L. l. 2. p. 1004. No. 21. *x*)
Le Manikor. Buff. ois. IV. p. 431. *y*)
— — de la nouvelle Guinée. Pl. enlum. 707. f. 2.

Dieß iſt eine kleine Art, die nur drey und ein Viertel Zoll in der Länge mißt. Ihr Schnabel iſt kurz und ſchwarz; die obern Theile des Kopfs, des Halſes und des Körpers, die Flügel und der Schwanz ſind grünlichſchwarz; letzter iſt nicht ganz gleich am Ende, indem ſeine zwey mittlern Federn etwas kürzer ſind als die übrigen; die untern Theile, vom Kinn bis zum After ſind ſchmutzigweiß; an der Bruſt iſt ein länglicher, orangefarbner Fleck, der bis an den Bauch reicht; die Füße ſind dunkel bleyfarbig.

Er iſt in Neuguinea zu Hauſe.

Büffon glaubt, man ſollte dieſen Vogel nicht mit der Gattung Manakin verbinden, wegen des Landes, aus dem er gebracht wird; des Schnabels, der keinen Ausſchnitt hat; und wegen der Form des Schwanzes; vorzüglich aber deswegen, weil er annimmt, die ganze Gattung ſey bloß in Südamerika zu Hauſe.

21. Der Manakin mit karmoiſinrothen After. (Crimson-vented M.)

Lipra hoemorrhoea. L. l. 2. p. 1004. No. 22. *z*)

Seine Länge iſt drey und drey Viertel Zoll. Der Schnabel iſt blaß; die obern Theile ſind dunkelſchwarz, die untern weiß; am After iſt ein karmoiſinrother Flecken; die untern Deckfedern des Schwanzes ſind weiß, und reichen faſt bis ans Ende des Schwanzes, der ſehr kurz iſt, wie bey dieſer Gattung gewöhnlich; die Füße ſind braun.

Sein Vaterland iſt unbekannt.

22. Der ſchwarzkehlige Manakin. (Black-throated M.)

Pipra nigricollis. L. I. 2. p. 1004. No. 23. *a*)

Er iſt vier Zoll lang; ſein Schnabel iſt braun; die Hauptfarbe des Gefieders an den obern Theilen bläulichſchwarz; Kehle und After ſind ſchwarz; der Bauch weiß; die Füße braun.

Sein Vaterland iſt unbekannt.

23. Der

w) Man ſollte ihn nach der Abbildung zu urtheilen eher für einen Sänger als für einen Manakin halten. B.

x) Latham Ind. orn. II. p. 561. n. 23. B.

y) Ueberſ. XIII. S. 106. B.

z) Latham Ind. orn. II. p. 181. n. 24. B.

a) Latham Ind. orn. II. p. 561. n. 25. B.

23. Der orangenbäuchige Manakin. (Orange-bellied M.)

Pipra capensis. L. I. 2. p. 1004. No. 24. *b*)

Seine Länge ist vier Zoll. Der Schnabel ist schwarz; das Gefieder an den obern Theilen dunkelfarbig; der Flügelrand und alle untern Theile hellgelblich orangefarben; die Schwungfedern dunkelfarbig, mit hellen Rändern; die Füße dunkelfarbig.

Vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Die zwey letzten sind in Sire Jos. Banks Sammlung.

24. Der aschgraue Manakin. (Cinereous M.)

Pipra cinerea. L. l. 2. p. 1004. No. 25. *c*)
Br. Mus.

Er ist vierthalb Zoll lang. Die Hauptfarbe des Gefieders ist aschgrau, unten am hellsten der Bauch ist sehr blaß, ins Weiße spielend.

Sein Vaterland ist ungewiß.

25. Der musikalische Manakin. (Tuneful M.)

Pipra musica. L. l. 2. p. 1002. No. 26. *d*)
L'Organiste. Buff. ois. IV. p. 290. *e*) — Pl. enlum. 809. f. 1.
L'Eveque. Hist. de la Louis. Vol. II. p. 140.

Seine Länge ist vier Zoll. Der Schnabel ist dunkelfarbig; die Stirn gelb; Scheitel und Nacken blau; das Kinn, die Seiten des Kopfs unter den Augen, und die Kehle schwarz; der obere Theil des Rückens, die Flügel und der Schwanz dunkelschwarz, letzter kurz; der untere Theil des Rückens, der Steiß, die Brust, der Bauch, der After und die Schenkel orangefarben; die Füße dunkelfarbig.

Er ist auf St. Domingo zu Hause, wo er den Namen Organist bekommen hat, wegen seiner Stimme, die die vollständige Oktave auf die angenehmste Art bildet, so daß eine Note ununterbrochen auf die andere folgt. Er soll nicht selten, aber nicht leicht zu schießen seyn, weil er, wie der Baumläufer beständig nach der entgegengesetzten Seite des Zweiges hinhüpft, und so den auspassenden Zuschauer necket.

Wahrscheinlich ist dieß der nämliche Vogel, dessen du Praß, wie oben bemerkt worden, erwähnt; von dem er sagt, seine Töne seyen so mannigfaltig und lieblich, und er girre (warbles) so zärtlich, daß, wer ihn gehört hat, den Gesang der Nachtigall weit geringer schätzt. Er soll beynahe zwey Stunden lang fortsingen, ohne nur Athen zu holen, und nach einer ohngefähr eben so

b) Latham Ind. orn. II. p. 561. n. 26. B.
c) Latham Ind. orn. II. p. 562. n. 27. B.
d) Latham Ind. orn. II. p. 562. n. 28. B.
e) Uebers. XII. S. 89. III. B.

ſo langen Pauſe, wieder anfangen. Du Praz, der ihn ſelbſt gehört hat, ſagt, er habe auf einer Eiche geſungen, die an dem Hauſe ſtand, in welchem er ſich damals befand.

Zuſätze.

26. Der prächtige Manakin.

Pipra superba. L. I. 2. p. 999. No. 14.
— — Latham Ind. orn. II. p. 556. No. 4. *f*).
Manacus superbus. Pallas spic. I. p. 8. t. 3. f. 1.

Er iſt etwas größer als der roth und ſchwarze Manakin (Nr. 9), und kömmt dem blaurückigen (Nr. 2.) ſehr nahe. Der Schnabel iſt ſchwarz; die Füße ſind gelb; die Stirnfedern bedecken die Naſenlöcher; an den Naſenlöchern und Mundwinkeln, ſo wie an der Kehle ſtehen viele Barthaare; die Hauptfarbe iſt dunkelſchwarz; die länglichen Federn der Mitte des Scheitels ſind feuerroth; auf dem Rücken zwiſchen den Flügeln liegt ein mondförmiges Fleck von verwaſchenen Himmelblau; die ſpitzigen vordern Schwungfedern ſind bräunlich; der Schwanz iſt kurz und enthält zehn Federn.

27. Der Mexikaniſche Manakin.

Pipra Picicitli. Latham Ind. orn. II. p. 559. No. 16.
Avis Picicitli Tetzcoquensis. Fern. N. Hisp. p. 55. Cap. CC.
Ueberſ. von Büffons Vögeln. XIII. S. 96. 3.

Er iſt klein und aſchgrau, Kopf und Hals ſind ſchwarz; ein weißer Fleck umgiebt die Augen, welche groß ſind, und dieß Weiße zieht ſich in eine Spitze nach der Bruſt zu.

Dieſe Vögel halten ſich in Mexiko auf. Sie erſcheinen nach dem Regen; wenn man ſie aufzieht, ſo ſterben ſie bald; ſie haben keinen Geſang; die Indianer wißen nicht, wo ſie niſten; ſie geben ein gutes Nahrungsmittel. — Es iſt ungewiß, ob ſie zur Manakingattung gehören.

28. Der Mays-Manakin.

Pipra Miacatotl. Latham Ind. orn. II. p. 560. No. 19. *ff*)
Miacatototl, seu avis germinis Maizi. Fernand. Hist. N. Hisp. p. 30.
Ueberſ. von Büffons Vögeln. XIII. S. 92. 1.

Es iſt eine kleine Art. Die Farbe iſt ſchwarz mit untermiſchten weißen Federn; der Bauch blaß; Schwanz und Flügel ſind unten aſchgrau.

Er hält ſich in Neuſpanien auf. Man ſieht ihn auf der Fruchtähre des Mais ſitzen. Er liebt kalte Plätze und iſt gut zu eſſen.

29. Der

f) S. oben Nr. 2. Note. q)

ff) Vergl. oben Nr. 16. Note. m)

29. Der dreyfarbige Manakin oder Manakin mit blauem Gesichte.

Pipra tricolor. Museum Leskeanum. T. I. f. 1.

Dieser hat fast die Größe eines Canarienvogels. Die Hauptfarbe ist schwarz; Stirn Kehle, Schläfe und Schultern sind schön blau; die Schwung- und Schwanzfedern grünlich gerändet; Hinterkopf, Rücken, Brust und Bauch grün; Steiß und After auch grün.

Seine Heymath ist das Vorgebirge der guten Hoffnung.

Mit dem Finken mit blauem Gesichte (s. oben BII. Th. I. S. 307. Nr. 91), hat dieser Vogel die größte Aehnlichkeit,) vorzüglich nach Bankrofts Beschreibung, aber der Schnabel und grüne Bauch unterscheiden ihn. B.

Drey und vierzigste Gattung. Meise.

Der Schnabel ist gerade, etwas zusammengedrückt, stark, hart und scharf zugespitzt; die Nasenlöcher sind rund, und mit übergebogenen Borsten bedeckt; die Zunge am Ende abgeschnitten, und in drey oder vier Borsten auslaufend; die Zehen bis an ihren Ursprung getrennt; die hintere Zehe sehr groß und stark.

Dieß sind die Gattungscharaktere nach Pennants Gattungen der Vögel (Gen. of. Bird); und sie sind vollkommen hinreichend.

Ich finde nicht, daß eine Art dieser Gattung wandere, weder bey uns, noch anderswo. Ihre Nahrung ist im allgemeinen Saamen, Früchte und Insekten. Einige wenige sind sehr gierig auf das Fleisch, sowohl auf mageres, als fettes; besonders aber auf das letztere. Es sind unruhige, und nichts weniger, als furchtsame Vögel; denn einige, besonders die erste Art, wagen es, Vögel, die dreymal größer sind, anzugreifen; und oft fallen sie auch schwächere Vögel an, als sie sind, die sie dann tödten; oder, wenn sie einen todten finden, so picken sie in beyden Fällen ein Loch in die Hirnschaale, und fressen das Hirn gleich auf der Stelle.

Sie sind sehr fruchtbar, so daß sie zum Sprichwort geworden sind; einige legen achtzehn bis zwanzig Eyer auf einmal.

1. Die Kohlmeise. (Die große Meise. (Great Titmouse.)

Parus major. L. I. 2. p. 1006. No. 3. g) — Scop. ann. I. p. 162. No. 242. h) — Kram.

g) Latham Ind. orn. II. p. 562. n. 1. B. h) Uebers. von Günther. S. 199. n. 242. B.

Kram. elench. p. 378. No. 1. — Müller Zool. p. 34. No. 283. — Georgi Reise p. 175. — Olina uccell. p. 28. — Fritch tab. 13.

La grosse Mesange, ou Charbonniere. Briss orn III. p. 539, No. 1. — Buff. ois. V. p. 392. pl. 17. *i*) — Pl. enlum 3. f. 1.

Parus major, seu Fringillago. Ray Syn. p. 73. A. 1.

Great Titmouse, or Ox-eye. Will. orn. p. 240. pl. 43. — Albin. Vol. I. pl. 46. — Br. Zool. I. No. 162. pl. 27. f. 1. — Arct. Zool. II. p. 425. H. *k*)

Die Länge dieser bekannten Art ist fünf und drey Viertel Zoll, und ihr Gewicht beynahe eine Unze. Ihr Schnabel ist über einen halben Zoll lang und schwarz; Kopf und Kehle sind schwarz; die Wangen weiß; Rücken und Flügel olivengrün; der Bauch grünlichgelb; längs der Mitte desselben läuft ein unregelmäßiger, schwarzer Streifen, der ihn bis zum After hin in zwey Theile theilt; der Steiß ist blaugrau; die Schwungfedern sind dunkelfarbig, mit grauen Rändern; die größern Deckfedern haben weiße Spitzen, und dieß bildet einen Streifen an den Flügeln; der Schwanz ist dunkelschwarz, die äußern Federn an der Außenseite weiß, die andern aber blaugrau; die Füße bleyfarbig.

Dieser Vogel wird durch ganz Europa, so wie in den übrigen Ländern der alten Welt gefunden. Ich höre von ihm von Schweden bis zum Vorgebirge der guten Hoffnung. Bey uns ist er ein sehr gemeiner Vogel, der sich in den Gärten aufhält, die Brütezeit ausgenommen, wo man ihn mehrentheils in Wäldern sieht *l*). Er nistet in hohle Bäume, und legt acht bis zwölf weiße, vorzüglich am breiten Ende rostfarbig gefleckte Eyer. Nach der Heckzeit hält sich die Familie bis zum nächsten Frühjahr zusammen, wo sie sich dann Paarweise trennt, um eine folgende Generation zu erzeugen *m*). Man sagt, er nistle zweymal, ja sogar dreymal des Jahrs, wenn ihm die ersten Nester weggenommen worden sind.

So geringfügig seine Stimme ist, so ist sie doch nicht unangenehm; sie hat aber zu wenig Abwechselung, als daß man ihn seines Gesangs wegen hielte *n*); auch ist sein Fleisch nicht gut zu essen, indem es sehr bitter ist.

Ge-

i) Ueberf. XVII. S. 29. B.

k) Uebers. II. p. 398. A. Vergl. auch Zorns Pethinoth. II. S. 358. Pallas N. nord. Beytr. IV. S. 10. Meine N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 547. N. G. der Stubenvögel. Nr. 111. B.

l) Vor dem Thüringerwald nistet er auch in Gärten. B.

m) Im October versammeln sich mehrere Familien zu einer Heerde und ziehen so den ganzen Herbst und Winter durch von einem Garten und Wald zum andern. Wenn im Herbst verschiedne Züge auf einander folgen, so sagt man, es sey der Meisenstrich. B.

n) Sie singt ungemein abwechselnd und anmuthig; daher es auch in Thüringen ein gewöhnlicher Stubenvogel ist, den man aber in einen drähthernen Käfig hält, damit er, unter andern Vögeln frey herumlaufend, diese nicht tödte. B.

o) Olina.

p) Hr. Latham machet im Ind. orn. I. c. β. auch eine Varietät: 1) Die Kohlmeise mit dem Kreuzschnabel. Cross-billed Titmouse. Lewin Br. Birds 1. t. tit. praef. Sie ist oben dunkelolivengrün, unten schmutziggelb, der Kopf schwarz, die Schläfe aschgrau, der Schnabel übers Kreuz gebogen, wie bey einem Kreuzschnabel.

Sie wurde bey Faversham, einer Stadt in Kent getödet.

Gewöhnlich lebt er fünf Jahre o); er ſoll aber Krämpfen und andern Krankheiten unterworfen ſeyn p).

2. Die Norwegiſche Meiſe. (Norway T.)

Parus ignotus. L. I. 2. p. 1006. No. 15. q)
— — Brünn. orn. p. 72. r)

Ihr Schnabel iſt oben ſchwarz, unten gelb; der Hals und alle obern Theile des Körpers gelbgrün; die Bruſt gelb, mit kaſtanienbraunen Flecken; der Bauch blau; nahe am After gelblich; der Schwanz gabelförmig; von einerley Farbe mit dem Rücken; die zwey mittlern Federn grünlich, die zwey äußern an der Außenſeite weiß; die Füße ſchwarz; die hintere Klaue dreymal ſo lang, als die andern.

Brünnich vermuthete, ſie ſey eine Spielart von der Kohlmeiſe; ſie hat aber nichts Schwarzes am Kopfe s).

Sie iſt in Norwegen zu Hauſe.

3. Die laſurblaue Meiſe. (Azure T.)

Parus Cyanus. L. I. 2. p. 1007. No. 16. t).
— — Pallas Nov. Comment. Acad. Petrop. Vol. XIV. p. 588. No. 8. t. 23. f. 3.
Parus dorso dilute caeruleo, inferne albus etc. Lepechin ibid. p. 498. No. 1. tab. 13. f. 1.

Da ſie ganz wie eine Kohlmeiſe geſtaltet war, nur ſchmutzigere Farben und einen Kreuzſchnabel hatte, ſo glaube ich, ſie war aus der Stube kommen, wo die Vögel zuweilen ſo werden.

Ich habe auch kleine Kohlmeiſen geſehen, welches gewöhnlich die ſind, die zuletzt aus den Eyern kommen; allein eine beſondere Race kenne ich nicht. Ich glaube alſo, es iſt bloß eine Namensverwechſelung und es wird hier die Tannenmeiſe gemeinet.

2) Die kleine Kohlmeiſe.

Ueberſ. von Büffons Vögel XVII. S. 43. „Man kann ſie nur des Namens halber, ſagt Hr. Otto, mit der Tannenmeiſe, die auch kleine Kohlmeiſe heißt verwechſeln, von der ſie übrigens ganz verſchieden iſt, da die Farben kaum von der an der gemeinen großen Kohlmeiſe oder Finkenmeiſe verſchieden ſind, ſo daß ich es nicht wage, ſie als eine beſondere Art anzugeben, obgleich ſie ſich nicht mit dieſer großen paarweiſe zuſammen hält. Sie iſt ſeltener als dieſe im nördlichen Deutſchlande, und ich kenne ihr Neſt nicht. Die Schriftſteller haben ihrer, ſo viel ich weiß, nicht erwähnt, und wenn man ſie geſehen, hat man ſie vielleicht ohne genauere Vergleichung, wenigſtens in der Ferne, gar nicht verſchieden von der großen gehalten.“ B.

q) Parus Stroemei Latham Ind. orn. II. p. 353. n. 2. B.

r) Vergl. Arct. Zool. II. p. 426. β. Ueberſ. II. S. 398. β. Ueberſ. von Büffons Vögeln. XVII. S. 162. Zuſ. 1. B.

s) Ich glaube auch, daß es eine Varietät iſt, denn dieſer kömmt ſie am nächſten; und man hat auch nichts weder von ihr gehört. B.

t) Latham Ind. orn. II. p. 563. n. 3. B.

Parus Saebyensis Sparm. Mus. Carlson. pl. 25. *u*)
Parus Indicus Aldrovandi. Ray. Syn. p. 74. No. 7. — Aldrov. Av. II. p. 714 fig. in p. 715.
La grosse Mesange bleue. Briss. orn. III. p. 548. No. 3. — Buff. ois. V. p. 455. *v*)
Azure Titmouse. Arct. Zool. II. p. 426. C. *w*)

Sie hat die Größe der Kohlmeise, und sechsthalb Zoll Länge. Ihr Schnabel ist schwärzlichblau, die Ränder schmutzigweiß; Stirn, Scheitel, Wangen, und alle untern Theile weiß, außer einem unregelmäßigen, länglichen, blauen Zeichen von der Brust bis zur Mitte des Bauchs, und einen blauen Streifen vom Schnabel zwischen den Augen hindurch, nach dem Hinterkopfe hin, unter welchem ein blasses Band ist; Rücken und Steiß sind hellblau; die obern Deckfedern des Schwanzes dunkelblau, mit weißen Endspitzen; die Flügel weiß, bleyfarbig und blau gemischt, ersteres bildet ein Queerband über die Flügel; die Schwungfedern braun, an den großen ist der innere Rand weiß, der äußere blau, und gegen die Spitze hin sind sie weiß, die kürzern sind auch an den Spitzen weiß; der Schwanz ist blau, die äußern Ränder der Federn sind weißlich, und zwar am mehrsten je weiter sie auswärts stehn, bey der äußersten ist die ganze äußere Fahne weiß, und eben diese Feder ist auch kürzer, als die andern; Füße und Klauen sind schwarz.

Diese Art ist bisher nur sehr wenig bekannt gewesen, indem die ganze Geschichte von ihr aus einem Gemälde des Aldrovands *ww*) genommen war, der uns sagt, sie sey in Ostindien zu Hause.

Der hier beschriebne Vogel läßt sich durch ganz Rußland und Sibirien, aber nur im Winter sehen; wahrscheinlich kommt er von Norden her. Häufig trifft man ihn um die Vorstädte von Petersburg an.

Diese *x*) schöne Art ist in den nördlichen Gegenden Europens zu Hause. Sie findet sich in Südermanland *xx*), man hat sie auch in großer Menge in den nördlich gelegenen Wäldern von Sibirien und Rußland, so wie um Synbirsk, im Gouvernement Casan angetroffen. Sie ist ein Zugvogel, der im Winter bey den Häusern in Petersburg erscheint. Sie zwitschert wie ein Sperling, aber mit einer sanftern und angenehmern Stimme *y*).

4. Die rothsteißige Meise. (Crimson-rumped T.)

Parus peregrinus. L. I. 2. p. 1010. No. 10. *z*)

Sie

u) Diese ist im System als eine eigne Art aufgeführt: p. 1008. No. 17. und ich glaube es ist eine Varietät der Blaumeise. B.
v) Uebers. XVII. S. 15. und n. 5. B.
w) Uebers. II. S. 399. C. B.
ww) Aldrovands Vogel hatte einen schwarzen Flecken unter den Augen; und der Scheitel, so wie alle übrigen obern Theile des Körpers, waren hellblau; der Augstern gelb.
x) Zus. a. d. Suppl. S. 189. Uebers.
xx) Mus. Carlson.
y) Arct. Zool.
z) Latham Ind. orn. II. p. 564. n. 4. Parus coccineus Gmelin Syst. I. p. 1018. n. 31. Sparmann Mus. Carl. II. t. 48. 49. Uebers. von Büffons Vögel. XVII. S. 164. n. 2. Man vergl. auch das Weibchen vom pomeranzenfarbenen Fliegenfänger (s. oben B. II. Th. 1. S. 328. Nr. 26.) B.

Sie hat die Größe der Kohlmeiſe. Die Hauptfarbe iſt aſchgrau, unten ganz weiß; der Steiß karmoiſinroth; die Schwungfedern braun; der Schwanz ſchwarz, die vier mittlern Federn ſind an den Endſpitzen nach einer ſchiefen Richtung gelb, die zwey mittelſten aber haben das Wenigſte von dieſer Farbe *a*).

Ihr Wohnort iſt unbekannt.

5. Die rothhaubige Meiſe. (Crimson-crowned T.)

Parus griseus. L. I. 2. p. 1010. No. 18. *b*)
— — Müller Zool. p. 34. No. 284.

Die Hauptfarbe dieſes Vogels iſt grau, den Scheitel ausgenommen, der karmoiſinroth iſt *c*). Sie iſt in Grönland zu Hauſe.

6. Die ſchwarzbrüſtige Meiſe. (Black-breasted T.)

Parus afer. L. I. 2. p. 1010. No. 19. *d*)

Sie hat die Größe der Kohlmeiſe, und iſt ſechs Zoll lang. Das Gefieder iſt oben dunkelfarbig; die Seiten des Kopfs und die Augenkreiſe ſind weiß; an jeder Seite des Halſes iſt ein

a) Ich will nach der Abbildung in Spar manns Mus. Carls. die vollſtändige Beſchreibung mittheilen: die fremde Meiſe (Parus peregrinus). Das Männchen: dieſe Meiſe hat die Größe der Kohlmeiſe und iſt 5 ½ Zoll lang. Der Schnabel und die Füße ſind ſchwarz; die Zügel und ein Fleck unter den Augen ſchwärzlich; Kopf, Kehle, Hinter- und Seitenhals, Schultern und Rücken bleyfarbenaſchgrau; die Deckfedern der Unterflügel ſchwefelgelb, die obern ſchwarz, einige von den mittlern mit ſaffrangelben Spitzen; von den zwölf erſten Schwungfedern ſind die drey bis vier erſten braunſchwarz, am innern Rande in der Mitte etwas gelb gefleckt, die übrigen ſo wie die hintern alle ſchwarz in der Mitte ſcharlachroth; einen Theil der Gurgel, die Bruſt und der Steiß ſcharlachroth; der Bauch und After ſchwach gelb; die zehen Schwanzfedern ſchwarz, die drey äußern auf beyden Seiten nach hinten zu ſcharlachroth.

Sie ſtimmt in vielen Stücken mit der Motacilla cinnamomea L. I. 2. p. 985. n. 32. überein, weicht aber auch in andern wieder ab.

Das Weibchen iſt am Oberleibe aſchgrau, am Steiß vorn gelblichgrün, hinten rothgelb; Kehle, Gurgel, Bruſt und Bauch ſind ſchmutzig weiß; der After iſt gelblich; die Deckfedern ſind vorne ſchwarz, hinten gelb; von den Schwungfedern ſind die vordern dunkelbraun, die übrigen faſt alle ſchwarz, an der Wurzel rothgelb, und machen dadurch mit den hintern Deckfedern einen gelben Fleck auf den Flügeln; die Schwanzfedern ſind wie am Männchen, aber die fünfte iſt auch auf beyden Seiten ſchwarz, an der Spitze aber ſchief ſcharlachroth. Vergl. Syst. nat. XII. p. 342. n. 10. B.

b) Latham Ind. orn. II p. 564 n. 6. Ueberſ. von Büffons Vögel XVII. S. 167. Zuſ. 3. B.

c) Ich glaube, daß dieſer Vogel kein anderer iſt, als mein rothhaubiger Fink (S. II. B. 1. Th. S. 252. No. 4.) der aber ſein volles Gefieder noch nicht hat. (Und ich glaube, es iſt weder eine Meiſe noch ein Fink, ſondern das Goldhähnchen, das ſich immer in Geſellſchaft der Meiſen aufhält. B.

d) Latham Ind. orn. II p. 564. n. 7. — Ueberſ. von Büffons Vögeln XVII. S. 168. B.

ein Streifen von der nämlichen Farbe; am Hinterkopf ein weißer Fleck; Kinn, Kehle und Bruſt ſchwarz; der Bauch ſchmutzigweiß; die Schwungfedern braun; der Schwanz ſchwarz; die äuſſere Fahne der äußerſten Feder weiß, die nächſte an ihr hat nur eine weiße Spitze; die Füße ſchwarz.

Vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

In der Sammlung des Sire Joſ. Banks.

7. Die Tannenmeiſe. (Kleine Kohlmeiſe. Colemouse.)

Parus ater. L l. 2. p. 1009. No. 7. *e*) — Scop. ann. l. p. 164. No. 245. *f*) — Kram. elench. p. 369. No. 4. — Georgi Reise. p. 175. — Frisch tab. 13.
La Mesange à tete noire. Briss. orn. ll. p. 551. No. 5.
La petite Charbonniere. Buff. ois. V. p. 400. g)
Parus ater, or Colemouse. Ray Syn. p. 73. A. 2. — Will. orn. p. 241. t. 43.
Colemouse. Br. Zool. l. No. 164. pl. 57. f. 3. — Arct. Zool. ll. p. 424. No. 32 *h*).
Br. Mus. Lev. Mus.

Kleiner, als die **Blaumeiſe** (Nr. 10.), zwey Quentchen ſchwer, und vier Zoll lang. Ihr Schnabel iſt fünfthalb Linien lang, und ſchwarz; Kopf und Kehle ſind ſchwarz; vom Schnabel läuft zu beyden Seiten ein breites, weißes Band, gerade unter den Augen weg, nach den Seiten des Halſes hin; am Hinterkopf iſt ein breiter, weißer Fleck; der Hinterhals, der Rücken und der Steiß ſind aſchfarben; von der Bruſt bis zum After iſt die Farbe gelbröthlichweiß; die Deckfedern der Flügel ſind grau, mit weißen Spitzen, und dieß bildet zwey Bänder von dieſer Farbe; Schwung- und Schwanzfedern ſind bräunlich aſchfarben, mit grauen Einfaſſungen; der Schwanz ſelbſt etwas gabelförmig; Füße und Klauen bleyfarbig.

Dieſe iſt ſehr gemein in Wäldern, in Baum- und andern Gärten *i*), wo ſie einerley Nahrung mit den andern **Brittiſchen** Arten dieſer Gattung genießt, und eine große Anzahl Eyer legt. Man findet ſie durch ganz **Europa** und auch in **Amerika**.

8. Die Sumpfmeiſe. (Marſh T.)

Parus palustris. L. l. 2. p. 1009. No. 8. *k*) — Scop. ann. l. p. 164. No. 246. *l*) — Brünn. orn. No. 288. — Kram. elench. p. 389. No. 5. — Müller Zool.

e) Latham Ind. orn. ll. p. 564. n. 8. B.
f) Ueberſ. von Scopoli S. 201. Nr. 245. B.
g) Ueberſ. XVII. S. 44. B.
h) Ueberſ. ll. S. 397. n. 244. Vergl. auch Zorns Pethinoth. ll. S. 149. Meine N. G. des In- und Auslands. l. 1. S. 547. Nr. 2. N. G. der Stubenvögel. Nr. 112. und Pallas N. nord. Beytr. IV. S. 10. B.
i) Sie liebt vorzüglich die Schwarzwälder, wo ſie in Erd- Baum- und Felſenlöcher, auf eine Unterlage von klar gebiſſenen Erdmoos mit Thierhaaren vermiſcht 6 bis 8 reinweiße, hellen befarbenen getüpfelte rundliche Eyer legt. B.
k) Latham Ind. orn. ll. p. 565. n. 9. B.
l) Ueberſ. von Günther S. 201. Nr. 246. B.

Zool. p. 34. No. 286. — Georgi Reise. p. 175. — Frisch tab. 13. — Sepp. Voy. pl. in p. 48.

La Mesange de marais, ou la Nonnete cendrée. Briss. orn. III. p. 555. No. 7. — Buff. ois. V. p. 403. *m*) — Pl. enlum. III. f 3.

Parus palustris, Marſh Titmouse, or Black-Cap. Ray Syn. p. 73. A. 3. — Will. orn. p. 241. pl. 43. — Albin. III. pl. 58 f. 1

Marſh Titmouse. Br. Zool. I. No. 165. pl. 57. f. 4 — Arct. Zool. II. p. 427. E. *n*)

Br. Mus. Lev. Mus.

Dieſe iſt etwas größer, als die letzte, und weicht nur in einigen wenigen Stücken von ihr ab. Der Scheitel iſt ſchwarz, aber kein weißer Fleck am Hinterkopf; an der Kehle iſt ein kleiner weißer Fleck, aber nicht ſo groß, als bey der letzten; die obern Theile des Körpers ſind grau; die Deckfedern der Flügel bey einigen einfärbig (plain); die untern Theile weiß; die Füße, wie bey der letzten.

Dieſe iſt gemein bey uns in England, und wird von andern als ein Europäiſcher Vogel aufgeführt. Man findet ſie in Schweden, in Italien, und in den meiſten dazwiſchen gelegenen Ländern. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß ſie keine eigne Art, ſondern eine bloße Spielart von der letzten iſt *o*). Lebensart und Gewohnheiten (haunts) ſind die nämlichen *p*). Sie iſt eben ſo fruchtbar, als die andern. Sie ſammelt ſich einen Vorrath von Saamen auf den Nothfall, und liebt die Bienen ſehr.

In *q*) meiner Synopſis war ich noch ungewiß, ob die Tannenmeiſe und dieſe, verſchiedene Arten ſeyn. Ich finde, daß ſie nach Sepp's Meynung nur eine Art ausmachen, da er, beyde auf der nämlichen Platte, als Männchen und Weibchen abgebildet hat. Die eine hat einen weißen Fleck am Hinterkopfe, und die Seiten des Kopfs ſind weiß; die Kehle ſchwarz. Die andere hat einen ganz ſchwarzen Scheitel, und der ſchwarze Fleck an der Kehle fehlt. Das Neſt iſt hier aus Riedgras verfertigt, mit großen Kätzchen (cat's tail) untermengt, und mit Pflaum und Federn ausgelegt, in dem Neſte ſind fünf weiße, rothbraun geſprenkelte Eyer *r*).

8. Var. A. Parus palustris. L. I. 2. p. 1009. No. 8. *β*. *s*)
Le Mesange a gorge noire. Pl. enlum. 502. f. 1. *t*)

Dieſe iſt fünfthalb Zoll lang, und gleicht einigermaßen der letzten; es fehlen ihr aber ſowohl der weiße

m) Ueberſ. XVII. S. 57. I. B.

n) Ueberſ. II. S. 400. E. Vergl. Zorns Pethinoth. II. S. 149. Meine N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 548. Nr. 5. N. G. der Stubenvögel Nr. 115. Pallas N. Nord. Beytr. IV. S. 10. B.

o) Es iſt unwiderſprechlich eine beſondere Art. B.

p) Gar nicht. Man ſehe hierüber, was ich in meiner N. G. Deutſchlands IV. geſagt habe. B.

q) Zuſ. a. d. Suppl. S. 189. Ueberſ.

r) Sie bauen in Thüringen in die Löcher der Obſtbäume und legen 10 bis 12 roſtfarbenweiße mit gelbrothen Flecke bezeichnete Eyer. B.

s) Latham l. c. *β*.

t) Ueberſ. a. a. O.

weiße Fleck am Hinterkopf, als die Bänder an den Flügeln; der schwarze Fleck an der Kehle ist viel breiter und das Colorit überhaupt dunkler; der Schwanz etwas keilförmig *).

Beym Weibchen ist der Kopf gelbrothgrau, fast wie die obern Theile des Körpers, aber dunkler.

Sie ist in Louisiana zu Hause.

8. Var. B. Parus palustris. L. l. 2. p. 1009. No. 8. *y. v*).

Ich habe auch noch eine andere Spielart gesehen, die darin abgieng, daß sie kein schwarzes Kinn hatte, und daß alle untern Theile weiß waren. Bey einem Geschlechte war der ganze Kopf schwarz, mit einem weißen Bande queer über den Hinterkopf; bey dem andern war blos der Scheitel schwarz, und der Nacken gelblich.

Diese sind in der Sammlung des Sire Jos. Banks, und wurden am Bord eines Schiffes, an der Küste von Japan, gefangen.

9. Die Canadische Meise. (Canada T.)

Parus atricapillus. L. l. 2. p. 1008. No. 6. *w*)
La Mesange à tête noire de Canada. Briss. orn. III. p. 553. No. 6. pl. 29. f. 1. Buff. ois. V. p. 408. *x*)
Canada Titmouse. Arct. Zool. II. p. 424. No. 328. y)

Von der Größe der letzten, und fünfthalb Zoll lang. Der obere Theil des Kopfs und die Kehle sind schwarz; der Hinterhals, die Schulterfedern und die kleinern Deckfedern der Flügel dunkelaschfarben; der Steiß eben so, aber heller; die obern Deckfedern des Schwanzes schmutzigweiß; die Seiten des Kopfs und alle untern Theile, bis zum Schwanze, weiß; die Schenkel aschgrau; die größern Deckfedern der Flügel braun, mit grauen Rändern; die Schwungfedern braun, außen mit grauen, inwendig mit weißlichen Rändern; der Schwanz braun, mit grauen Rändern, die zwey mittlern Federn aschgrau; Füße und Klauen schwärzlich.

Sie ist in Nordamerika zu Hause.

10. Die Blaumeise. (Blue T.)

Parus caeruleus. L. l. 2. p. 1008. No. 5. *z*) — Scop. ann. I. p. 163. No. 245.

x) Diese Varietät gehört, wie man sieht, zur Tannenmeise; da aber unser Verfasser sie mit Büffon für einerley Art hält, so hat er sie nach Büffon hierher gesetzt. Hr. Pennant hält sie für einerley Art mit der folgenden Canadischen Meise. B.

v) Latham l. c. *y*.
w) Latham Ind. orn. II. p. 566. n. 10. B.
x) Ueberf. XVII. S. 67. N. 2.
y) Ueberf. II. S. 327 n. 245. B.
z) Latham Ind. orn. II. p. 566. n. 12. B.

245. *a*) — Kram. elench. p. 379. No. 3. — Ray Syn. p. 74. A. 4. — Müller Zool. p. 34. No. 285. — Frisch pl. 14.
La Mesange bleue Briss. orn. III. p. 544. No. 2. — Buff. ois. V. p. 413. *d*) Pl enlum III. f. 2.
Blue Titmouse. Albin. I. pl. 47. Will. orn. p. 242. pl. 43. — Br. Zool. I. No. 163. pl. 57. f. 2. — Arct. Zool. II. p. 427. D. *c*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre Länge ist fünfthalb Zoll. Der Schnabel ist fünfthalb Linien lang, und schwärzlich; der Scheitel blau; die Stirn und die ganze Seite des Kopfs weiß; vom Schnabel, zwischen den Augen hindurch, läuft eine schmale, schwarze Linie nach dem Hinterkopf hin, der, so wie der Hinterhals schwarz ist, und in eine schwarze Linie nach dem Schnabel hin ausläuft, die den untern Theil des Weißen an den Seiten des Kopfs umgränzt; der Rücken ist gelblichgrün; die Deckfedern der Flügel blau; die Schwungfedern schwarz mit dunkelfarbigen Rändern; der Schwanz blau, der äußere Rand heller, die zwey mittlern Federn am längsten; die untern Theile des Körpers gelblichweiß; Füße und Klauen schwarz.

Diese schöne Art ist durch ganz Europa wohl bekannt, und unsern Obst- und Baumgärten sehr schädlich, indem sie die Blüthenknospen aufbeißt, um Insekten zu suchen; inzwischen ist sie, nach Albin's Bemerkung, auf eine andere Art wieder nützlich, indem sie die jungen Raupen, und die Eyer der den Früchten nachtheiligen Insekten zerstört.

Das Weibchen macht ein Nest in die Löcher der Mauern oder Bäume, und legt es gut mit Federn aus; in dieses Nest legt sie eine große Zahl kleiner, weißer Eyer, wenigstens vierzehn bis funfzehn, obschon einige sagen, bis zwey und zwanzig *d*); doch brütet sie des Jahrs nur einmal, außer wenn das erste Nest ausgenommen worden ist. Sie verläßt ihr Nest leicht, auch wenn die Eyer bloß berührt worden sind, besonders aber wenn eines zerbrochen worden ist. Wenn aber die Jungen einmal ausgekrochen sind, so vertheidigt sie kein Vogel so muthig, als dieser.

Ihre Stimme besteht überhaupt in einem unangenehmen Geschrey, jezuweilen einen Versuch zu zwitschern (warble) abgerechnet; aber auch dieser ist nichts weniger, als angenehm *e*).

a) Ueberf. von Günther. S. 200. Nr. 2. 44. B.
b) Ueberf. XVII. S. 75. B
c) Ueberf. II. S. 299. D. Vergl. auch Zorns Pathnoth. II. S. 361. 2. Meine N. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 548. N. G. der Stubenvögel. Nr. 113. B.
d) Ich habe noch nie mehr als 8 bis 10 gefunden. B.
e) Hierher rechne ich als Spielart die Säbysische Meise. Parus Saebyensis L. 12. p. 1008. n. 17. — Mus. Carls. T. 25. Ueberf. von Büffons Vögel XVII. S. 84. Sie wurde auf des Ritters Carlsons Landgut Säby in Südermannland gefangen, und gehört unter diese Art. Der Leib und Schwanz sind weiß, so auch die Kopfplatte, der Oberrücken, eine Querbinde der Flügel und einige Schwungfedern; blau sind oben der Schwanz, ein Querflecken im Genicke und einige Schwung- und Schwanzfedern. Die obern Flügeldeckfedern sind blau, die untern weiß, und bilden einen weißen Querstreifen auf denselben. Die erste bis zur fünften Schwungfeder sind graubraun, am äußeren Rande weiß und an der Wurzel blau. Von der sechsten bis zur dreyzehnten sind sie gleichfarbig mit weißen Spitzen; die übrigen sind am äußern Rande blau, am innern aber und an den Spitzen weiß.

Der

11. Die Toupet-Meise. (Toupet T.)

Parus bicolor. L. I. 2. p. 1085. No. 1. *f*)
— — Faun. Groenl. p. 123. No. 84.
Le Mesange huppée de la Caroline. Briss. orn. III. p. 561. No. 9. — Buff. ois. V. p. 451. *g*)
Crested Titmouse. Catesby Carol. I. pl. 57. *h*)
Toupet Titmouse. Arct. Zool. II. p. 423. No. 324. *i*)

Sie hat die Größe der Kohlmeise, und ist sechs Zoll lang. Ihr Schnabel ist sechstehalb Linien lang, und schwarz; an der Stirn, gerade über dem Schnabel ist ein schwarzer Fleck; der Kopf ist mit einem ziemlich langen, spitzigen Federbusch geziert, der, wie alle obern Theile des Körpers dunkelgrau ist; die untern Theile sind röthlichweiß, am dunkelsten an den Seiten; Schwungfedern und Schwanz gelbrothgrau geändert, letzte etwas gabelförmig; die Füße bleyfarben.

Das Weibchen unterscheidet sich dadurch vom Männchen, daß bey ihm Bauch und Seiten fast weiß sind.

Dieser Vogel ist in Carolina und Virginien zu Hause, wo er sich das ganze Jahr hindurch, hauptsächlich in Wäldern aufhält, und, wie andere seiner Gattung, von Insekten lebt. Man hat ihn auch in Dänemark und in den südlichen Gegenden von Grönland anzutreffen, wo er Avingarsak heißt. Er fliegt schnell, und im Fliegen schlägt er oft die Flügel auf, wobey er einen sanften Laut hören läßt.

12. Die Haubenmeise. (Crested T.)

Parus cristatus. L. I. 2. p. 1005. No. 2. *k*) — scop. ann. I. p. 162. No. 243. *l*) Kram. elench. p. 379. No. 2. — Müller p. 34. No. 283. — Georgi Reise. p. 173. — Frisch tab. 14.
La Mesange huppée. Briss. orn. III. p. 558. No. 8. Buff. ois. V. p. 446. *m*) — Pl. enlum. 502. f. 2.
Crested Titmouse. Ray Syn. p. 74. No. 6. — Albin. II. pl. 57. — Will. orn. p. 242. tab. 43. — Arct. Zool. II. p. 427. F. *n*)
Br. Mus.

Sie

Der Schwanz ist blau, unten weiß; die vier obersten Schwanzfedern blau mit weißen Spitzen und schwarzen Schäften. Die Füße und der Schnabel fallen braungelblich aus. An beyden Seiten läuft von dem Schnabel an ein schwarzer Strich über die Augen.

f) Latham Ind. orn. II. p. 567. n. 13. B.
g) Uebers. XVII. S. 142. B.
h) Seligmanns Vögel. III. Taf. 14. B.
i) Uebers. II. S. 393. Nr. 241. B.
k) Latham Ind orn. II. p. 567. Nr. 14. B.
l) Uebers. von Günther. S. 199. B.
m) Uebers. XVII. S. 134. B.
n) Uebers. II. S. 400. F. Vergl. Zorns Pethinoth. II. S. 365. Meyers Thiere. II. Taf. 26. Meine N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 548. Nr. 4. N. B. der Singvögel. Nr. 114. B.

Sie hat die Größe der Blaumeiſe, wiegt ein Drittel Unze, und iſt vier und drey Viertel Zoll lang. Ihr Schnabel iſt ſechſthalb Linien lang, und ſchwärzlich; die Stirn und die Seiten des Kopfs ſind weiß; der Scheitel iſt mit langen, ſchwarzen, weißgeränderten Federn geziert, die wenn ſie aufgerichtet ſind, einen ſchönen, oben zugeſpitzten Federbuſch bilden; Kinn und Kehle ſind ſchwarz, wovon eine ſchwarze Linie nach dem Hinterkopf hinläuft, und das Weiße an den Wangen an den untern Theile umgiebt; an den Ohren iſt ein unregelmäßiger, ſchwarzer Fleck; die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz ſind gelbrothgrau, die zwey letzten am dunkelſten; die untern Theile des Körpers ſind weiß; die Seiten haben einen gelbrothen Anſtrich; die Füße ſind bleyfarben.

Dieſen Vogel findet man in vielen Gegenden Frankreichs, beſonders in der Normandie *), und in mehrern, zwiſchen dieſer und Schweden gelegenen Ländern. Man trifft ihn vorzüglich in dunklen Wäldern an, und beſonders bey den Nadelbäumen, ſo daß er an dem harzigen Geruche derſelben gleichſam Theil zu nehmen ſcheint. Er ſoll die Einſamkeit lieben, ſich niemals mit andern Vögeln vermengen, noch auch ſelbſt mit ſeiner eignen Art in großer Zahl zuſammenhalten †); auch läßt er ſich nicht zahm machen, daher er bekannt iſt, nur den wenigen, die ihn in ſeinem Aufenthaltsorte aufſuchen ‡). Er iſt eben ſo fruchtbar, als die übrigen ſeiner Gattung §).

13. Die Virginiſche Meiſe. (Virginian T.)

Parus virginianus. L. I. 2. p. 1010. No. 9. *s*)
La Mesange de Virginie. Briss. orn. III. p. 565. No. 14.
La Mesange à croupion jaune. Buff. ois. V. p. 153. *t*)
The Ye low-Rump. Catesby Carol. I. pl. 58. *tt*)
Virginian Titmouse. Arct. Zool. II. No. 325. *u*)

Dieſe iſt fünf Zoll lang. Ihr Schnabel iſt fünf Linien lang, und ſchwärzlich; der Kopf, und die obern Theile des Körpers ſind olivenbraun; die untern grau; der Steiß ſchön gelb; Füße und Klauen braun.

Männchen und Weibchen ſind einander ſehr ähnlich.

*) Weder um Paris, noch um Orleans trifft man ſie an. — Salerne orn. p. 216.

†) Er iſt im Herbſt und Winter immer der Anführer von den Tannenmeiſenheerden und Goldhähnchen; aber freylich nur immer einzeln. Es iſt in der That bewundernswürdig, daß dieſe Vögel auf ſein Geſchrey hinfliegen, wohin er ſie haben will. B.

‡) Er iſt ſchwer zahm zu machen. B.

§) Das Neſt findet man in allerhand Löchern, Steinen und Baumhöhlen, auch in alten verlaſſenen Elſter- und Eichhornneſtern. Die 8 bis 10 Eyer ſind ſchneeweiß, oben mit blaurothen Flecken, die oft zuſammengelaufen ſind, bezeichnet. B.

s) Latham Ind. orn. II. p. 567. n. 15. B.

t) Ueberſ. XVII. S. 148. n. 3. B.

tt) Setzmanns Vögel III. Taf. 16. B.

u) Ueberſ. II. S. 396. n. 242. B.

Sie ist in Virginien zu Hause, leb von Insecten, und läuft nach diesen mit großer Leichtigkeit die Bäume auf und ab, wie ein Specht.

14. Die Guianische Meise. (Guiana T.)

Parus Cela. L. I. 2. p. 1015. No. 14. *v*)
Le Cela. Buff. ois. V. p. 458. *w*)
Black Parus of Linnaeus. Kalm. Trav. II. p. 151. *x*)
Lev. Mus.

Der Schnabel ist weiß; das ganze Gefieder schwarz, einen gelben Flecken den an Flügeln, und einem andern an der Wurzel des Schwanzes ausgenommen.

Sie ist in Guiana zu Hause.

15. Die verliebte Meise. (Amorous T.)

Parus amatorius. L. I. 2. p. 1015. No. 30. *y*)
La Mesange amoureuse. Buff. ois. V. p. 456. *z*)

Diese Art wiegt drey Quentchen, und ist fünf und ein Viertel Zoll lang. Der Schnabel ist acht Linien lang, an der Wurzel schwarz und am Ende orangenfarben; das Gefieder ist über und über dunkelfleischfarben, beynahe schwarz, außer an der Mitte der Flügel, wo ein länglicher Fleck halb gelbroth, und halb gelb steht, der von den äußern Rändern einiger der mittlern Deckfedern der Flügel gebildet wird, die diese Farben haben.

Sie ist in den nördlichen Gegenden Asiens zu Hause, und wird ihres Temperaments (disposition) halber, die verliebte (Amorous) genannt. Man hat sie im Käfig gehalten, und in diesem Zustande der Gefangenschaft, wenn sie Paarweiße beysammen sind, kann nichts die Liebe des einen Geschlechts zum andern übertreffen, indem sie sich beständig liebkosen, und hierdurch erleichtern sie sich die Unannehmlichkeit der Gefangenschaft, und machen sie sich erträglich.

16. Die Beutelmeise. (Der Pendulin. Penduline T.)

Parus pendulinus. L. I. 2. p. 1014. No. *a*)
— — Georgi Reise. p. 175.
La Mesange de Pologne, ou le Remiz. Briss. orn. III p. 565. No. 11. pl. 9. f. 2. — Buff. ois. V. p. 423 *b*) — Pl. enlum 608 f. 3.
Mountain Titmouse. Albin. III. pl. 57. (Männchen und Weibchen.)

An

v) Latham Ind. orn. II. p. 568. n. 56. B.
w) Uebers. XXII. S. 160. B.
x) Vergl. Bankroft Guiana. S. 110. B.
y) Latham Ind. orn. II. p. 568. n. 17. B.
z) Uebers. XVII. S. 156. B.
a) Latham Ind. orn. II. p. 568. n. 18. B.
b) Uebers. XVII. S. 95. B.
c) Titius Beschreibung des Remitz Leipzig 1785. Vergl. meine N. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 550. Nr. 8. B.

Am Größe gleicht sie der Blaumeise und hat über fünfthalb Zoll Länge. Ihr Schnabel ist fünf Linien lang, und aschfarben; der Vorderkopf weißlich, der Hinterkopf und der Hals aschgrau; der obere Theil des Rückens und die Schulterfedern gelbrothgrau; der untere Theil und der Steiß grau; die Stirn schwarz, und dieß verlängert sich nach hinten in ein Band unter jedem Auge; Kehle und Vorderhals sind sehr hell aschfarben; die übrigen untern Theile hell gelbroth; die obern kleinern Deckfedern der Flügel braun, mit gelbrothen Spizzen, die größern schwärzlich, mit kastanienbraunen Rändern, und hellgelbrothen Spitzen; Schwungfedern und Schwanz braun, mit weißen Rändern, die Füße röthlich grau; die Klauen schwärzlich.

Diese Art ist nicht bloß in Polen, woher sie, von einigen benannt worden ist, sondern auch in Italien, Sibirien *) und den dazwischen gelegenen Ländern zu Hause.

Das Merkwürdigste von diesem Vögel ist sein Nest, denn wunderbarer kann man gar nichts sehen. Es ist rundlich geformt, dem der Schwanzmeise (Nr. 18.) nicht unähnlich, aber aus viel feinerm Stoff zusammengesetzt.

Der Vogel hält sich an wasserreichen Plätzen auf, der Wasserinsekten wegen, von denen er lebt, und bedient sich des Pflaums von Weiden und Pappeln, so wie des der Disteln, u. d. gl. Diese wirket er mit seinem Schnabel in einen dichten Körper zusammen, unterstützt dieses sein Werk von außen mit zarten Pflanzenfasern und Wurzeln, und legt das Ganze inwendig wieder mit etwas von dem oben erwähnten lockern und weichern Pflaum aus. Dieses Nest hängt an dem äußersten Ende eines schwachen Zweiges, der über das Wasser herüber reicht, und ist ganz bedeckt, eine kleine, zum Eingang gelassene Oeffnung ausgenommen, die an der einen Seite, gewöhnlich an der dem Wasser gegen überstehenden angebracht ist. Mit diesem sonderbaren Instinkt, fürchtet er weder vierfüßige Thiere, noch kriechende Amphibien; denn keine von beyden können ihm, weder von oben, noch von unten beykommen.

Das Weibchen legt vier bis fünf Eyer, so weiß, wie Schnee, und beynahe durchscheinend; es brütet gewöhnlich zweymal des Jahrs, zuerst im April oder May, und dann wieder im August.

Diese Nester sieht man häufig in den Sümpfen um Bologna, und an andern Orten. Die Landleute, die in diesen Gegenden wohnen, machen großen Gebrauch sowohl von den Vögeln, als von ihren Nestern; und von den letztern hängen sie eines an die Thür ihrer Hütten. Was dem Vogel selbst betrifft, so halten sie ihn für heilig, und begegnen ihm mit jener abergläubischen Verehrung, die gewöhnlich die Wirkung unaufgeklärter Köpfe ist.

17. Die

*) Sie ist gemein in Rußland; in grofer Menge um Sundärf, am Yaik, ob man sie gleich auch an der Wolga und anderwärts sieht. S. Decouv. Russ. I. p. 480. III. p. 363.

17. Die Languedokiſche Meiſe. (Languedoc T.)

Parus narbonensis. L. I. 2. p. 1014. No. 39. *e*)
La Penduline. Briss. ois. V. p 433. *f*)
Mesange du Languedoc. Pl. enlum. 708. f. 1.

Ihre Länge iſt vier Zoll. Ihr Schnabel iſt vier Linien lang, ſchwarz, der Rand der obern Kinnlade gelbbraun; der Scheitel grau; die obern Theile des Körpers gelbrothgrau; die untern eben ſo, aber heller; die obern Deckfedern der Flügel ſchwärzlich, mit gelbrothen Rändern; die kürzern Schwungfedern eben ſo, an den Enden aber heller; die großen Schwungfedern ſchwärzlich, mit weißlichen Rändern; der Schwanz auch ſchwarz, aber mit gelbrothen Rändern; die Füße bleyfarbig *g*).

Man trifft dieſen Vogel in Languedok an, und was ſeine Kunſttriebe (manners) anbelangt, ſo mag er den vorigen wohl noch übertreffen; denn ſein Neſt iſt eben ſo künſtlich gebaut, ziemlich groß, in Verhältniß zu der Größe des Vogels, an Form einem Strafeney ähnlich, und auch nicht viel kleiner; denn der längſte Durchmeſſer deſſelben iſt ſechs, und der kürzeſte vierthalb Zoll. Er befeſtigt es an einem gabelförmigen Zweig eines Pappelbaums, und umwickelt es mit Wolle, hiezu bedient er ſich des Pflaumartigen Theils der Pappelblüthen, und anderer ähnlicher Materialien, wie die letzte Art. Es iſt ebenfalls an einer Seite offen, der Eingang aber noch überraſchender; denn der Vogel baut eine Art von Wetterdach über denſelben, das faſt drey Viertel Zoll weit hervorſpringt, und hiedurch gewinnt er noch mehrere Sicherheit gegen den Wind, den Regen und andere Ungemächlichkeiten.

In Languedok wird er der wilde Canarienvogel genannt.

18. Die Schwanzmeiſe. (Long-tailed T.)

Parus caudatus. L. I. 2. p. 1010 No. 11. *i*) — Scop. ann. I. p. 164. No. 247. *k*) Kram. elench. p. 379. No. 6. — Frisch. tab. 14. — Ray Syn. p. 74. A. 5. — — Sepp. Vog. pl. in p. 49.
La Mesange à longue queue. Briss. orn. III. p. 510. No. 13. — Buff. ois. V. p. 437. pl. 19. k) — Pl. enlum 502. f. 3.
Long-tailed Titmouse. Will. orn. p. 242. pl. 43. — Albin. II. pl. 57. f. 1. Br. Zool. I. No. 166. — Arct. Zool. II. p. 428. G. *l*)
Bi. Mus. Lev. Mus.

Dieß iſt ein ſchöner Vogel, und ſeine Länge beynahe ſechsthalb Zoll. Der Schnabel iſt kurz, dick und ſchwarz; der Augenſtern nußbraun; der Scheitel weiß, mit Grau gemiſcht, und dieß

e) Latham Ind. orn. II. p. 569. n. 19. B.
f) Ueberſ. XVII. S. 110. B.
g) Die Beſchreibung iſt faſt wie bey einem jungen Goldhähnchen. B.
h) Hist. des Ois.
i) Latham Ind. orn. II. p. 569. n. 20. B.
k) Ueberſ. von Günther S. 202. Nr. 247. B. kk) Ueberſ. XVII. S. 115. B.
l) Ueberſ. II. S. 400. G. Vergl. auch Zorns Pethmoth. II. S. 366. und B. I. p. 324. Meine N. G. Deutſchlands. I. 1. S. 549. Nr. 6. Meine getreue Abbildungen Heft. 2. Männchen und Weibchen. B.

dies ist ringsherum mit einem breiten, schwarzen Streifen, gleich einer Krone eingefaßt, der sich hinten vereinigt, und längs dem Hinterhals und Rücken, bis zum Steiß herabläuft; die Seiten des Kopfs, und alle untern Theile bis zur Brust sind weiß, letztere aber spielt ins Röthliche; die Seiten des Rückens, der Steiß, der Bauch, die Seiten und der After sind matt rosenroth, haben aber eine Mischung von Weißem an den untern Theilen; die kleinern Deckfedern der Flügel sind schwarz; die größern braun, mit rostfarbenen Rändern; die Schwungfedern dunkelfarbig mit hellen Rändern; der Schwanz beträgt über die Hälfte der Länge des Vogels, denn er ist vierthalb Zoll lang; seine Federn sind von sehr ungleicher Länge, denn die äußern sind nur einen und drey Viertel Zoll lang *m*), die vier mittlern sind schwarz, die dritte zu beyden Seiten ist eben so, mit grauen Rändern, und die andern sind schwarz und weiß; Füße und Klauen schwarz *n*).

Kein Vogel in unsern Gegenden macht ein so eignes und schönes Nest, als dieser. Es ist gewöhnlich eyförmig, mit einer kleinen Oeffnung *o*) an der Seite zum Eingange; die äußern Materialien sind Moos, Leberkraut und Wolle, die sonderbar unter einander gewebt sind und inwendig ist es vollkommen mit den weichsten Federn ausgelegt. Dieses Nest hängt nicht, von einem Zweige herab, wie einige andere dieser Gattung, sondern es ist fest an die Gabel eines Astes angelegt, drey oder vier Fuß hoch vom Boden *p*). Er legt gewöhnlich zehn bis siebenzehn Eyer, die graulich sind, mit einer Mischung von Röthlichem, aber heller am breitern Ende.

Dieser Vogel scheint in den meisten Gegenden gemein genug zu seyn, vorzüglich aber ist er es in Obst- und andern Gärten, wo er die Knospen mit großer Geschicklichkeit aufbeißt. Es ist ein flinkes, unruhiges Thierchen, das immer vor und rückwärts fliegt, und auf den Zweigen

m) Die meisten Vögel mit keilförmigen Schwänzen beobachten eine regelmäßige oder stufenweise Ungleichheit in den Schwanzfedern; dieser aber ist wahrhaft sonderbar, denn die zwey mittlern Federn sind drey Zoll, zwey Linien lang, die nächste zu beyden Seiten vierthalb Zoll, die dritte drey und einen Viertel Zoll, die vierte drey Zoll, die fünfte zwey Zoll, sieben Linien, und die sechste, oder äußerste, nur einen und drey Viertel Zoll.

n) Männchen und Weibchen sind in ihren vollkommnen Zustande folgender Gestalt gezeichnet: Am alten Männchen ist der ganze Kopf und Hals rein weiß, und nur bey jungen und einjährigen Männchen findet man noch einen schwarzen Streifen und schwarze Mischung um den Scheitel herum. Das Weibchen hingegen hat die Zeichnung des Kopfs so, wie sie der Hr. Verfasser vom Männchen angiebt. Von den Augen an läuft nämlich ein schwärzlicher Streifen nach dem Hinterkopf hin und vereinigt sich da mit den andern schwarzen Theilen. Diejenigen Schwanzmeisen die am Kopf mehr gefleckt sind, sind Junge, die sich noch nicht, oder nur zum erstenmal gemausert haben, und die man im Winter oder Herbst, wo diese Vögel in Gesellschaft herum ziehen, fängt oder schießt. Wenn man den Geschlechtsunterschied in der Farbe bemerken will, so muß man ein Päärchen im Frühjahr zu bekommen suchen. B.

o) Frisch bemerkt, es wären zuweilen zwey Eingänge, einer dem andern gegenüber, damit der Vogel beym Umwenden seine Federn nicht verwirre.

p) Es steht oft in der Mitte der höchsten Eiche, und ist meist auf einen starken Ast am Baume angeklebt. B.

gen nach allen Richtungen mit großer Behendigkeit auf- und abläuft. Junge und Alte bleiben den ganzen Winter über beysammen, und trennen sich nicht, bis der Frühling sie zur Begattung und zur Fortpflanzung ihrer Art einladet.

Ich finde seiner von den Schriftstellern als eines Schwedischen auf der Einen, und als eines Italiänischen Vogels auf der andern Seite erwähnt, und ohne Zweifel ist er auch in den dazwischen gelegenen Ländern zu Hause. Aus der Dichtheit seines Gefieders, worin ihm nur die Eule gleicht, sollte man schließen, er könnte auch wohl die Kälte eines strengern Himmelsstriches, als der eben erwähnte, aushalten. Inzwischen ist es wunderbar genug, daß er gleich der weißen Eule, aus Jamaika gebracht wurde, und beyde schienen eben so dicht bekleidet, als in den kältesten Gegenden.

In *q*) meiner Synopsis habe ich gesagt, dieser Vogel sey aus Jamaika gebracht worden. Ich halte es für nothwendig, diesen Irrthum hier zu verbessern. Einer meiner Freunde, der mir diese Sache erzählte, erhielt diesen Vogel nebst andern dort einheimischen, erfuhr aber nachher, daß dieser, erst nach ihrer Ankunft, in England war zu der Sammlung gethan worden *qq*).

19. Die Capsche Meise. (Cape T.)

Parus capensis. L. l. 2. p. 1011. No. 20. *s*)
La Mesange du Cap de bonne Esperance. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 206. pl. 115.
Le petit Devil. Buff. ois. V. p. 445. *t*)

Der Schnabel ist schwarz, der Augenstern roth; der Kopf, der Hals, der Rücken, der Bauch und die Deckfedern der Flügel hell aschgrau; die Schwungfedern schwarz, mit weißen Rändern; der Schwanz oben schwarz, und unten weiß; die Füße schwarz.

Dieser Vogel ist auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause, und baut ein Nest, das an Gestalt einer Flasche mit einem kurzen Halse nicht unähnlich ist. Es besteht aus einer Art von Baumwolle, und ist in das dickste Gesträuch gebaut. Der Hals ist schmal, und an der Außenseite ist eine Art Nebennest angebracht, das dem Männchen zur Wohnung dient, während das Weibchen inwendig über seinen Eyern sitzt. Man sagt, wenn das Weibchen aus dem Neste herausgehe, so schlage das Männchen mit aller Stärke seiner Flügel gegen die Außenseite, wodurch die Ränder des Eingangs zusammenfielen, und auf diese Art den Insekten u. s. w. die den Jungen in der Abwesenheit derselben Schaden zufügen könnten, der Eingang verschlossen würde.

20. Der

q) Oft bis zwanzig. Salern. orn. p. 116.
qq) Zus. a. d. Suppl. S. 190. Uebers.
r) Ich muß hier einer Varietät erwähnen:
Var. A. Die blasse Blaumeise.
P. c. pallidus.
Das was schwarz ist, sieht aschgrau aus. Es gewährt dieß in Verbindung mit der schneeweißen Farbe einen angenehmen Anblik. Vielleicht ist es eine ausgebichne Farbe, denn man findet vor dem Mausern mehrere beysammen, die so gezeichnet sind. B.
s) Latham Ind. orn. II. p. 570. n. 22. B.
t) Uebers. XVII. S. 130. B.

20. Die Bartmeise. (Bearded T.)

Parus biarmicus. L. I. 2. p. 1011. No. 12. — Scop. ann. I. No. 241. *u*) — Frisch tab. 8 — Sepp. Voy. pl. in p. 83.
Lanius. Brünn. orn. p. 8.
Pendulus. Kram. elench. p. 373.
La Mesange barbue, ou le Moustache Briss orn. III. p. 567. No. 12. — Buff. ois. V. p. 418 pl. 18. *w*). — Pl. enlum 618. f. 1. 2.
Beardmanica. Albin. I. pl. 48.
Least Butcher Bird. Edw. pl. 55. *x*)
Bearded Titmouse. Br. Zool. I. No. 167.
— — Arct. Vol. II. p. 428. H. *y*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Sie hat die Größe der Schwanzmeise, aber einen größern Körper, und ihre Länge ist sechs, und ein Viertel Zoll. Ihr Schnabel ist sechsthalb Linien lang, und orangefarben, so lange der Vogel lebt, wird aber unmittelbar nach dem Tode desselben schmutziggelb; der Augenstern ist gelb; der Kopf hellaschfarben; unter den Augen ist ein Büschel von schwarzen Federn, der in eine Spitze ausläuft, fast wie ein Knebelbart; der Hinterhals und der Oberrücken sind orangebraun (bay), oder gelbroth; die Kehle weiß; die Brust fleischfarbig; Bauch, Seiten und Schenkel wie der Rücken, aber heller; der After schwarz; der Schwanz ist zwey und drey Viertel Zoll lang, und keilförmig, er hat beynahe einerley Farbe mit dem Rücken; die äußerste Feder ist sehr kurz, an der Wurzel dunkelfarbig, und am Ende fast weiß, die dritte ist blos gerade an der Spitze so; die Füße sind schwarz.

Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch den Mangel des Knebelbarts unter den Augen; der Scheitel ist rostigroth, mit schwarzen Flecken, und die Federn am After sind nicht schwarz, sondern von einerley Farbe mit den übrigen untern Theilen.

Man hat diese Vögel in England gefunden, bisher aber blos nur noch an sumpfigen Plätzen, wo Schilf wächst, von dessen Saamen, so wie von kleinen Insekten sie leben; denn beyde hat man in ihren Magen gefunden. Sehr häufig und in beträchtlicher Anzahl sind sie in den Sümpfen, unter dem Schilf, zwischen Erith und London; auch hat man sie an dergleichen Plätzen bey Gloucester, so wie in den großen Schilfgründen bey Combet, in Lancashire angetroffen. Ohne Zweifel brüten sie an allen diesen Orten, denn ich weiß, daß sie sich in den zuerst benannten Gegenden das ganze Jahr hindurch aufhalten. Ihr Nest kennt man nicht mit Gewißheit, ich habe aber eines gesehen, das aus sehr weichen, pflaumartigen Materialien bestand, zwischen drey ineinander gewundenen Schilfröhren aufgehängt war, und das Werk dieses Vogels zu seyn schien *a*).

u) Latham Ind. orn. II. p. 570. n. 23. B.
v) Ueberf. von Günther. S. 198 Nr. 241. B.
w) Ueberf. XVII. S. 86. B.
x) Seligmanns Vögel III. Taf. 5. B.
y) Ueberf. II. S. 401. H. Vergl. auch meine N. G. des In- und Auslands II. 1. S. 549. Nr. 7. N. G. der Stubenvögel. Nr. 116. und getreue Abbildung. Heft. II. Männchen und Weibchen. B.
a) Kramer sagt, das Nest ist unter den Weiden

Sie sind auch in Dänemark gemein, und Büffon vermuthet, ein Paar derselben, das aus einem Käfig bey der Gräfin von Albemarle entwischt sey, habe diese Colonie in England errichtet. Dieß mag vielleicht der Fall bey denen gewesen seyn, die sich um Erith aufhalten, das an den Ufern der Themse liegt; aber auf die anderwärts angetroffenen will es nicht so gut passen, und ich glaube gar, daß sie bey uns einheimisch sind, es schon ursprünglich waren, und daß blos der Umstand, daß sie sich nur an schilfreichen Orten aufhalten, daran Schuld ist, daß man sie bisher so wenig gekannt hat; denn da sich diese Vögel nie über einige wenige Ruthen (gards) von den Betten (beds) entfernen, *b*) so haben sie das große Glück gehabt, nicht früher bemerkt zu werden. Inzwischen werden künftige Beobachter wohl daran thun, wenn sie in ihren Untersuchungen über diesen Vogel noch weiter fortfahren, und zwar erstlich in Rücksicht des Nestes selbst, und der Art, wie er seine Jungen aufzieht, und dann zweytens, in welchen andern Gegenden Englands man ihn beobachtet hat.

Ich *c*) bin bisher noch nicht im Stande gewesen, mich des Nestes und der Eyer selbst zu versichern. In Sepp's Figur ist das Nest auf dem Boden, unter den Weiden angebracht. Es ist von sehr lockern Gewebe und aus trocknen Grasblätzen zusammengesetzt, mit den Saamenknöpfchen von Schilf und Rohr, und schmalen Blättern untermengt. Der Eyer sind vier an der Zahl, röthlichweiß, mit kleinen, braunen Flecken.

Diese Art findet sich in Schonen in Schweden, vor, aber selten. Sehr gemein ist sie um den Caspischen See, den See Maroris, und unter den Schilf der Flüße, die in denselben fallen, aber in keiner beträchtlichen (high) Breite in Asien. In Sibirien gar nicht *d*).

21. Die Chinesische Meise. (Chinese T.)

Parus sinensis. L. I. 2. p. 1012. No. 22.

Ihre Länge ist drey und drey Viertel Zoll. Der Schnabel kurz, schwarz, und ein wenig gebogen; die Hauptfarbe des Gefieders rostigrothbraun, am hellsten am Kopfe und Halse; Schwungfedern und Schwanz braun, mit schwarzen Rändern, letzterer ziemlich lang; die Füße roth.

Sie ist in China zu Hause, und nach Gemählden, die Capitain Broadley hat, beschrieben.

22. Die

den angebracht, hat die Form eines Beutels, besteht aus weichen, pflaumartigen Stoff, wie z. B. der Pflaum der großen Teichkolbens (Greater Cat's Tail. Typha latifolia L.) oder der Espen (Asp. Populustremula L.) und hängt an einem Zweige.

b) Die Schilfbette (Reed beds) bedecken oft viele Morgen Landes, sie wachsen im Wasser, so daß sie zu jeder Jahrzeit überschwemmt sind, und wenige Personen kommen nahe an sie, außer zur Zeit des Abschneidens, das sie in Booten verrichten, weil man in sehr seichter Fluth (bide) kaum einen Fuß innerhalb ihrer Gränzen setzen kann.

c) Zus. a. d. Suppl. S. 190. Ueberf.

d) Arct. Zool.

22. Die Malabariſche Meiſe. (Malabar T.)

Parus malabaricus. L. I. 2. p. 1012. No. 23. *d*)
La Mesange de la cote de Malabar. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 203. pl. 14. f. 1.

Sie iſt fünf und zwey Drittel Zoll lang. Der Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern roth; Kopf, Hinterhals und Rücken dunkelgrau; die Kehle ſchwarz; Bruſt, Bauch und After roth; opermentfarben; die Deckfedern der Flügel ſchwarz mit einem hellrothen Fleck an einigen der untern; die übrigen Schwungfedern ſchwarz, die nächſte an ihnen halb roth, halb ſchwarz, die großen Schwungfedern ſchwarz; die zwey mittlern Schwanzfedern ſchwarz, die andern, zur Hälfte von der Wurzel an, hellroth, die Endhälfte ſchwarz; die untern Deckfedern des Schwanzes hellgelbroth; die Füße ſchwarz.

Das Weibchen hat ein minder lebhaftes Colorit, alle untern Theile ſind rothgelb (rofous-yellow); der Fleck an den Flügeln und am Steiß aber, wie beym Männchen.

Sie wird auf der Küſte von Malabar angetroffen.

23. Die Sibiriſche Meiſe. (Sibirian T.)

Parus sibiricus. L. I. 2. p. 1003. No. 24. *e*)
La Mesange à ceinture blanche. Buff. ois. V. p. 446. *f*)
La Mesange de Sibirie. Pl. enlum 708. f. 3.

Ihre Länge iſt fünf Zoll. Der Schnabel iſt einen halben Zoll lang, und ſchwärzlich; das Kinn und die Kehle bis zur Bruſt ſind ſchwarz; der Scheitel und alles über den Augen graulichbraun; vom Schnabel geht ein weißer Streifen unter den Augen weg, worauf er ſich erweitert, und, nachdem er beyde Seiten des Halſes eingenommen hat, nach der Bruſt unter das Schwarze, verläuft; von hier an bis zum After iſt die Farbe gelbrothgrau; Flügel und Schwanz ſind aſchbraun; die Schwungfedern gelbrothgrau geändert; der Schwanz iſt über einen und drey Viertel Zoll lang, und ein wenig keilförmig, die äußerſte Feder iſt gelbrothgrau geſäumt; die Füße ſind ſchwärzlich..

Sie in Sibirien zu Hauſe.

23. Var. A. Parus sibiricus. L. I. 2. p. 1013. No. 24. β. g)
Lev. Mus.

Dieſe iſt ſechsthalb Zoll lang. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; die obern Theile des Gefieders ſind hell bräunlichaſchfarben; die Stirn und die untern Theile weiß; längs der Mitte der Kehle und der Bruſt iſt die Farbe ſchwarz; die Schwungfedern ſind dunkelfarbig, mit ſchimmelgrauen Rändern; der Schwanz dritthalb Zoll lang, und einfarbig dunkel; die Füße ſchwarz.

b) Latham Ind. orn. II. p. 564. n. 5. Ueberſ. von Büffons Vögel. XVII. S. 172. Zuſ. 7. B.
e) Latham Ind. orn. II. p. 571. n. 25. B.
f) Ueberſ. XVII. S. 132. B.
g) Latham l. c. β.

Sie unterſcheidet ſich von der letzten durch die Länge des Schwanzes, ſo wie auch durch die Kehle und das Kinn, an welchen das Schwarze nicht ſo breit, und auch das Weiße, das dieſes einfaßt, nicht ſo ſichtbar iſt; ſo hat auch der Bauch keinen gelbrothen Anſtrich.

Dieſe wurde auf den Schiffen unſrer letzten Weltumſeegler mit nach Hauſe gebracht, woher aber iſt nicht bekannt.

24. Die Meiſe von Hudſonsbay. (Hudsons-Bay T.)

Parus hudsonius. L. I. 2. p. 1013. No. 26. *h*)
— — Forster in Phil. Trans. Vol. LXIV. p. 408.
Hudsons-Bay Titmouse. ibid.
— — Arct. Zool. II. p. 425. *i*)

Ihre Länge iſt fünf und ein Achtel Zoll, die Breite ſieben Zoll, und das Gewicht eine halbe Unze. Der Schnabel iſt ſchwarz; der Kopf roſtigrothbraun; unter den Augen iſt ein weißer Streifen; die Kehle iſt ſchwarz, und dieſe Schwärze zieht ſich unter dem weißen Streifen weg; der Rücken iſt grünlich aſchfarben; Bruſt und Bauch weiß; die Seiten des Bauchs roſtigroth; die Flügel braun; die Schwungfedern aſchgrau gerändert; der Schwanz dritthalb Zoll lang, am Ende etwas abgerundet, und an Farbe, wie die Schwungfedern; der Steiß gelbrothweiß. Alle Federn dieſes Vogels ſind lang und locker, an den Wurzeln ſchwarz, und nur an den Spitzen von oben erwähnten Farben; die Füße ſchwarz; die hintere und die mittlere Klaue zweymal ſo lang als die andern. Männchen und Weibchen ſehen einander gleich.

Sie iſt in der Hudſon'sbay zu Hauſe, wo ſie dem ſtrengſten Winter trotzt. Hr. Forſter ſagt, daß ſie um unſre Beſitzungen daſelbſt brüte, und fünf Eyer lege. Sie iſt häufig um die Wachholderſträuche, und wird von den Eingebohrnen Pehe-ke-ke-ſhiſh genannt. Dieſe *k*) Meiſe läßt eine andere Stimme, oder größeres Zwitſchern (chirp) hören. Man ſieht ſie das ganze Jahr hindurch auf den mit Wachholderbüſchen beſetzten Ebenen. Im Winter fliegt ſie in kleinen Heerden, eine kurze Strecke auf einmal. Sie niſtet in die Wachholderſtauden im Junius, und macht ein Neſt von Gras, das mit Federn ausgelegt iſt. Die Jungen werden zu Anfang des Julius flick. Im Sommer ſind Fliegen aller Art ihre Nahrung; beſonders liebt ſie die Moskiten *l*), mit welchen ſie auch ihre Jungen äzt; im Winter aber muß ſie ſich von Beeren und Saamen und zu Zeiten von den innern Theilen der Wachholder- und Fichtenknospen nähren, von welchen ſie ſich zu dieſem Behufe einen Vorrath aufbewahren ſoll *m*).

25. Die großköpfige Meiſe. (Great-headed T.)

(ſ. die zweyte Figur der ſieben und funfzigſten Kupfertafel.)

Parus macrocephalus. L. I. 2. p. 1013. No. 27. *n*)

Sie

h) Latham Ind. orn. II. p. 566. n. 11. B.
i) Ueberſ. II. S. 397. Nr. 246. auch Ueberſ. von Büffons Vögel. XVII. S. 176. Zuſ. 9. B.
k) Zuſ. a. d. Suppl. S. 190. 91. Ueberſ.
l) Culex pipiens L. Ueberſ.
m) Herr Hutchins.
n) Patham Ind. orn II. p. 571. n. 26. Vergl. auch Ueberſ. von Büffons Vögel XVII. S. 178. Zuſ. 10. B.

Sie ist fünfthalb Zoll lang. Ihr Schnabel ist klein, blaß und an der Wurzel mit einigen wenigen Borsten versehen; der Kopf steckt sehr in Federn, so daß er zur Größe des Vogels unverhältnißmäßig scheint; Kopf, Hals und Rücken sind dunkelschwarz; an der Stirn, gerade über dem Schnabel, ist ein weißer Flecken; an den Flügeln ein weißer Streifen; die Brust ist orangefarben; die übrigen untern Theile sind sohlenledergelb, mit einer schwarzen Mischung an den Schenkeln; der Schwanz ist lang, und abgerundet, seine Farbe schwarz, die zwey äußern Federn sind weiß, mit schwarzen, schief abgetheilten Endspitzen, die nächste ist inwendig an der Spitze weiß *); die Füße sind dunkelbraun.

Das Weibchen ist oben hellbraun; unten durchaus gelb; der Schnabel und der Fleck über demselben, wie beym Männchen; die Schwungfedern dunkelfarbig.

In der Sammlung des Sire Jos. Banks. Sie findet sich in Königin Charlotten Sund, in Neuseeland, und heißt daselbst Mirro-Mirro.

25. Var. A. p)

Eine Spielart, die sich auf Norfolk Eyland vorfand, gieng darin ab, daß ihre Brust, statt orangefarben, schön karmoisinroth war pp).

26. Die Neuseeländische Meise. (New-Zealand T.)

Parus novae Seelandiae. L. I. 2. p. 1013. No. 28. q)

Sie ist fünf Zoll lang. Ihr Schnabel ist klein, und nur ein Viertel Zoll lang, von Farbe braun, mit einer dunkelfarbigen Spitze; die Stirn ist gelbroth; die obern Theile des Körpers sind hell aschgraulichroth, mit Braun gemischt; über den Augen ein weißer Streifen; die Stelle unter den Augen, und die Seiten des Kopfs sind aschgrau; die untern Theile hell gelbrothgrau; die Schwungfedern hellbraun; der Schwanz hat die Farbe des Rückens, seine zwey mittlern Federn sind schwarz, die übrigen mit einem viereckigen, braunen Flecken, ohngefähr in der Mitte jeder Feder bezeichnet; die Füße einen Zoll lang und dunkelfarbig; die Klauen schwarz.

Diese Meise ist auf Dusky-Bay in Neuseeland angetroffen worden, wo sie Tom-Tom genannt wird. Aus Sire J. Banks Gemälden.

27. Die Klettermeise. (Creeping T.)

Parus americanus. L. I. 2. p. 1007. No. 4. r)

Le

*) Bey einigen Vögeln sind blos die vier mittlern Schwanzfedern schwarz; alle andern weiß, mit schwarzen äußern Rändern und Spitzen; der Schnabel ist auch schwarz.

p) A. d. Suppl. S. 101. Uebers.

pp) Anderson's Ms. (Es ist dieß vielleicht ein sehr altes Männchen, da die oben beschriebenen Junge sind; denn gewöhnlich erhöht sich bey den Vögeln die rothe Farbe im Alter. B.)

q) Latham Ind. orn. II. p. 571. n. 27. S. auch Uebers. von Büffon Vögel XVII. S. 179. Zus. II. B.

r) Latham Ind. orn. II. p. 571. n. 28. B.

Le Figuier cendré de la Caroline. Briss. orn III. p. 522. No. 66. — Pl. enlum 731. f. 1.
Le Figuier cendré à collier. Buff. ois. V. p. 301. *s*)
Finck-creeper. Catesby Carol. I. pl. 64. *t*) — Arct. Zool. II. No. 326. *u*)

Sie hat die Größe des Müllerchens. Die obere Kinnlade des Schnabels ist braun, die untere gelb; der Kopf ist blau; über den Augen ein weißer Fleck, und ein anderer unter denselben; der obere Theil des Rückens ist gelblichgrün; die übrigen obern Theile, und der Schwanz sind dunkelblau; die Deckfedern der Flügel weißgefleckt, und dieß bildet zwey Bänder von dieser Farbe an den Flügeln; Kehle und Brust sind gelb, letztere am dunkelsten; am untern Theile des Halses ist ein halbes schwarzes Halsband; der Bauch ist weiß; die Seiten sind mit röthlichen Flecken bezeichnet; die Schwungfedern schwärzlich, mit bläulichaschfarbenen Rändern; inwendig weiß; der Schwanz ist etwas gabelförmig, und schwärzlich, die zwey mittlern Federn aschblau, die andern eben so geändet, die zwey äußern inwendig an der Spitze mit einem weißem Flecke bezeichnet; die Füße gelblich.

Das Weibchen ist bloß schwarz und braun.

Sie wohnen in Carolina, wo sie den Winter über bleiben, und an den Baumstämmen auf und ablaufen, und zwar der Insekten wegen. Man hat sie auch in Canada angetroffen.

Zusätze.

28. Die Indische Meise.

Parus indicus. Mus. Carls. II. No. 50.
— — L. I. 2. p. 1015. No. 32.
— — Latham Ind. orn. II. p. 572. No. 29.

Sie ist so groß als ein Rothkehlchen und sechs Zoll lang.

Der Schnabel und die Füße sind dunkelbraun; der Vorderkopf aschgrauschwärzlich; der Augenkreiß, Hinterkopf, Hinterhals, die Schultern, der Rücken und Steiß aschgrau; die Kehle und die Gurgel schmutzig weißlich; die Brust, der Bauch und After roſtfarben geändet; die Schwungfedern rußschwärzlich; der Schwanz oben braunschwärzlich, unten aschgraubraun.

29. Die Alpenmeise.

Parus alpinus. L. I. 2. p. 1013. No. 21.
— — Latham. Ind. orn. II. p. 569. No. 21.
Hablizl. in S. G. Gmelins Reise. IV. p. 171. —
Pallas neue Nord. Beytr. IV. S. 49. Uebers. von Büffons Vögeln. XVII. S. 169. Zus. 5.

Diese

s) Uebers. XVI. S. 124. Nr. 26. B.
t) Seligmanns Vögel III. Taf. 28. B.
u) Uebers. II. S. 396. Nr. 243. B.

Diese Meise hat fast ganz die Größe der Schwanzmeise, von welcher sie auch vielleicht ein junger Vogel ist. Der Schnabel ist pfriemenförmig, grade, ganz und schwarz; die Zunge abgestumpft, an der Spitze borstig; die Nasenlöcher sind nierenförmig und mit einer Haut halb bedeckt; den ganzen Oberleib bedecken schwarze, mit einem grauen Rande versehene Federn; vom Schnabelwinkel läuft um den Kopf herum eine weiße Linie bis in Nacken; der Unterleib ist weißröthlich, hin und wieder mit länglichen schwarzen Flecken, besonders an den Seiten des Halses; die Flügel reichen zusammengelegt nur etwas über den Anfang des Schwanzes, und bestehen aus achtzehn Schwungfedern, die oben schwarz und unten grau sind; die gleich gefärbten Deckfedern haben weiße Spitzen; der Schwanz ist beweglich, gespalten, und besteht aus zwölf Federn, von denen die zwey äußern am Ende mit einem keilförmigen weißen Fleck versehenen sind; die Füße sind schwarz; der Hinternagel am stärksten und mehr gekrümmt.

Sie bewohnt das Sunamisische Gebirge in Persien und nährt sich von Insecten.

30. Die Prinzchen-Meise.

Parus Knjaesciok. L. l. 2. p. 1013. No. 26.
— — Latham Ind. orn. II. p. 572. No. 30.
Lepjchin Reisen. I. p. 181. — Uebers. von Büffons Vögeln. XVII. S. 174. Zus. 8.

Sie hat fast die Größe der Kohlmeise, und ist fünf Zoll, sieben Linien lang. Der Schnabel ist kegelförmig, vier Linien lang, schwärzlichblau, mit weißlichen Rändern; die Nasenlöcher sind klein, rundlich, mit steifen, kurzen weißen Federchen besetzt; Stirn, Scheitel, Wangen Hals, Brust und Bauch sind mit weißen Federn bedeckt, ein unregelmäßiger Fleck ausgenommen, welcher sich von der Brust bis in die Mitte des Bauchs erstreckt; von den Nasenlöchern zieht sich eine sehr deutliche schwarzbläuliche Linie über die Augen bis zu einem gleichfarbigen Halsband des Genickes, unter welchem ein anderes weißes Halsband durchschimmert; Rücken und Steiß sind hellblau; die hintern Deckfedern der Flügel ebenfalls; die achtzehn Schwungfedern sind weiß, bleyfarben und blau gesprenkelt; der zwey Zoll und fünf Linien lange Schwanz besteht aus zwölf Federn, wovon die zwey mittelsten ganz blau und nur bey der Spitze auf der äußern Fahne weiß sind, an den übrigen nimmt die blaue Farbe mit der Länge ab, und die weiße nimmt so zu, daß die äußere Fahne der äußersten Schwanzfeder ganz weiß ist; Füße und Nägel sind schwarz.

Diese Meise, welche ihrer Schönheit halber zu Sibirzk Knjas-ziok d. i. Prinzchen heißt, hält sich in den Sibirischen Eichwäldern auf. B.

Vier und vierzigſte Gattung. Schwalbe.

Die Vögel dieſer Gattung haben einen kurzen, an der Wurzel breiten, an der Spitze ſchmalen, und ein wenig gebogenen Schnabel; die Naſenlöcher ſind offen; die Zunge iſt breit, kurz und geſpalten. (Der Rachen ſehr weit.) Der Schwanz mehrentheils gabelförmig *a*). Die Flügel lang; die Füße kurz; drey Zehen vorwärts und eine rückwärts *b*).

1. Die Rauchſchwalbe. (Chimney Swallow.)

Hirundo rustica. L. l. 2. p. 1015. No. 1. *c*) — Scop. ann. I. p. 165. No. 219 *d*) Kram. elench. p. 380. No. 1. — Müller Zool. No 287. — Brünn. orn. p. 73. No. 289. — Georgi Reise p. 175. — Frisch tab. 18. — Faun. Suec. p. 270.

Hirundo domestica. Ray Syn. p. 74. A. 1. — Faun. Arragon. p. 90. — Sepp. Vog. pl. in p. 31.

L'Hirundelle de Cheminée. Briss. orn. II. p. 486 No. 1.

L'Hirondelle de Cheminée, ou l'Hirondelle domestique. Buff. ois. VI. p. 591. pl. 25. f. 1. — Pl. enlum. 543. f. 1.

Common or Chimney-Swallow. Will. p. 212. tab. 39. — Albin. I. pl. 45. — Br. Zool. I. No. 168. pl. 58. — Arct. Zool. II. No. 330 *e*) Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre Länge beträgt über ſechs Zoll. Der Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern nußbraun; Stirn und Kinn roth, ins kaſtanienbraune ſpielend; die obern Theile des Kopfs, Halſes und Körpers, die Flügel und der Schwanz ſind ſchwarz mit einem ſchönen purpurblauen Glanze; Bruſt und Bauch weiß; der Schwanz ſtark gabelförmig, alle ſeine Federn, die zwey mittlern ausgenommen, an der innern Fahne am Ende, mit einem eyrunden, weißen Fleck bezeichnet; die Füße ſehr kurz, und ſchwärzlich.

Dieſe Art iſt durch ganz England ſehr bekannt, wo ſie ihre Wohnung die Sommer-Monate hindurch aufſchlägt, zu Ende des Septembers wegreiſt, und zu Ende des Märzes wiederkommt. Bey uns niſtet ſie allgemein in die Rauchfänge, fünf oder ſechs Fuß von der Spitze, an der innern Seite, und macht ihr Neſt aus Lehm (mud), mit Stroh und Haaren vermengt, und

a) No. 24. ausgenommen, die einen gleichen Schwanz hat.

b) Die vier lezten ausgenommen, bey denen alle Zehen vorwärts ſtehen.

c) Latham Ind. orn. II. p. 522. n. 1. B.

d) Ueberſ. von Günther. S. 204. Nr. 249. B.

e) Ueberſ. II. S. 401. Nr. 247. Vergl. auch meine N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 553. n. 1. N. G. Deutſchlands. IV. 1. B.

und mit Federn ausgelegt *f*). Sie legt vier bis ſechs weiße, rothgeſprenkelte Eyer, und brütet zweymal des Jahrs, einmal im Junius, das andermal im Auguſt. Das Männchen hat eine unbedeutende, zwitſchernde, aber nicht unangenehme Stimme.

Man vermuthet, daß dieſe Art, mit einigen Eigenheiten, ihr Winterquartier in Senegal *g*), und den benachbarten Ländern aufſchlage, und ſie ſcheint wechſelsweiſe die ganze alte Welt zu beſuchen, denn man kennt ſie von Norwegen bis zum Vorgebirge der guten Hoffnung auf der einen, und von Kamtſchatka bis nach Indien und Japan auf der andern Seite. So findet man ſie auch in allen Gegenden von Nordamerika, wo ſie vom Norden gegen Süden wandert, wie bey uns. In Schweden und Nordamerika wird ſie Scheurenſchwalbe (Barn-Swallow) genannt *h*). Kalm ſagt, in Amerika niſten ſie in die Häuſer, und außen unter die Dächer; auch in Gebirgen an ſolchen Plätzen, wo ſie eine überhängende Decke haben, ſo wie unter die Klüfte der ſenkrechten Felſen; die ſtachelſchwänzigen aber (Nr. 32.) bauen in die Schornſteine, wie bey uns.

Ueber ihre Wanderungen ließe ſich viel ſagen, ob einige von ihnen den Winter unter dem Waſſer zubringen u. ſ. w. Dieß würde uns aber zu viel Zeit und Papier rauben, und was noch ſchlimmer iſt, uns dennoch im Dunkeln über dieſen Gegenſtand laſſen. Wer Luſt hat, das, was hierüber geſagt worden iſt, zu leſen, der ſehe Phil. Trans. No. 36. vol. L. 1. p. 459. — Aol. L. III. p. 101. Buff. ois. VI. p. 552. - ſq. - Br. Zool. vol. I. Art. Schwalbe *i*).

Die *k*) Amerikaniſche Schwalbe geht darin von der Europäiſchen ab, daß ihre untere Seite roſtigroth iſt, welchen Farbenwechſel man auch an denen bemerkt, die man jenſeits des Jeniſey, und in allen nord-öſtlichen Gegenden Sibiriens angetroffen hat *l*). Die Wotiaken ein Finniſches Volk, haben große Achtung vor den Schwalben; denn wer eine Schwalbe, ei-

f) Bey uns niſtet ſie faſt gar nicht in die Rauchfänge, ſondern in den Hausfluhr an die Decke und ſetzt ihr Neſt auf einen Nagel oder Bretchen, auch trifft man auf den Dörfern ihr Neſt in den Kämmern und auf den Sälen an. Unter großen Brücken habe ich auch daſſelbe im Freyen gefunden. Sie baut mit allerhand zähen Koth und mengt Gras und Strohhalmen drunter. B.

g) Herr Adanſon, wenn er von den Schwalben ſpricht, ſagt: „Man ſieht ſie in Senegal zu keiner andern Jahrszeit, als zu dieſer, (nach dem October,) zugleich mit den Wachteln, Bachſtelzen, Milanen und einigen andern Zugvögeln, die jährlich hieher kommen, wenn ſie die Kälte aus den temperirten Ländern Europen's vertreibt. Eine andere, nicht minder merkwürdige Erſcheinung iſt, daß die Schwalben in Senegal ihre Neſter nicht bauen, wie in Europa; ſie liegen alle Nächte Paar und Paar, oder einzeln, an der Seeküſte, die ihnen beſſer zu gefallen ſcheint, als die Plätze landeinwärts.“ Voy. to Seneg. p. 121. Und dann ferner (S. 163.) erwähnt er, die Schwalben hätten ihr Nachtquartier in ſeiner Hütte, in der es ſehr dunkel war, aufgeſchlagen, und auf den Querbalken geſeſſen, daher einige zweifeln, ob dieß auch unſre Schwalben wären.

h) Ladu-swala. Faun. Suec. p. 96. — S. auch Kalm. Trav. vol. II. p. 270.

i) Man vergleiche auch was ich gegen den Winterſchlaf der Schwalben geſagt habe. N. G. Deutſchlands II. S. 88. III. S. 761. IV. unter dem Artikel Aufenthalt der Rauchſchwalben. B

k) Zuſ. a. d. Suppl. S. 192. Ueberſ.

l) Arct. Zool.

nen Kybiz, eine Taube, oder eine Bachstelze tödet, der setzt sich allen Arten von Unglück bey seiner Heerde (flock) aus [m]). Sie bauen sogar Nester für die Schwalben [n]).

1. Var. A. Die weiße Schwalbe. (White Sw.)

Hirundo rustica. L. I. 2. p. 1015. No. 1. β.
L'Hirondelle blanche. Briss. orn. II. p. 1189. A.
Br. Mus. Lev. Mus.

Diese Spielart ist ganz weiß [o]). Ich habe auch ein Exemplar mit einem röthlichen Kinn gesehen, das außerdem rein weiß war [p]).

2. Die Otaheitische Schwalbe. (Otaheite Sw.)

(s. die erste Figur der acht und funfzigsten Kupfertafel.)

Hirundo tahitica. L. I. 2. p. 1016. No. 13. o)

Sie ist fünf Zoll lang. Ihr Schnabel ist schwarz. Die Farbe des Körpers braun schwarz, mit einem bräunlichen Glanz; vom Kinn bis zum obern Theil der Brust ist die Farbe rothgelb purpurfarben; die übrigen untern Theile sind rußbraun; der After am hellsten; der Schwanz ist etwas gabelförmig, oben schwarz, unten eben so, aber heller, und seine Länge zwey und ein Viertel Zoll; die Füße sind schwarz.

Sie ist in den Berggegenden von Otaheite zu Hause. Eine davon ist in der Sammlung des Sire Jos. Banks, bey welcher das Purpurfarbne bis an die Brust vorläuft, und so ist es auch auf unsrer Kupfertafel abgebildet.

3. Die

m) Auch in Thüringischen Dörfern ist noch der Aberglaube, daß man deswegen keine Schwalbe töden dürfe, weil man sonst einer Feuersbrunst ausgesetzt wäre, und daß ein Rauchschwalbennest vor derselben schütze. Ein weit natürlicher Grund ist, sie zu hegen, damit sie die Insekten, die das Hausvieh so sehr plagen, wegfangen. B.

mm) Dec. Russ. vol. I. p. 138.

n) Var. β. Die aschgraue Rauchschwalbe.

Hicondo rustica cinerea.

Beseke N. G. der Vögel Curlands. S. 84. Sie ist durchaus aschgrau, und hier und da etwas rauchfarben. B.

o) Unter einigen Chinesischen Gemälden, die dem verstorbenen Dr. Fothergill gehörten, bemerkte ich eine ganz weiße Schwalbe, unter dem Namen Hirundo vulgaris: Ihr Schnabel war roth, und kurz; die Flügel lang; die Schwanzfedern gleich; die zwey äussern ausgenommen, welche um anderthalb Zoll länger waren, als die übrigen; die Füße roth. Auch traf ich unter andern Chinesischen Gemälden eine an, die in jeder Rücksicht die nämliche war, die zwey langen Schwanzfedern ausgenommen, die in der Mitte des Schwanzes, und nicht an der Aussenseite standen. Ob die Zeichnung richtig war, oder ob der Vogel überhaupt unter die Schwalben gehörte, bin ich nicht im Stande genau zu bestimmen.

p) Latham Ind. orn. II. p. 573. n. 2. B.

1. Die Otaheitische Schwalbe. 2. Die rothköpfige Schwalbe.

3. Die Hausschwalbe. (Martin.)

Hirundo urbica. L. l. 2. p. 1017. No. 3. *q*) — Scop. ann. 1. p. 165. No. 150. *r*) — Kram. elench. p 380. No. 2. — Brünn. orn. No. 290. Müller Zool. No. 288. — Frisch tab. 17. — Georgi Reise p. 175. Faun. Suec. p. 271. — Faun. Arragon. p. 90. — Sepp. Vög. pl. in p. 33.

Hirundo rustica, sive aggrestis Plinii. Ray Syn. p. 71. A. 3.

La petite Hirondelle, ou le Martinet à cul blanc. Briss. orn. III. p. 490. No. 2.

L'Hirondelle à cul blanc, ou de fenetre. Buff. ois. VI. p. 616. pl. 25. No. 2.

Le petit Martinet. Pl. enlum 542. f. 2.

Martin, Martlet, or Martinet. Will. orn. p. 213. t. 39. — Albin. II. pl. 56. a. — Br. Zool. I No. 169. — Arct. Zool. II. No. 331. *s*)

Br. Mus. Lev. Mus.

Diese ist nicht völlig so groß, als die letzte, und nur sechsthalb Zoll lang. Ihr Schnabel ist schwarz; der Rachen inwendig gelb; der Augenstern nußbraun; der Kopf, die obern Theile des Körpers, die Flügel und der Schwanz sind glänzend blauschwarz; der Steiß, so wie alle untern Theile des Körpers, vom Kinn bis zum After, weiß; der Schwanz gabelförmig, aber nicht so stark, wie bey dem letztern; die Füße bis an die Klauen, die auch weiß sind, mit weißen Pflaumfedern bedeckt.

Diese Vögel sind in England zahlreicher, als die Rauchschwalben. Die nisten unter die Sparren und Gesimse der Häuser und machen ihr Nest aus Lehm und Stroh *t*), wie jene, lassen ein Loch zum Eingange offen, und legen es inwendig mit Federn aus. Oft „bauen sie „an die hohen See-Klippen; so lange die Jungen noch im Neste sind äßen sie die Al„ten, indem sie sich mit den Klauen an die Außenseite des Nestes hängen; so bald sie es „aber verlassen haben, füttern sie sie im Fliegen, mittelst einer geschwinden, und für diejenigen, „die so etwas noch nicht zu beobachten gewohnt sind, fast unmerklichen Bewegung" *u*). Gewöhnlich hecken sie des Jahrs zweymal; das erstemal fünf weiße, am breitem Ende ins dunkelfarbige ziehende Eyer; bey der zweyten Brut sind nur drey, höchstens vier Eyer vorhanden; und bey der dritten, die sich auch zuweilen ereignet *v*), nie mehr, als zwey oder drey *w*).

Nach England kommen sie ohngefähr zwanzig Tage nach der Rauchschwalbe, und ziehen gewöhnlich zu Anfang des Oktobers wieder weg.

Herr *x*) Hutchins sagt mir, die Hausschwalbe werde auf Hudson's Bay, Shashywinepeshew genannt, ich bin aber noch nicht gewiß, ob sie ganz mit der Beschreibung der Eng-

q) Latham Ind. orn. II. p. 573. n. 3. B.

r) Uebers. S. 205. Nr. 250. B.

s) Uebers. II. S. 402 Nr. 248. Vergl. auch meine N. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 553. Nr. 2. B.

t) Ihr Nest sieht viel glätter aus, da sie nicht erst hinfliegen und Stroh und Grashalmen zum Bau hohlen, wie die Rauchschwalben, sondern den Koth nehmen, wie er ist. B.

u) Br. Zool. I. p. 401.

v) Hist. das Ois.

w) Diese Zahl trifft so genau nicht zu. Man trifft 3 bis 6 Eyer im Neste an, gewöhnlich die mehrsten im ersten Gehecke, doch auch oft umgekehrt. B.

x) Zus. a. d. Suppl. S. 192. Uebers.

liſchen Art übereinſtimme; vielleicht iſt es die Schwalbe mit ſchwarzem Stiß, deren in den Philoſoph. Transact. y) erwähnt wird.

3. Var. A. Hirundo urbica. L. I. 2. p. 1017. No. 3. β.

In Sire Joſ. Banks Sammlung bemerke ich eine Hausſchwalbe, die der obigen ſehr gleich kommt, aber an jenen Theilen, wo dieſe ſchwarz erſcheint, dunkelfarbig iſt; die Schwungfedern, der Schwanz und die obern Deckfedern deſſelben haben weiße Spitzen.

Dieſe kam aus irgend einem Theile von Nordamerika z).

4. Die Panayiſche Schwalbe. (Panayan Sw.)

Hirundo panayana. L. I. 2. p. 1018. No. 17. a)
L'Hirondinelle d'Antigue. Sonn. Voy. p. 118. pl. 76.
— — à gorge couleur de rouille. Buff. ois. VI. p. 607.

Sie hat die Größe der vorigen. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; an der Stirn iſt ein rothgelber Fleck; die Kehle iſt eben ſo, und mit einem ſchmalen, ſchwarzen Halsband eingefaßt; Kopf, Hals und Rücken ſind ſammetſchwarz; die kleinen Deckfedern der Flügel ſchillernd violetſchwarz; die größern, und die Schwungfedern kohlſchwarz; der Schwanz eben ſo, und gabelförmig; Flügel und Schwanz von gleicher Länge; alle untern Theile des Körpers, von der Kehle an, weiß; die Füße ſchwarz.

Sie iſt auf Antigua, in der Inſel Panay, eine der Philippinen zu Hauſe.

5. Die rothbäuchige Schwalbe. (Rufous-bellied Sw.)

Hirundo rufa. L. I. 2. p. 1018. No. 18. b)
L'Hirondelle à ventre roux de Cayenne. Buff. ois. VI. p. 607. — Pl. enlum. 724. f. 1.

Sie iſt keiner, als unſre Rauchſchwalbe, und ſechsthalb Zoll lang. Ihr Schnabel iſt einen halben Zoll lang, und ſchwarz; die Stirn weißlich; die obern Theile des Körpers glänzend ſchwarz; die untern gelbroth, das gegen den After hin heller wird; die Füße dunkelfarbig.

Dieſe wohnt in Cayenne, und wird nordwärts bis Neuyork nicht ſelten angetroffen.

Es.

y) Vol. LXII. p. 408—Arct. Zool.

z) Hierher gehören noch: Var. β. Die weiße Hausſchwalbe.
Hir. urb. candida.
Sie iſt rein weiß, ſo gar Schnabel und Augen. Auch Hr. Beſeke ſagt in ſeiner N. G. der Vögel Curlands S. 84. „Es wurde für mich eine ganz weiße Schwalbe geſchoſſen, indem ſie von der ganzen Schwalbenfamilie einige Tage lang aufs äußerſte verfolgt worden war.“ Ob dieſe auch weißen Schnabel und Augen hatten, wie die meinige, iſt nicht angemerkt.
Var. C. Die bunte Hausſchwalbe.
Hir. urb. varia.
Sie hat weiße Schwingen und Schwanz. B.

a) Latham Ind. orn. II. p. 574. n. 4. B
b) Latham Ind. orn. II. p. 574. n. 5.

Es iſt dieſelbe Art, von der Herr Bajon c) ſagt, daß ſie in die Häuſer baue und zwar ohne alle Miſchung von Lehm, ihr Neſt aus Moos, dürren Pflanzen und kurzen Stückchen Holz mache, und dieß alles mit einer Art von Kütt zuſammenleime, ſo daß es kaum zerbrochen werden kann, und die inwendige Seite mit Federn auslege. Dieſes Neſt hängt ſie an die Balken und Sparren an die Mauernwände, und an die Dachrinnen der Häuſer auf; zuweilen iſt es einen halben Fuß lang, und an einer Seite befeſtigt; die Oeffnung iſt am Boden angebracht. Das Weibchen legt vier bis fünf Eyer. Die Jungen verlaſſen das Neſt, ſobald ſie ihre Flügel tragen können.

6. Die Capſche Schwalbe. (Cape Sw.)

Hirundo capensis. L. I. 2. p. 1019. No. 19. d)
L'Hirondelle à Capuchin roux. Buff. ois. VI. p. 608.
Hirondelle à tete rousse de Cap de bonne Esperance. Pl. enlum. 723. f. 2.

Ihre Länge iſt ſieben Zoll. Der Schnabel iſt einen halben Zoll lang, und ſchwarz; der ganze Scheitel, die Stelle unter den Augen zu beyden Seiten, und der Nacken ſind dunkel rothgelb, mit ſchwarz gemiſcht; der Hinterhals, der Rücken und die Deckfedern der Flügel ſind blauſchwarz; die Schwungfedern braun, mit lichtern braunen Rändern; der Schwanz gabelförmig, und ſchwärzlich, alle ſeine Federn, die zwey mittlern ausgenommen, mit einem eyrunden, weißen Fleck bezeichnet, der, wie bey der unſrigen, nur dann ſichtbar wird, wenn der Schwanz ausgebreitet iſt; die Kehle iſt braun, mit Weiß melirt; die übrigen untern Theile ſind gelblichweiß, mit ſenkrechten, ſchwärzlichen Streifen bezeichnet; die Füße dunkelfarbig.

Sie iſt auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hauſe, wo ſie in die Häuſer niſtet, und ihr Neſt an das Tafelwerk befeſtigt. Sie bauet es von außen aus Lehm, von innen aus Federn, und giebt demſelben eine rundliche Geſtalt, mit einer Art von cylindriſchem Eingange. Das Weibchen legt vier bis fünf geſprenkelte Eyer.

7. Die Senegalſche Schwalbe. (Senegal Sw.)

Hirundo senegalensis. L. I. 2. p. 1021. No. 8. e)
L'Hirondelle du Senegal. Briss. orn. II. p. 496. No. 5. pl. 45. f. 1.
La grande Hirondelle à ventre roux du Senegal. Buff. ois. VI. p. 610. — Pl. enlum. 310.

Dieß iſt eine große Schwalbe, denn ſie mißt neunthalb Zoll in die Länge, und funfzehn und ein Viertel Zoll in die Breite. Ihr Schnabel iſt acht Linien lang, und dunkelfarbig; der Scheitel, der Hinterhals der Rücken und die Deckfedern der Flügel ſind glänzend ſtahlſchwarz; Schwungfedern und Schwanz ſchwarz, letzter ſtark gabelförmig; der Steiß und alle untern Theile des Körpers gelbroth; an der Kehle und unter den Flügeln ſehr hell.

Sie iſt in Senegal zu Hauſe.

8. Die

c) Mem. sur Cayene vol. II. p. 275.
d) Latham Ind. orn. II. p. 574. n. 6. B.
e) Latham Ind. orn. II. p. 574. n. 7. B.

8. Die weißbäuchige Schwalbe. (White-bellied Sw.)

Hirundo fasciata. L. l. 2. p. 1022. No. 24 *f*)
L'Hirondelle à ceinture blanche. Buff. ois. VI. p. 611.
Hirondelle de Cayenne à bande blanche sur le ventre. Pl. enlum. 724. f. 2.

Ihre Länge ist sechs Zoll. Der Schnabel ist einen halben Zoll lang, und schwarz, der ganze Vogel schwarz, ein weißes Band queer über den Bauch, und einen Fleck von der nämlichen Farbe an der Außenseite der Schenkel ausgenommen; der Schwanz ist gabelförmig.

Sie findet sich in Cayenne, aber nicht häufig, auch in Guiana, an den Ufern der Flüsse. Sie durchfurcht (skims) die Oberfläche des Wassers, wie unsre Europäischen Schwalben, und oft sieht man sie auf schwimmenden Bäumen sitzen, die ein Zufall in den Strom geworfen hat.

9. Die Amberschwalbe. (Ambergris Sw.)

Hirundo ambrosiaca. L. l. 2. p. 1021. No. 23.
L'Hirondelle du rivage du Senegal. Briss. orn. II. p. 508. pl. 45. f. 4.
L'Hirondelle ambrée. Buff. ois. VI. p. 612.

Von der Größe des Zaunkönigs, und sechsthalb Zoll lang. Der Schnabel ist einen halben Zoll lang, und schwärzlich; das ganze Gefieder graubraun, am dunkelsten am Kopf und an den Schwungfedern; der Schwanz stark gabelförmig; die Füße sind braun.

Sie ist in Senegal zu Hause, und soll sehr stark nach Amber riechen *g*).

9. Var. A. *b*)

Ihre Länge ist fünf Zoll. Die Hauptfarbe ist am Oberleibe der Uferschwalbe (Nr. 10.) nicht unähnlich; unten ist sie aschgräulichweiß; der Schwanz stark gabelförmig.

Diese traf ich in der Sammlung des Sire Jos. Banks an, und vermuthlich kam sie aus China. Wahrscheinlich ist sie eine Spielart, wo nicht bloß eine Geschlechtsverschiedenheit von der Amberschwalbe.

10. Die Uferschwalbe. (Sand Martin.)

Hirundo riparia. L. l. 2. p. 1019. No. 4. *i*) — Kram. elench. p. 381. No. 4. — Brünn. orn. No. 291. — Müller Zool. p. 34. No. 289. — Frisch tab. 18. — Georgi Reise. No. 175. No. 175. — Faun. Suec. 273.
Hirundo riparia Aldrovandi, Ray Syn. p. 71. A. 3.

L'Hiron-

f) Latham Ind. orn. II. p. 575. n. 8. B.
g) Seba.
b) A. d. Suppl. S. 193. Uebers.
i) Latham Ind. orn. II. p. 575. n. 16. B.

L'Hirondelle de rivage. Buff. ois. II. p. 506. No. 12. — Buff. ois. VI. p. 632. — Pl. enlum. 543. f. 2.
Sand Martin or Shore-bird. Will. orn. p. 213. t. 39. — Albin. II. pl. 56. 6. — Br. Zool. No. 170. — Arct. Zool. II. No. 332. *k*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre Länge ist vier und drey Viertel Zoll. Der Schnabel ist fünf Linien lang, und schwärzlich; die obern Theile des Gefieders sind mausfarben; die Kehle und die untern Theile weiß; an der Brust ist ein mausfarbener Streifen; die Füße sind schwärzlich, und hinten mit Federn bedeckt.

Diese Art ist gemein an den Ufern der Flüsse und an den Sandbänken (sand-pits), wo sie tiefe, horizontale Löcher in die Wände gräbt *l*), an deren Ende sich das Nest befindet, das blos aus einigen dürren Fasern oder Stroh besteht, und mit Federn vermengt ist. Sie soll nur einmal des Jahrs (fünf bis sechs weiße, durchscheinende) Eyer legen, und ihre Jungen früher, als andere ihrer Gattung, ausbrüten *m*).

Salerne bemerkt, die Jungen seyen sehr fett, und von Geschmack beynahe eben so gut, als Ortolane.

Diese Art befindet sich in ganz Europa. Sie giebt sich nicht immer die Mühe, Löcher zu ihrem Neste zu graben; oft legt sie ihre Eyer in die Höhlen der Steinbrüche (guarriers), und in Baumlöcher, wo sie sie hierzu bequem findet. Sie ist auch in ganz Nordamerika zu Hause, und baut ihr Nest in die steilen Küsten der Flüsse und Seen, eben so wie in England *n*).

II. Die Steinschwalbe. (Rook Sw.)

Hirundo rupestris. L. I. 2. p. 1019. No. 20. *o*)
— — Scop. ann. I. p. 167. No. 253. *p*)

Sie hat die Größe der Hausschwalbe. Ihr Schnabel ist schwarz; die obern Theile des Gefieders sind mausfarben; Schwungfedern und Schwanz am dunkelsten; die untern weißlich; der

k) Uebers. II. S. 403. Nr. 249. Vergl. auch meine N. G. des In- und Auslands I. 1. p. 554. N. G. Deutschlands IV. Nr. 3. B.

l) In Deutschland und besonders in Thüringen baut sie auch in die Wände der Lehmgruben und Steinbrüche. In einem kleinen Steinbruch trifft man oft 50 Nester an, so gesellschaftlich ist der Vogel. Ich habe sie auch in den Nestern der Hausschwalben wohnen sehen. B.

m) Frisch. — Wenn dies der Fall ist, so sollte man glauben, daß sie wenigstens zweymal des Jahrs brüte.

n) Kalm. — In Amerika wird sie Erdschwalbe genannt.

Var. A. Die weiße Uferschwalbe. H. rip. alba.

Diese habe ich mehrmalen in Thüringen angetroffen, rein weiß, und schmutzig weiß. B.

o) Latham Ind. orn. II. p. 576. n. 11.

p) Uebers. von Günther S. 207. B.

der Schwanz ist am Ende fast gleich, oder doch nur sehr wenig gabelförmig; an jeder Feder ist ein weißer Fleck an der innern Fahne; die Füße sind nackt, und schwarz q).

Sie ist in Krayn zu Hause, und macht ihr Nest aus Thon in die Felsenhöhlen.

12. Die Felsenschwalbe. (Crag Sw.)

Hirundo montana. L. I. 2. p. 1020. No. 21. r)
L'Hirondelle grise des rochers. Buff. ois. VI. p. 641.
Lev. Mus.

Ihre Länge ist sechsthalb Zoll. Der Schnabel schwarz; das Gefieder an den obern Theilen wie bey der Uferschwalbe; Schwungfedern und Schwanz graubraun, mit gelbrothen Rändern; der Schwanz kaum gabelförmig, seine zwey mittlern Federn, und die äußern zu beyden Seiten einfärbig, die vier zu beyden Seiten, zwischen diesen, an der innern Fahne mit einem weißen Fleck bezeichnet; die untern Theile des Körpers gelbroth; die Seiten ins Braune spielend; die Füße mit grauen, braun melirten Pflaum bedeckt; die Klauen schwarz.

Diese wohnt auf den Felsen und Steinklippen um Savoyen, wo sie in der Mitte des Aprils ankommt, und mehrentheils den funfzehnten August wieder wegzieht. Einige Herumschwärmer (straggler) bleiben zuweilen bis zum zehnten Oktober. Eben diese Art findet sich auch in den Gebirgen von Auvergne und der Dauphines. Ich habe sie auch von Gibraltar erhalten.

Sie scheint große Verwandschaft mit der letztern zu haben s)

13. Die Dauurische Schwalbe. (Daurian Sw.)

Hirundo dauurica. L. I. 2. p. 1024. No. 12. t)
— — Linn. Mantiss. 1771. p. 528.
— — Act. Holm. 1769.
— — Pallas spicileg. Zool.
— alpestris. eiusd. Trav. Vol. II. p. 709. No. 19.

Größer als die Rauchschwalbe; ihr Schnabel etwas breiter; der Scheitel, die Wurzel der Flügel, die Stelle zwischen denselben, und die Deckfedern des Schwanzes sind dunkel stahlschwarz; an beyden Seiten des Kopfes, vom Auge bis zum Nacken, die Schläfe mit eingeschlossen, ist ein dreyeckiger, rostigrother Fleck, der sich bey einigen Exemplaren am Hintertheile vereinigt; der untere Theil des Rückens und der Steiß sind hellrostigroth; die Federn an den untern Theilen schmuzig weiß, und längs den Schäften schwarz gestreift; der Schwanz glänzend schwarz, und sehr gabelförmig, seine vier mittlern Federn beynahe gleich, die äußerste beson-

q) Dieß ist, wie die ganze Beschreibung ausweißt, die Uferschwalbe (Nr. 10.), höchstens nur eine Varietät von ihr. Auch dieß bestätigt schon Günther in einer Note zu obigem Citat aus Scopoli. B.

r) Latham Ind. orn. II. p. 576. n. 12. B.

s) Sie wäre also mit der Uferschwalbe einerley- oder bloß eine Varietät. B.

t) Latham Ind. orn. II. p. 576. n. 13. B.

beſonders bey alten Vögeln, ſehr lang, und gemeiniglich inwendig mit einem weißen Fleck bezeichnet; die Füße ziemlich ſtark und braun.

Sie iſt in Sibirien zu Hauſe, wo ſie in die hohen Felſen der Alkaiſchen Bergkette, und jenſeits der See Baikal, zuweilen aber auch in verlaſſene, zerſtörte Gebäude niſtet. Ihr Neſt beſteht aus Thon, iſt groß, von halbkugelrunder Form, mit einem langen, ſchmalen, halsförmigen Canal, als Eingang.

14. Die blutköpfige Schwalbe. (Die rothköpfige Schwalbe. Red-headed Sw.)

Hirundo erythrocephala. L. I. 2. p. 1024. No. 29. *u*)

Sie hat die Größe eines kleinen Kolibri. Ihr Schnabel iſt kurz, platt und dunkelfarbig; der Kopf roth; der Rücken dunkelfarbig; die Federn weiß gerändert; die untern Theile des Körpers weiß; die Deckfedern des Schwanzes hellbraun; der Schwanz ein wenig gabelförmig, und nebſt den Flügeln dunkelfarbig.

Sie iſt in Indien zu Hauſe. (Herr Pennant.)

15. Die Schwalbe von Unalaſchka. (Aoonalaſhka Sw.)

Hirundo unalaſchkensis. L. I. 2. p. 1025. No. 30 *v*).
Lev. Mus.

Ihre Länge iſt fünfthalb Zoll. Der Schnabel ſehr kurz, und dunkelfarbig; das Gefieder an den obern Theilen matt ſchwarz, ohne Glanz; an den untern und an den Seiten des Kopfs dunkelaſchfarben, am letztern am dunkelſten; der Steiß ſchmutzig weiß; der Schwanz gabelförmig, und jede Feder am Ende abgerundet; die Füße ſind dunkelfarbig.

Sie iſt in Unalaſchka zu Hauſe.

16. Die rothköpfige Schwalbe. (Ruſous-headed. Sw.)

(ſ. die zweyte Figur der acht und funfzigſten Kupfertafel.)

Hirundo indica. L. I. 2. p. 1025. No. 31. *w*)

Sie hat vier Zoll Länge. Ihr Schnabel iſt dunkelbraun; der ganze Scheitel, auch die Augen mit eingeſchloſſen, gelbroth, ins Braune ſpielend; die obern Theile des Halſes, der Flügel des Körpers und des Schwanzes braun; letzterer gabelförmig; die untern Theile ſchmutzig weiß; einige Deckfedern der Flügel weißgerändet; die Schwungfedern länger, als der Schwanz; die Füße dunkelfarbig.

Sie iſt in Oſtindien zu Hauſe.

u) Latham Ind. orn. II. p. 577. n. 14. B.
v) Latham Ind. orn. II. p. 577. n. 15. B.
w) Latham Ind. orn. II. p. 577. n. 16. B.

Aus einigen, nicht bekannt gewordenen Gemählden des verstorbenen Herrn Edwards, die ich jetzt besitze.

17. Die schwarze Schwalbe. (Black Sw.)

Hirundo nigra. L. I. 2. p. 1025. No. 32, *x*)
Le Martinet de St. Domingue. Briss. orn. II. p. 54. No. 16. pl. 46. f. 3.
Le petit Martinet noir. Buff. ois. VI. p. 668. — Mem. sur Cayenne. Vol. II. p. 276.

Diese hält beynahe sechs Zoll in die Länge. Ihr Schnabel ist einen halben Zoll lang; die Farbe des Vogels ist durchaus schwarz; der Schwanz gabelförmig; die Flügel fast anderthalb Zoll länger, als dieser.

Diese Art ist in St. Domingo und Cayenne zu Hause, aber nicht zahlreich. Man sieht sie oft auf abgestorbenen Bäumen sitzen.

Sie hält sich blos auf den dürren Haiden im Innern des Landes auf. Sie gräbt sich eine Höhle in der Erde, einen halben Fuß lang, mit einer sehr kleinen Oeffnung, so daß sie noch gerade hineinkommen kann. In dieser Höhle bauet sie ihr Nest.

Büffon erwähnt einer solchen Schwalbe, als einer Spielart, die ein schmales, weißes Band an der Stirn hatte, und einer zweyten, die aus Louisiana kam *y*), von der nämlichen Größe, aber durchaus matt schwärzlichgrau; die Füße unbefiedert *z*).

18. Die Schwalbe von St. Domingo. (St. Domingo Sw.)

Hirundo dominicensis. L. l. 2. p. 1025. No. 33 *a*)
L'Hirondelle de St. Domingue. Briss. orn. II. p. 495. No. 3.
Le grand Martinet noir à ventre blanc. Buff. ois. VI. 669.
L'Hirondelle d'Amerique. Pl. enlum. 545. f. 1.
Lev. Mus.

Von der Größe unsrer Rauchschwalbe, und sieben Zoll lang. Ihr Schnabel ist acht Linien lang, und braun; der ganze Vogel ist schwarz, mit polirten Stahlglanze, den Bauch und die untern Deckfedern des Schwanzes ausgenommen, die weiß sind; der Schwanz ist sehr wenig gabelförmig; Füße und Klauen braun.

Sie ist auf St. Domingo und andern Inseln Westindiens im May, Junius und Julius zu Hause, und soll der Lerche in ihrem Gesang nachahmen.

19. Die

x) Latham Ind. orn. II. p. 577. n. 17. B.
y) Martinet de la Louisiane. Pl. enlum. 726. f. 1.
z) Im Ind. orn. wird sie von Latham als eine Varietät der aschbäuchigen Nr. 20. angegeben. s. unten. B.

a) Latham Ind. orn. II. p. 577. n. 15. B.

19. Die Peruaniſche Schwalbe. (Peruvian Sw.)

Hirundo peruviana. L. I. 2. p. 1025. No. 34. *b*).
La grande Hirondelle de Perou. Briss. orn. II. p. 498. No. 6.
Le Martinet noir et blanc, à ceinture grise. Buff. ois. VI. p. 670.

Ihr Schnabel iſt ſchwarz; Kopf, Kehle und Hals ſind grau; der Rücken, Steiß, die Schulterfedern und obern Deckfedern des Schwanzes ſchwarz; die untern Theile des Körpers rein weiß, ein aſchfarbnes Band queer über die Bruſt ausgenommen; die obern Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern und der Schwanz hellgrau, mit gelblichgrauen Rändern; die Klauen ſchwarz.

Sie iſt in Peru zu Hauſe.

20. Die aſchbäuchige Schwalbe. (Aſh - bellied Sw.)

Hirundo cinerea. L. I. 2. p. 1026. No. 35. *c*)
L'Hirondelle de Perou. Briss. orn. II. p. 498. No. 6.
La petite Hirondelle noire à ventre cendré. Buff. ois. VI. p. 673.

Dieſe iſt kleiner, als die Rauchſchwalbe, und ihr Schnabel ſehr kurz; die Augen ſind ſchwarz, und mit braunen Kreiß umgeben; die obern Theile des Gefieders glänzend ſchwarz; alle untern Theile aſchfarben = Schwungfedern und Schwanz dunkelaſchfarben, mit gelblichgrauen Rändern *d*).

Sie iſt in Peru zu Hauſe, und Dr. Forſter hat ſie auch auf Otaheite angetroffen.

21. Die violette Schwalbe. (Violet Sw.)

Hirundo violacea. L. I. 2. p. 1026, No. 36. *e*)
L'Hirondelle bleue de la Louisiane. Buff. ois. VI. p. 674. Pl. enlum. 722.

Ihre Länge iſt neunthalb Zoll. Der Schnabel iſt drey Viertel Zoll lang, und ſchwarz; die Hauptfarbe des Gefieders dunkelblau, das einen violeten Glanz in verſchiedenen Schattirungen wirft, je nachdem ſich die Lichtſtrahlen brechen; die innern Fahnen der großen Schwungfedern ſind ſchwarz; der Schwanz iſt ſtark gabelförmig; die Füße ſind ſchwarz.

b) Latham Ind. orn. II. p. 577. n. 19. B.

c) Latham Ind. orn. II. p. 578. n. 20. B.

d) Var. A. Die grauſchwärzliche Schwalbe.
H. tota griseo nigricans. Latham Ind. orn. II. p. 578 n. 20. β.
Martinet de la Louisiane. Pl. enlum. 725. f. 2.
Buffon VI. p. 669.
Sie iſt am ganzen Leibe grauſchwärzlich und die Flügel ſind länger als der Schwanz.
Ihr Aufenthalt iſt in Louiſiana.
(Vergl. oben Nr. 17. wohin ſie ſonſt Latham zählte.) B.

e) Hirundo purpurea. Latham Ind. orn. II. p. 578. n. 22. wo ſie mit Nr. 23 und 24. für ein drey Vogel ausgegeben wird, mit dem Unterſchied, daß letzteres das Weibchen iſt. B.

Sie ist in Louisiana zu Hause, von welchem Lande man auch eine andere gesehen hat, die etwas größer war, aber darin abzieng, daß die größern Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern und der Schwanz einfärbig matt schwarz waren.

22. Die stahlschwarze Schwalbe. (Chaly-beate Sw.)

Hirundo chalybea. L. I. 2. p. 1026. No. 37. *f*).
L'Hirondelle de Cayenne. Briss. orn. p. 495. No. 4. pl. 46. f. 1. — Buff. ois. VI. p. 675. — Pl. enlum 545. f. 2.
Lev. Mus.

Sie ist sechs Zoll lang. Der Schnabel drey Viertel Zoll lang, etwas stärker, als bey dieser Gattung gewöhnlich ist, und braun; das Gefieder an den obern Theilen schwarz, mit dem Glanze von polirtem Stahl, an den untern weiß; Schwungfedern und Schwanz schwarz, ohne Glanz, letzterer gabelförmig; die Füße braun.

Sie ist in Cayenne gemein. Man sieht sie häufig auf gefällten Bäumen sitzen, oder an entlaubten kleben (burnt). Sie macht kein Nest, sondern legt ihre Eyer in die Baumlöcher, und bleibt das ganze Jahr hindurch in Cayenne.

23. Die Purpurschwalbe. (Purple Sw.)

Hirundo purpurea. L. I. 2. p. 1020. No. 5. *g*)
Le Martinet de la Caroline. Briss. orn. II. p. 515. No. 17.
Purple Martin. Catesby Carol. I. pl. 51.
— — Kalm. Trav. II. p. 147.
— Swallow. Arct. Zool. II. p. 333. *h*)

Kleiner als die Mauerschwalbe (Nr. 34.), und sieben und drey Viertel Zoll lang. Ihr Schnabel ist zehn Linien lang, und schwarz; der ganze Körper dunkel violet, mit starkem Glanze; Schwungfedern und Schwanz eben so, aber noch dunkler, letzter gabelförmig; Füße und Klauen schwärzlich.

Das Weibchen ist dunkelbraun, mit einem kaum bemerkbaren, purpurfarbnen Anstrich *i*). Diese

f) Latham Ind. orn. II. p. 578. n. 21. B.
g) Latham Ind. orn. II. p. 576. n. 22. B.
h) Uebers. S. 403. Nr. 250. B.
i) Pennant beschreibt in der Arct. Zool. diesen Vogel folgendergestalt: Das ganze Gefieder ist schwarz, mit einem sehr hohen blau und tief purpurroth schillerndem Glanze, die Flügel und der Schwanz haben keine so lebhafte Farben; die Beine und Füße sind nackt, groß und stark. Sie ist weit größer als die Europäische Mauerschwalbe, aber die Flügel sind nach Verhältniß kürzer.

Die Farben des Weibchens sind nicht so glänzend auf den obern Theilen des Körpers, unten ist es schmutzig weiß, und bey einigen ist der Rücken der Flügel weiß und die Brust grau. So ist das vom Hrn. Edwards (s. Nr. 24.) abgebildete Exemplar beschaffen. Ich halte diese Figur für einen jungen Vogel, welcher der Art nach wohl nicht verschieden ist, wohl aber in Ansehung des Geschlechts von der des Hrn. Catesby (Nr. 23.) abweichen mag; denn ich habe Gelegenheit gehabt beyde, Mann-

Diese Art ist im Sommer in Carolina und Virginien, wo sie im May ankommt, und bey Annäherung des Winters wieder wegzieht. Das gemeine Volk lockt sie sehr *k*), und macht ihr kleine Töpfen oder Büchsen an der äußern Wand der Häuser zurechte, auf die der Vogel bauen kann, so wie man in England für die Sperlinge dergleichen zurichtet. Denn man liebt sie sehr gerne in die Nähe, weil sie das Federvieh bey der Annäherung des Habichts, oder anderer Raubvögel aufmuntern, indem sie nicht nur bey der Erscheinung dieser Feinde sehr schreyen, sondern sie selbst, wie unsre Europäischen Hausschwalben nachdrücklich angreifen.

24. Die Canadische Schwalbe. (Canada Sw.)

Hirundo Subis. L. I. 2. p. 1021. No. 7. *l*)
L'Hirondelle de la Baye d'Hudson. Briss. orn. VI. Append. p. 56. No. 18. — Buff. ois. VI p. 677.
Great American Martin. Edw. Ill. pl. 120.
Lev. Mus.

Diese ist etwas größer, als die Mauerschwalbe, hat aber nicht so lange Flügel; ihr Schnabel ist ziemlich stark; das Gefieder an den obern Theilen des Körpers ist purpurschwarz; Kehle, Vorderhals und Brust sind dunkelgrau; der Bauch, der Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes weiß, mit Braun schattirt; an den Seiten ist die Farbe auch bräunlich; Schwungfedern und Schwanz sind schwärzlich, mit braunen Rändern; letzter gabelförmig; Füße und Klauen dunkelfarbig *m*).

Sie ist auf Hudson's Bay zu Hause, wo sie die Einwohner Sashaua-paschu nennen.

25. Die Brasilische Schwalbe. (Brasilian Sw.)

Hirundo Tapera. L. I. 2. p. 1022. No. 9. *n*)
L'Hirondelle d'Amerique. Briss. orn. II. p. 502. No. 10. pl. 45. f. 3.
Le Tapere. Buff. ois. VI. p. 678.
Hirundo americana Brasiliensibus Tapera dicta. Ray Syn. p. 72. No. 3. p. 185. No. 32. — Will. orn. p. 214. No. 6.
Swallow. Sloane Jam. p. 312. pl. 51.

Sie ist fünf und drey Viertel Zoll lang. Ihr Schnabel ist acht Linien lang, und schwarz; die obern Theile des Gefieders sind braun; Kehle, Vorderhals, Brust, Seiten und Schenkel graulichbraun; der Bauch und die untern Deckfedern des Schwanzes weiß; die Schwungfedern schwärz-

Männchen und Weibchen, welche aus Neuyork kamen untersuchen zu können. Ich muß auch die Louisianische Schwalbe (s. Nr. 17. 20.) des Grafen Büffon mit dieser Art vereinigen. B.

k) Kalm.

l) Hirundo purpurea (femina) Latham Ind. orn. II. p. 575. n. 22. B.

m) Dieß ist, wie aus dem Ind. orn. des Lathams und Pennants Arct. Zool zu ersehen, das Weibchen der Purpur- und violeten Schwalbe. B.

n) Latham Ind. orn. II. p. 579. n. 23. B.

schwärzlichbraun; der Schwanz kaum etwas gabelförmig, und von der Farbe der Schwungfedern; Füße und Klauen braun.

Sie wohnt in Südamerika o), und man trifft sie in Brasilien und Cayenne, so wie in Jamaika p) an. Sloane bemerkt, sie halte sich nur sechs Monate daselbst auf, wie die Schwalbe in Europa, und besuche die Ebenen und Haiden dieser Insel; zuweilen setze sie sich auf die Spitzen der Sträucher.

26. Die Schwalbe mit braunem Halsbande. (Brown-collared Sw.)

Hirundo torquata. L. I. 2. p. 1022. No. 25. q)
L'Hirondelle brune et blanche, à ceinture brune. Buff. oit. VI p. 680.
L'Hirondelle brune à collier du Cap de bonne Esperance. Pl. enlum. 723. f. 1.

Ihre Länge ist sechs Zoll. Der Schnabel ist acht Linien lang, und ziemlich stark; der obere Theil des Körpers braun, der untere weiß, ein braunes Band queer über die Brust ausgenommen; die Schenkel sind auch braun; zwischen dem Schnabel und den Augen ist ein kleiner, weißer Fleck; der Schwanz am Ende gleich.

Sie ist auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause.

27. Die weißflüglige Schwalbe. (White-winged Sw.)

Hirundo leucoptera. L. I. 2. p. 1022. No. 26. r)
L'Hirondelle à ventre blanc de Cayenne. Buff. ois. VI. p. 681. — Pl. enlum 546. f. 2.

Ihre Länge ist von vier und ein Viertel Zoll, bis fünf Zoll. Der Schnabel sechs bis acht Linien lang, und schwarz; der Scheitel, Hals, Körper und die kleinern Deckfedern der Flügel sind aschfarben, mit blauen und grünen Wiederschein, in verschiedenem Lichte, und einige der größern Deckfedern sind weiß geändert; einige Exemplare haben auch viel Weißes an den kürzern Schwungfedern; die großen Schwungfedern und der Schwanz sind braun, mit dem nämlichen grünen und blauen Glanze, wie der Körper, aber dunkler; alle untern Theile, vom Kinn bis zum After weiß; der Steiß auch weiß; der Schwanz ein wenig gabelförmig, und über ein Viertel Zoll kürzer als die Flügel; die Füße blaß.

27. Var. A. Hirundo leucoptera. L. I. 2. p. 1022. No. 26. β.
L'Hirondelle à ventre tacheté de Cayenne. Buff. ois. VI. p. 682. — Pl. enlum. 546. f. 1.

Die obern Theile dieses Vogels sind mattbraun, ohne Glanz und ohne irgend eine Mischung von Weißem; die untern Theile weiß, mit braunen Längsflecken bezeichnet, die an Hals und Brust am häufigsten sind; Schnabel und Füße, wie bey der vorigen.

Durch

o) Brisson.
p) Sloane.
q) Latham Ind. orn. II. p. 559. n. 24. B.
r) Latham Ind. orn. II. p. 579. n. 25. B.

Durch die Größe, die Farbe der Füße und die Gestalt überhaupt, wird es sehr wahrscheinlich, daß sie eine Spielart der vorigen ist. Beyde finden sich in Guiana, wo sie sich auf den feuchten Haiden aufhalten, und die Oberfläche der Erde überfliegen (skimming), um Insekten zu suchen, wie andre Schwalben; oft sieht man sie auch auf niedern Zweigen unbelaubter Bäume sitzen.

28. Die eßbare Schwalbe. (Escolent Sw.)

Hirundo esculenta. L. I. 2. p. 1016. No. 2. *s*)
— — Osbeck Voy. Vol. II. p. 330.
— sinensis, nido eduli Bontii. Ray. Syn. p. 72. No. 6.
L'Hirondelle de rivage de la Cochinchine. Briss. orn. II. p. 510. No. 14. pl. 46. f. 2. A.
La Salangane. Buff. ois. VI. p. 682.
Chinese Swallow, whose nest is edible. Will. orn. p. 215. *t*)

Diese Art soll kleiner als der Zaunkönig und nur zwey und ein Viertel Zoll lang seyn *r*). Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern gelb; die obern Theile des Körpers braun; die untern weißlich; der Schwanz gabelförmig, und jede seiner Federn mit einer weißen Spitze versehen; die Füße braun.

Die Abbildung dieses Vogels verdanken wir dem Pinsel des Herrn Poivre, nach welcher Brisson die obige Beschreibung desselben entworfen, und die Figur in seiner Ornithologie copirt hat. Demohngeachtet bin ich doch noch zweifelhaft, ob nicht, so getreu die Figur auch seyn mag, die Größe viel zu gering angegeben ist; denn Herr Marsden *u*) sagt, „der Vogel scheint die gemeine Hausschwalbe zu seyn“; und ich bin sehr geneigt zu glauben, daß er wenigstens die Größe habe, wegen der Eyer, die noch beym Neste, im Brittischen Museum, sich befinden, und so groß, als die der Hausschwalbe, und von der nämlichen Farbe sind. Inzwischen kann ich diesen Umstand nicht als gewiß behaupten (dispute the point). Das Sonderbarste in der Naturgeschichte dieses Vogels ist sein Nest, das aus solchen Materialien besteht, daß es nicht bloß eßbar ist, sondern für einen der größten Leckerbissen der Asiatischen Schwelger gehalten wird. Es wiegt eine halbe Unze, und gleicht an Gestalt einer Limone, oder, wie es einige vergleichen, einer halben Schüssel (sauces), auf der einen Seite plattgedrückt, wo es an dem Felsen anhängt. Die Textur desselben gleicht einigermaßen dem Talkstein (isinglass), oder vielmehr seinem Traganth, und die verschiedenen Schichten des Stoffes, aus dem es zusammengesetzt ist, sind sehr sichtbar (apparent); es ist nämlich aus verschiedenen Theilen einer weichen, schleimigen Substanz gemacht, auf die nämliche Art, wie die Hausschwalben ihre Nester aus Lehm verfertigen.

Die Schriftsteller sind verschiedener Meynung über die Materialien, aus denen es besteht. Einige vermuthen, es bestehe aus Seewürmern, aus der Ordnung Mollusca *v*) andere aus der See-

s) Latham Ind. orn. II. p. 580. n. 26. B.
t) Auch meine N. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 355. Nr. 6. B.
u) Hist. sumatr. p. 141.
v) Osbeck.

Seequalle, einer Art von Kuttelfiſch, oder einer ſchleimigen Seepflanze, Agal, Agal genannt [w]). Man hat auch ſogar die Vermuthung geäußert, daß ſie andern Vögel ihre Eyer raubten, und nachdem ſie die Schaalen zerbrochen hätten, das Weiße derſelben zu dieſem Entzwekke anwendeten [x]). Der Gebrauch, den man von dieſen Neſtern macht, iſt zweyfach; die beſte Sorte, die rein und vom Schmuz vollkommen frey iſt, wird in Fleiſchbrühe aufgelößt, um dieſe dick zu machen, und ſie ſoll ihr einen vortrefflichen Geſchmack mittheilen [y]). Aus den ſchwarzen und ſchmuzigen macht man Kleiſter [z]).

Dieſe Neſter findet man in großer Zahl in gewiſſen Höhlen, in verſchiedenen Inſeln des Soolo Archipelagus [a]), die zwiſchen 117° und 120° Länge, und 5° und 7° Breite liegen; vorzüglich auf drey kleinen Inſeln, oder vielmehr Felſen, in deren Höhlen man ſie in ungeheurer Zahl an den Wänden hängen findet. Man trifft ſie auch in erſtaunender Menge auf einer kleinen Inſel, Toc genannt, in der Sundriſchen Straße an, deren Höhlen mit dieſen Neſtern tapeziert ſind; nirgends aber in größerer Menge, als um Croce, am ſüdlichen Ende von Sumatra, vier Meilen einem Strom dieſes Namens hinauf. Sie ſind aber nicht blos auf oben benannte Gegenden eingeſchränkt; denn auch von Java bis Cochinchina gegen Norden, und von der Spitze von Sumatra gegen Weſten, bis nach Neu-Guinea gegen Oſten ſind ſie gemein, wo die See mit einer zähen, halb zerlaſſenen Kleiſter (glue) ähnlichen Subſtanz bedeckt ſeyn ſoll, die der Vogel vermuthlich entweder mit ſeinem Schnabel im Fluge, von der Oberfläche wegſchöpft, oder von den Felſen, an denen ſie die Wellen ſitzen gelaſſen haben, abpickt.

Die beſten Neſter, oder die reinen, weißen, von aller fremden Beymiſchung freyen, koſten in China 1000 bis 1500 Thaler der Pickel [b]); die ſchwarzen und ſchmuzigen aber nur 20 Thaler. Die letztern werden vermuthlich vom Alter ſo, und ſind mit Koth oder Federn vermiſcht; und die Neſterſammler ſchlagen alle ſchwarzen herab, zu denen ſie kommen können, in der Hoffnung, daß ſie, weil die Vögel in die Nothwendigkeit verſetzt ſind, friſche Neſter zu bauen, beym nächſten Einſammeln mit nutzbarern vertauſcht ſeyn ſollen. Man ſagt, bloß die Holländer führen jährlich 1000 Pickels dieſer Neſter aus Batavia [c]), die aus den Inſeln Cochinchina und den gegen Oſten dieſes Landes gelegenen gebracht werden. Man muß ſich wundern, daß unter andern Artikeln des Luxus, die aus Oſtindien zu uns gebracht werden, der

w) Forrest Voy. p. 28.

x) Man ſagt für gewiß, daß die röhrige Seeblaſe. (Holothuria tabulosa) die Materialien dazu hergebe. B.

y) Hauptſächlich bedient man ſich ihrer, zu Suppen und Hühnerragouts, die man dann mit der Ginſengwurzel vermiſcht. Die Neſter müſſen erſt in Waſſer eingeweicht werden; dann werden ſie in Stücke zerriſſen, und, nachdem ſie mit Ginſeng vermiſcht worden ſind, in den Körper eines Huhns geſtekt. Das Ganze wird alsdann in einem Topfe, mit gehöriger Menge Waſſers, langſam gekocht, und die ganze Nacht auf den Kohlen ſtehen gelaſſen. Den folgenden Morgen iſt es zum Eſſen fertig. — Voy. de siam. vol. 1. p. 278. 79.

z) Marsden Sumatr. p. 141.

a) Forrest.

b) Der Pikel oder Pekul hält ohngefähr 125 Pfund; oder, wie Dampier ſagt, 300 Pekuls ſind gleich 396 Engliſchen Pfunden. ſ. Voy. vol. 11. p. 132.

c) Oſbeck.

der Gebrauch dieſer Neſter noch einen Weg zu unſern Tafeln gefunden hat; denn ſie ſind ſo ſelten in England, daß man ſie als Seltenheiten in den Cabinetten der Sammler aufbewahrt.

Der Vogel ſelbſt iſt zu Sumatra unter dem Namen: Layönglayöng bekannt *).

29. Die Waizenſchwalbe. (Wheat Sw.)

Hirundo borbonica. L. I. 2. p. 1017. No. 14. e)
La grande Hirondelle brune à ventre tacheté, ou l'Hirondelle des blés. Buff. ois. VI. p. 694.
L'Hirondelle de l'isle de Bourbon. Pl. enlum 544. f. 2. (eine Spielart.)

Sie hat die Größe der Mauerſchwalbe. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; das Gefieder an den obern Theilen ſchwärzlich braun; an den untern grau, und mit braunen Längsflecken bezeichnet; der Schwanz am Ende gleich; die Füße ſchwarz.

Sie iſt auf der Inſel Frankreich zu Hauſe, wo ſie ſich auf den mit Weizen (wheat) beſäeten Plätzen, um die abgeholzeten Stellen (glades) der Wälder aufhält. Sie liebt erhabene Oerter, und oft ſieht man ſie auf Bäumen und Steinen ſitzen. Sie folgt den Viehheerden, der Fliegen wegen, die dieſe umgeben, und nicht ſelten ſieht man ſie bey den Schiffen die auf den Rheeden dieſer Inſel liegen, ohne Zweifel in der nämlichen Abſicht. Oft bemerkt man ſie des Abends um die Bergklüfte herum, wo ſie die Nacht zubringt, und ihr Neſt aus Stroh und Federn verfertigen ſoll, in das ſie zwey graue braue punktirte Eyer legt.

Auf der Inſel Frankreich kennt man dieſen Vogel unter dem Namen: Hirondelle des blés, oder Waizenſchwalbe.

29. Var. A.

Der aus dem Pl. enlum. oben citirte Vogel iſt in etwas verſchieden; denn der Scheitel, die Flügel und der Schwanz ſind ſchwärzlichbraun; die drey äußern Schwanzfedern haben ſchmuzigweiße Spitzen, und ſind gräulichbraun eingefaßt; die übrigen obern Theile ſind von letzter Farbe; die untern grau, und nach der Länge braun geſtreift.

30. Die grauſteißige Schwalbe. (Grey-rumped Sw.)

Hirundo francica. L. I. 2. p. 1015. No. 17. f)
La petite Hirondelle noire à croupion gris. Buff. ois. VI. p. 696.
Hirondelle de Bourbon. Pl. enlum 544. f. 2.

Ihre Länge iſt vier und ein Viertel Zoll; die obern Theile des Körpers ſind ſchwärzlich, die untern und der Steiß weißlich, oder grau.

Sie bewohnt die Inſel Frankreich, gehört aber unter die weniger zahlreichen Arten. Vorzüglich findet man ſie in der Nachbarſchaft von friſchen Gebüſchen. Sie fliegt ſchnell; ſelten ſieht man

*) Hist. sumatr.
e) Latham Ind. orn. II. p. 580. n. 27. B.
f) Latham Ind. orn. II. p. 580. n. 28. B

ſieht man ſie aufſitzen; vermuthlich bringt ſie die Nacht in den Wäldern zu, weil man ſie des Abends in den Vorſäumen derſelben ſieht. Sie iſt gewöhnlich ſehr mager, und nicht gut zu eſſen.

Herr Sonnerat hat eine Schwalbe aus Indien mitgebracht, die zu dieſer Art zu gehören ſcheint, und deren untere Theile geſtreift ſind, wie bey der Weißenſchwalbe; auch die Farbe der obern Theile, ſo wie die Größe, ſind die nämlichen; nur ſind die Flügel über anderthalb Zoll länger, als der Schwanz.

31. Die rothſteißige Schwalbe. (Rufous-rumped Sw.)

Hirundo americana. L. I. 2. p. 1017. No. 16. g)
L'Hirondelle à crupion roux et queue carrée. Buff. ois. VI. p. 698.

Sie iſt ſiebenthalb Zoll lang. Die obern Theile des Gefieders ſind ſchwärzlichbraun, mit grünlichem und blauem Glanze; Steiß und After gelbroth, mit einer geringen Miſchung von Weißem; die Schwungfedern inwendig weißlich; die untern Theile des Körpers ſchmutzigweiß; der Schwanz gleich.

Sie befindet ſich im Mai an den Ufern des Plata-Stroms, in Südamerika.

31. Var. A.

Eine Spielart davon hatte keine gelbrothe Kehle, mehr Weißes als Gelbrothes, an dem Steiß und den untern Deckfedern des Schwanzes, und nichts Weißes an den Schwungfedern, der Schwanz war ein wenig gabelförmig *h*).

32. Die Stachelſchwalbe. (Aculeated Sw.)

Hirundo pelasgia. L. I. 2. p. 1023. No. 10. *i*)
L'Hirondelle de la Caroline. Briss. orn. II. p. 501. No. 9. — Buff. ois. VI. p. 700.
American Swallow. Catesby Carol. Append. pl. 8. — Arct. Zool. II. No. 135. t. 18. *k*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Kleiner, als die Rauchſchwalbe, vier und ein Viertel Zoll lang *l*). Der Schnabel iſt braun, an den untern eben ſo, aber heller; die Kehle weißlich; alle Schwanzfedern endigen ſich in einen unbefiederten, zugeſpitzten Schaft *m*).

Sie

g) Latham Ind. orn. II. p. 581. n. 29. B.
h) Latham frägt im Ind. orn. ob es etwa eine beſondre Art ſey? B.
i) Latham Ind. orn. II. p. 581. n. 30. B.
k) Uebers. II S. 405. Nr. 252. B.
l) Pennant ſagt, ſie ſey 5 1/2 Zoll lang. B.
m) Pennant beſchreibt ſie genau ſo: Der Schnabel iſt kurz, breit und ſchwarz; Kopf, Obertheil des Halſes und Flügel dunkelbraun; die Bruſt aſchgrau; Rücken, Schwanz und Bauch braun; der Schwanz iſt am Ende grade, aber das äußerſte Ende an dem Schafte jeder Feder nackt

Sie ist in Carolina und Virginien im Sommer zu Hause, und baut in die Schornsteine *n*).

32. Var. A. Hirundo pelasgia. L. l. 2. p. 1023. No. 10.
L'Hirondelle brune acutipenne de la Louisiane. Buff. ois. VI. p. 699.
L'Hirondelle a queue pointue de la Louisiane. Pl. enlum 726. f. 2.
Louisiane Swallow. Arct. Zool. II. No. 335. *p*)

Von der Größe der letzten; das Gefieder überhaupt braun; Kehle und Vorderhals schmuzigweiß, mit grünlichbraunen Flecken; der Schwanz spitzig, wie bey der letzten.

Var. B. Hirundo pelasgia. L. l. 2. p. 1023. No. 10. γ. *q*)
L'Hirondelle acutipenne de Cayenne. Buff. ois. VI. p. 601. — Pl. enlum. 726. f. 1.

Sie ist über fünfthalb Zoll lang. Oben bläulichbraun; der Steiß grau; Kehle und Vorderhals gelbrothgrau.

Sie ist in Cayenne und Guiana zu Hause, selten aber an bewohnten Plätzen; auch weiß man nicht, ob sie in Schornsteine nistet oder nicht, da es in diesen Ländern keine giebt.

33. Die scharfschwänzige Schwalbe. (Sharp-tailed Sw.)

Hirundo acuta. L. l. 2. p. 1023. No. 27. *r*)
L'Hirondelle noire acutipenne de la Martinique. Buff. ois. VI. p. 702. — Pl. enlum. 544. f. 1.

nackt und scharf zugespitzt; die Flügel reichen weit über den Schwanz hinaus; die Beine sind kürzer als gewöhnlich bey dieser Gattung und etwas unter den Knieen nackt. B.

n) Und macht wie Pennant näher angiebt, aus kleinen kurzen Reisern, welche sie mit dem Gummi des Pechbaums zusammenklebt, ein merkwürdiges Nest. Dieß ist an der Spitze offen, und hat die Form des dritten Theils von einem Cirkel. Sie legt im Junius 4 bis 5 Eyer, und verläßt das Land im August. Sie hängen oft mit den Füßen fest an der Schornsteinwand und halten sich mit ihrem scharfen Schwanz. Sie machen wenn sie den Schornstein herauf und herunter fliegen, beständig ein donnerndes Geräusch.

Es ist merkwürdig, daß drey Arten der Amerikanischen Schwalben, diese und die Purpur- und Mauerschwalbe, den Schutz der Häuser zum Nesterbauen suchen; das bleibt aber doch gewiß, daß sie vor der Ankunft der Europäer zu Felsen und hohen Bäumen ihre Zuflucht nehmen mußten; denn die elenden Hütten der Indianer hatten weder Dachrinnen für die beyden andern Arten, noch Schornsteine für diese Schwalbe. Jene müssen also ihre Nester an die Vorderseite eines jähen Abhangs geheftet haben, so wie einige Hausschwalben in Amerika, und so wie es diese Art an den steilen Felsen um Irkutsk in Sibirien macht. Der Instinkt, welche einen Theil dieser Gattung leitet, Schutz bey Menschen zu suchen; sobald die vorher unbekannte Gelegenheit sich darzu darbietet, ist wunderbar und unerklärlich. B.

o) Latham l. c. 8.

p) Uebers. II S. 405. Nr. 252. unten.

q) Latham l. c. γ. B

r) Latham Ind. orn. II. p. 581. n. 31. B.

Sie hat die Größe eines Zaunkönigs, und ist drey Zoll, acht Linien lang. Oben ist sie schwarz; die Kehle bräunlichgrau; die übrigen untern Theile mattbraun; Schnabel und Füße braun; die Enden der Schwanzfedern zugespitzt, wie bey der letzten Art. Bey einigen sind die untern Theile des Körpers röthlichbraun.

Sie ist auf Martinique zu Hause, und eine der kleinsten dieser Gattung *).

34. Die gemeine Mauerschwalbe. (Swift.

Hirundo Apus. L. I. 2. p. 1020. No. 6. *t*) — Scop. ann. I. p. 166. No. 251. *u*) Kram. elench. p. 380. No. 3. — Brünn. orn. p. 74. No. 292. — Frisch tab. 17. — Müller Zool. No. 260. — Georgi Reise. p. 175.
Le Martinet. Briss. orn. II. p. 512. No. 15.
— — noir. Buff. ois. VI. p. 643.
Le grand Martinet. Pl. enlum. 542. f. 1.
Black Martin, or Swift. Ray Syn. p. 72. A. 4. — Will. orn. p. 214. No. 39. Albin. II. pl. 55. — Br. Zool. I. No. 171. — Arct. Zool. II. No. 334 *v*) Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß ist eine große Art, die beynahe acht Zoll lang ist, aber nur eine Unze wiegt. Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern nußbraun; die Farbe des ganzen Gefieders rußschwarz, das Kinn ausgenommen, das weiß ist; die Flügel sind sehr lang, und messen, von einer Spitze zur andern, nicht weniger als achtzehn Zoll; die Füße sind sehr kurz, und alle Zehen vorwärts gerichtet; der Schwanz gabelförmig, und seine äußerste Feder einen Zoll, und drüber, länger, als die mittlere; Füße und Klauen sind schwärzlich.

Das Weibchen ist etwas kleiner; sein Gefieder spielt mehr ins Braune; und das Weiße an der Kehle ist minder ausgezeichnet.

Dieß ist ein Sommerbewohner unsrer Königreiche. Er kommt unter allen seiner Gattung am spätesten an, und zieht am frühsten wieder weg; nicht immer bleibt er bis zur Mitte des Augusts, und oft kehrt er vor Anfang des Mais nicht wieder zurück.

Er mag gerne auf erhabene Oerter nisten, je höher, desto besser, als Kirchthürme, andere hohe Gebäude u. d. gl. in deren Höhlungen er sein Nest baut. Man glaubt, er kehre jährlich auf

*) Im Ind. orn. zweifelt Latham, ob sie von der letzten Art verschieden sey. B.

t) Latham Ind. orn. II. p. 582. n. 32. Von hier gehen die Schwalben an, die alle vier Zehen vorwärts gekehrt haben. Eigentlich steht zwar nur die Hinterzehe nahe zur Seite. Daher, und weil auch diese, so wie die folgende drey Schwalben einen an der untern Kinnlade niederwärts gebogenen Schnabel, elliptische, inwendig verdoppelte Nasenlöcher haben, so möchte sie Latham zu einer eignen Gattung gemacht wissen. So viel ist gewiß, daß sie auch durch die Breite des Kopfs viel Aehnlichkeit mit der Nachtschwalbe haben, daher sie wenigstens als besondere Familie einen Uebergang zu jener Gattung ausmachen, wenn man sie nicht als Gattung trennen will. B.

u) Uebers. von Günther S. 205. Nr. 251. B.

v) Uebers. II. S. 404. Nr. 251. B.

auf den nämlichen Platz zurück. Er hat nur eine Brut des Jahrs. Mehrentheils legt er fünf weiße Eyer, von etwas länglicher Form *w*). Seine Nahrung ſind Fliegen, Motten, und andere geflügelte Inſekten; und da er alles im Fluge haſchen kann, ſo haben ihn viele mittelſt des Köders von einem Maikäfer, der an eine Schnur befeſtigt war, gefangen. Er ſchluckt denſelben ſo begierig hinunter, als ein Fiſch. Auf der Inſel Zanta, ſollen ſich die Knaben auf einen erhöhten Ort begeben, und blos mit einem Haaken, der mit einer Feder beködert war, fünf bis ſechs Dutzend dieſer Vögel in einem Tage gefangen haben *x*). Er fliegt vorzüglich des Morgens und des Abends, und während der Tagshitze liegt er in ſeiner Höhle, wahrſcheinlich, weil er die Hitze eben ſo wenig vertragen kann, als die Kälte.

Auſſer unſrer Inſel, iſt er noch auf dem ganzen feſten Lande von Europa zu Hauſe. Eben ſo wird ſeiner als eines auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung *y*) und in Carolina, in Nordamerika *z*), einheimiſchen Vogels erwähnt. Daher iſt er ſehr wahrſcheinlich ein allgemeiner Bewohner der alten und neuen Welt.

35. Die Chineſiſche Mauerſchwalbe. (Chinese Sw.)

Hirundo sinensis. L. I. 2. p. 1021. No. 22. *a*)
Le grand Martinet de la Chine. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 199.

Dieſe iſt zwölfthalb Zoll lang. Schnabel und Augenſtern ſind bläulichgrau; jener kurz, und an der Wurzel breit; die Flügel lang; die Füße kurz; der Schwanz gabelförmig, und ſo lang, als die Flügel; der Scheitel hell gelbroth; die Kehle weiß; der Hinterhals, der Rücken, die Flügel und der Schwanz braun; über den Augen ein ſchöner Streifen, der über ſie hinausreicht, und ſich mit der Hauptfarbe des Halſes vermiſcht; Bruſt und Bauch ſind ſehr hell gelbrothgrau; die Augen mit weißen Federn rings umgeben; die Füße blaugrau *b*).

Sie iſt in China zu Hauſe.

36. Die weißbäuchigel Mauerſchwalbe. (Alpenſchwalbe. White-bellied Sw.)

Hirundo Melba. L. I. 2. p. 1023. No. 11. *c*)
— — alpestris. Scop. ann. I. p. 166. No. 252. *d*)
La grande Hirondelle d'Espagne. Briss. orn II p. 504 No. 11.
Le grand Martinet à ventre blanc. Buff. ois. VI. p. 660.
Greatest Martin or Swift. Edw. I. pl. 27. *e*)

Ihr

w) Zum Neſte trägt er etliche Federn, Käferflügel und auf Dächern liegendes Geniſt zuſammen, und lagirt das Neſt mit einem aus dem Munde fließenden Schleim aus. B.
x) Hist. des Ois.
y) Kolbe.
z) Lanson.
a) Latham Ind. orn. II. p. 583. n. 85. B.
b) Es wird nicht geſagt, ob alle vier Zehen vorwärts ſtehn, wie bey der vorigen Art; ob — ſich dieſes gleich aus der Benennung ſchließen läßt.
c) Latham Ind. orn. II. p. 582. n. 33. B.
d) Ueberſ. von Günther S. 207. Nr. 252. B.
e) Kleins Prodromus hist. av. und XXXVIII. IVa

Ihre Länge ist achthalb Zoll, und ihr Gewicht zwey Unzen, fünf Quentchen. Der Schnabel ist einen halben Zoll lang, etwas gebogen, und schwarz, der Augenstern blau; die obern Theile des Körpers graubraun, Flügel und Schwanz am dunkelsten mit rothem und grünem Glanze bey gewissem Lichte; Kehle, Brust und Bauch weiß; am Halse ist ein graubraunes, schwärzlich melirtes Halsband; die Seiten sind dunkelfarbig und weiß gemischt; der untere Theil des Bauchs und die untern Deckfedern des Schwanzes, eben so, wie der Rücken; die Füße fleischfarben und an der vordern und innern Seite mit Federn bedeckt; alle Zehen stehn vorwärts, wie bey unsrer Mauerschwalbe.

Dieser Vogel ist in den bergichen Gegenden Spaniens zu Hause, und nistet in die Felsenhöhlen. Man findet ihn auch an den Ufern der Rhone, in Savoyen, auf der Insel Malta, den Schweizeralpen, den Felsen von Gibraltar, und zu Aleppo *f*). Er unterscheidet sich dadurch, daß seine Flügel verhältnißmäßig länger sind, und daß er nur zehn Federn im Schwanze hat *g*).

Nach Savoyen kommt er zu Anfang Aprils, und hält sich funfzehn oder zwanzig Tage ang an Teichen und Sümpfen auf, nachher zieht er sich in die Berggegenden zurück, um zu brüten. Er fliegt höher, als unsre Mauerschwalbe, und nährt sich auf dieselbe Art. Sein Fleisch wird für einen schmackhaften Bissen gehalten. Diese Art ist nicht zahlreich. Skopoli sagt, sie baue auf die Gipfel der Tyroler Gebirge. *h*)

37. Die Mauerschwalbe mit dem weißen Halsbande. (White-collared Sw.)

Hirundo cayennensis. L. I. 2. p. 1024. No. 28. *i*).
Le Martinet à collier blanc. Buff. ois. VI. p. 671.
— — de Cayenne. Pl. enlum. 725. f. 2.

Sie hat die Größe der gemeinen Mauerschwalbe, und ist fünf und ein Viertel Zoll auch darüber, lang. Ihr Schnabel ist sechs bis sieben Linien lang, und schwarz; der Kopf schwarz; Kinn und Kehle weiß, und von da aus läuft es in einem schmalen Halsbande um den Hals herum; zwischen den Schnabel und den Augen ist ein weißer Streifen, der sich in zwey zerspaltet, wovon der Eine etwas über- und der Andere etwas unter das Auge hinläuft; das übrige Gefieder ist schwarz, mit violettem Glanze; aber die größern, zunächst am Körper stehenden Deckfedern, sind braun, mit weißen Rändern; zu beyden Seiten des Unterleibs, und über den Schenkeln ist die Farbe weiß; Schwungfedern und Schwanz sind schwarz, letzterer gabelförmig; die Füße schwarz; alle Zehen stehn vorwärts, wie bey unsrer Mauerschwalbe, und sind bis an die Klauen mit Federn bedeckt.

Dieser Vogel macht sein Nest in die Häuser in Cayenne. Es ist von beträchtlicher Größe, und hat die Form eines abgestumpften Kegels; fünf Zoll auf der einen, und an drey Zoll auf der

IV. 2. Meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 554. n. 5. B.
f) Hist. Alepp. p. 70.
g) Hist. des Ois.
h) Ich habe sie auch in Thüringen bemerkt. B.
i) Latham Ind. orn. II. p. 583. n. 34. B.

der andern Seite breit (?), und neun Zoll lang. Es beſteht aus dem Pflaum von Hundskohl (dogs-bane) k), der geſchickt unter einander gewebt iſt. Die Höhlung iſt ohngefähr in der Mitte, nach der Länge ſchief abgetheilt, und zwar mittelſt einer Abtheilung, die ſich ſelbſt auf denjenigen Theil des Neſtes verbreitet, wo die Eyer liegen, das ſehr nahe am Boden iſt; eine kleine Parthie des nämlichen weichen Pflaums, die eine Art von Filz (plug) bildet, iſt über dem Rücken (top) angebracht, und dient, die junge Brut von dem Eindrucke der Luft zu bewahren; woraus man ſchließen kann, daß ſie ſehr zärtlich ſeyn muß.

Zuſatz.

38. Die Javaiſche Schwalbe l).

Hirundo Javanica. Mus. Carls. IV. No. 100.

Sie hat kaum die die Größe der Rauchſchwalbe, und iſt vier und einen halben Zoll lang. Der Schnabel iſt an der Spitze pfriemenförmig, an der Wurzel zuſammengedruckt, von Farbe ſchwarz; die Naſenlöcher ſind eyrund und nackt; der Rachen weiter als der Kopf; die Zunge ſpitzig und getheilt; die Flügel länger als der Schwanz; die Schwungfedern ſchwarz, ſpitzig, die erſte und zweyte faſt von gleicher Länge, die übrigen nach und nach kürzer, die hintern an der Spitze mit einem ſchmalen weißlichen Rand; der Schwanz ganz, aus zwölf gleichen Federn beſtehend, alle, außer die mittlern, mit einem weißen Fleck bezeichnet; die Füße nackt und ſchwarz; der Oberleib ſchwarzbraun glänzend; Stirn, Kehle und Unterhals roſtfarben; Bruſt, Bauch, Steiß und Unterflügel aſchgrau.

Sie wohnt in Java unter der Erde. B.

k) Apocynum androsaemifolium Lin. B.

l) Sie ſollte eigentlich oben hinter Nr. 33. folgen, da ſie nicht zur Familie der Mauerſchwalben gehört, ſondern drey Zehen vor- und eine rückwärts hat. Allein um die Ordnung der Nummern nicht zu ändern laſſe ich ſie hier nachfolgen.

Fünf und vierzigste Gattung. Nachtschwalbe.

Der Schnabel ist bey dieser Gattung sehr kurz, und am Ende gekrümmt; der Rachen ungeheuer weit; an den Rändern der obern Kinnlade stehn sieben oder mehr steife Borsten. Der Schwanz besteht aus zehn Federn, und ist nicht gabelförmig. Die Füße sind kurz; die Zehen bis an das erste Gelenk durch eine Haut vereinigt; die Klaue der mittlern Zehe breit gerändert, und bey den meisten Arten gezähnelt *m*).

Nur eine Art dieser Gattung ist in der ganzen alten Welt, und den angränzenden Inseln zu Hause; alle andern sind Bewohner der neuen. Die Lebensart derselben ist aber nicht sehr von der der Europäischen verschieden.

1. Die große Nachtschwalbe. (Grand Goatsucker.)

Caprimulgus grandis. L. l. 2. p. 1029. No. 7.
Le grand Tette-Chevre tacheté du Bresil. Briss. orn. II. p. 458. No. 7.
Le grand Jbijau. Buff. ois. VI. p. 541.
— Crapaud volant de Cayenne. Pl. enlum. 523.
Jbijau, Amerikan Goatsucker. Ray Syn. p. 27. No. 2. — Will. orn. p. 108. pl. 13. (die größere Art.) Eine schlechte Figur.
Lev. Mus.

Ihre Größe ist die des Bussards, und ihre Länge drey und zwanzig und ein halber Zoll. Ihr Schnabel ist bis zum Ende des Rachens drey Zoll lang; und die Weite des Rachens die nämliche; die Nasenlöcher sind nicht sichtbar, da der Schnabel fast bis an die Spitze mit Haaren bedeckt ist; das Gefieder an den obern Theilen des Körpers ist gelblichweiß (cream-colour), ganz klein braun punktirt, und mit der nämlichen Farbe längs den Schäfte herab gestreift; an den Schulterfedern ist viel Weißes, besonders an der einen Seite derselben; der äußere Rand (ridge) der Flügel ist braun; die Flügel reichen fast bis ans Ende des Schwanzes; die Schwungfedern sind dunkelbraun, zu beyden Seiten ein wenig weiß gestreift, die Schäfte schwarz; der Schwanz eilf Zoll lang, und am Ende abgerundet, von Farbe braun, mit sieben oder acht schmalen, weiß punktirten Streifen durchzogen; die Füße braun, und fast bis an die Zehen mit Federn bedeckt; die mittlere Zehe nicht gezähnelt.

Sie ist in Cayenne zu Hause.

Eine, die Sire A. Lever besitzt, scheint um anderthalb Zoll länger zu seyn, als Büffon's seine. Eben dieser erwähnt einer andern, die eine bräunliche Brust hatte; vielleicht war sie dem Ge-

m) Bey den zwey ersten Arten ist es nicht so, und bey einigen andern ist es noch zweifelhaft, wenigstens wird es nicht angegeben.
n) Latham Ind. orn. II. p. 583. n. 1. B.

Die Jamaikaiſche Nachtſchwalbe.

ISH MUSEUM

Geſchlecht nach von oben beſchriebenen verſchieden. Dieſe ſoll ſich den Tag über in der Höhle irgend eines gefällten Baumes aufhalten, und zwar beſonders in ſolchen, die nahe am Waſſer ſind. Sie iſt die größte ihrer Gattung, und lebt, wie alle übrigen, einſam.

Büffon's großer Ibijau iſt bey Markgrafen mit einem Federbuſche und mit einem Horn auf dem Kopf abgebildet, und ſo hat ihn auch Willughby kopirt; da wir uns aber auf die Treue der Markgraffſchen Figuren nicht verlaſſen können, ſo wage ich zu behaupten, daß er kein anderer, als der oben beſchriebene Vogel ſey.

2. Die Jamaikaiſche Nachtſchwalbe. (Jamaica G.)

(ſ. die neun und funfzigſte Kupfertafel.)

Caprimulgus jamaicensis. L. I. 2. p. 1029. No. 6. o)
Le Guira-querea. Buff. ois. VI. p. 536.
— — Ray Syn. p. 180.
A Wood Owl. Sloan. Jam. II. p. 295.
Mountain Owl. Brown. Jam. p. 473.
Lev. Mus.

Sie hat die Größe der mittlern Ohreule p), und iſt ſechzehn Zoll lang q). Ihr Schnabel iſt von der Spitze bis zum Ende des Rachens zwey und ein Viertel Zoll lang; das Ende deſſelben iſt einen Viertel Zoll lang oder mehr, abwärts gebogen, und ſchwarz; das Ende der untern Kinnlade iſt ebenfalls abwärts gebogen, um beym Schließen mit der obern zuſammen zu preſſen; die Naſenlöcher ſind mit Federn bedeckt; der Augenſtern iſt röthlichgelb, und die Augen ſind mit einem Kreiß von Federn umgeben, faſt wie bey den Eulen; die obern Theile des Kopfs, des Halſes und des Körpers haben eine Miſchung von roſtigrothem und ſchwarzem, nach der Länge geſtreift; die Deckfedern der Flügel ſind theils dunkelbraun, theils roſtigroth und braun gemiſcht, viele derſelben unregelmäßig ſchwärzlich getüpfelt, und einige innere haben eine Miſchung von Weißem; die Schwungfedern ſind dunkel ſchwarzbraun, am äußern Rande mit acht oder neun weißen Flecken bezeichnet; der Schwanz iſt ſieben Zoll lang, aſchgrau, ſchwarz getüpfelt, und mit ſieben oder acht ſchwarzbraunen Streifen durchzogen; die Füße ſind ziemlich ſtark, und bis an die Zehen, die gelb ſind, befiedert; die Klauen ſchwarz, und die mittlere Zehe nicht gezähnelt.

Sie iſt in Jamaika zu Hauſe, ſoll aber nicht ſehr gemein ſeyn. Der Kreiß von Federn um die Augen giebt ihr das Anſehen einer Eule, daher ſie Sloane nicht unſchicklich ſo genannt hat. Sie hält ſich in Wäldern auf, und lebt von Inſekten.

3. Die graue Nachtſchwalbe. (Grey G.)

Caprimulgus griseus. L. I. 2. p. 1029. No. 5. r)
L'Engoulevent gris. Buff. ois. VI. p. 548.

o) Latham Ind. orn. II. p. 584. n. 2. B.
p) Long-eared Owl. Strix otus L.
q) Sloane's Vogelmaß achtzehn Zoll.
r) Latham Ind. orn. II. p. 584. Nr. 4. B.

Sie ist dreyzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist zwanzig Linien lang, oben braun, unten gelblich; die Hauptfarbe des Gefieders ist grau; die Flügel sind dunkelschwarz, mit hellgrauen Streifen; der Schwanz über fünf Zoll lang, bräunlichgrau, mit braunen Streifen, und nur sehr wenig länger, als die Flügel.

Sie ist in Cayenne zu Hause.

4. Die Carolinsche Nachtschwalbe. (Caroline G.)

Caprimulgus carolinensis. L. I. 2. p. 1029. No. 5. *s*)
Le Tette-Chevre de la Caroline. Briss. orn. II. p. 475. No. 2.
L'Engoulevent de la Caroline. Buff. ois. VI. p. 532.
Carolina Goatsucker. Catesby Carol. I. pl. 8.
Rain-bird. Brown. Jam. 467. *t*)

Sie hat die Größe der Europäischen Nachtschwalbe (Nr. 5), und eilf und ein Viertel Zoll Länge. Ihr Schnabel ist dunkelfarbig; längs den Rand der obern Kinnlade stehen steife Borsten; die obern Theile des Kopfs, Halses und Körpers sind mit wechselsweisen dunkelfarbigen und grauen Zik-zakstreifen nach der Queere durchzogen; auf dem Scheitel sind auch einige Flecken von letzter Farbe, und an den Flügeln sind sowohl Flecken als Längsstreifen von gelblicher und dunkler Farbe; die Seiten des Kopfs, und alle untern Theile sind gelbrothgrau, nach der Länge mit schwärzlichen Linien bezeichnet; von der Oeffnung des Mundes längs der Kinnlade zu beyden Seiten läuft ein weißer Streifen herab; unter diesem sind einige wenige gelbliche Flecken; die Schwungfedern sind dunkelfarbig und grau gestreift, und an den äußern Fahnen gelb gefleckt, an den innern Fahnen der drey ersten ist ein breiter, weißer Fleck, die zweyte ist die längste; der Schwanz ist grau, vier Zoll lang, und mit dunkeln Bändern und Linien durchzogen; die Füße sind braun; die Klauen schwarz, die mittlere gezähnelt.

Sie bewohnt Virginien und Carolina und läßt sich, wie die übrigen, nur des Abends sehen, oder wenn der Himmel, mit Wolken bezogen, Regen verkündigt; daher man ihn den Namen: Regenvogel gegeben hat. Sie soll ihre Eyer auf den Boden legen, und diese sollen den Kybizeyern nicht unähnlich aussehen.

5. Die Europäische Nachtschwalbe. (European G.)

Caprimulgus europaeus. L. I. 2. p. 1027. No. 1. *u*) — Scop. ann. I. No. 254. *v*) Kram. elench. p. 281. *w*). — Müller Zool. p. 34. No. 291. — Brünn. orn. No. 293. — Faun. Arragon p. 91. — Georgi Reise. p. 175. — Fisch tab. 101. — Sepp. Vog. pl. in p. 39.

Tette

s) Latham Ind orn II. p. 584. n. 4. B.
t) Arct. Zool II. n. 336. t. 18. Uebers. II. S. 406. B.
u) Latham Ind. orn. II. p. 584. n. 5. B.
v) Uebers. von Günther. S. 208. Nr. 254. B.
w) Er nennt sie: Hirundo cauda integra, ore setis ciliato. nach der ersten Ausgabe der Faun. sue.

Tette-Chevre, ou Crapaud volant. Briss. orn. II. p. 470. No. 1. pl. 44.
L'Engoulevent. Buff. ois. VI. p. 512.
Caprimulgus, Fern-oul, Churn-oul, or Goatsucker. Ray Syn. p. 26. — Will. orn. p. 107. Albin. pl. 10. — Borl. Hist. Cornw. pl. 24 f. 13.
Dorr-Hawk, Night Jarr, or Night Hawk. Charlet. exot. p. 71. No. 8.
Nocturnal Goatsucker. Br. Zool. No. 172. pl. 172. — Arct. Zool. II. p. 437. A. x)

Br. Mus. Lev. Mus.

Die Länge dieses Vogels ist eilfthalb Zoll, und sein Gewicht dritthalb Unzen. Sein Schnabel ist sehr kurz, der Rachen aber weit; das Gefieder läßt sich nicht wohl beschreiben; die Grundfarbe ist fast schwarz; aber außerordentlich schön mit aschgrau, dunkelbraun, rostigroth und weiß, auf verschiedene Arten, geschäckt; der Schwanz ist vier Zoll lang; die Füße sind kurz, weit über die Kniee hinab befiedert, und scheinen rauch oder schuppig zu seyn; die Zehen hängen an beyden Seiten durch eine dünne Haut zusammen; die mittlere Klaue ist gezähnelt.

Das Männchen hat einen eyrunden, weißen Fleck an den innern Fahnen der drey ersten Schwungfedern, und einen andern an den Endspitzen der zwey äußersten Schwanzfedern; sein Gefieder ist überhaupt lebhafter; als das des Weibchens.

Er ist der Einzige seiner Gattung, der in Europa angetroffen wird, wo man ihn zwar allenthalben sieht, doch nirgends sehr zahlreich. Er hält sich auch, so viel man weiß nicht Flugweis zusammen. Man hat ihn auch in Asien und Afrika y) bemerkt. In England kommt er gewöhnlich zu Ende des Mays an, und bleibt bey uns in den südlich gelegenen Gegenden ohngefähr bis zu Ende Septembers. Er hält sich größtentheils in Wäldern auf, und lebt von Insekten, die er im Fluge in der Abend- und Morgendämmerung hascht; gleich der Eule, zieht er sich bey Tageslicht in irgend einen dunkeln Winkel zurück, weil er, wie diese, in der Dämmerung am besten sieht; ja man hat ihn noch nie bey Tage fliegen gesehen, sondern bloß, wenn er aufgestört worden ist, oder bey äußerst trübem Wetter. Es ist bemerkt worden, daß er ein mächtiger Vertilger der Maykäfer sey. Ich erinnere mich, einst sechs ganze solche Käfer, und außer diesen noch vier oder fünf großleibige Motten (moths) in den Magen eines solchen Vogels bey der Zergliederung gefunden zu haben z). Die Fabel, daß er die Euter der Ziegen aussauge, wie die Alten glaubten, ist kaum des Erwähnens werth, man müßte denn blos thun um dieß Vorgeben lächerlich zu machen. Sein Laut ist von doppelter Art: einer gleicht dem Buchstaben R beständig wiederhohlt, oder wie andere sagen, dem geschwinden Schnurren eines Spinnrades a); der andere ist ein scharfer, oft wiederhohlter Schrey. Den ersten beginnt er in der Abenddämmerung, wo er auf einem abgestorbenen Zweige sitzt, mit dem

x) Uebers. II. S. 408. A. Vergl. auch N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 552. und N. G. Deutschlands IV. Nr. 1. B.

y) Auch in Indian Hr. Souverat hat einen an der Küste, von Coromandel angetroffen.

z) Andere Schriftsteller haben ebenfalls einen ähnlichen Umstand bemerkt. s. Hist. des Ois. VI. p. 516. Note (c)

a) Daher der Name: Radvogel (Wheelbird.)

Kopfe zu unterſt gekehrt; zu welchem Ende, iſt unbekannt [b]). Der andere wird für einen Liebesruf gehalten, weil man bemerkt, daß er ihn zu der Zeit hören läßt, wo er ſein Weibchen verfolgt. Dieſes baut kein Neſt, ſondern legt ſeine Eyer auf den bloßen Boden, oder in eine bloße Steinklippe (loose crag), ohne ſcheinbare Vorſorge für dieſelben hin. Es ſind ihrer gewöhnlich zwey, ſchmutzigweiß, mit bläulichbraunen Flecken. Man ſagt auch, es trage ſeine Eyer an einen ſichern Platz, wenn es beunruhigt würde. Man hat bemerkt, daß dieſer Vogel nach der Länge [c]) auf den Zweigen ſitzt, nicht nach der Queere, wie bekanntlich die meiſten Vögel thun;

Dieſe [d]) Art findet ſich durch ganz Sibirien und Kamtſchatka vor. Sie lebt nicht blos in Wäldern, ſondern auch auf offnen Plätzen, wo ſie Felſen, oder hohe Dämme zum Schutz antrifft.

6. Die Virginiſche Nachtſchwalbe. (Virginian G.)

Caprimulgus virginianus. L. l. 2. p. 1028. No. 3. *e*)
Tette - chevre de Virginie. Briss. orn. II. p. 477. No. 3.
Whip - poor - will. Buff. ois. VI. p. 534. — Catesby Carol. vol. III. pl. 16. — Edw. II. pl. 63. — Kaam. Trav. Vol. II. p. 151.
Long - winged Goatsacker. Arct. Zool. II. No. 337. *f*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Sie iſt kleiner, als unſere Art, und nur neun Zoll lang. Der Schnabel iſt bis zum Rachen zehnthalb Linien lang, und mit Borſten beſetzt; alle obere Theile des Körpers ſind mattbraun, nach der Queere mit gelbrothbraun geſchäckt und gemiſcht, hier und da mit einer Miſchung von Weißem und einem geringen Theil grauen an den Flügeln; über den Augen, zu beyden Seiten und am Hinterhalſe ſind einige wenige orangefarbne Flecken, unter den Augen iſt die Farbe aſchbraun; am Kinn iſt ein weißer, dreyeckiger Fleck, der am unterſten Theile orangefärbig geſprenkelt (mottled) iſt; die übrigen untern Theile ſind röthlichweiß, mit dunkeln Streifen durchzogen; die Schwungfedern dunkelfarbig, die fünf erſten ohngefähr in der Mitte mit einem weißen Fleck bezeichnet, der beyde Fahnen einnimmt, außer an der erſten, wo er nur an der innern zu ſehen iſt; der Schwanz iſt den Flügeln nicht unähnlich, ſeine zwey äußern Federn ſind am Ende mit einem weißen Fleck bezeichnet; die Füße fleiſchfarben; die mittlere Klaue gezähnelt.

Dieſe Art bewohnt im Sommer Virginien. Sie kommt gegen die Mitte des Aprils daſelbſt an, und hält ſich in bergigen Gegenden auf, nähert ſich aber oft des Abends den Häuſern, wo ſie ſich dann auf einem Schranken (rail) oder Pfoſten niederläßt, und verſchiedenemale nach einander ſehr laut etwas ſchreyt, das dem Worte: Whiperiwhip, oder whip-poon whip-poon-will ähnlich iſt, und wovon ſie die erſte und die letzte Sylbe am lauteſten hören läßt. Wenn ſie eine Weile an einer Stelle damit fortgefahren hat, ſo fliegt ſie nach einer andern,

b) Es iſt ſein Geſang. B.
c) Hist. des Ois.
d) Zuſ. a. d. Suppl. S. 194. Ueberſ.
e) Latham Ind. orn. II. p. 585. Nr. 6. B.
f) Ueberſ. II. S. 408. Nr. 254. B.

dern, und thut das nämliche; zuweilen ſchreyen vier oder fünf zugleich. Das Geſchrey fängt ſie gleich nach Sonnenuntergang an, und fährt abgebrochen damit fort bis unmittelbar vor Sonnenaufgang. Die Inſekten fängt ſie nicht immer im Fluge, ſondern ſie ſitzt oft auf einer hiezu bequemen Stelle, hüpft nach ihnen, wenn ſie herbey fliegen, und kehrt dann wieder auf den nämlichen Platz zurück. Sie baut kein Neſt, ſondern legt ihre Eyer, deren zwey ſind, und eine mattgrüne Farbe haben mit dunkeln Flecken und Streifen, auf die bloße Erde im offenem Felde. Ihr Fleiſch ſoll gut zu eſſen ſeyn *g*).

Beyde Geſchlechter *h*) ſcheinen bey dieſer Art zu variiren, wie bey der Europäiſchen. Eine, die mir Herr Wavel zum Geſchenk gemacht, war acht Zoll lang; der Fleck am Kinn etwas heller, als das übrige Gefieder; aber keineswegs weiß; kein weißer Fleck, weder an den Schwung- noch Schwanzfedern, woraus ich ſchließe, daß dieß das Weibchen und das von mir beſchriebnen das Männchen ſey.

Es ſollte ſcheinen, als wäre dieß einerley Vogel mit dem Moſkiten-Habicht (Moskito-Hawk) von der Hudſon's Bay; aber nach Herrn Hutchin's Manuſcript iſt dieſer zehnthalb Zoll lang, und drey und zwanzig Zoll breit, und wiegt, nach ausgenommenen Eingeweiden, eine und drey Viertel Unzen. Auf Hudſon's Bay kennt man ihn unter dem Namen; Payek, oder Peeſk, der von ſeiner Stimme hergenommen iſt, und er iſt ein Zugvogel daſelbſt. Er ſoll ſehr zahlreich in den innern Theilen ſeyn, und von Moſkiten und Fliegen leben.

7. Die weißkehlige Nachtſchwalbe. (White-throated G.)

Caprimulgus albicollis. L. l. 2. p. 1030. No. 8. *i*).

Ihre Länge iſt zehn, und ein Viertel Zoll. Der Schnabel iſt braun, mit einer ſchwarzen Spitze; die Naſenlöcher ſtehn etwas hervor; das Gefieder iſt gelbrothbraun, mit ſchwarzen Punkten; der Kopf ſchwarz geſtreift; die obern Theile des Körpers ſind eben ſo, aber dunkler die Schulterfedern, und die meiſten der äußern Deckfedern der Flügel haben ein ſchwarzes Band am Ende, und die Spitzen ſind gelblich ſohlenlederfarben; die kleinern Schwungfedern ſind an den äußern Fahnen gelbroth milchrahmfarben gefleckt; die großen dunkelſchwarz, ohngefähr in der Mitte mit einem weißen Streifen durchzogen; der Schwanz iſt etwas keilförmig, ſeine vier mittlern Federn wie der Rücken, und mit dunkeln Streifen durchzogen, die nächſte zu beyden Seiten weiß, die vorletzte an der innern Fahne weiß, und an der äußern dunkelſchwarz, an der Wurzel aber mit einem weißen Flecken bezeichnet, die äußerſte dunkelſchwarz, an der innern Fahne, an der Wurzel aber weiß; die untern Theile hellbraun, mit dunkeln Linien durchzogen; an der Kehle iſt ein breites, dreyeckiges, weißes Zeichen, und jede Feder derſelben dunkelfarbig eingefaßt; die Füße dunkelfarbig; die mittlere Zehe ſehr lang, und ſtark gezähnelt.

In der Sammlung des Majors Davies. Man vermuthet, ſie ſey aus Cayenne gekommen.

8. Die

g) Kalm

h) Zuſ. a. d. Suppl. S. 194. Ueberſ.

i) Latham Ind. orn. II. p. 585. n. 7. B.

8. Die gelbrothe Nachtschwalbe. (Rufous G.)

Caprimulgus rufus. L. l. 2. p. 1030. No. 9. *k*)
L'Engoulevent roux de Cayenne. Buff. ois. VI. p. 550.
Crapaut volant, ou Tette-chevre de Cayenne. Pl. enlum. 735.

Ihre Länge ist eilfthalb Zoll. Der Schnabel hellbraun, und ein und zwanzig Linien lang; der Augenstern gelb; das Gefieder überhaupt gelbroth; unregelmäßig, in verschiedenen Schattirungen, mit Schwarz bezeichnet; die obern Theile des Körpers sind nach der Länge gestreift, und mit unregelmäßigen und schiefen Zeichen von letzterer Farbe melirt; die Flügel mit eben solchen Queerbändern durchzogen; die Kehle ist mit Queerlinien gestreift; die untern Theile des Körpers sind eben so; die Linien aber nehmen an Breite zu, so wie sie mehr nach hinten zu stehen kommen; der obere Theil des Bauchs spielt stark ins Schwarze, der untere ins Gelbrothe; die Schwungfedern sind wechselsweis gelbroth und schwarz gestreift; der Schwanz hat schwarze Bänder und ist um einen halben Zoll länger, als die Flügel; außer diesen sind noch einige wenige weiße Flecken unregelmäßig über das Gefieder, oben und unten zerstreut; die Füße sind fleischfarben.

Sie wird in Cayenne gefunden.

9. Die Guianische Nachtschwalbe. (Guiana G.)

Caprimulgus gujanensis. L. l. 2. p. 1030. No. 10. *l*)
Le Montvogau de la Guiane. Buff. ois. VI. p. 549.
Tette-Chevre roux de la Guiane. Pl. enlum. 733.

Sie ist neun Zoll lang. Ihr Schnabel ist über drey Viertel Zoll lang, und mit Borsten besetzt; die Hauptfarbe des Gefieders ist rothgelb (fulvous) durchaus mit einer unregelmäßigen Mischung von Hellrothen, am Scheitel und Hinterhalse stehen die Streifen nach der Länge, am Oberrücken aber schief, und an den übrigen obern Theilen sind sie auch mit Flecken von unregelmäßiger Gestalt vermischt, mit einem graulichen Anstriche; die untern Theile sind den obern nicht sehr unähnlich; die Zeichen stehen aber größtentheils nach der Queere; an der Oeffnung des Mundes ein weißes Band, das längs der Kinnlade, und unter die Kehle hinläuft; die Schwungfedern sind schwarz, die fünf oder sechs ersten mit einem weißen Fleck bezeichnet; der Schwanz ist drey Zoll lang, und um einen Zoll länger als die Flügel.

Sie ist in Guiana zu Hause, wo man sie des Abends im Gesträuche antrifft. Man sagt, sie wiederhohle die drey Sylben: Mont-voy-au sehr deutlich, daher sie auch diesen Namen bekommen hat.

Im Brittischen Museum ist ein, diesem sehr ähnlicher, Vogel; er ist zehn Zoll lang, und hat das weiße Band um die Kehle, außer diesem ist noch ein gelblichweißer Streifen am Ende von sechs Schwanzfedern.

10. Die

k) Latham Ind. orn. II. p. 586. n. 9. B. *l*) Latham Ind. orn. II. p. 586. n. 8. B.

10. Die Brasilische Nachtschwalbe. (Brasilian G.)

Caprimulgus brasilianus. L. I. 2. p. 1031. No. 11. *m*)
Le Tette-chevre tacheté du Bresil. Briss. orn. II. p. 483. No. 6.
L'Jbijau. Buff. ois. VI. p. 539. — Petiver.
Gazophyl. pl. 59. f. 1. — Ray. Syn. p. 27. No. 2. — Will. orn. p. 108. pl. 14. (die kleinere Art.) eine schlechte Figur.

Sie hat die Größe einer Schwalbe. Schnabel und Augen sind schwärzlich, und auswärts mit einem gelblichweißen Ring umgeben; die obern Theile des Gefieders sind schwärzlich, mit kleinen, weißen Punkten bezeichnet, und mit ein wenig Gelb vermischt; die untern Theile ebenfalls schwarz und weiß geschäckt; Flügel und Schwanz gleich; die Füße weiß; die mittlere Klaue am äußern Rande gezähnelt.

Sie ist in Brasilien zu Hause, und soll ihren Schwanz oft nach Art eines Fächers ausbreiten.

11. Die Nachtschwalbe mit weißem Halsbande. (White-collared G.)

Caprimulgus semitorquatus. L. I. 2. p. 1031. No. 12. *n*).
Le petit Engoulevent tacheté de Cayenne. Buff. ois. VI. p. 540. — Pl. enlum. 734.

Sie hat die Größe der lezten, und ist acht Zoll lang. Die Hauptfarbe des Gefieders ist schwärzlich, mit gelbrothen und grauen Flecken; am Vorderhalse ist ein halbes, weißes Halsband; die untern Theile gränzen mehr ans braune, als bey der zulezt beschriebnen.

Sie ist in Cayenne zu Hause.

12. Die weißhälsige Nachtschwalbe. (White-necked G.)

Caprimulgus cayennensis. L. I. 2. p. 1031. No. 13. *o*)
L'Engoulevent de Cayenne. Buff. ois. VI. p. 545.
Crapaud volant de Cayenne. Pl. enlum. 760.

Ihre Länge ist achthalb Zoll. Der Schnabel schwarz; der Augenstern gelb; der Kopf grau, mit feinen, schwarzen Linien bezeichnet, und mit Gelbroth überzogen; der Hinterhals eben so, aber deutlicher; die Seiten des Kopfs gelbroth, und jede Feder mit fünf schwarzen Streifen bezeichnet; Kehle und Vorderhals weiß; der Rücken gelbroth, mit schwarzen Streifen durchzogen; die Deckfedern der Flügel schwarz und grau gemischt; Brust und Bauch eben so, aber regelmässiger bezeichnet, und mit einigen wenigen weißen Flecken bestreut; der untere Theil des Bauchs und die Schenkel weißlich, mit schwarzen Flecken; an den Flügeln ist ein weißer Streifen; die Schwungfedern sind schwarz, die ersten fünf mit einem weißen Fleck bezeichnet; die zwey mittlern Schwanzfedern grau, mit fünf oder sechs schwärzlichen Bändern durchzogen, die andern schwarz

m) Latham Ind. orn. II. p. 586. n. 10. B.
n) Latham Ind. orn. II. p. 586. n. 11. B.
o) Caprimulgus cayanus. Latham Ind. orn. II. p. 586. n. 12. B.

schwarz, mit weißem Saume, der an den äußern den größten Raum einnimmt; die Füße gelbbraun.

Sie ist in Cayenne zu Hause, wo sie in den Plantagen gefunden wird. Sie schüttelt (quivers) ihre Flügel oft, wobey sie sie einen schwachen Schrey ausstößt, welchen man mit dem einer Kröte verglichen hat. Sie bringt aber auch noch einen andern Laut hervor, der dem Bellen eines Hundes nicht unähnlich klingt. Sie ist nicht sehr scheu, denn sie läßt einen sehr nahe an sich kommen, ehe sie wegfliegt, und wenn sie aufgestört wird, so setzt sich in einer kleinen Entfernung wieder nieder.

Man sieht sie nicht selten.

13. Die scharfschwänzige Nachtschwalbe. (Sharp-tailed G.)

Caprimulgus acutus. L. I. 2. p. 1031. No. 14. *p*)
L'Engoulevent acutipenne de la Guiane. Buff. ois. VI. p. 547. — Pl. enlum. 732.

Ihre Länge ist achthalb Zoll. Der Schnabel ist schwarz; der Scheitel und der Hals sind nach der Queere gelbrothbraun und schwarz gestreift; die Seiten des Kopfs sind eben so, spielen aber sehr stark ins Gelbrothe; der Rücken ist grau mit schwarzen Streifen durchzogen; die untern Theile sind eben so, die Grundfarbe aber ist gelbroth; der Schwanz ist etwas länger als die Flügel, hell gelbroth, mit schwarzen Punkten, und am Ende mit Streifen von der nämlichen Farbe, jeder schwarze Streifen aber ist am obern Theile weiß gerändert; die Füße sind schwarz.

Sie ist in Guiana zu Hause.

Der Umstand, daß die Schwanzfedern dieses Vogels an den Enden scharf sind, ist bey der Beschreibung desselben oben vergessen worden. Die Schäfte jeder Feder sind an den Spitzen ohne Fahnen, wie bey dem dornschwänzigen Sänger *q*), aber kürzer, als bey der Stachelschwalbe *r*).

Büffon bemerkt, daß die Vögel dieser Gattung sich häufig mit den Fledermäusen zusammenhalten; und dieß ist auch nicht befremdend, da ihre Erscheinung Morgens und Abends, in die nämlichen Stunden fällt, und die Nahrung beyder vollkommen einerley ist. Ich erinnere mich noch wohl, einst die Körper von Maikäfern in dem Magen der Hufeisennase *s*) gefunden zu haben; und bey genauerer Untersuchung fand sich, daß das Thier blos den Leib dieses Insekts frißt, und die übrigen Theile wegwirft; denn auf der Erde und um ihre Höhlen herum, lagen eine Menge Köpfe, Bruststücke und Flügel zerstreuet.

14. Die Amerikanische Nachtschwalbe. (American G.)

Caprimulgus americanus. L. I. 2. p. 1032. No. 2. *u*)

Le

p) Latham Ind. orn. II. p. 587. n. 13. B.
q) Zus. a. d. Suppl. S. 195. Uebers.
r) s. oben S. No. 71.
s) s. oben S. Nr. 32.
t) Vespertilio Ferrum equinum L.
u) Latham Ind. orn. II. p. 587. n. 14. B.

Le Tette-chevre de la Jamaique. Briss. orn. II. p. 480. No. 4.
L'Engoulevent à lunettes, ou le Haleur. Buff. ois. VI. p. 543.
Small Wood-Owl. Ray. Syn. p. 180. No. 4. — Sloan. Jam. p. 296. pl. 255. f. 1.
Screech-Owl. Brown. Jam. p. 473.

Ihre Länge ist sieben Zoll, ihre Breite zehn *v*). Ihr Schnabel ist schwarz, mit Borsten besetzt; die Nasenlöcher sehr hervorragend, und ein Achtel Zoll vom Schnabel abstehend; das Gefieder besteht aus einer Mischung von Grauem, Schwarzem und Mattgelbem (fillemot), am hellsten an den Flügeln und am Schwanze; Füße und Klauen sind grau.

Sie ist in Jamaika zu Hause, und lebt, wie die andern, von Insekten.

15. Die Nachtschwalbe mit goldnem Halsbande. (Gold-collared G.)

Caprimulgus torquatus. L. I. 2. p. 1032. No. 15. *w*)
Le Tette-chevre du Bresil. Briss. orn. II. p. 481.
Guira-querea Marcgrafii. Ray Syn. p. 27. No. 3. — Will. orn. p. 108. pl. 14. (eine schlechte Figur.)

Sie hat am Körper die Größe einer Feldlerche, scheint aber viel größer, und hat lange Flügel, so wie einen langen Schwanz. Die obere Kinnlade des Schnabels ist gekrümmt, die Wurzel derselben mit zehn oder zwölf dicken Borsten besetzt; die Augen sind schwarz; der Kopf groß, flach und breit. Die Hauptfarbe des Gefieders aschbraun, mit mattgelben, so wie um den Hals herum mit einigen weißlichen Flecken bezeichnet; am Hinterkopf steht ein dunkel goldfarbner Ring; die zwey mittlern Schwanzfedern sind acht Zoll lang, die andern viel kürzer; die Füße dunkelfarbig; die Klauen schwarz, die mittlere gezähnelt.

Sie ist in Brasilien zu Hause.

16 *x*). Die Bombayische Nachtschwalbe. (Bombay G.) *y*)

Sie hat die Größe der Virginischen (Nr. 6.), und ist zwölfthalb Zoll lang. Ihr Schnabel ist dunkelfarbig; die Hauptfarbe des Gefieders der Sibirischen Eule *z*) nicht unähnlich, nämlich eine schöne Mischung von hell aschfarbnem, mit Schwarz und Rostigroth gesprenkelt (mottled); der Scheitel hell aschfarben, längs der Mitte herab dunkelfarbig gesprenkelt; zu beyden Seiten der untern Kinnlade ist ein blasser Streifen, und an der Kehle ein weißlicher Fleck; die Brust ist mit zahlreichen aschgrauen Streifen durchzogen; zwischen den Beinen ist die Farbe hell gelbroth; die Schwungfedern sind dunkelfarbig, mit gelbrothen Streifen, die erste ist die kürzeste, vier der großen haben einen weißen Fleck an der innern Fahne; der Schwanz ist eben so gezeichnet, wie die Schwungfedern, seine zwey mittlern Federn aber ebenfalls gesprenkelt,

v) Sloane. — Brisson sagt, sie sey eilf Zoll lang. Vielleicht erstreckt sich Sloane's Maaß nur bis an die Wurzel des Schwanzes.
w) Latham Ind. orn. II. p. 587. n. 15. B.
x) Diese und die folgende sind im Suppl. S. 195. 96. hinzugekommen. Uebers.
y) Caprimulgus asiaticus Latham Ind. orn. II. p. 588. n. 16. B.
z) S. I. B. 1. Th. S. 122. No. 16.

kelt, wie der Rücken; die zwey äußern zu beyden Seiten ſind an den Enden, ohngefähr einen Zoll breit, weiß, an den äußern Fahnen aber erſtreckt ſich das Weiße höher hinauf; die mittlere Zehe iſt ſtark kammförmig eingeſchnitten (pectinated).

Sie wohnt auf Bombay, in Oſtindien. Die Beſchreibung iſt von einem Exemplar, das Sire Joſ. Banks beſitzt, genommen.

17. Die Indiſche Nachtſchwalbe. (Indian G.) a)

Scheitel und Rücken ſind weißlich aſchfarben, und ſehr ſchön mit ganz kleinen, dunkelfarbigen Linien bezeichnet; die Wangen, die Bruſt, die Deckfedern der Flügel und die kürzern Schwungfedern ſind ungemein ſchön auf die nämliche Art mit roſtfarbnen Linien und großen Flekken bezeichnet; die großen Schwungfedern dunkelfarbig; die mittlern Schwanzfedern licht aſchfarben, mit einigen wenigen ſchwarzen Streifen durchzogen, die äußerſte roſtigroth und ſchwarz.

Sie iſt in Indien zu Hauſe. — Lady Impey.

Zuſatz.

18. Die Neuholländiſche Nachtſchwalbe.

Caprimulgus novae Hollandiae. Latham Ind. orn. II. p. 588. No. 18.
Caprimulgus cristatus White Voy. to new Sud-Wales. tab. p. 241.
Crested Goatsucker. Philip. t. p. 270.

Sie iſt etwas kleiner als die Europäiſche, neun und einen halben Zoll lang. Der Schnabel iſt wie bey den vorhergehenden Arten geſtaltet, ſchwarz; der weite Rachen gelblich, an den Seiten mit harten Borſten beſetzt; an der Wurzel der obern Kinnlade ſtehen einzeln zehn bis zwölf Bartborſten ſeitwärts, wie ein Federbuſch in die Höhe; der Körper iſt oben dunkelbraun, mit weißlichen Wolken und Bändern; unten weiß, an Hals und Bruſt mit ſchwärzlichen, undeutlichen Queerbinden; die Schwungfedern ſind dunkelbraun, die fünf bis ſechs äußern an der Außenſeite mit weißlichen Flecken; der Schwanz iſt abgerundet und dunkelbraun, mit zwölf weißlichen Queerbinden, die ſchwarz genebelt ſind; die ſtärkern und längern Beine ſind gelb und die Zehen braun.

Sie bewohnt Neuholland. B.

a) Caprimulgus indicus. Latham Ind. orn. II. p. 588. n. 17. B.

Vierte Ordnung. Taubenarten. b)

Sechs und vierzigste Gattung. Taube.

Diese Gattung hat einen weichen, dünnen, an der Wurzel geraden, und mit einer weichen aufgeschwollenen Haut versehenen Schnabel, in welcher die Nasenlöcher liegen. Die Zunge ist ganz. Die Füße sind kurz, und mehrentheils roth. Die Zehen bis an ihren Ursprung getrennt.

Die Lebensart dieser Vögel im Allgemeinen ist bekannt genug und kaum von der, unter dem Artikel: wilde Taube (Biset. No. 2. Var. A.) angegebenen, verschieden.

* Mit mittelmäßigen Schwänzen.

1. Die Holztaube. (Stock Pigeon.)

Columba Oenas. L. I. 2. p. 769. No. 1. c) — Faun. Suec. No. 207. — Frisch tab. 139. — Georgi Reise p. 173. — Sepp. Vog. pl. in p. 13. — Faun. Arragon. p. 83.
Le Pigeon sauvage. Briss. orn. I. p. 86. No. 5.
Oenas, sive Vinago, Stock Dove. Ray Syn. p. 62. A. 10. — Will. orn. p. 185. pl. 35. — Albin. II. pl. 46.
Stock Pigeon. Br. Zool. I. 2. Append. — Arct. Zool. II. p. 329. A. d) Lev. Mus.

Ihre Länge ist vierzehn Zoll. Der Schnabel ist hellroth; der Kopf aschfarben; der Hinterhals und die Seiten desselben sind goldgrün, mit Kupferglanze in verschiedenem Lichte; der obere Theil des Rückens und die Flügel matt aschfarben; der untere Theil desselben, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes lichter aschfarben, der Vorderhals aschfarben; der untere Theil desselben und die Brust weinfarben (vinaceous); der Bauch, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes hell aschfarben; die vier oder fünf äußersten Schwungfedern schwarz, mit weißen äußern Rändern, die übrigen aschfarben, mit schwarzen Endspitzen;

b) Columbine. — Da diese Ordnung nur Eine Einzige und noch dazu wohl bekannte Gattung enthält; so ist es unnöthig, sie weitläuftig aus einander zu setzen; denn was in Pennants Gattungen der Vögel hierüber gesagt wird, ist vollkommen hinreichend.

c) Latham Ind. orn. II. p. 589. n. 1. B.

d) Uebers. II. S. 306. A. Vergl. auch Uebers. von Büffons Vögel. VI. S. 144. Meine N. G. des In- und Auslands I. 1. p. 453. n. 1. und N. G. der Stubenvögel. S. 116. Nr. 29. B.

an jedem Flügel sind zwey schwarze Querstreifen; der Schwanz ist aschfarben, und ein Drittheil der Endhälfte schwarz, seine zwey äußersten Federn, von der Wurzel bis zur Mitte am äußern Rande weiß; die Füße roth, die Klauen schwarz.

Diese *e*) **Taube** (Pigeon) ist sehr gemein in den südlichen Gegenden von **Rußland** und in **Schweden**; überall aber bemerkt man, daß sie bey Annäherung des Winters nach Süden zieht. In **Siberien** sieht man gar keine, bis man jenseits des Sees **Baikal** gelangt, wo man eine unmerkliche Spielart mit weißem Steiß in großer Menge zwischen den Felsen findet. Auch nicht Eine Art findet sich in **Kamtschatka** *f*)

2. Die gemeine Taube. (White-rumped P.)

Columba domestica. L. I. 2. p. 769. No. *g*)
— Oenas. ibid. Ed. XII. p. 279. No. 1. — Faun. Suec. No. 207. — Scop. ann. I. No. 177. *h*)
Le Pigeon domestique. Briss. orn. I. p. 68. No. 1.
Common Pigeon. Ray Syn. p. 49. A. I. p. 183. No. 21. — Will. orn. p. 180. Sloan. Jam. p. 302. — Brown. Jam. p. 468. — Albin. III. pl. 42. 44. — Br. Zool. No. 101. pl. 45.
Lev. Mus.

Diese ist etwas kleiner, als die vorige, und scheint hauptsächlich darin von ihr abzugehn, daß der untere Theil ihres Rückens weiß ist.

2. Var. A. Die wilde Taube. (Biset P.)

Columba domestica, Livia. L. l. 2. p. 769. No. 2. *β*. *i*)
— Livia. Ray Syn. p. 62. 8. W. Will. orn. p. 186.
Le Biset. Briss. orn. I. p. 82. No. 3.
— Buff. ois. II. p. 498. — Pl. enlum. 510. k)
Stock-Dove. Albin. III. pl. 44.

Sie hat die Größe der leztern; der untere Theil des Rückens ist bey ihr gleichfalls weiß; quer über die Flügel hat sie zwey schwarze Bänder, und eine der äußern Schwanzfedern ist an den äußern Fahnen weiß. Ich kann sie als eine sehr unbedeutende Spielart von der leztbeschriebnen ansehen; vielleicht ist sie der nämliche Vogel *l*).

Die

e) Zus. a. d. Suppl. S. 797. Uebers.
f) Arct. Zool.
g) Columba domestica Latham Ind. orn. II. p. 589. n. 2. Vergl. auch Uebers. von Büffons Vögeln. Meine N. G. des In- und Auslands, und N. G. der Stubenvögel a. a. O. und N. G. Deutschlands IV. wo ich unter dem Artikel gemeine Taube, nicht nur die Varietäten gehörig geordnet, sondern auch alles hierher gehörige Merkwürdige weitläuftig auseinandergesetzt habe. B.
h) Uebers. von Günther. S. 147. Nr. 177.
i) Latham l. c. *β*.
k) Uebers. a. a. O.
l) Ich sehe wenigstens keinen Unterschied. Es ist der sogenannte Feldflüchter, wie ihn Taubens

Die wilde Tauben ziehen bey Annäherung des Winters aus den nördlichen Gegenden nach England, und kehren im Frühjahr wieder zurück, doch bleiben auch viele in den mehr nordwärts gelegenen Theilen das ganze Jahr hindurch unter den Felsen, eingefallenen Gebäuden, und Bergen, wo sie brüten. Andere halten sich auch in waldigen Gegenden auf, und brüten in die Löcher abgestandner (decayed) Bäume. Man hat ihnen daher verschiedene Namen gegeben, als Stocktaube, Steintaube, Waldtaube u. s. w. Die erste Entfernung der Taube von ihrem wilden Zustande, ist die in das Taubenhaus, wo sie, weil sie jedwedes Erforderniß zum Nestbauen zur Hand findet, und sich zugleich ihre Nahrung auf eine viel leichtere Art erwerben kann, als in ihrem ganz wilden Zustande, mehrentheils mit ihrer Lage wohl zufrieden ist; inzwischen kann man diese Tauben nur halbgezähmte nennen, weil sie in der Farbe wenig abändern, und sehr geneigt sind, wieder in solche Gewohnheiten (haunts) zurückzufallen, die sie vermuthlich vorher in ihrem wilden Zustande besessen haben. Ganz anders verhält es sich mit den eigentlich sogenannten zahmen Tauben. Diese sehen sich blos bey ihrem Liebhaber um Futter um, und suchen weiter keines; ja! wenn man ihnen dieß nähme, so würden sie Hungers sterben, weil sie nicht gewohnt sind, selbst für sich zu sorgen. Ich meyne hier diejenigen Tauben, die von solchen Taubenliebhabern gehalten werden, die sie die Gefangenschaft im Hause ertragen lehren; da sie hier einen großen Vorrath von Speise und Trank finden, so haben sie eigentlich keine Ursache, den Verlust der Freyheit zu bedauern. Inzwischen werden viele sogenannten zahmen Tauben von Leuten gehalten, welche aber nicht mit dem Grad von Sorgfalt bedient werden, wie die Liebhabertauben, und wenn sie gleich einiges Futter zu Hause finden, so müssen sie doch das Uebrige auswärts suchen.

In ihrem wilden Zustande brütet die Taube des Jahrs zweymal, aber gleich zu Anfang ihrer Gefangenschaft im Taubenhause, zuweilen dreymal; und so im Verhältniß bis zu ihrer gänzlichen Einsperrung oder dem zahmen Zustande; denn in diesem lezten legt sie oft zehn bis zwölfmal des Jahrs Eyer. Dies ist auch, genauer betrachtet, nicht so wunderbar, als es beym ersten Anblik scheinen möchte, denn es findet auch bey verschiedenen Arten von Hühnervieh statt, deren Entstehung im wilden Zustande bekanntlich nicht variirt (not to vary). Aber dies ist nicht Alles; denn den Stand der Zähmung (domestication) verdanken wie alle Spielarten der herrlichsten Früchte, der vortrefflichen Vegetabilien für die Tafel, und eine zahllose Menge Blumen, die alle durch Kultur hervorgebracht werden, und alle eben so wieder ausarten, wie jene Produkte aus dem Thierreiche, wenn sie wieder in den Stand der Natur zurückkommen.

Die Tauben legen selten oder gar niemals mehr, als zwey Eyer[m]) auf einmal, über diesen sitzen sie vierzehn bis siebenzehn Tage, ehe die Jungen ausgebrütet werden; und mehrentheils bemerkt man, daß eins ein Männchen, und das andere ein Weibchen ist[n]).

Außer-

benliebhaber nennen, der bey uns gar auf Thürmen und Kirchen, und auf alten hohen Gebäuden in Löchern wohnt, in andern Gegenden, aber, die hohe Felsenwände haben, in Felsenhöhlen, so in Sardinien. Man sehe Uebers. von Cetti N. G. von Sardinien. II. B. 132. B.

m) Ich habe mehrmalen Tauben gehabt, die 3 Eyer gelegt haben, und jezt habe ich grade ein Paar, das jedesmal drey Eyer legt, aber freylich selten mehr als ein Paar aufzieht. B.

n) So unbedeutend diese Zahl auch scheinen mag, so

Ausserdem, daß man sie für eine schmackhafte Speise hält, schätzt man sie auch noch in andern Rücksichten. Ihren Dünger hält man für so ein gutes Düngmittel in gewißen Boden, daß man ihn sechzehn Meilen weit hergehohlt, und eine Ladung Kohlen für eine Ladung dieses Düngers gegeben hat o). Man braucht ihn auch, um das Oberleder der Schuhe zu gerben, und auf den heutigen Tag wird er noch als Ueberschlag (cataplasm) angewendet. In vorigen Zeiten hat man Salpeter aus ihm bereitet. Den stärksten Gebrauch macht man von den Tauben zu Ispahan in Persien, wo man über dreytausend Taubenhäuser gezählt hat, und diese halten blos Türken, denn die Christen dürfen keine halten p). Tavernir sagt, man bediene sich des Düngers, um die Melonen damit zu treiben. Der gewöhnliche Weg, den man einschlägt, um die Tauben anzureizen, da zu bleiben, wo man sie haben will, ist, daß man einen so genannten Salzkasten (saltcat) in den Schlag stellt; dieser besteht aus Lehm, alten Schutt und Salz, und ist so dienlich zu diesem Endzweck, daß man sie von andern Orten damit weglocken kann, weßwegen er auch in den Gesetzen verboten ist.

Ich werde unten kürzlich einige Spielarten der Taubengattung anführen; wer aber mehr hierüber zu lesen wünscht, der mag Willughby's Ornithologie — Moore's Columbarium — die Abhandlung von den Haustauben u. s. w. nachschlagen, und in Rücksicht der Naturgeschichte derselben, besonders was Büffon hierüber sagt, nachlesen; denn ich, meines Theils, fürchte ohnehin schon meine gewöhnliche Kürze überschritten zu haben, und kehre daher, mit Hintansuchung aller weitern Nachrichten, zu meinen allgemeinen Beschreibungen zurück.

2. Var. B. Die Steintaube. (Rock P.)

Columba domestica, saxatilis. L. I. 2. p. 769. No. 2. γ. q)
—— rupicola. Ray Syn. p. 63. A. 11.
Le Pigeon de roche, ou le Rochevage. Briss. orn. I. p. 84. No. 4.
Rock Pigeon. Will. orn. p. 186. 9.

Sie hat die Größe der wilden Taube, spielt aber mehr ins Aschfarbne; die Bänder über den Flügeln sind schwärzlichbraun, und die Schwungfedern braun.

2. Var. C. Die Römische Taube. (Roman P.)

Columba domestica, hispanica. L. I. 2. p. 769. No. 2. β. r)
— — major. Ray Syn. p. 60. No. 1.

Le

so beläuft sich doch, vorausgesetzt, daß wir annehmen, die Tauben brüten neunmahl des Jahrs, die Nachkommenschaft eines Einzigen Paars, am Ende des neunten Jahrs, auf eine Zahl von 14, 762. S. Amoen. Academ. vol. 11. p. 32. — Stillingfleet's Tracts p. 75. — Linne' nach belauft sich die Zahl auf mehr, als 18,000.

o) Plat.

p) Dr. Pococke erwähnt der vielen Taubenhäuser in Egypten und sezt hinzu, ein Taubenhaus werde für einen großen Theil des Vermögens eines Hauswirths gehalten, und es sey ein gemeines Sprüchwort in dortigen Gegenden, daß ein Mann, der ein Taubenhaus hat, um die Ausstattung (disposal) seiner Tochter nicht verlegen seyn darf. S. Pococke's Trav. vol. 1. p. 210. p. 8.

q) Columba domestica rupicola, Latham Ind. orn. I c. γ.

r) Latham Ind. orn. I. c. δ.

Le Pigeon Romain. Briss. orn. I. p. 71. No. 2. — Buff. ois. II. p. 510. *s*). — Pl. enlum. 110.
Greater tame Pigeon. Will. orn. p. 181. tab. 33. 34.
Lev. Mus.

Diese mißt zu zehn Zoll, und ist zweymal so groß, als die gemeine Taube. Sie wird als sehr variirend in der Farben beschrieben, und ist, nach Brisson's Vermuthung, die Stammmutter aller der Spielarten, die wir in den Taubenschlägen der Liebhaber antreffen.

2. Var. D. Die rauhfüßige Taube. (Rough-footed P.)

Columba domestica, dasypa. L. I. 2. p. 769. No. 2. *s. t*). — Frisch. tab. 145.
Le Pigeon Patu. Briss. orn. I. p. 63. A.
Rough-footed Dove. Will. orn. pl. 34. *u*)
Lev. Mus.

Diese unterscheidet sich blos dadurch, daß ihre Füße bis an die Zehen, mit langen Federn bedeckt sind *v*).

2. Var. E. Die Mönchstaube. (Crested P.)

Columba domestica. cristata. L. I. 2. p. 769. No. 2. *ξ. w*)
Le Pigeon huppé. Briss. orn. I p. 73. B. — Buff. ois. II. p. 510. *ww*) — Frisch tab. 144.

Diese hat eine Kuppe auf dem Kopf, und lange Federn an den Füßen, wie die letzte.

2. Var. F. Die Norwegische Taube. (Norway P.)

Columba domestica. norwegica. L. I. 2. p. 769. No. 2. *η. x*)
Le Pigeon de Norwege. Briss. orn. I. p. 74. E.

Diese hat ebenfalls eine Kuppe auf dem Kopf, und Füße wie die zwey letzten, ist aber fast so groß, als eine Henne, und über und über schneeweiß.

2. Var. G. Die Barbarische Taube. (Barbary P.)

Columba domestica, barbarica. L. I. 2. p. 769. No. 2. *ϑ. y*)
Le Pigeon de Barbarie. Briss. orn. I. p. 74. D. — Buff. ois. II. p. 579. No. 2. *z*)
Barbary Pigeon. Ray Syn. p. 60. No. 8. — Will. orn. p. 182. No. 8. pl 54.
Lev. Mus.

Diese

s) Uebers. VI. S. 178. B.
t) Latham Ind. orn. I. c. *ε*.
u) Uebers von Büffons Vögeln IV. S. 179. B.
v) Hierher die merkwürdige Varietät, die Tromtaube, die sich so sehr vor andern in ihrer Gestalt und vorzüglich durch die tromelnde Stimme auszeichnet. B.
w) Latham Ind orn. I. c. *ζ*.
ww) Uebers. VI. S. 180. B.
x) Latham Ind. orn. I. c. *η*.
y) Latham Ind. orn. I. c. *ϑ*.
z) Uebers. VI. S. 175. B.

Diese hat einen kurzen Schnabel, und einen breiten Kreis von knotigen, warzigen (mealy), rothen Fleisch rings um die Augen; der Augenstern ist weiß; das Gefieder bläulich, mit zwey schwärzlichen Flecken an jedem Flügel.

Mit dieser sind die **Bastard-Schnäbel** (Bastard-Bills) verwandt, die aber größer sind, und einen kürzern Schnabel, und rothe Augen haben.

Die **Mavmet- oder Mahomets Taube** ist auch so ziemlich die nämliche, und unterscheidet sich hauptsächlich durch die Augenlieder, die groß und schwarz sind; die Hauptfarbe ist milchrahmfarben, oder weiß, mit zwey deutlichen, schwarzen Streifen queer über die Flügel.

2. Var. H. Die Schleyertaube. (Jacobine P.)

Columba domestica, cucullata. L. I. 2. p. 769. No. 2. ε *a*) — Faun. Suec. No. No. 207. ζ — Frisch tab. 150.
Le Pigeon nonein. Briss. orn. I. p. 74. E. — Buff. ois. II. p. pl. 19. *b*)
Jacobine Ray Syn. p. 60. No. 6. — Will. orn. p. 181. 6. pl. 33. — Albin. III. pl. 43.
Lev. Mus.

Ihr Schnabel ist kurz; die Federn am Hinterkopf und Halse sind vorwärts gekehrt, und bilden eine Art von Mönchskutte.

Im Leverschen Museum ist eine von brauner (dun) Farbe *c*). Die sogenannten **Kragen-** und **Kapuzinertauben** (Ruff and Capudcin) gehören zu der Spielart.

2. Var. I. Die Struptaube. (Laced P.)

Columba domestica, hispida. L. I. 2. p. 769. No. 2. k. *d*)
Le Pigeon frisé. Briss. orn. I. p. 76. G. — Buff. ois. II. p. 519. No. 3. *e*)
Lev. Mus.

Diese ist weiß *f*). Die Füße ausgenommen, die roth sind; die Federn des ganzen Körpers haben lockere Fahnen, und sind gekräuselt oder frisirt. Ich glaube diese Spielart wird die **Struptaube** (Laced C.) genannt. Die **Zittertaube** (Frill back) ist dieser einigermaßen ähnlich, indem die Spitze jeder Feder aufwärts gebogen ist. Sie ist gewöhnlich weiß.

2. Var. K. Die Mövchentaube. (Turbit P.)

Columba domestica, turbita. L. I. 2. p. 769. No. 2. λ. *g*) — Frisch tab. 147.
Le Pigeon à gorge frisée. Briss. orn. I. p. 75. F.

Le

a) Latham Ind. orn. i.
b) Ueberf. VI. S. 181. B.
c) Die rothbraunen sind bey uns die gewöhnlichsten. B.
d) Latham Ind. orn. I. c. κ.
e) Ueberf. VI. S. 202. B.
f) Man hat sie von mehrern Farben. B.
g) Latham Ind. orn. I. c. λ.

— cravate. Buff. ois. II. p. 513 pl. 23. *b*)
Turbit. Ray Syn. p. 60. No. 7. — Will. orn. p. 162.
Lev. Mus.

Ihr Schnabel iſt ſehr kurz; der Scheitel flach; ſie unterſcheidet ſich von andern dadurch, daß die Federn an ihrer Bruſt nach den Seiten zurückgebogen ſind *i*).

Die Eulentaube (Owl-Pigeon) gehört auch zu dieſer, und hat eben ſolche Bruſtfedern; iſt aber kleiner, und immer nur von einer Farbe, da hingegen die Mövchentaube gewöhnlich zweyfärbig iſt.

2. Var. L. Die Pfauentaube. (Shaker P.)

Columba domestica, laticauda. L. I. 2. p. 769. No. 2. *μ*. *k*) — Frisch tab. 151.
Le Pigeon Paon. Briss. orn. I. p. 80. P. — Buff. ois II. p. 502. pl. 22. *l*).
Broad- and narrow-tailed Shakers. Ray Syn. p. 60. No. 3. 4. — Will. orn. p. 181. No. 3. 4. pl. 34.

Dieſe Spielart hat eine große Menge Federn im Schwanze *m*), den ſie immer aufrecht trägt; auch bemerkt man, daß ſie oft den Kopf ſchüttelt (ſhake). Sie wird auch Fächerſchwanz (Fan-tail) genannt.

Die ſchmalſchwänzige Pfauentaube, (Narrow-tailed Shaker) hat weniger Federn im Schwanze *n*). Beyde variiren ſehr in der Farbe *o*).

2. Var. M. Die Purzeltaube. (Tumbler P.

Columba domestica, gyratrix. L. I. 2. p. 766. No. 2. *ν*. *p*) Frisch tab. 148.
Le Pigeon culbutant. Briss. orn. I. p. 99. No. — Buff. ois. II. p. 517. *q*).
Tumbler. Ray Syn. p. 61. No. 10. — Will. orn. p. 182.
Lev. Mus.

Dieß iſt eine kleine Taube, die verſchiedene Farben hat. Ihr Hauptunterſchied von andern beſteht darinn, daß ſie ſich im Fluge in der Luft immer überpurzelt, und zwar dadurch, daß ſie ſich ſelbſt rückwärts wirft. Der Mandel-Tümmler (Almond Tumbler) wird unter ihnen am meiſten geſchätzt *r*). Man nennt ſie auch Klappertaube (Clappers).

h) Ueberſ. VI. S. 187. B.
i) Sie bilden einen ordentlichen Buſenſtreifen, wie ihn die Mannsperſonen an den Hemden tragen. B.
k) Latham Ind. orn. I. c. *μ*.
l) Ueberſ. VI. S. 183. B.
m) Oft bis ſechs und zwanzig. Willughby.
n) Briss. orn. I. p. 81.
o) In Thüringen nennt man jene pfaunen- und dieſe hühnerſchwänzige Tauben. B.
p) Latham Ind. orn. I. c. *ν*.
q) Ueberſ. VI. S. 197. B.
r) Man hat achtzig Guineen für Eine gegeben.

2. Var. N. Die Schwalbentaube. (Helmet P.)

Columba domestica, galeata. L. I. 2. p. 769. No. 3. ξ. *s*)
Le Pigeon cuirassé. Brics. orn. I. p. 80. o. — Bufs. ois. II. p. 515 *t*)
Helmet Pigeon. Ray Syn. p. 61. No. 11. — Will. orn. p. 182. No. 11.

Bey dieser sind Kopf, Schwungfedern und Schwanz von einerley Farbe, der übrige Körper von einer andern, und die Farben selbst variiren *u*).

2. Var. O. Die Türkische Taube. (Persica P.)

Columba domestica, turcica. L. I 2. p. 769. No. 2. o. *v*) — Frisch tab. 149. *w*)
Le Pigeon turc. Briss. orn. I. p. 70. H.
Turkish, or Persian Pigeon. Will. orn. pl, 33.

Diese ist dunkelfarbig; ihr Schnabel gelb; der Augenkreiß roth; die Nasenlöcher höckrig, und mit rothen Knoten besetzt; die Füße hellroth.

2. Var. P. Die Posttaube. (Carrier P.)

Columba domestica. tabellaria. L. I. 2. p. 769. No. 2. π. *x*)
Le Pigeon Messager. Briss. orn. I. p. 77. I.
Carrier Pigeon. Ray Syn. p. 60. No. No. 5. — Will. orn. p. 181. No. 5. pl. 34. — Albin. II. pl. 45.
Br. Mus. Lev. Mus.

Diese ist der letzten an Farbe sehr gleich, und deßwegen merkwürdig, weil sie außerordentlich viele Höcker um Augen und Schnabel herum hat; die Augensterne sind scharlachroth; die Füße roth.

Diese Varietät hat man ehedem zum Briefstragen gebraucht, jetzt ist es fast ganz außer Gebrauch gekommen. Man konnte es sehr leicht bewerkstelligen; denn, wenn man eine solche Taube einige Zeitlang eingesperrt hatte, trug man sie auf einige Entfernung weg, und dann ließ man sie fliegen; und sie verfehlte nie ihren Weg unmittelbar nach Hause zu finden, indem sie in gerader Linie, mit dem Briefe, den man unter ihre Flügel befestigt hatte, darauf zuflog *y*).

2. Var.

s) Latham Ind. orn. I. c. ξ.
t) Uebers. VI. S. 191. B.
u) Für die schönsten werden diejenigen gehalten, welche einen gelbrothen Scheitel und dergleichen Flügel haben, sonst aber schneeweiß sind. B.
v) Latham Ind. orn. I. c. o.
w) Uebers. von Büffons Vögeln. VI. S. 177. B.
x) Latham Ind. orn. I. c. π.
y) Sie soll sechs und zwanzig Meilen in Einer Stunde fliegen: Aber Lithgow in seinen Reisen erwähnt einer Taube, die diese noch übertraf; denn sie kam von Babylon nach Aleppo, welches dreyßig Tagreisen ist, in einer Zeit von acht und vierzig Stunden.

2. Var. Q. Die Kropftaube. (Pawter P.)

Columba domestica, gutturosa. L. I. 2. p. 769. No. 2, ϱ. z) — Faun. Suec. No. 207. γ. — Frisch tab. 146.
Le Pigeon grand gosier. Briss. orn. I. p. 78. K.
— grosse gorge. Buff. ois. II. p. 505. pl. 17. 18. a)
Cropper Pigeon. Ray Syn. p. 60. No. 2. — Will. orn. p. 181. No. 2. pl. 34. Lev. Mus.

Sie hat die Größe der Römischen Taube (2. Var. C.), und kann ihren Kropf mit Luft anfüllen, bis er zu einer monströsen Größe anwächst. Sie variirt stark. Büffon führt dreyzehn Spielarten an.

Die Parazene, oder Pariser Kropftaube b) (Parazene, or Parisian Pawter) wird sehr geschätzt: der Cropper und Uploper gehören auch zu dieser Spielart.

2. Var. R. Die Rittertaube. (Horsemann P.)

Columba domestica, eques. L. I. 2. p. 769. No. 2. ε.
Le Pigeon Cavalier. Briss. orn. I. p. 78. L.
Light Horsemann Pigeon. Ray Syn. p. 61. No. 12. — Will. orn. p. 182. No. 12. Albin. II. pl. 45. c)

Diese ist mit den zwey letzten verwandt (partake of); sie soll eine sehr gute Bruttaube seyn, und den Platz wo sie brütet, niemals verlassen. Aus diesem Grunde wird sie auch eine gute Brieftaube (carrier), und in England hat man sich ihrer öfterer bedient, als der wahren Posttaube, weil dieser Vogel zu hoch geschätzt wird, als daß man bey jedweder, unbedeutenden Nachricht hätte Gefahr laufen mögen, ihn einzubüßen d).

2. Var. S. Die Schlagtaube. (Smiter P.)

Columba domestica, percussor. L. I. 2. p. 766. No. 2. τ. e)
Le Pigeon batteur. Briss. orn. I. p. 79. M.
Smiter Pigeon. Ray Syn. p. 60. No. 9. — Will. orn. p. 182. No. 9. f)

Von diesem Vogel findet sich keine Beschreibung, und er ist bloß deßwegen merkwürdig, weil er im Flug seine Flügel zusammenschlägt, so daß man ihn auf einige Entfernung hören kann.

z) Latham Ind. orn. I. c. ϱ.
a) Uebers. VI. S. 168. B.
b) Daß man 20 Guineen für ein Paar Kropftaube giebt, ist nichts seltnes. (Bey uns kann man das schönste Paar um 16 gr. haben. B.)
c) Uebers. von Büffons Vögeln. VI. S. 204.
d) Von der Dragonertaube (Dragoon P.) die eine Mittelart zwischen der Ritter- und Posttaube ist, wird gesagt, daß sie von St. Edmondsbury nach Bischopsgatestreet, einen Weg von zwey und siebenzig Meilen, in dritthalb Stunden geflogen sey. S. Treat. on domest. Pigeons p. 90.
e) Latham Ind. orn. I. c. τ.
f) Uebers. von Büffons Vögeln VI. 200. B.

2. Var. T. Die Mähnentaube. (Turner P.)

Columba domestica, jubata. L. I. 2. p. 769. No. 2. *v.* *g*)
Turner Pigeon. Will. orn. p. 182. No. 14.

Dieſe hat einen Federbüſchel vom Scheitel hinten herabhängend, gleich einer Pferdemähne. Mit ihr ſind die (Plätſcher) Finnikins verwandt, die ihr ſehr gleich ſehen, aber kleiner ſind.

2. Var. V. Die Maskentaube. (Spot P.)

Columba domestica, maculata. L. l. 2. p. 769. No. 2. *Φ.* *b*)
Spot Pigeon. Will. orn. p. 182. No. 17. *i*)

Dieſe iſt merkwürdig wegen ihres Flecken an der Stirn über dem Schnabel, der einerley Farbe mit dem Schwanze hat; Körper und Flügel ſind weiß.

Außer den obigen werden noch folgende von den Kennern in dieſem Fache angeführt, obgleich die gewöhnlichen Syſtematiker ihrer nicht erwähnen; als die Kragen-Nonnen-Loch-Trompetentaube u. ſ. w. die man alle, nebſt vielen andern, in den verſchiedenen Abhandlungen über dieſen Gegenſtand findet *k*).

3. Die Rebhuhntaube. (Partridge P.)

Columba montana. L. l. 2. p. 772. No. 15. *l*)
Le Pigeon roux de Cayenne. Briss. orn. l. p. 131. No. 29. pl. 12. f. 2. *m*)
Perdix montana. Ray Syn. p. 183. No. 20.
Mountain Partridge. Sloan. Jam. II. p. 304. pl. 261. f. 1. — Brown. Jam. p. 469. — Ldw. III. pl. 119. *n*)
Lev. Mus.

Ihre Länge iſt neunthalb Zoll. Der Schnabel iſt roth, mit einer ſchwarzen Spitze; der Augenſtern auch roth, und mit einer warzigen Haut von eben dieſer Farbe umgeben; die obern Theile des Körpers ſind gelbroth, mit einem purpurfärbigen Anſtrich; die untern bis zur Bruſt fleiſchfarben; Bauch, Seiten, Schenkel und After ins Gelbrothe ſpielend; die untern Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern und der Schwanz gelbroth; die Klauen braun.

Sie

g) Latham Ind. orn. l. c. *v.*
b) Columba domestica frontalis Latham Ind. orn. l. c. *φ.*
i) Ueberſ. von Büffons Vögeln VI. S. 195. B.
k) Eine ſehr merkwürdige Varietät, die ich noch nirgends angeführt gefunden habe iſt
Var. w. Die Haustaube mit dem Schwalbenſchwanz.
Columba domestica forficata.
Sie hat die Größe der gemeinen Feldtaube, iſt aber länglicher und ſchlanker gebaut; der Schwanz hat eine gabelförmige oder die Geſtalt wie bey der Hausſchwalbe. Sie iſt ſelten. Ich habe ſie aber von mehrerley Farbe geſehen. ſ. N. G. Deutſchlands IV. Taf. 1. B.
l) Latham Ind. orn. II. p. 594. n. 3. B.
m) Ueberſ. von Büffons Vögeln VI. S. 217. B.
n) Seligmanns Vögel V. Taf. 14. B.

Sie soll in Cayenne zu Hause seyn. Die Jamaikaische, deren Edwards erwähnt, ist etwas verschieden; die Stirn nämlich thonfarbig; Kopf und Hals röthlich purpurfarben; Rücken, Flügel und Schwanz rothbraun, mit kupferfarbigem Glanze; der Vorderhals röthlichthonfarben; die Brust, der Bauch, die Schenkel, und die untern Deckfedern des Schwanzes licht thonfarben; ein weißes Zeichen zu beyden Seiten unter den Augen, und ein anderes an der Seite der Kehle, und gerade am Flügelbug.

Sie nistet auf Bäume, die niedere Aeste haben, und legt ihr Nest mit Haaren und Baumwolle aus. Beym ersten Anblick hat sie das Ansehen eines Rebhuhns.

Ich o) habe die Vermuthung, das dieser Vogel auch auf St. Helena angetroffen werde; denn in Herrn Anderson's Verzeichnisse finde ich einen, unter dem Namen: Columba perdix, der auf dieser Insel gemein seyn soll.

4. Die Waldhuhntaube. (Tetraoid P.)

Columba tetraoides. L. I. 2. p. 772. No. 3. *p*)
— — — Scop. ann. I. p. 125. No. 180. *q*)

Die ganze Beschreibung, die wir von diesem Vogel haben, ist, daß er dem Rothhuhn *r*) an Größe gleiche, einen schwarzen Kopf und Hals habe, welches Schwarz von einer weißen Linie eingefaßt ist, wie bey diesem.

Skopoli sagt uns nicht, woher er kam, oder ob er damals in einer Menagerie lebte. Aus dem Namen, den er ihm gegeben hat, schließe ich, daß er einigermaßen das Ansehen des Rothhuhns *s*) haben müsse.

5. Die weißköpfige Taube. (White-crowned P.)

Columba leucocephala. L. I. 2. p. 772. No. 14. *t*)
— minor, capite albo. Ray Syn. p. 63. No. 18. p. 184. No. 24.
Le Pigeon de roche de la Jamaique. Briss. orn. I. p. 137. No. 33.
Bald-pated Pigeon. Sloan. Jam. p. 303. tab. 261. f. 2. — Brown. Jam. p. 468.
White-crowned Pigeon. Catesby Carol. I. pl. 25. — Arct. Zool. II. No. 189 *u*) Lev. Mus.

Sie ist achthalb Zoll lang. Ihr Schnabel ist roth, mit einer weißen Spitze; die Augen sind mit einer weißen Haut umgeben; die Augensterne gelb; der Scheitel ist weiß; unter demselben ist die Farbe schillernd purpurfarben; der Hals grün und blau, mit Kupferglanze melirt; die

o) Zus. a. d. Suppl. S. 197. Uebers.
p) Latham Ind. orn. II. p. 594. n. 4. B.
q) Uebers. von Günther S. 159. Nr. 180.
r) Red-legged Partridge s. unten: 54ste Gatt. No. 12. Var. A. Tetrao rufus L. Uebers.
s) Vielleicht ist er in etwas mit der leztern verwandt.
t) Lstham Ind. orn. II. p. 594. n. 5.
u) Uebers. II. S. 305. Nr. 105. Vergl. auch Uebers. von Büffons Vögeln VI. S. 235. und Seligmanns Vögel I. Taf. 50. B.

die obern und untern Theile des Körpers bläulich graubraun; die großen und kleinen Schwungfedern, und der Schwanz braun; die Füße roth; die Klauen grau.

Sie ist in Jamaika, St. Domingo und den Bahama Inseln zu Hause, wo sie in großer Menge brütet, und ihr Nest unter die Felsen macht. Sie frißt die Beeren vom wilden Kaffe (Sweet wood). „Sie sind bitter oder süß im Geschmack, nach Maßgabe der Jahrzeit oder vielmehr des Futters das sie fressen, und wenn sie viele süße Beeren antreffen, so hält man sie für eine gute Speise.“

6. Die weißflügelige Taube. (White-winged P.)

Columba leucoptera. L. l. 2. p. 773. No. 15. v)
— — Jacq Beytr. p. 38. No. 27.
Le Pigeon des Indes. Briss. orn. I. p. 105. No. 15.
White-winged Dove. Brown Jam. p. 468.
Brown Indian Dove. Edw. II. pl. 76. w)

Sie hat die Größe der Turteltaube (Nr. 40.), und ist acht oder neun Zoll lang. Ihr Schnabel ist dunkelschwarz; die Augen umgiebt eine schöne, blaue Haut; der Augenstern ist karmoisinroth; Stirn, Wangen, Vorderhals und Brust sind hell gelbrothbraun; Hinterkopf und Hals mattbraun; unter den Ohren, zu beyden Seiten, ist ein schwarzer Queerstreifen, der nicht sichtbar wird, außer wenn der Vogel den Hals streckt; unter diesem Zeichen haben die Federn einen goldgrünen Glanz, und unter diesem, so wie am Hinterhals, schillert dieser Glanz ins Violette; die obern Theile des Körpers sind dunkelbraun, mit einer Mischung von Blauem bey gewissem Lichte; die größern Deckfedern der Flügel sind eben so, die äußern Ränder und die Spitzen aber weiß; der Unterrücken und der Steiß matt aschfarben; der Bauch, die Schenkel, die Seiten und die untern Deckfedern des Schwanzes bläulich aschfarben; die großen Schwungfedern schwarz, mit hellern Rändern, die kleinern eben so, und einige derselben gerade an der Spitze weiß gerändet; die zwey mittlern Schwanzfedern haben einerley Farbe mit dem Rücken, die andern sind matt aschfarben, mit weißen Spitzen die Füße roth; die Klauen braun.

Sie ist in Ostindien zu Hause. Edwards bemerkt, sie bewege den Schwanz oft auf und nieder (flirts), wie die Bachstelze. Die Haut, die die Augen umgiebt, geht bey Edwards's Vogel bis an die Wurzel der obern Kinnlade hin.

Jacquin x) sagt, sie würde in Carthagena, in Südamerika angetroffen; so wie eine andere, von der Größe einer Turteltaube, welche braun, schwarz und weiß gemischt ist y), mit geschäcktem (scalloped) Hals und Brust, und schwarzen Augen.

7. Die

v) Latham Ind. orn. II. p. 595. n. 6. B.
w) Vergl. auch Uebers. von Büffons Vögeln VI. S. 222. und Seligmanns Vögel III. Taf. 47. B.
x) Zus. a. d. Suppl. S. 197. Uebers.
y) Dies ist C. fusca L. I. 2. p. 773. No. 4. Jacquin's Beytr. p. 33. No. 27. Uebers.

7. Die Martinikische Taube. (Martinico P.)

Columba Martinica. L. I. 2. p. 781. No. 24. *z*)
Le Pigeon violet de la Martinique. Briss. orn. I. p. 129. No. 27. pl. 12. f. 1. — Buff. ois. II. p. 525. *a*) — Pl. enlum. 162.

Diese hat ohngefähr die Größe einer Turteltaube, und ihre Länge ist neun und ein Viertel Zoll. Ihr Schnabel ist roth; die Augen sind mit karmoisinrothen Erhabenheiten umgeben, und der Augenstern von der nämlichen Farbe; der Kopf, der Hals und die obern Theile des Körpers sind kastanienbraun, mit violettem Glanze; die untern Theile des Körpers mehr oder minder gelbroth; die Schwungfedern eben so, wie die obern Theile aber nur an den äußern Rändern; die innern sind gelbroth; die Schwanzfedern hingegen sind an beyden Rändern die nämlichen; die Füße roth; die Klauen bräunlich.

Sie ist in Martinik zu Hause.

7. Var. A. Columba martinica. L. I. 2. p. 781. No. 24. *s. b*)
Le Pigeon de la Martinique. Briss. orn. I. p. 103. No. 14.
— roux de Cayenne. Buff. ois. II. p. 526. *c*) — Pl. enlum 141.

Etwas länger, als die letzte. Ihr Schnabel ist schwarz; Kopf, Hals und Brust purpurkastanienbraun; die Federn aber, die den untern Theil des Halses umgeben, haben einen violetten Goldglanz, und bilden eine Art von Halsband; die obern Theile des Körpers und die Flügel sind gelbrothbraun, mit einigen schwarzen Flecken an den größern, zunächst am Körper stehenden Deckfedern der Flügel; der Bauch, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes sind licht rothgelb, mit einem weinfarbnen Anstrich; die Seiten und die untern Deckfedern der Flügel aschfarben; die Schwungfedern schwärzlich, mit weißlichen, äußern Rändern; die kürzern eben so, mit grauen Spitzen; die zwey mittlern Schwanzfedern gelbrothbraun, die andern zwey Drittheile ihrer Länge braun, mit gelbrothen äußern und dunkelaschfarbnen innern Rändern, das Uebrige ihrer Länge nach schwarz, mit grauen Spitzen, die äußerste Feder ist auch ihrer ganzen Länge nach an der Außenseite grau; die Füße sind roth; die Klauen schwarz.

Sie ist ebenfalls auf Martinik zu Hause.

Brisson bemerkt, man nenne diesen Vogel, so wie den letzten, daselbst Rebhuhn; daher ich es für sehr wahrscheinlich halte, daß sie bloße Geschlechtsverschiedenheiten von einander sind, da sowohl die Farben selbst, als die Vertheilung derselben nicht sehr verschieden sind. Dieß ist auch Büffon's Meynung, der diesen letzten für das Weibchen hält.

8. Die weißbäuchige Taube. (White-bellied P.)

Columba jamaicensis. L. I. 2. p. 782. No. 25. *d*)
— minor, ventre condido, Ray Syn. p. 63. No. 16.

Le

z) Latham Ind. orn. II. p. 595. n. 7. B.
a) Ueberf. VI. S. 217. S. auch Seligmanns Vögel. V. Taf. 14. B.
b) Latham l. c.
c) Ueberf a. a. O.
d) Latham Ind. orn. II. p. 595. n. 8. B.

Le Pigeon de la Jemaique. Briss. orn. I. p. 134. No. 31. — Buff. ois. II. p. 529. pl. 21. *e*)
White-bellied Dove. Sloan. Jam. II. p. 303. pl. 262. f. 1. — Brown. Jam. p. 469.
Lev. Mus.

Diese ist neun Zoll lang. Die Nasenlöcher sind sehr erhaben, und bilden zwey Knoten an der Wurzel des Schnabels; der Augenstern ist weiß; der Scheitel, und alle untern Theile des Halses und Körpers sind weiß; der Hinterhals ist blau und purpurfärbig gemischt; der Rücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes sind purpurbraun, mit einem lichtröthlichen Anstrich; der Schwanz blau und mit einem schmalen, weißen Bande eingefaßt.

Sie findet sich auf den Heiden in Jamaika, im Jänner, vielleicht auf ihrer Wanderung in andere Länder. Sie lebt von Beeren, und wird für eine gute Speise gehalten, da sie nicht so bitter ist, als die weißköpfige Taube (Nr. 5). Sie erhebt auf den Bäumen der ganzen Insel ein klägliches Geschrey, das zuweilen sehr laut und unangenehm ist.

9. Die große Kronentaube. (Great-crowned P.)

Columba coronata. L. I. 2. p. 774. No. 17. *f*)
— mugiens. Scop. ann. I. No. 179. *g*)
Le Faisan couronné des Indes. Briss. orn. I. p. 279. No. 6. pl. 26. f. 1. — Buff. ois. II. p. 354. 542. *h*) — Pl. enlum 118
Le Goura de la nouvelle Guinée. Sonn. Voy. p. 169. tab. 104.
Great-crowned Indian Pigeon. Edw. pl. 338. — Damp. Voy. Vol. III. part. 2. p. 93. pl. 3. *i*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Sie hat die Größe eines Truthahns. Ihr Schnabel ist schwarz, und zwey Zoll lang; von der Wurzel desselben geht ein schwarzer Streifen zwischen den Augen durch, und etwas hinter dieselben hin; der Augenstern ist roth; der Kopf, der Hals, die Brust, der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes sind aschblau; der Kopf ist mit einem Federbusch geziert; die Federn, die ihn bilden, sind vier und drey Viertel Zoll lang, und von der nämlichen Farbe, die Fahnen aber von lockerem Gewebe; der Rücken, der Steiß, die Schulterfedern und die obern Deckfedern des Schwanzes sind dunkel aschfarben, mit einer purpurkastanienbraunen Mischung am Oberrücken und an den Schulterfedern; die kleinern Deckfedern der Flügel sind auch dunkel aschfarben, mit purpurkastanienbraunen Spitzen; die zunächst am Körper stehenden, inwendig aschfarben, auswendig weiß, und mit eben solchen Spitzen, wie die andern, nur daß diese letzte Farbe an der äußern Seite mehr Raum einnimmt, als an der innern; die größern, am weitesten vom Körper abstehenden Deckfedern der Flügel sind inwendig aschfarben, und purpurkastanienbraun an der äußern Seite und an den Spitzen; die Schwungfedern

e) Uebers. VI. S. 236. B.
f) Latham Ind orn II. p. 596. n. 9. B.
g) Uebers. von Günther S. 148. Nr. 149. B.
h) Uebers. VI. S. 266. a.
i) Vergl. auch vorzüglich Naturforscher XVII. S. 32. n. IV. B.

dern dunkel schwärzlich aschfarben; der Schwanz eben so, an der Spitze aber licht aschfarben; die Füße schwärzlich [k]).

Diese Art ist auf den Moluckischen Inseln, und in Neu-Guinea zu Hause, und ist lebendig nach England gebracht worden. Büffon sagt, in Frankreich seyn fünf lebendige Vögel zu gleicher Zeit gewesen [l]). An Größe übertrifft sie freylich jede Taubenart; aber ihre Lebensart zeigt deutlich, daß sie zu keiner andern Gattung gehören kann. Inzwischen hat sie Brisson unter den Fasanen aufgestellt, und die Pl. enlum. haben diesen Namen kopirt; wer sie aber beobachtet hat, der kann nicht mehr zweifeln, wohin sie gehöre.

Ihre Stimme ist girrend und kläglich, wie bey andern Tauben, nur verhältnißmäßig lauter. Das klägliche Geschrey dieser Vögel beunruhigte Bougainville's Schiffsvolk sehr [m]), wenn sie sich in der Nähe desselben aufhielten, indem es dasselbe für Menschenstimmen hielt. Weder in Frankreich noch Holland hat man sie jemals Eyer legen gesehen, ob sie gleich einige Zeit lang eingesperrt waren [n]). Skopoli aber versichert uns, das Männchen nähere sich dem Weibchen, den Kopf in die Brust geleckt, mit einem mehr brüllenden, als girrenden Laute; und sie hätten nicht bloß ein Nest auf den Bäumen in der Menagerie, wo sie gehalten wurden, gemacht, sondern auch Eyer gelegt [o]). Das Nest bestund aus Heu und Halmen. Das Weibchen saß nicht, sondern stand über den Eyern, und dieß allein hält er für die Ursache, daß sie keine Jungen hervorbrachten.

Man sagt, in Ostindien hielten sie Einige als Hausvögel in ihren Höfen.

Die Holländer auf Molukka nennen sie Kronvogel [p]).

Sonnerat, so wie Dampier, fanden sie in Menge auf Neu-Guinea, und wahrscheinlich sind sie ursprüglich von da aus nach Banda gebracht worden, woher sie jetzt die Holländer vorzüglich erhalten.

k) Edwards sagt, sie seyn weißlich, mit rothen Flecken; und Scopoli, aschfarben. Ich vermuthe daher, daß sie bey verschiedenen Individuen, verschieden sind. Hr. Götz sagt im Naturforscher: die Füße sind gelblich mit schwärzlichen Schuppen, welches wohl die schwarzen Flecken des Scopoli auf den von ihm unrichtig bezeichneten aschgrauen Füßen sind. B.

l) Auch in Hanau und im Haag hat man sie in den Menagerien gehabt. B.

m) Voy. p. 326.

n) In Hanau, wo man vor einigen Jahren ein Pärchen hatte, legte das Weibchen Ein Ey, ließ es aber liegen und brütete es nicht aus. Man legte es einer Henne unter, diese brütete es in vier Wochen aus, das Junge starb aber ganz natürlich nach vier Tagen, da es aus dem Kropfe gefüttert werden mußte, wenn es sollte am Leben bleiben. B.

o) Dampier sagt, die Eyer seyn so groß, wie Hühnereyer, und der Vogel niste auf Bäume.

p) Bey den Eingebohrnen wird sie Bululu, und bey den Papuanern, Monubi genannt.

10. Die kleine Kronentaube. (Lesser-crowned P.)

Columba cristata. L. I. 2. p. 774. No. 7. q)
Le Rouloul de Malacca. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 174. pl. 100.

Sie hat die Größe der gemeinen Taube. Ihr Schnabel ist konisch, und ein wenig gebogen, seine Farbe schwarz, die untere Kinnlade an der Wurzel gelb; der Augenstern gelb; Kopf und Hals schwarz; auf der Stirn sind sechs sehr lange, schwarze, borstenartige Haare, die aufrecht stehn, aber nach Willkühr niedergelassen werden können; am Hinterkopf ist ein Federbusch von goldrother Farbe; die Federn, aus denen er besteht, sind etwas hart und steif, und die Fahnen hängen nicht unter einander zusammen; der Raum zwischen diesen zwey Federbüschen ist weiß, und bildet ein Band queer über den Kopf; die Augen sind mit weißen, steifen Federn rings umgeben; Brust und Bauch sind schön dunkel violett; die kleinern Deckfedern der Flügel braun, die andern, und die kurzen Schwungfedern gelbrothweiß, mit wellenförmigen, schwarzen Linien durchzogen; die großen Schwungfedern gelbroth, und wie die andern bezeichnet; Rücken, Steiß und Schwanz dunkelgrün, letzter kurz, und wird horizontal getragen; die Füße gelb; die Zehen bis an ihren Ursprung getrennt, der hintern aber fehlt die Klaue r).

10. Var. A. Columba cristata. L. I. 2. p. 774. No. 8. β.

(s. die erste Figur der sechzigsten Kupfertafel.)

Lev. Mus.

Sie hat die Größe der gemeinen Taube, und ist zehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist gelblich; mit einer schwarzen Spitze; der Hinterkopf ist mit einem Federbusch geziert, wie bey der vorigen; die Stirn weiß, und dieß zieht sich zu beyden Seiten unter dem Federbusch hin; die Augenlieder sind roth; die Augenkreiße sind nur wenig mit röthlichen Federn bekleidet, die nach hinten in eine Spitze auslaufen; Kopf und Hals sind dunkel röthlichbraun; Brust, Bauch und Aster violetschwarz; die Flügel schön röthlichbraun; Rücken, Steiß und Schwanz mattbräunlichgrün; die Deckfedern des Schwanzes lang, und fallen über den Schwanz herüber; die Füße röthlichgelb; die Klauen schwarz.

Ein Exemplar von obiger Art ist im Leverschen Museum, und wurde zufälliger Weise bey einem Trödler angetroffen, ohne die geringste, beygefügte Geschichte. Es ist wahrscheinlich blos eine Geschlechtsverschiedenheit von der letzten. Fürjetzt will ich es als eine Spielart aufstellen s).

11. Die

q) Latham Ind. orn. II. p. 596. n. 30. B.

r) Im Ind. orn. steht noch folgendes: Das Weibchen ist ein wenig kleiner; der Federbusch fehlt; die vordern Schwungfedern und die Deckfedern der Flügel sind röthlichrostfarben. Die Jungen sind wollig und schwarz. B.

s) Nach obiger Bemerkung aus dem Ind. orn. fällt die Vermuthung als Weibchen weg. Vielleicht ist es ein junges noch nicht völlig ausgefärbtes Männchen. B.

1. Die kleine Kronentaube. 2. Die haakenschnäblige Taube.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

11. Die grauköpfige Taube. (Grey-headed P.

Columba albicapilla. L. I. 2. p. 775. No. 8. *t*)
Le Pigeon verd à tete grise d'Antigue. Sonn. Voy. p. 112. tab. 66. *u*)

Von der Größe der gemeinen Taube. Ihr Schnabel ist matt roth; der Augenstern gelb; der obere Theil des Kopfs schmutzig weiß; der Hinterkopf und die Seiten des Halses röthlichbraun, mit Kupferglanz; die kürzern Schwungfedern lebhaft grün, mit Metallglanz, der in verschiedenem Lichte schillert; die großen Schwungfedern und der Schwanz schwarz; zwischen den Flügelbug und und dem Körper ist ein halbcirkelrunder Fleck, der aus halb grünen, halb grauen Federn besteht; der übrige Körper grün; die Füße matt roth.

Sie ist auf der Insel Panay zu Hause.

12. Die Pompadeurfarbene Taube. (Pompadoor P.)

Columba Pompadora. L. I. 2. p. 775. No. 9.
Pompadour Pigeon. Brown's illustr. pl. 19. (das Männchen?)
Yellow-faced Pigion. ibid. pl. 20. (das Weibchen?)

Sie ist kleiner, als eine Turteltaube. Der Schnabel bläulich; Wangen und Kinn sind hellgelb; Rücken, Brust und Bauch hellgrün; die Deckfedern der Flügel schön Pompadurfarben; die Schwungfedern schwarz, mit gelben Rändern, der Schwanz lichtgrün, und lang; die Füße roth.

Die oben angeführte zweyte Figur ist das Weibchen. Seine Farben sind blässer; und die Deckfedern der Flügel von Einer Farbe, mit dem Körper.

Sie sind zu Zeylan zu Hause, wo man sie immer auf den Bäumen, und niemals auf dem Boden, sieht; mehrentheils kennt man sie daselbst unter dem Namen: Waringin Grothebria, von den Beeren, die sie so gerne fressen. Sie sind gut zu essen, und werden von den Europäern deshalb geschossen. Die Eingebohrnen fangen sie mit Leimruthen.

Sie *v*) sind in verschiedenen Ländern Indiens zu Hause, und gemein auf dem Lande um Bengalen, wo sie Coucla genannt werden. Sie haben eine pfeifende Stimme, die jener der Drossel nicht unähnlich ist, und mit der Stimme anderer Tauben gar keine Aehnlichkeit hat — Herr Widdleton.

13. Die Granatflügelige Taube. (Garnet-winged P.)

Columba erythroptera. L. I. 2. p. 775. No. 10. *w*)
Lev. Mus.

t) Latham Ind. orn. II. p. 397. n. 11. B.
u) Uebers. von Büffons Vögeln. VI. S. 233. 2)
v) Zus. a. d. Suppl. S. 198. Uebers.
w) Latham Ind. orn. II. p. 597. n. 13. B.

Ihre Länge ist zehnthalb Zoll. Der Schnabel ist drey Viertel Zoll lang, und dunkelgelb, bey einigen Individuen schwarz; die Stirn weiß, von hier aus geht ein Streifen von der nämlichen Farbe über jedes Auge, fast bis zum Hinterkopf hin, der so wie der Nacken schwarz ist; der untere hintere Theil des Halses, die Schultern und die Deckfedern der Flügel sind sehr schön dunkel granatfarbig; der Rücken zwischen den Flügeln, die Schwungfedern, der Schwanz, der untere Theil der Brust, der Bauch und der After -- alle sind schwarz; der Schwanz ist drittehalb Zoll lang, und am Ende gleich, die obere Hälfte gräulichaschfarben, die Endhälfte schwarz, die untere Seite einfärbig dunkel; die Füße braun.

Sie ist auf der Insel Einwo zu Hause.

Var. A.

Nebst der obigen findet sich in Sire Jos. Banks Sammlung noch eine andere vor x), die ohne Zweifel bloß eine Geschlechts- oder Altersverschiedenheit ist. Sie ist ohngefähr um einen Zoll länger; Stirn, Kehle, Vorderhals und Brust sind weiß; der Hinterhals dunkelfarbig; über den Augen ist ein rostigrother Streifen, der zu beyden Seiten des Halses etwas herabläuft; der Rücken ist dunkelschwarz; der Bauch dunkelfarbig; die Schultern und die Deckfedern der Flügel wie bey den andern; Schwungfedern und Schwanz schwärzlich.

Diese wurde auf Otaheite angetroffen.

Var. B.

In der nämlichen Sammlung finde ich noch eine y), die von der Insel Tanna kam, und die zwischen den zwey obigen mitten inne zu stehn scheint; denn sie hat den weißen Streifen über den Augen von der ersten, und den weißen Vordertheil bis zur Brust von der lezten; so sind auch die Stirn, die Seiten des Kopfs und der Vorderhals weiß; die Füße dunkel matt karmesinroth; Bauch und Rücken röthlich schwarz; den Schwanz abgerundet.

14. Die grünflügelige Taube. (Green-winged P.)

Columba indica. L. l. 2. p. 785. No. 29. z)
— — Jacq. Beytr. p. 35. No. 29. pl. 16.
Le Pigeon ramier d'Amboine. Briss. orn. I. p. 150. No. 42. pl. 15. f. 1.
Green-winged Dove. Edw. pl. 14.
Lev. Mus.

Sie hat die Größe einer Turteltaube, und ist zehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist scharlachroth und zehn Linien lang; die Nasenlöcher sind bläulich; das Auge von dunkler Farbe; die Stirn weiß; zwischen den Augen ein Streifen von eben dieser Farbe; der Scheitel bläulich: die Seiten des Kopfs, der Hals und die Brust röthlich, der Hinterhals am dunkelsten; der Flü-

x)) Columba erytroptera. L. l. c. No. 10. β.
y) C. erythroptera L. l. c. No. 10. γ.
z) Latham Ind. orn. II. p. 595. n. 16. B.

Oberrücken und die Deckfedern der Flügel goldgrün, mit Kupferglanze; der Rand (ridge) der Flügel weiß gefleckt; der Unterücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes aschfarben; der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die obern Deckfedern des Schwanzes röthlichbraun; die Schwungfedern bräunlich; ihre innern Fahnen, zwey Drittheile ihrer Länge von der Wurzel an gelbroth; der Schwanz schwarz, und drey Zoll lang, seine zwey mittlern Federn schwarz, die übrigen aschgrau, mit schwarzen Spitzen; die Füße roth; die Klauen schwarz *a*).

Sie ist auf Amboina, in Ostindien zu Hause.

15. Die purpurköpfige Taube. (Purple-crowned P.)

Columba purpurata. L. l. a. p. 784. No. 64. *b*)
Lev. Mus.

Sie hat die Größe einer Turteltaube, und ist neun Zoll lang. Ihr Schnabel ist drey Viertel Zoll lang, und gelblich; der Augenstern hellgelb; die Stirn, bis an die Mitte des Scheitels, purpurfarbig; der Kopf, der Hals und die untern Theile des Körpers hellgrün, ins Aschfarbne spielend; der After und die untern Deckfedern des Schwanzes gelb; alle obern Theile des Körpers schön dunkelgrün, und sehr glänzend; die Schwungfedern schwarz; die zwey äussern ganz so, die andern grün gerändet, die kürzern an den äussern Rändern gelb eingefaßt; der Schwanz dritthalb Zoll lang, seine Federn ziemlich gleich, und am Ende alle etwas zugespitzt, die Farbe grünlichschwarz, mit grünen äußern Rändern; wenn der Schwanz ausgebreitet ist, so erscheint am Ende ein grünlicher Streifen, bey genauer Untersuchung aber sieht man, daß er unterbrochen ist, und diese Farbe nur die innere Fahne jeder Feder einnimmt; die Füße sind sehr rauh, und dunkel schwarz; die Klauen schwarz.

Diese Beschreibung ist nach einem Exemplar gemacht, das aus Otaheite kam. Ich finde aber viele Spielarten von diesen Vögeln, nach den verschiedenen Inseln, von denen sie gebracht werden; denn sie sind auf dem ganzen stillen Meere, innerhalb der Wendecirkel, zu Hause. In Otaheite ist der Scheitel sehr matt purpurfarbig; auf Ulietra und einigen andern Inseln dunkler. Die Exemplare aber, die sich auf Tongo Tabu vorfinden, haben einen äußerst dunkel und lebhaft purpurfarbnen Scheitel, der gelb eingefaßt ist; der Schnabel ist bey diesen dunkelfarbig; der Augstern gelb; der After beynahe orangenfarben; und die Füße dunkelroth.

Unter den andern bemerke ich einige, die nicht die geringste Spur von Rothem auf dem Scheitel haben; ob diese aber verschiedenen Geschlechts, oder junge Vögel sind, oder ob sie diese Verschiedenheit blos dem Wohnorte zu verdanken haben, kann ich nicht genau bestimmen.

Diese

a) In den Suppl. (S. 898.) steht nach der Zusaz. „Hier (nämlich bey Jacquin) ist auch eine Spielart angeführt mit grünen Schwungfedern und Schwanz, violetten Deckfedern der Flügel, und blauem Steiß und After.“ Sie steht auch im Systema nat. c. C. indica s. so wie in Latham Ind. orn. l. c. s. B.

b) Latham Ind. orn. II. p. 598. n. 17. B.

Diese Art wird von den Einwohnern auf Tougo Tabu, Kurukuru; und von denen auf Otaheite, Oopa, oder Oopara genannt.

Sie lebt von Pfang, und ist leicht zu zähmen.

Die schöne grüne Turteltaube, deren Bougainville c) erwähnt, ist vielleicht mit dieser Eine und ebendieselbe. Er spricht auch von Tauben, mit goldgrünem Gefieder d), grünlichweißem Hals und Brust, und kleinen Federbüschen auf dem Kopfe, ob sie zu obigen, oder zu irgend einer andern Art gehören, läßt sich aus einer so kurzen Beschreibung, nicht bestimmen; vielleicht sind sie die gleich zu beschreibende.

16. Die Jambu-Taube. (Jamboo P.)

Columba Jambu. L. I. 2. p. 784. No. 63. e)
Pooni Jamboo. Marsden Sumatr. p. 84.

Diese ist kleiner, als die gewöhnlichen Tauben. Ihr Schnabel ist gelb; der Vorderkopf dunkelroth (deep pink) f); Rücken, Flügel und Schwanz grün; Brust und Kropf weiß; der vordere Theil (front) des lezten aber hat eine lichtrothe Schattirung, das Weiße an der Brust läuft in einem schmalen Streifen fort, der an der Einen grau, und an der andern roth ist, halb um die Augen herum, die groß und gelb sind.

Sie ist auf der Insel Java zu Hause, und lebt, in der Wildniß, von den Beeren des Rumpooni; aber auch von gesottenem Reis und Padda.

17. Die rothköpfige Taube. (Red-crowned P.)

Columba rupicapilla. L. l. 2. p. 784. No. 62. g)
Le Pigeon violet à tete rouge d'Antigue. Sonn. Voy. p. 112. tab. 67. h)

Sie hat die Größe der Schleyertaube (2. Var. H.) Ihr Schnabel ist grau, an der Wurzel der obern Kinnlade ist eine fleischige Haut, von lebhaft rother Farbe, die die Augen ganz umgiebt; der Augenstern hat zwey Kreise, einen großen, rothen, und einen kleinern, grauen; der Scheitel ist mit schmalen (slenders), schön rothen Federn bedeckt, die eine Art von Hut bilden; der Hals, der obere Theil des Rückens und die Brust sind bläulichgrau, die Brust am hellsten; der übrige Körper und der Schwanz sammetschwarz, das ins Blaue und Violette spielt, nach der verschiedenen Brechung der Lichtstrehlen; die Füße grau.

Diese hat Herr Sonnerat in Antigua auf der Insel Panay, vorgefunden.

18. Die

c) Voy. p. 247. —
d) Ib. p. 329.
e) Columba Iambos Latham II. p. 598. n. 18. B.
f) Diese wird mit der Farbe der Jambublüthen verglichen, deren Frucht an Gestalt einer Birn gleicht. Es giebt zwey Arten Eugenia malaccensis, und Iambos Linn.) die beyde köstlich zu essen seyn sollen.
g) Latham Ind. orn. II. p. 599. n. 19. B.
h) Uebers. von Büffons Vögeln IV. S. 234. 3) B.

18. Die purpurfarbige Taube. (Purple P.)

Columba purpurea. L. l. 2. p. 784. No. 61. *i*)
Purple Pigeon. Brown's illustr. p. 42. pl. 18.

Von der Größe der Engliſchen Holztaube. Die Stirn iſt hellgrün; Kopf und Hals ſind ſchön licht purpfarben; die Bruſt orangefarben; der Rücken, die Schulterfedern und der Bauch lichtgrün; der After ſcharlachroth; die Schwungfedern dunkelfarbig.

Sie iſt auf der Inſel Java zu Hauſe, wo ſie Jooan heißt, von Joo, das in der Javaniſchen und Malayiſchen Sprache Grün bedeutet *k*).

19. Die purpurbrüſtige Taube. (Purple-breasted P.)

Columba eimeensis. L. l. 2. p. 784. No. 60.

Ihre Länge iſt vierzehn Zoll. Der Schnabel ſchwarz; die Seiten des Kopfs, unter den Augen, dunkelfarbig; Stirn, Kehle und Vorderhals hellgelbroth, oder vielmehr weinfarbig (vinaceous); Scheitel und Hinterhals dunkelbraun, mit einem grünlichen Anſtrich an erſterm; die Seiten des Halſes rothbraun, das, ſo wie es herabwärts kommt, ins glänzend Purpurfarbne, oder Lackrothe (lake-colour) ſpielt, und ſich zu beyden Seiten vereinigt, um einen Streifen von dieſer Farbe an der Bruſt zu bilden; die Farbe der Deckfedern der Flügel iſt eben das ſchöne Purpurroth, das der Streifen an der Bruſt hat; die Schwungfedern ſind dunkelfarbig; über den purpurrothen Streifen an der Bruſt iſt ein weißes Queerband; der Bauch iſt dunkelfarbig; die Füße ſind roth und anderthalb Zoll lang; die Klauen ſchwarz.

Sie iſt auf der Inſel Eimeo zu Hauſe.

20. Die Papagey-Taube. (Parrot P.)

Das Männchen.

Columba vernans. L. l. 2. p. 789. No. 69. *l*)
Le Pigeon verd des Philippines. Briss. orn. l. p. 143. No. 38. pl. 11. f. 2. — Buff. ois. ll. p. 528. *m*) — Pl. enlum. 138.
Parrot Dove. Ray Syn. p. 196. N. 15. pl. 2.
Le Pigeon verd male des isles de Luçon et d'Antigue. Sonn. Voy. p. 110 tab. 64.

Etwas

i) Latham Ind. orn. II. p. 599. n. 20. B.

k) Herr Loten ſagt, er habe mehr als achtzehn bis zwanzig Arten von Waldtauben, auf den Inſeln Java, Celebes und Ceylon kennen gelernt, einige ſo groß, als eine kleine Henne, von ſchöner weißer Farbe mit ſchwarzen Flügeln und Schwanz; andere bläulich grün; einige durchaus ſchön dunkelroth, zwiſchen Scharlach und Carmoiſin, und andere unſern Europäiſchen Turteltauben ähnlich.

l) Latham Ind. orn. II. p. 594. n. 22. B.

m) Ueberſ. VI. S. 228. B.

Etwas größer als eine Turteltaube, und zehnthalb Zoll lang. Der Schnabel iſt drey Viertel Zoll lang, und ſchwärzlich, mit einer gelblichen Spitze; Kopf und Kehle ſind matt olivengrün; der Augenſtern beſteht aus zwey Kreiſen, einem rothen, äußern, und einem grünen innern; der Hals iſt hell kaſtanienbraun, ins weinfarbene ſpielend; der Rücken, der Steiß, die Seiten und die obern Deckfedern des Schwanzes olivengrün; die Deckfedern der Flügel eben ſo, die größern aber mit ſchwefelgelben Spitzen, das einen Fleck an den Flügeln bildet; die Bruſt orangenfarben; Bauch und Schenkel hell olivengrün, das ins helle ſpielt, und gegen den After hin, der gelb iſt, heller wird; die untern Deckfedern des Schwanzes gelbroth, und ſo lang als der Schwanz ſelbſt; die Schwungfedern oben ſchwärzlich, unten aſchfarben, mit ſchwefelgelben Rändern; der Schwanz oben aſchfarben, unten ſchwärzlich; die Füße roth; die Klauen ſchwarz.

Dieß ſollte ich glauben, wäre der oben angeführte Vogel des Sonnerat; aber das hell Aſchgraue *n*) am Scheitel, deſſen dieſer Schriftſteller erwähnt, hatte Briſſon's Vogel nicht. Sonnerat ſagt, der Schnabel ſeines Vogels ſey kurz, und grau; und die gelbe Farbe an der Bruſt, die Briſſon orange nennt, vergleicht er mit Operment. Uebrigens ſcheinen beyde überein zu kommen.

Das Weibchen.

Le Pigeon verd femelle de l'isle de Luçon. Sonn. Voy. p. III. tab. 69.

Bey dieſem ſind der Kopf, der Hals, und die obern Theile des Körpers graulichgrün; Bruſt und Bauch gelblichgrün; die Schwungfedern ſchwarz, mit gelben Rändern, die kurzen aber haben einen röthlichen Glanz; der Schwanz iſt ſchwarz; der Schnabel iſt bey dieſem länger, als bey den andern, und wie die Füße aſchfarben; der Augenſtern licht apfelgrün.

Dieß iſt das Weibchen von letztern. Beyde ſind auf Manilla und Panay zu Hauſe.

21. Die Gewürztaube. (Aromatic P.)

Columba aromatica L. l. 2. p. 778.. No. 47. *o*)
Le Pigeon verd l'Amboine. Briss. orn. I. p. 145. No. 39. pl. 10. f. 2. — Buff. ois. II. p. 528. *p*) — Pl. enlum. 163.

Sie hat die Größe einer Turteltaube, und eilfthalb Zoll Länge. Ihr Schnabel iſt grünlich; der obere Theil des Kopfs vornen lichtgrau, hinten dunkler; die Seiten deſſelben, die Kehle, der Hals, die Bruſt, der Bauch, der Steiß, die obern Deckfedern des Schwanzes und der Schwanz olivengrün, am Hals und Bruſt ins Gelbe ſpielend; die untere Seite des Schwanzes an der Wurzel ſchwarz, und am Ende ſchmutzigweiß; die obern Deckfedern deſſelben ſchmutzig

n) Vielleicht meynt Briſſon eben dieſen Vogel, wenn er ſagt, er habe einen geſehen, der aus einer Gegend jenſeits des Ganges kam, und ſich blos durch einen ſchön grünlich weißen Kopf auszeichnete. Orn. vol. 1. p. 145.

o) Latham Ind. orn. II. p. 599. n. 23. B.

p) Ueberſ. VI. S. 229. B.

zig gelblichweiß; der Rücken und die Deckfedern der Flügel ſchön kaſtanienbraun, die Spitzen einiger derſelben gelblich, und dieß bildet ein Band an den Flügeln, und unter dieſem iſt die Farbe ſchwarz, mit gelben Rändern; der Flügelbug ſchwärzlich; die Schwungfedern ſchwarz, und gelb geründet, am ſchmalſten an den großen; Füße und Klauen grau *q*).

Sie iſt auf Amboina zu Hauſe.

22. Die St. Thomas-Taube. (St. Thomas's P.)

Columba St. Thomae. L. l. 2. p. 778. No. 46. *r*)
Le Pigeon verd de l'isle de St. Thomas. Briss. orn. I. p. 147. No. 40. — Buff. ois. II p. 528. *s*)
A wild Pigeon from St. Thomas his Island. Will. orn. p. 183. — Ray. Syn. p. 62. No. 7.

„Dieſe ſagt Willughby, „hat die Größe und Bau unſrer Feldtaube; ihr Oberſchnabel „aber iſt gekrümmt, die vordere Hälfte deſſelben blau, mit etwas Weißem und Gelbem unter„miſcht, die hintere blutroth; die Augen ſind ſchwarz, mit einem blauen Kreiſe; der ganze Kör„per iſt mit grünen Federn bedeckt, gleich einem Papagey; die großen Schwungfedern ſind „dunkelfarbig, eben ſo das Ende des Schwanzes; unter dem After hat ſie gelbe Federn; Bei„ne und Füße ſind ſchön ſaffrangelb; die Klauen aber dunkelfarbig.“

Sie iſt auf der St. Thomas Inſel zu Hauſe.

23. Die haakenſchnäblige Taube. (Hook-billed P.)

(ſ. die zweyte Figur der ſechzigſten Kupfertafel.)

Columba curvirostra. L. l. 2. p. 777. No. 45. *t*)
Lev. Mus.

Sie iſt achthalb Zoll lang. Ihr Schnabel iſt am Rücken ſcharf ausgehöhlt (carinated), und am Ende ſtark gekrümmt, die Wurzel deſſelben roth, das Uebrige gelb; die Hauptfarbe des Vogels iſt grün, unten gelblich; an den Flügeln ſind zwey gelbe Streifen, weil nämlich einige Deckfedern der Flügel und die kürzern Schwungfedern gelbe Endſpitzen nach dieſer Richtung haben; der Rücken und die Schultern ſind ſchön röthlich kaſtanienbraun; die Außenſeite der Schenkel iſt aſchfarben; die untern Deckfedern des Schwanzes ſind roſtigroth; der After ſelbſt aber weiß; der Schwanz abgerundet, ſeine zwey mittlern Federn grün, die andern dunkel aſchfarben, mit einem ſchwarzen Streifen, ohngefähr drey Viertel Zoll breit vom Ende.

Ein anderer, bey dieſem, vermuthlich das Weibchen, unterſchied ſich durch einen grünen Rücken und dergleichen Schultern; und die untern Deckfedern des Schwanzes waren weiß, wie der After.

q) In den Pl. enlum. roth.
r) Latham Ind. orn. II. p. 600. Nr. 4. B.
s) Ueberſ. VI. S. 230. B.
t) Latham Ind. orn. II. p. 600. n. 25 B.

Dieſe Vögel wurden auf der Inſel Tanne in der Südſee angetroffen.

Ein, dem obigen ähnlicher, Vogel befindet ſich unter den Gemälden des Sire Joſ. Banks. Er iſt beynahe eilf Zoll lang, ſein Schnabel nicht ſo gekrümmt; die kleinern Deckfedern der Flügel weiß gefleckt; die Endſpitzen der kurzen Schwungfedern an den äußern Fahnen gelb; der Schwanz am Ende ſehr blaß; die Füße roth *u*).

24. Die Taube mit roſtfarbenem After. (Ferruginous-vented P.)

Columba pacifica. L. I. 2. p. 777. No. 44. *v*)

Ihre Länge iſt vierzehn und ein halber Zoll. Der Schnabel iſt ſchwarz; die Naſenlöcher ſind höckerig; Kopf und Hals ſehr licht aſchfarben; das Kinn faſt weiß; die obern Theile des Körpers braun, mit grauem Glanze; die Bruſt röthlich iſabellenfarben, mit einem weinfarbigen Anſtrich; der Bauch aſchfarben, das an der Mitte herab ins Braune ſpielt; der After und die untern Deckfedern des Schwanzes dunkel roſtigroth; die Schwungfedern dunkelbraun, mit grünlichbraunen Rändern; der Schwanz fünf Zoll lang, und ſchwarz, mit grünlichem Glanze; die Füße roth, bey einigen Exemplaren braun oder dunkelfarbig.

Sie iſt auf den Freundſchafts Inſeln, in der Südſee zu Hauſe *w*).

25. Die Mexikaniſche Taube. (Mexican P.)

Columba mexicana. L. I. 2. p. 777. No. 43. *x*)
Le Pigeon de Mexique. Briss. orn. I. p. 99 No. 10. — Buff. ois. II. p. 525. *y*)
Cehoilotl. Ray Syn. p. 63. No. 14.

Alle Nachrichten, die ich von dieſem Vogel finde, beſtehen darin, daß ſeine Augen karmoiſinroth eingefaßt ſind; der Augenſtern ſchwarz; das ganze Gefieder braun iſt, die Bruſt und die Flügelſpitzen ausgenommen, die weiß ſind; die Füße roth.

Sie iſt in Mexiko zu Hauſe.

26. Die ſchwarzgefleckte Taube. (Black-spotted P.)

Columba naevia. L. I. 2. p. 777. No. 42. *z*)
Le Pigeon sauvage du Mexique. Briss. orn I. p. 100. No. 11. — Buff. ois. II. p. 525. *a*)
Hoilotl. Ray Syn. p. 63. No. 12.

Sie

u) S. Syst. Nat. l. c. No. 45. C. curvirostra *s.* Ueberſ.
v) Latham Ind. orn II. p. 600. n. 27. B.
w) Im Ind. orn. wird noch folgende Varietät angegeben: Kopf, Hals Bruſt und Bauch ſind weißlich; Rücken, Deckfedern der Flügel und Schwanz grünlich; der Schnabel an der Wurzel iſt höckrig. B.
x) Latham Ind. orn II. p. 601. n. 28. B.
y) Ueberſ. Vl. S. 215. B.
z) Latham Ind. orn II. p. 601. n. 29. B.
a) Ueberſ. Vl. S. 215. B.

Sie hat die Größe der erſten Art. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; der Kopf, der Hals und die obern Theile braun, mit ſchwarzen Flecken; Bruſt, Bauch und Schenkel hellrothgelb; die untern Deckfedern des Schwanzes und die Stelle unter den Flügeln aſchgrau; Schwungfedern und Schwanz braun; die Füße roth.

Sie findet ſich in Mexiko, und bewohnt die Wälder in den kältern Gegenden dieſes Landes.

27. Die weißſchulterige Taube. (White-shouldered P.)

Columba Hoilotl. L. I. 2. p. 777. No. 12. *b*)
Le Pigeon de montagne du Mexique. Briss. orn. I. p. 170. No. 28. — Buff. ois. II. p. 525. *c*)
Hoilotl. Ray Syn. p. 63. No. 13.

Sie hat die Größe der Römiſchen Taube (2 Var. C.) Schnabel und Füße ſind ſcharlachroth, und das Gefieder von purpurgelbrother Farbe, die kleinern Deckfedern der Flügel ausgenommen, die weiß ſind.

Andere ſind hell rothgelb, mit weißen, kleinern Deckfedern der Flügel, wie jene; Schnabel und Füße röthlich.

Sie iſt in Mexiko zu Hauſe.

28. Die blaue Taube. (Blue P.)

Columba caerulea. L. I. 2. p. 776. No. 11. *d*)
Le Pigeon bleu du Mexique. Briss. orn. I. p. 139. No. 35. — Buff. ois. II. p. 525. *e*)
Flacahoilotl. Ray Syn. p. 63. No. 15.

Von der Größe einer Haustaube. Schnabel, Augenſtern und Füße ſind roth; der Kopf, der Hals, die obern Theile und die Schenkel blau; am Kopf und Hals iſt auch eine Miſchung von Rothem, beſonders am vordern Theile; die Bruſt, der Bauch, die Seiten, die Deckfedern der Flügel und der Schwanz von unten, ſind roth; Schwungfedern und Schwanz blau.

Sie iſt in Mexiko zu Hauſe.

Büffon glaubt, dieſe vier hätten ſehr viele Aehnlichkeit mit der gemeinen Europäiſchen Taube.

29. Die Ringeltaube. (Ring P.)

Columba Palumbus. L. I. 2. p. 776. No. 19. *f*) — Faun. Suec. No. 208. — Scop. ann. I. No. 278. *g*) — Müller Zool. No. 228. — Brünn. orn.

b) Latham Ind. orn. II. p. 607. n. 30. B.
c) Ueberſ. VI. S. 216. B.
d) Latham Ind. orn. II. p. 601. n. 31. B.
e) Ueberſ. VI. S. 216. B.
f) Latham Ind. orn. II. p. 601. n. 32. B.
g) Ueberſ. von Günther S. 147. Nr. 178. B.

No. 204. — Georgi Reise p. 173. — Kram. elench. p. 359. No. 2. — Frisch tab 138. — Sepp. Vog. pl. in p. — Faun. Arragon. p. 83.
Le Pigeon ramier. Briss. orn. I. p 89. No. 6. — Buff. ois. II. p. 351. pl. 24. *b*) — Pl. enlum. 316.
Ring Dove. Ray. Syn. p. 62. A. 9. — Will. orn. p. 185. pl. 35. — Br. Zool. I. No. 102. *i*) — Arct. Zool. II. p. 329. B. *k*) — Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß ist eine große Art, die siebenzehn und einen halben Zoll mißt. Ihr Schnabel ist vierzehn Linien lang, und von gelblicher Farbe; die Nasenlöcher sind mit einer rothen, fleischigen Haut bedeckt; der Augenstern ist hellgelb; der Kopf, der Rücken und die Deckfedern der Flügel bläulich aschfarben, am dunkelsten am Kopf, der Oberrücken spielt ins Braune, und Unterrücken, Steiß und Vorderhals sind hell aschfarben; der übrige Hals und die Brust weinfarben, mit Aschfarbe untermischt; Bauch, Schenkel und After schmutzigweiß; der Hinterhals und die Seiten desselben goldgrün, das bey gewißem Lichte ins Blaue schillert, mit einem Kupferglanze; und zu beyden Seiten des Halses steht ein weißer halber Mond; die großen Schwungfedern sind dunkelfarbig, alle, die äußerste ausgenommen, mit weißlichen, äußern Rändern, die hintern sind graulichbraun; an der Wurzel der Afterflügel ist ein weißer Fleck (dash); der Schwanz ist oben aschfarbig, mit schwärzlicher Endspitze, unten aber aber sind Wurzel und Endspitzen schwarz, die Mitte schimmelgrau; die Füße sind fast bis an die Zehen mit Federn bedeckt, und roth; die Klauen schwarz.

Dieser Vogel wird in ganz Europa angetroffen. Im Rücksicht unsrer Reiche, ist der größte Theil derselben Zugvögel, die am Ende des Jahrs wegwandern, und zeitlich im Frühjahr wiederkommen *l*). Sie halten sich beständig in Wäldern auf, nisten auf die Gipfel der Bäume, und machen ein großes, lockeres, flaches Nest aus dürren Reisern. Sie sollen zweymal des Jahrs brüten. Einmal im April, und dann wieder in der Mitte des Sommers (Midsummer). Büffon ist von erstern überzeugt, weil man ihm öfter, als einmal, zu Anfang des Aprils ein Nest gebracht hat, das zwey, zuweilen drey Junge enthielt; und da ihre Menge im August allenthalben zunimmt, so sollte man glauben, sie brüteten in England öfter, als einmal des Jahrs. Inzwischen nimmt man allgemein an, daß sie nur eine Brut haben, außer wenn ihnen die Jungen aus dem ersten Neste genommen worden sind. Ich kann aber niumand finden, der mir über diesen Punkt Gewißheit verschaffte *m*). Die Eyer gleichen andern Taubeneyern, sind aber größer, und das Weibchen sitzt vierzehn Tage über ihnen, ehe die Jungen ausgeheckt werden.

In einigen Gegenden Englands wird diese Art Queest und Custhal genannt.

Ich *n*) bin bisher ungewiß gewesen, ob die Ringeltaube zweymal des Jahrs brüte, oder nicht; jetzt aber habe ich Autorität, um zu behaupten, daß dieses oft, wo nicht gewöhnlich der Fall

h) Ueberf. VI. S. 238. B.
i) Ueberf. S. 94. Taf. 45. B.
k) Ueberf. II. S. 307. β. Vergl. auch meine N. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 491. Nr. 2. und N. G. Deutschlands IV. Nr. 3. B.
l) Dieser Vogel ist mir öfter, als Einmal, in der Mitte des Decembers geschickt worden.
m) In Thüringen brüten sie des Jahrs zweymal. B.
n) Zus. a. d. Suppl. S. 198. Ueberf.

Fall sey. Ein Brief meines Freundes und Verwandten, Herrn L. Porter, von Chertsey, im Surrey, giebt mir über diese Sache folgenden Ausschluß: „Die Ringeltaube brütet, außer allen Zweifel, zweymal des Jahrs, denn man findet ihr Nest sehr häufig in der Mitte und am „Ende des Augusts, auf dem Gipfel der Weiden, wo sie gerne nistet; und vor einigen Jahren „habe ich ein Weibchen gesehen, das geschossen wurde, als es eben das Nest verließ, am 22sten „September; wo, als man zum Neste kam, das auf einer abgestutzten (pollard) Eiche angebracht war, zwey Eyer, die Junge enthielten, gefunden wurden."

Diese Art ist sehr gemein in den Russischen Wäldern, aber sehr selten in Sibirien, und in Nord-Osten sieht man gar keine; Schweden besucht sie im Sommer, und zieht im Herbst wieder weg; in Norwegen ist sie nicht o).

30. Die Muskatennuß-Taube. (Nutmeg P.)

Columba aenea. L. l. 2. p. 780. No. 22. p)
Le Pigeon ramier des Moluques. Briss. orn. I. p. 148. No. 41. pl. 13. f. 2. — Buff. ois. II. p. 538. q) — Pl. enlum 164.

Sie hat die Größe der Ringeltaube, und ist siebenzehn Zoll lang. Ihr Schnabel ist beynahe grünlich; der Kopf, der Hals und die untern Theile des Körpers schmutzig weiß; mit einem weinfarbnen Anstrich; der Rücken, der Steiß, die obern Deckfedere des Schwanzes und der Schwanz grün, mit Gold- und Kupferglanze; die Seiten und die Stelle unter den Flügeln schmutzigweiß; die untern Deckfedern des Schwanzes purpurkastanienbraun; die Schwungfedern aschfarben, und die Spitzen der großen, so wie die äußern Ränder und Spitzen der kurzen von der Farbe des Rückens; der Schwanz am Ende gleich; die Füßel zur Hälfte herab mit Federn bedeckt, und nebst den Klauen grünlich.

Sie ist auf den Molukkischen Inseln zu Hause, wo sie von Muskatennüßen lebt.

30. Var. A. Columba aenea. L. l. 2. p. 780. No. 22. s. r)
Le Pigeon cuivre mangeur de Muscade. Sonn. Voy. p. 198. tab. 102. s). Lev. Mus.

Diese scheint der letzten sehr ähnlich zu seyn, und ist vielleicht eine bloße Geschlechtsverschiedenheit; sie hat einerley Größe mit ihr. Der Kopf ist blaugrau; der Schnabel grau; Augensterne und Füße sind hell hell karminroth; die obern Theile des Körpers grün, mit Gold- und Kupferglanze; Hals, Brust und Bauch röthlichgrau; die untern Deckfedern des Schwanzes gelblichweiß; Schwungfedern und Schwanz schwarz.

Eine, dieser ähnliche, ist in der Sammlung des Sire Jos. Banks, die aus Neuseeland kam.

Un-

o) Arct. Zool.
p) Latham Ind. orn. II. p. 902. n. 33. B.
q) Uebers. VI. S. 251. B.
r) Latham Ind. orn. I. c. β.
s) Uebers. von Büffons Vögeln. VI. S. 253. 1. B.

Unter den Gemälden eben dieſes Herrn, bemerke ich eine, die dieſer faſt gleich, aber nur dreyzehn Zoll lang iſt. Ihr Schnabel iſt einen Zoll lang; die Naſenlöcher ſtehen in einem Höcker (knob); Kopf und Hals ſind aſchfarben; der Augenſtern orangefarben, Halſter und Kinn grau; die obern Theile des Körpers grün, das am Steiß ins Rothe ſpielt; die untern röthlichbraun; die Flügel blau; die Schwungfedern dunkelblau gerändet; der Schwanz dunkelfarbig; die Füße roth.

Dieſe wurde auf der Inſel Amſterdam angetroffen, wo ſie Oroobaya genannt wird.

31. Die weiße Muskatennuß-Taube. (White Nutmeg P.)

Columba alba. L. I. 2. p. 780. No. 35. *t*)
Le Pigeon blanc, mangeur de Muscade de la nouvelle Guinée. Sonn. Voy. p. 169. pl. 103. *u*)

Dieſe iſt von mitlerer Größe. Ihr Schnabel iſt lichtgrau; der Augenſtern gelblich; das Gefieder iſt durchaus weiß, die Schwungfedern und ein Drittheil des Schwanzes, zunächſt am Ende, ausgenommen, die ſchwarz ſind; die Füße ſind lichtgrau.

Sie iſt in Neuguinea zu Hauſe, frißt, wie die letztere, Muskatennüſſe, und befördert die Verbreitung dieſes nützlichen Gewürzes, wie dieſe.

Dieſe Art lebt, wie uns die Schriftſteller verſichern, von Muskatennüſſen, und wahrſcheinlich dient ihr bloß die äußere Haut derſelben zur Nahrung; denn die Nuß ſelbſt wird ganz, und ſo wenig verändert wieder ausgeleert, daß ſie, nachdem ſie die Verdauungswerkzeuge durchwandert hat, nicht im mindeſten zum Keimen untauglich geworden iſt; daher kommt es, daß dieſe Vögel, indem ſie von einer Inſel zur andern fliegen, allenthalben, wo ſie hinkommen, die Muskatennüſſe ausſäen und verbreiten *v*).

32. Die Taube mit den dreyeckigen Flecken. (Triangular-spotted P.)

Columba guinea. L. I. 2. p. 774. No. 16. *w*)
Le Pigeon de Guinée. Briss. orn. I. p. 132. No. 30. — Buff. ois. II. p. 538. *x*)

t) Latham Ind. orn. II. p. 602. n. 34. **B.**

u) Ueberſ. von Büffons Vögeln VI. S. 253 f. **B.**

v) Auf der Inſel Rotterdam hat man eine Taube gefunden, mit zwey Muſkatennüſſen im Maul und Kropfe, die noch mit ihrer ſcharlachrothen Decke, oder Macis, bedeckt waren. Forster voy. p. 335. Ebendeſſelben Reply. p. 35. Auf eben dieſe Art wird auch der Zimmetbaum, auf Zeylan, durch gewiſſe wilde Tauben fortgepflanzt, die deswegen Zimmetfreſſer genannt werden, und das Entſtehen ſo vieler jungen Bäume längs der Rheede verurſachen, ſo daß dieſe einen Wald gleicht. Forrest voy. p. 345. (keine Beſchreibung des Vogels.) Tauben ſollen auch die Verbreiter der Cumantſchen Ringelblume Loranthus Stelis Linn. ſeyn. „ſie leben nämlich von den Beeren derſelben, und geben die Steine an den Stämmen der Bäume, wo ſie wachſen, wieder von ſich.“ S. Parkinson's voy. p. 38.

w) Latham Ind. orn. II. p. 602. n. 35. **B.**

x) Ueberſ. VI. S. 254. **B.**

La Tourterelle du Cap de bonne Esperance. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 179.
Triangular-spotted Pigeon. Edw. II. pl. 75. *y*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Sie gleicht an Größe der Holztaube. Ihr Schnabel ist schwärzlich; die Augen sind mit einer rothen Haut umgeben; der Augenstern lebhaft gelb; der Kopf, der Hals und die untern Theile des Körpers sind hell aschfarben; Bauch und After weiß; die Federn am Halse zugespitzt, aschfarben, mit einem weinfarbnen Anstrich; der Oberrücken purpurbraun, mit violettem Glanze; die Deckfedern der Flügel und die kurzen Schwungfedern eben so, jede Feder aber an der Spitze mit einem dreyeckigen, weißen Flecke, deßen Spitze aufwärts gekehrt ist; die großen Schwungfedern schwarz, mit grauen Rändern; der Unterrücken und der Steiß weiß; der Schwanz matt aschfarben, mit schwarzen Spitzen; die Füße hellroth; die Klauen braun.

Sie ist in den südlichen Gegenden von Guinea, und in den steinigen Gegenden Afrika's zu Hause; auch ist sie gemein ums Vorgebirge der guten Hoffnung *z*).

33. Die ringelschwänzige Taube. (Ring-tailed P.)

Columba caribaea. L. I. 2. p. 773. No. 6. *a*)
— — Jacquin's Beytr. p. 30. No. 24.
Le Pigeon á queve annelée de la Jamaique. Briss. orn. I. p. 138. No. 34. — Buff. ois. II. p. 539. *b*)
Columba caudâ fasciâ notatâ. Ray Syn. p. 63. No. 17. — p. 183. No. 22.
Ring-tailed Pigeon. Sloan. Jam. p. 302. — Brown. Jam. p. 468.

Sie hat die Größe der Ringeltaube, und ihre Länge ist funfzehn Zoll. Die Haut, welche die Nasenlöcher bedeckt, ist höckerig; der Augenstern karmoisinroth; Kopf, Vorderhals und Brust purpurfarbig; der Hinterhals grünlich purpurfarben, mit Seidenglanze; der Rücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes hellblau; die Flügel bräunlich; der Bauch weißlich; der Schwanz, wie der Rücken, mit einem schwarzen Bande durchzogen.

Sie ist in Jamaika zu Hause, wo sie häufig Bergtaube genannt wird. Zuweilen findet sie sich in den Savannenwäldern, im Sommer.

Var. A. *c*)

Bey *d*) Jacquins Vogel ist der Schnabel grünlichroth; die Augenkreise kahl und schmutziggelb; der Schwanz keilförmig, und ohngefähr so lang, als der Körper. Er geht darin von dem, von Brisson beschriebenen ab, daß er weder einen weißen Bauch, noch den Streifen am Schwanze hat.

Man

y) Seligmanns Vögel. III. Taf. 45. B.
z) Edwards sagt, daß er wenig Tauben gesehen hätte, die an Schönheit und Farbe, dieser gleich kämen. B.
a) Latham Ind. orn. II. p. 603. n. 36. B.
b) Uebers. VI. S. 258. B.
c) Latham Ind. orn. I. c. *c*.
d) Zus. a. d. Suppl. S. 199. Uebers.

Man trifft ihn in allen Wäldern der Caribäiſchen Inſeln an. Er iſt ziemlich zahm, denn er legt, in einen Käfig eingeſperrt, Eyer; doch kann man ihn nicht frey herumlaufen laßen. Er wird als ein Leckerbiſſen hochgeſchätzt, ſo daß man einen einzigen Vogel für einen Thaler verkauft.

34. Die Neuſeeländiſche Taube. (New Zeeland P.)

Columba novae Seelandiae. L. I. 2. p. 773. No. 5. *e*)

Ihre Länge iſt achtzehn Zoll. Der Schnabel iſt einen Zoll lang, und roth; der Augenſtern und die Augenkreiſe ſind roth; die obern Theile des Körpers rubinroth, mit grünem Glanze am Vorderhalſe; die Schwungfedern dunkelfarbig; der Steiß blau; der Schwanz ſchwarz; die untern Theile von der Bruſt an weiß, das gegen den After hin ins Blaue ſpielt; die Füße roth.

Sie iſt auf Duſky Bay, in Neuſeeland zu Hauſe, wo ſie Hagarreroo genannt wird.

35. Die Madagaskariſche Taube. (Madagascar P.)

Columba madagascariensis. L. I. 2. p. 779. No. 21. *f*)
Le Pigeon ramier bleu de Madagascar. Briss. orn. I. p. 140. No. 36. pl. 14. f. 1. — Pl. enlum 11.
Le Founingo. Buff. ois. II. p. 539. *g*)

Sie hat ohngefähr die Größe einer gemeinen Taube, und eilfthalb Zoll Länge; der Schnabel iſt roth; die Augen liegen in einer kahlen, rothen Haut; das Gefieder iſt durchaus blauſchwarz, und ſehr glänzend, die Federn am Halſe ſchmäler, als die andern, und mit einer Miſchung von Aſchfarbnem; der Schwanz violet-purpurfarben; die Füße roth; die Klaue ſchwarz.

Dieſe Art iſt auf Madagaskar zu Hauſe, wo ſie Founingo-mena-rabou heißt.

35. Var. A. Columba madagascariensis. L. I. 2. p. 779. No. 21. *β*. *h*)
— australis. Linn. Mantiss. 1771. p. 526.
Le Pigeon ramier verd de Madagascar. Briss. orn. I. p. 142. No. 37. pl. 14. f. 2. — Buff. ois. II. p. 540. *i*) — Pl. enlum. 111.

Von der Größe der letzten, und faſt zwölf Zoll lang. Der Schnabel iſt aſchfarben, mit einer röthlichen Wachshaut; Kopf, Hals, Bruſt, Bauch und Seiten ſind olivengrün; der Rücken, der Steiß, die obern Deckfedern der Flügel und des Schwanzes eben ſo, aber dunkler; am Flügelbug iſt ein kleiner, röthlicher Fleck; die Schwungfedern ſind oben ſchwärzlich, und unten

e) Columba Zealandica Latham Ind. orn. II. p. 303. n. 37. B.
f) Latham Ind. orn. II. p. 604. n. 40. B.
g) Ueberſ. VI. S. 259. B.
h) Columba australis Latham Ind. orn. II. p. 604. Hier wird dieſe Taube unter dem Namen der Südländiſchen als eine eigene Art aufgeführt; doch nicht mit Gewißheit. B.
i) Ueberſ. a. a. O.

ten aschfarben, die äußern Ränder schwefelgelb; die größern Deckfedern der Flügel haben eben solche Spitzen; der untere Theil des Bauchs und die Schenkel haben eben die grüne Farbe des Körpers, mit Gelb und Schwärzlich; die untern Deckfedern des Schwanzes sind gelbroth und weißlich melirt; der Schwanz ist aschfarben, seine zwey mittlern Federn sind an der Wurzel von dunklerer Farbe; die Füße roth; die Klauen aschfarben.

Sie ist ebenfalls in Madagaskar zu Hause, und wird daselbst Founingo-maitsou genannt; wahrscheinlich eine bloße Spielart von der letzten, oder verschiedenen Geschlechts.

36. Die Taube von der Insel Frankreich. (Hackled P.)

Columba Franciae. L. l. 2. p. 779. No. 51. *k*)
Le Pigeon Hollandois. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 175. pl. 101.

Diese ist viel größer, als unsere Ringeltaube. Schnabel und Augenstern sind karmoisinroth; die Federn des Kopfs, des Halses und der Brust lang, schmal, zugespitzt, und von sonderbarem Gewebe, so daß sie einer polirten Oberfläche gleichen, auf eben die Art, wie die Anhänge der Flügelfedern des Seidenschwanzes *l*), oder des wilden Indianischen Hahnes *m*); rund um die Augen geht eine kahle, dunkelrothe Haut; Rücken, Flügel und Bauch sind dunkelblau; Steiß und Schwanz dunkel karmisinroth; die Füße schwarz.

Sie ist auf der Insel Frankreich zu Hause, und ihr Fleisch, wie man vorgiebt, giftig.

37. Die grünfleckige Taube. (Spotted-green P.)

Columba maculata. L. l. 2. p. 780. No. 52. *n*)

Ihre Länge ist zwölf Zoll. Ihr Schnabel ist schwarz, mit einer hellgelben Spitze; die Hauptfarbe des Gefieders dunkelgrün und glänzend; Kopf und Hals dunkler, als das Uebrige, und nur von blaser Farbe, die eben des Halses lang und schmal, wie die spitzigen, gekrümmtern Halsfedern (hakles) eines Hahns; jede Flügel und Schulterfeder hat an der Spitze einen sehr hell aschgraulichweißen Fleck, mit einer aufwärts laufenden Spitze, und ist etwas dreyeckig; Schwungfedern und Schwanz sind schwarz, die Federn der erstern haben aschgraulichweiße, die des letzten rostigröthlichweiße Spitzen; der Schwanz ist am Ende gleich; Bauch, Schenkel und After sind dunkelschwarz; die Füße braun, und die Schienbeine zur Hälfte mit pflaumartigen Federn bedeckt; die Klauen schwarz.

In der Sammlung des Majors Davies. Ich sah auch eine in Sire Jos. Banks Sammlung. Ihr Geburtsort ist unbekant.

k) Latham Ind. orn. II. p. 604. n. 42. **B.**
l) Bohemian Chatterer. Ampelis Garrula L. S. Allg. Uebers. 2. B. 1. Th. S. 86.
m) S. unten 51ste Gatt. No. 1. Uebers.
n) Latham Ind. orn. II. p. 605. n. 43. **B.**

38. Die Nikobarische Taube. (Nicobar P.)

Columba nicobarica. L. I. 2. p. 783. No. 27. o)
Le Pigeon de Nincobar. Briss. orn. I. p. 153. No. 44. — Buff. ois. II. p. 541. p) — Pl. enlum 491.
Pigeon from the Nincobar. Albin. III. pl. 47. 48. (Männchen und Weibchen.) — Edw. glean. pl. 339.
Lev. Mus.

Sie hat die Größe der gemeinen Taube. Ihr Schnabel ist dunkelfarbig; der Augenstern nußbraun; der Kopf, der Hals, die Brust, der Bauch, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes sind dunkel bläulich-purpurfarben; die Federn am Halse lang, und spitzig, und werfen einen rothen, blauen Gold- und Kupferglanz von sich; der Rücken und der obere Theil der Flügel sind grün, in die Kupfer- und Goldfarbe spielend; einige äußere Schwungfedern und die Deckfedern über denselben sind schön blau; der Schwanz und seine obern Deckfedern weiß; die Füße röthlich.

Dieß ist Edwards's Beschreibung, der sie von einem lebenden Vogel nahm.

Das Weibchen unterscheidet sich bloß durch ein minder glänzendes Colorit, und dadurch, daß die spitzigen Federn am Halse kürzer sind.

Sie sind auf der Insel Nikobar zu Hause.

39. Die schäckhälsige Taube. (Scallop-necked P.)

Columba speciosa. L. I. 2. p. 783. No. 58. q)
Le Ramiret. Buff. ois. II. p. 541. r)
Le Pigeon ramier de Cayenne. Pl. enlum. 213.
Lev. Mus.

Größer, als eine Turteltaube. Ihr Schnabel ist roth, und mit einer weißen Wachshaut bedeckt; der Kopf rostigroth; Hals und Brust gelbroth, weiß und purpurfärbig blau geschäckt, jede Feder nämlich anfangs gelbroth, dann weiß, mit blauen Rändern, wodurch sie ein wellenförmiges Ansehen erhalten, und einen äußerst schönen Anblick gewähren; der Rücken und die Flügel sind rostigroth; die Schwungfedern dunkler, als die übrigen Theile; der Schwanz dunkelschwarz, und abgerundet; die Füße roth.

Das Weibchen ist eben so gezeichnet, wie das Männchen, aber von viel mattern Farben.

Sie sind in Cayenne zu Hause.

40. Die gemeine Turteltaube. (Common Turtle.)

Columba Turtur. L. I 2. p. 786. No. 32. s) — Scop. ann. I. No. 181. t) — Kram

o) Latham Ind orn. II p. 605. n 44. B.
p) Ueberf. VI. S. 264. B.
q) Latham Ind. orn. II. p. 605. n. 45. B.
r) Ueberf. VI. S. 263. B.
s) Latham Ind. orn. II. p. 605. n. 47. B.
t) Ueberf. von Günther. S. 149. Nr. 181. B

Kram. elench. p. 359. No. 3. — Frisch tab. 144. — Georgi Reise. p. 173. — Sepp. Vog. pl. in p. 11. Faun. Arragon. p. 83.

La Tourterelle. Briss. orn. I. p. 92. No. 8.

— — Buff. ois. II. p. 545. pl. 25. *v*).

— — Pl. enlum. 394.

Turtle Dove. Ray Syn. p. 61. A. 2. — Will. orn. p. 183. pl. 35. — Albin. II. pl. 47. — Br. Zool. I. No. 103. pl. 45. *n*) — Arct. Zool. *w*). Br. Mus. Lev, Mns.

Die Länge dieses Vogels ist über zwölf Zoll. Sein Schnabel ist braun; der Augenstern gelb; die Augenkreiße karmoisinroth; der Scheitel aschgrau-olivenfarbig; Stirn und Kinn fast weiß; zu beyden Seiten des Halses ist ein Fleck von schwarzen Federn, mit weißen Spitzen *x*); der Rücken ist aschfarben, mit röthlichbraunen Rändern; die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel sind röthlichbraun jede Feder in der Mitte schwarz *y*); die Schwungfedern braun, mit blassen Rändern und Spitzen *z*); Vorderhals und Brust weinfarbig, aber blaß; der untere Theil der Brust dunkelgrau; Bauch, Schenkel und After weiß; die zwey mittlern Schwanzfedern braun, die übrigen dunkler, mit weißen Spitzen, und die äußerste am äußern Rande weiß; die Füße röthlich *a*).

Dieser Vogel ist sehr gemein in unsern Reichen, und ich glaube ein vollkommener Zugvogel, weil man nach der Zeit seines Abzuges im Herbst, keinen mehr gesehen hat. Er kommt später, und zieht früher wieder weg, als irgend eine andre Taube, und ist sehr gemein in Kent, wo man ihn oft, während des Sommers in Wäldern sieht. Auch besucht er die Erbsenfelder in Flügen zu zwanzig und mehrern, sobald die Erbsen reif zu werden beginnen, wovon er zuweilen allzu viele verheert, und damit fortfährt, bis zu seiner Abreise, die ohngefähr in das Ende des Augusts, oder in den Anfang des Septembers fällt. Er nistet größtentheils in die dicken Wälder, auf die höchsten Bäume, legt zwey Eyer, wie andre Tauben, und macht, wie man glaubt, nur eine Brut des Jahrs *b*), welches auch sehr wahrscheinlich ist, da sein Aufenthalt bey uns wenigstens um zwey Monate kürzer ist, als bey andern Tauben, die uns besuchen.

n) Uebers. VI. S. 271. B.

w) Uebers. p. 94. Taf. 44.

w) In der Arkt. Zool. finde ich sie nicht. Man vergl. aber Zorns Pethinoth. II. S. 303. Meine N. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 431. Nr. 3. Meine N. G der Stubenvögel S. 122. Nr. 31. und N. G. Deutschlands. IV Nr. 4. B.

x) Die weißen Spitzen machen auf dem schwarzen Fleck drey bis vier schöne halbmondförmige weiße Streifen. B.

y) Die obersten kleinen Deckfedern sind hellaschgrau, die übrigen schwärzlich mit breiter rosenfarbiger Einfassung. B.

z) Die vordern Schwungfedern sind schwärzlich, die hintern aschfarben mit rosenrothen Kanten; daher die Flügel ungemein schön aussehen. B.

a) Das Weibchen ist an der Brust blässer, die Flügel sind, statt rosenfarben, rostfarben gefleckt, und der schwarze Fleck am Hals ist nicht so breit. B.

b) Bey uns nisten sie auch zweymal des Jahrs, nicht blos in Wäldern sondern auch in Gärten auf den Obstbäumen, nicht blos hoch, sondern auch und vielmehr tief auf hohes Buschholz. Sie haben ein sehr schlechtes Nest. Es wird oft vom Wind herabgeworfen. Wenn es vielen Fichtensaamen im Thüringerwalde giebt, so habe ich sie oft in der größten Menge gesehen. Es ist bey uns ein Stubenvogel, der sich auch mit der Lachtaube fortpflanzt, und Bastarde erzeugt. B.

Ich bemerke, daß Pennant und Skopoli Anſtand nehmen, das Linnäiſche Synonym unter dieſen Vogel zu ſetzen; ich zweifle aber keineswegs, daß dieſer, oder die erſte Spielart (40 Var. A.) die eigentliche Art ſey, die er gemeynt hat, ob er ſchon ſeinen Vogel zu einem Indianiſchen macht.

Briſſon erwähnt einer Abbildung eines Vogels dieſer Art, die aus China kam, und in Nichts von dem, von ihm beſchriebenen, abgieng, außer, daß die untern Theile durchaus weinfarbig waren; er iſt auch der Meynung, daß Sloane's Ohrtaube [c]), der nämliche Vogel ſey, und in der Indiſchen Zoologie [d]) wird die Europäiſche Turteltaube, als ein Bewohner von Java aufgeführt.

Dieſe [e]) Art iſt ſehr häufig im ſüdlichen Rußland, in den ſteinigen Gegenden jenſeits des Sees Baikal. In den Türkiſchen Beſitzungen, wo ſie ungemein zahlreich iſt, wird ſie ſehr hoch geſchätzt, und die Regierung bewilligt ein gewiſſes pro Cent in Rückſicht der Gebühr an Getraide, auf Rechnung dieſer Vögel. Eine Menge dieſer Vögel kommt beſtändig auf die Schiffe, die den Hafen von Conſtantinopel durchkreuzen, und frißt ſich, ohne daß man ſie ſtöhrt, in den Magazinen und Mühlen ſatt. Dieſe Erlaubniß ſich da am Getraide Gutes zu thun, lockt ſie in großer Zahl herbey, und macht ſie ſo dreiſte, daß ſie ſich auf die Schultern der Ruderknechte ſetzen, und nach einem leeren Platze hinſehen, wo ſie ihren Kropf aufs neue füllen können [f]).

Ich glaube ſie iſt ziemlich gemein in China und verſchiedenen Ländern Indiens, denn ich habe verſchiedenemal Gemälde von ihr und der Turreltaube mit gefleckтem Halſe (40 Var. A.) von daher geſehen. In Sire Joſ. Banks Sammlung iſt eine aus erſt benanntem Lande, die etwas größer, als unſre Brittiſche, und an Colorit viel höher zu ſeyn ſcheint, ob ſie ſchon in allen übrigen vollkommen eine und eben dieſelbe iſt.

40. Var. A. Die Turteltaube mit gefleckтem Halſe. (Spotted-necked T.)

Columba Turtur. L. I. 2. p. 786. No. 32. g)

Im Leverſchen Muſeum iſt ein Vogel, der in Buckinghamſhire geſchoſſen wurde, und der von obigem darin abgeht, daß ſein Hals, ſtatt blos einen Flecken zu haben, faſt an der ganzen Seite ſchwarz iſt; und ſtatt, daß jede Feder eine weiße Spitze hat, iſt ein runder weißer Fleck an jeder, ganz am Ende, und dieß giebt den Seiten des Halſes ein äußerſt ſchönes Anſehen. Man hat mir auch geſagt, daß viele von dieſer Art in jener Gegend geſehen worden wären [h]).

Unter

c) Ear-Dove-Sloan. Jam. 11. p. 304. t. 262. f. 2. — Raii Syn. p. 184. No. 26.

d) p. 42. — Eben dieſes wird bemerkt in Osbecks Reiſe 1. S. 158.

e) Zuſ. a. d. Suppl. S. 199. 200. Ueberſ.

f) Mem. of the Baron de Tott.

g) Latham l. c. β.

h) Ich habe auch alte Turteltauben geſehen, die ſo ausſahen, und wenn beſonders der Hals beym Ausſtopfen ausgedehnt wird, ſo erſcheinen ſie noch vielmehr als dieſe Varietät. B.

Unter einigen Vögeln, die von der letztern Südsee-Reise kamen, bemerkte ich einen solchen; da er aber in einem Packete war, worin sich andere, die vom Vorgebirge der guten Hoffnung kamen, befanden, so ist es wahrscheinlich, daß er etwa auch daher gebracht worden ist *i*). Wie dieß auch immer seyn mag, so dient es doch zum Beweise, daß weder dieser, noch der vorige, auf Europäische Länder allein eingeschränkt ist.

40. Var. B. Die Portugiesische Turteltaube. (Portugal T.)

Columba Turtur. L. I. 2. p. 786. No. 32. *γ*. *k*)
La Tourterelle de Portugal. Briss. oru. I. p. 98. No. 9. Buff. ois. II. p. 556. *l*)
Portugal Dove. Albin. II. pl. 48.

Diese ist größer als unsere Turteltaube. Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern saffranfarben; der ganze Vogel dunkelbraun; zu beyden Seiten des Halses, ohngefähr in der Mitte, sind zwey oder drey glänzend schwarze Federn, mit weißen Spitzen; die kleinern Deckfedern der Flügel sind schwarz, mit weißen Rändern; die andern braun, mit gelben Rändern; die Schwungfedern schwärzlich, mit gelben Rändern; die zwey mittlern Schwanzfedern dunkel aschfarben, mit weißen Spitzen, die andern an den äußern Rändern und Spitzen weiß, und inwendig aschfarben; die Füße roth; die Klauen schwarz *m*).

Sie ist in Portugall zu Hause.

40. Var. C. Die Turteltaube von Luçon. (Luconian T.)

Columba Turtur. L. I. 2. p. 786. No. 32. *δ*. *n*)
La Tourterelle grise de l'isle de Luçon. Sonn. Voy. p. 52. tab. 12. *o*)

Sie hat die Größe einer gemeinen Turteltaube. Schnabel und Augenstern sind karmoisinroth; Kopf und Hals lichtgrau aschfarben; zu beyden Seiten des Halses haben sechs oder sieben Federn weiße Spitzen; Brust und Bauch sind weinfarbiggrau; die großen Schwungfedern schwarz, die kurzen eben so, die Enden derselben aber haben einen bräunlichgelben Anstrich; die zwey mittlern Schwanzfedern sind schwarz, die andern weiß; die Füße röthlich.

Sie ist auf Manilla zu Hause.

40. Var. D. Die Chinesische Turteltaube. (Chinese T.)

Columba Turtur. L. I. 2. p. 786. No. 32. *ε*.
La Tourturelle brune de la Chine. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 177.

Von

i) Hierin bin ich noch mehr bestärkt worden, da ich sie in zwey verschiedenen Sammlungen von Chinesischen Gemälden antraf wo sie gut vorgestellt war. Der Name, den sie in China führt, ist Parcou.
k) Latham l. c. *γ*.
l) Uebers. VI. S. 302. B.
m) Es ist vielleicht eine gezähmte Turteltaube. Ich habe eine jung aus dem Nest genommne Turteltäubin gesehen, die grade so aussah. B.
n) Latham l. c. *δ*
o) Uebers. von Büffons Vögeln VI. S. 298. B.
p) Columba orientalis Latham Ind. orn. II.

Von der Größe der gemeinen Turteltaube. Schnabel und Augenſtern ſind roth; Kopf, Hals, Bruſt und Rücken ſchmutzig bräunlichgrau, am hellſten an der Bruſt; zu beyden Seiten des Halſes ſtehen einige ſchwarze Federn, mit hell aſchgrauen Enden; die Flügel ſind braun, und mit einem gelben Band durchzogen; die Schwunfedern braun; Steiß und Schwanz dunkel aſchgrau; Bauch und Schenkel weingrau (vinous grey); die untern Deckfedern des Schwanzes hell aſchgrau; die Füße roth.

Sie iſt in China zu Hauſe.

41. Die Surinamſche Turteltaube. (Surinam T.)

Columba surinamensis. L. l. 2. p. 787, No. 67. *q*)
La Tourterelle. Fermin. Surin. II. p. 165.

Dieſe iſt zehn Zoll lang, und achzehn breit. Ihr Schnabel iſt dünn (fine) und lang, von außen dunkelblau, inwendig roth; Kopf und Hals aſchfarben; die Kehle grün und ſchwarz melirt; die äußern Flügelfedern braun, und die mittlern aſchfarben; Bruſt und Bauch weißlich; die Füße roth.

Dieß iſt Fermin's Beſchreibung, der von ihr, als von einem in Surinam gemeinen Vogel ſpricht, und ſagt, ſie heckte des Jahrs zweymal, und baute ihr Neſt in den Wäldern, von den Wohnungen entfernt, auf die höchſten Bäume. Hierin iſt die unſere Art gleich, mit der ſie auch eine Aehnlichkeit hat, obgleich ſie um zwey Zoll kleiner iſt. Ihr Fleiſch iſt, wie er bemerkt, ſaftig und ſehr wohlſchmeckend.

42. Die Lachtaube. (Die Turteltaube mit dem Halsbande. Collared T.)

Columba risoria. L. l. 2. p. 787. No. 33. *r*) — Scop. ann. I. p. 125. No. 182. *s*) Frish tab. 141,
La Tourterelle à collier. Briss. orn. I. p. 95. No. 8. — Buff. ois. II. p. 550. pl. 26. *t*) — Pl. enlum 244.
Turtur Indicus Aldrov. Ray Syn. p. 61. No. 3.
Indian Turtle. Will. orn. p. 184. — Albin. III. pl. 45. *u*) Lev. Mus.

Dieſe iſt etwas größer, als die letzte. Ihr Schnabel iſt ſchwärzlich; der Augenſtern ſchön roth; der obere Theil des Kopfs und Halſes, der Rücken und die Deckfedern der Flügel ſind gelbroth oder röthlichweiß, beynahe milchrahmfarben; Vorderhals und Bruſt weiß, mit einem weinfar-

p. 636. n. 48. Hier wird ſie unter dem Namen Orientaliſche Turteltaube zu einer beſondern Art gemacht. B.
q) Latham Ind. orn. II. p. 609. n. 50.
r) Latham Ind. orn. II. p. 601. n. 57. B.
s) Ueberſ. von Günther S. 150. Nr. 182. B.
t) Ueberſ. VI. S. 277. 280. B.
u) Vergl. auch Zorns Pethinoth. II. S. 303. Meine N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 492. Nr. 4. N. G. der Stubenvögel S. 225. und N. G. Deutſchlands IV. Nr. 5. B.

farbigen Anſtrich; die übrigen untern Theile weiß; der Steiß graulichbraun; die Schwungfedern eben ſo, mit weißlichen Rändern; der Schwanz aſchgrau, die zwey mittlern Federn einfärbig, die übrigen mit weißen Spitzen, und die äußerſte am äußern Rande weiß; der Hinterhals iſt mit einem Halsbande von ſchwarzen Federn verſehen; die Füße ſind roth; die Klauen braun.

Das Weibchen unterſcheidet ſich vom Männchen durch minder lebhafte Farben, und ſpielt ins Graue.

Sie ſind in Indien zu Hauſe, aber auch gemeine Vögel in Frankreich und andern Gegenden des feſten Landes von Europa [v]); in England aber höre ich nicht, daß ſie im Freyen angetroffen wurden [w]).

42. Var. A. Die Chineſiſche graue Turteltaube. (Chinese grey T.)

Columba risoria. L. I. 2. p. 787, No. 32. 3. *x*)
La Tourterelle grise de la Chine. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 176. pl. 102.

Sie hat die Größe der letztern. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern roth; der Scheitel grau; der Hinterkopf dunkel weinfarbig grau; die Federn um die Augen herum weiß; Vorderhals, Bruſt und Bauch ſehr hell röthlich weingrau; die Federn am Hinterhalſe ſtehen in Form eines umgekehrten Herzens, ſind ſchwarz, bilden einen breiten halben Mond, und haben an jeder Seite einen runden, weißen Flecken; Flügel, Rücken, und Steiß ſind ſchmuzig braun; die Schwungfedern ſchwarz: die zwey mittlern Schwanzfedern braun, die andern zur Hälfte ſchwarz, und von da an bis ans Ende weiß; die untern Deckfedern des Schwanzes ſehr hell röthlichgrau; die Füße gelb.

Sie iſt in China zu Hauſe. Ich habe ſie auch auf einigen Gemählden geſehen, nach deren Angabe ſie in Madras zu Hauſe war.

42. Var. B. Die Baſtard-Turteltaube. (Hybridal T.)

Columba risoria. L. I. 2. p. 787. No. 35. *y*, *y*)
La Tourterelle mulet. Briss. orn. I. p. 97. A.

Dieß iſt eine Baſtardbrut von der gemeinen Turteltaube und der Lachtaube. Kopf, Hals und Bruſt ſind weinfarbig; der Rücken matt röthlich aſchfarben; der Bauch, die untere Flä-

v) Einige glauben bis nach Schweden; ich glaube aber nicht, daß Linne's Worte dies beſtätigen. Er ſagt „habitat in India nobis communis Turtur;" wobey er, wohl blos meynt, daß ſie allenthalben in Käfigen gehalten werden wie bey uns in England. In der Faun. Suec. hat er ſie nicht angeführt.

w) Sie ſind wohl in ganz Europa blos Stubenvögel. In Thüringen hält man ſie häufig in der Stube, und groſſe Taubenliebhaber haben ſie auch wohl in Schlägen, die aber im Winter geheizt werden müſſen. B.

x) Latham l. c. β.

y) Latham l. c. γ.

Fläche der Flügel, und die Schwanzspitze, wie bey letztbenanntem Vogel; die Schwungfedern braun; die Füße blutroth z).

43. Die gestrichelte Turteltaube. (Striated T.)

Columba sinica. L. l. 2. p. 783. No. 28. *a*)
La Tourterelle rayée de la Chine. Briss. orn. I. p. 107. No. 16. — Buff. ois. II. p 556. *aa*)
Dove from China. Albin. III. pl. 46.

Sie hat die Größe der Lachtaube. Ihr Schnabel ist bläulich-aschfarben; der Augenstern weiß; der Scheitel aschfarben; die Wangen und die Seiten des Halses gelb; die Federspitzen an letzterm roth, welche Farbe von dem Oberhalse durch ein längliches blaues Band getrennt ist; der Hinterkopf, der Oberhals, der Rücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes sind braun, nach der Queere mit schmalen, gekrümmten, schwarzen Bändern bezeichnet; Brust, Bauch, Seiten und Schenkel rosenfarben; die kleinern Deckfedern der Flügel hellbraun, mit einem schwarz- und weißen, queerstehenden Zeichen an der Spitze jeder Feder bezeichnet; die übrigen Deckfedern schwarz, mit weißen Spitzen; die Schwungfedern schwarz, mit weißen Rändern; der Schwanz hellbraun; die Füße roth; die Klauen weiß.

Sie ist in China zu Hause.

44. Die gestreifte Turteltaube. (Barred T.)

Columba striata. L. I. 2. p. 775. No. 18. *b*)
— — Jacquin's Beytr. p. 32. pl. 16.
La Tourterelle rayée des Indes. Briss. orn. I. p. 109. No. 17. — Buff. ois. II. p. 557. *c*)
Transverse-striped or barred Dove. Edw. pl. 16. *d*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Sie ist etwas kleiner, als unsre Turteltaube, und zehnthalb Zoll lang. Ihr Schnabel ist drey Viertel Zoll lang, und hell hornfarben; die Nasenlöcher sind hellblau; die Augensterne blaugrau; die Augen liegen in einer kahlen, weißen Haut, die bis an die Nasenlöcher reicht; Stirn, Wangen und Kehle sind hellblau; Scheitel und Hinterkopf spielen ins Gelbrothe; der Oberhals, der Rücken und die Deckfedern der Flügel sind bräunlich aschfarben, mit queerstehenden, krummen, schwarzen Bändern bezeichnet; der Steiß eben so, aber nicht gebändert; die Seiten des Halses und des Körpers ziehen sich ins Blaue, und sind mit blauschwarzen, zarten Queerlinien durchzogen; Vorderhals, Brust, Bauch und Schenkel haben einen rosenfarbnen Anstrich; die untern Deckfedern des Schwanzes sind weiß; die Füße hellroth; die Klauen braun.

Sie

z) Die weiße Lachtaube.
C. risoria candida.
Sie ist am ganzen Leibe schneeweiß und nur am Halse steht der schwarze halbe Mond. B.
a) Latham Ind. orn. II. p. 608. n. 52. B.
aa) Uebers. VI. S. 302. B.
b) Latham Ind. orn. II. p. 601. n. 53.
c) Uebers. VI. S. 303. B.
d) Seligmanns Vögel II. Taf. 31. B.

Sie iſt in Oſtindien und China zu Hauſe. Von den Chineſern wird ſie Fowat genannt.

Sie [e]) iſt häufig auf Malakka, wie auch in großer Menge auf der St. Helenen Inſel. Jakquin erwähnt ihrer auch unter den Vögeln, die ſich in der Nachbarſchaft von Venetzuela, in Südamerika aufhalten.

45. Die blauköpfige Turteltaube. (Blue-headed T.)

Columba cyanocephala. L. l. 2. p. 778. No. 20. *f*).
— — Jacquin's Beytr. p. 36. No. 30. tab. 17.
La Tourterelle de la Jamaique. Briss. orn. I. p. 135. No. 32. pl. 13. f. 1. — Buff. ois. II. p. 558. *g*) — Pl enlum. 147.
Turtle Dove from Jamaica. Albin. II. pl. 49.

Sie hat die Größe der gemeine Taube, und ihre Länge iſt eilf Zoll. Ihr Schnabel iſt beynahe einen Zoll lang, an der Wurzel roth, und an der Spitze aſchfarben; der Scheitel und die Kehle ſind blau, und dieſe Farbe ſteigt ein wenig herab, bis zur Mitte des Vorderhalſes, unter welcher die Federn ſchwarz ſind, und wo ſich an einigen derſelben ein weißer Queerſtreifen befindet; von der untern Kinnlade bis zum Hinterkopf läuft ein weißer Streifen unter den Augen weg; der Hinterhals, der Rücken, der Steiß, die Deckfedern der Flügel und des Schwanzes ſind weinfarbigbraun; der Vorderhals (außer gerade an der Mitte herab, wie oben geſagt), und die Bruſt ſind ſchön weinfarbig; der Bauch und die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes eben ſo, aber ins Gelbrothe ſpielend; die Schwungfedern braun, mit gelbrothen, äußern Rändern; der Schwanz oben dunkel aſchfarben, unten ſchwärzlich; Füße und Klauen roth.

Dieſer Vogel iſt in Jamaika und den wärmern Gegenden des feſten Landes von Amerika zu Hauſe.

Er [b]) iſt ſehr gemein auf der Inſel Cuba, wo er in Fallen gefangen, und in Menge auf die Märkte zum Eſſen gebracht wird. Man kann ihn zahm machen, er pflanzt ſich aber in dieſem Zuſtande nicht fort, denn es iſt einige Zeit lang in einem Vogelkaſten der Verſuch gemacht worden, aber ohne Erfolg.

46. Die Suratiſche Turteltaube. (Surat T.)

Columba suratensis. L. I. 2. p. 778. No. 38. *i*)
La Tourterelle de Surate. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 179.

Sie hat die Größe der Lachtaube. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern roth; Kop und Vorderhals weingrau; Bruſt, Bauch und Schenkel eben ſo; oben heller; die Federn am obern und hintern Theil des Halſes ſind ſchwarz, mit einem weißen Bande an den Spitzen

e) Zuſ. a. d. Suppl. S. 200. Ueberſ.
f) Dieſer Trivialname kommt im Syſtem noch einmal vor, ſ. unten No. 52. Ueberſ.
g) Ueberſ. VI. S. 308. Note 2. B.
h) Zuſ. a. d. Suppl. S. 200. Ueberſ.
i) Latham Ind. orn. II. p. 609. n. 55. B.

am untern Theil eben ſo, aber mit einem gelbrothen Bande; die Deckfedern der Flügel hellaſchgrau, jede Feder längs dem Schaft herab ſchwarz geſtreift, und dieſe Streifen werden breiter (widens), ſo wie ſie ſich der Spitze nähern; die Schwungfedern ſchwarz; Rücken, Steiß und Schwanz dunkel ſchmutzig grau; die untern Deckfedern des Schwanzes weiß; die Füße roth.

Sie iſt in Surate, in Oſtindien, zu Hauſe.

47. Die Cambayiſche Turteltaube. (Cambayan T.)

Columba Cambayensis. L. I. 2. p. 779. No. 49. k)
La Tourterelle grise de Surate. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 180.

Von der Größe der letzten. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern roth; der Kopf hellweingrau; die Federn am Vorderhals zwey Drittheile ihrer Länge ſchwarz, das Uebrige hell gelbroth; Hinterhals und Rücken ſchmutzig [illegible]; die Deckfedern der Flügel aſchgrau; die Schwungfedern ſchwarz; die zwey mittlern Schwanzfedern ſchmutziggrau, die andern halbſchwarz, halb grau; der Bauch, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes weiß; die Füße roth.

Sie iſt in Surate, und andern Gegenden der Provinz Cambay zu Hauſe.

48. Die Malabariſche Turteltaube. (Malabar T.)

Columba malabarica. L. I. 2. p. 779. No. 50. l).
La Tourterelle de la cote de Malabar. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 180.

Sie iſt ſo groß als die Lachtaube. Schnabel und Augenſtern ſind roth; Kopf, Rücken und Flügel hell aſchgrau; Hals und Bruſt licht weinfarbiggrau; die mittlern Deckfedern der Flügel mit eyrunden Flecken bezeichnet; die zwey mittlern Schwanzfedern grau, die andern zwey Drittheile ihrer Länge ſchwarz, und von da an bis zum Ende weiß; die Füße roth.

Sie iſt an der Küſte von Malabar zu Hauſe.

49. Die grüne Turteltaube. (Green T.)

Columba viridis. L. I. 2. p. 780. No. 23. m)
La Tourterelle verde d'Amboine. Buff. orn. I. p. 152. No. 42. pl. 15. f. 2.
Le Tourvert. Buff. ois. II. p. 595. 1me espece. n)
La Tourterelle à gorge pourpré d'Amboine. Pl. enlum 142.

Ihre Länge iſt ſieben und drey Viertel Zoll. Der Schnabel roth, und acht Linien lang; Vorderkopf und Kehle ſind aſchfarben; der Hinterkopf und Hals, der Rücken, der Steiß, die obern Deckfedern des Schwanzes und der Flügel, die Bruſt, der Bauch, die Seiten und die Schen-

k) Latham Ind. orn. II. p. 609. n. 56. B.
l) Latham Ind. orn. II. p. 609. n. 57. B.
m) Latham Ind. orn. II. p. 609. n. 56. B.
n) Ueberſ. VI. S. 296. 1.

Schenkel goldgrün, mit Kupferglanze; der Vorderhals prächtig violet, purpurroth; die größern obern Deckfedern der Flügel haben an der Spitze ſchwefelgelbe, äußere Ränder, die untern Deckfedern der Flügel aber aſchfarbene; die Schwungfedern ſind ſchwärzlich, und ihre äußern Ränder und Spitzen haben einerley Farbe mit dem Körper; der Schwanz iſt blaugrün, mit Kupferglanze, ſeine zwey mittlern Federn einfarbig, und ſpielen an den innern Fahnen ins Schwärzliche, die andern haben alle ſchwefelgelbe Spitzen; unten erſcheinen ſie alle ſchwärzlich, mit ſchmuzigweißen Spitzen, und die untern Deckfedern des Schwanzes ſind grünlichweiß; die Füße roth, und zur Hälfte mit Federn bedeckt; die Klauen graubraun.

Sie iſt auf der Inſel Amboina zu Hauſe.

50. Die ſchwarzköpfige Turteltaube. (Black-capped T.)

Columba melanocephala. L. I. 2. p. 781. No. 54. *o*)
Le Turvert. Buff. ois. II. p. 555. IIde esp. *p*).
La Tourterelle de Batavia. Pl. enlum 214.
Black-capped Pigeon. Ind. Zool. pl. 7. *q*)

Sie iſt zehnthalb Zoll lang. Ihr Schnabel iſt kurz, ſchwarz, und an der Spitze gelb; der Kopf hellbläulichaſchfarben; der Hinterkopf ſchwarz; Kinn und Kehle ſchön dunkelgelb: der Hals, und der Körper überhaupt ſchön dunkelgrün; der After pomeranzengelb; einige Federn an der Außenſeite der Schenkel haben eben ſolche Spitzen; die innere Seite derſelben iſt weiß; der Schwanz iſt etwas keilförmig, ſechs der mittlern ſind grün, die drey äußern zu beyden Seiten ungemein ſchön karmoiſinroth; die Füße roth.

Dieſe Beſchreibung iſt nach einem ganz vollſtändigen Exemplare, das Sire Joſ. Banks beſitzt, gemacht.

Bey dem in der Indiſchen Zoologie abgebildeten Vogel, iſt der untere Theil des Bauchs, ſammt dem After gelb *r*) und dieſer wurde auf der Inſel Java todt auf der Erde gefunden.

51. Die Javaiſche Turteltaube. (Javan T.)

Columba Javanica. L. I. 2. p. 781. No. 35. *s*)
Le Turvert. Buff. ois. II. p. 555. IIIme esp. *t*)
La Tourterelle de Java. Pl. enlum. 177.

o) Latham Ind. orn. II. p. 610. n. 59. B.
p) Ueberſ. VI. S. 296. 2. B.
q) Vergl. auch Naturforſcher I. S. 269. B.
r) Eigentlich iſt die Farbe, des in der Indiſchen Zoologie unter dem Namen der ſchwarzgehaubten Taube angegebnen Vogels folgende: Der Vorderkopf, die Wangen und die Vorderbruſt ſind weiß; der Hinterkopf ſchwarz; das Kinn gelb; die Kehle, Bruſt und Vorderbauch nebſt den Deckfedern und kleinen Flügelfedern alle ſchön grün; die Schwungfedern dunkel violet; der Hintertheil des Bauchs und die Afterfedern ſchön gelb; die Schenkel an der äußern Seite grün, an der innern weiß; der untere Theil des Schwanzes ſchön karmoiſinroth. Vielleicht iſt dieſer und La [illegible] Vogel dem Geſchlecht nach verſchieden. B.
s) Latham Ind. orn. II. p. [illegible]. B.
t) Ueberſ. VI. S. 296. 3.

Sie hat die Größe der letzten. Ihr Schnabel ist hellroth, und mit einer weißen Wachshaut bedeckt; Kopf, Hals und Brust sind weinroth, die Stirn und die Seiten des Kopfs am hellsten; Rücken und Flügel dunkelgrün; die großen Schwungfedern braun; der Bauch von dunkler Farbe, die gegen den Schwanz hin, der unten auch dunkelfarbig ist, sehr blaß wird; die Füße roth.

Sie ist in Java zu Hause.

52. Die blauhaubige Turteltaube. (Blue-crowned T.)

Columba cyanocephala. L. I. 2. p. 781. No. 56. *u*)

Von der Größe der letzten. Der Schnabel roth; der Scheitel blau; die obern Theile des Halses und Körpers röthlich; Schwungfedern und Schwanz blauschwarz; die Füße roth.

Sie ist in China zu Hause, und wird von den Eingebohrnen Yaupuan genannt. Sie ist der letztbeschriebnen einigermaßen ähnlich.

53. Die Senegalsche Turteltaube. (Senegal T.)

Columba senegalensis. L. I. 2. p. 782. No. 26. *v*)
La Tourterelle à gorge tachetée du Senegal. Briss. orn. I. p. 125. No. 25. pl. 8. f. 3. — Buff. ois. II. p. 552. *w*)

An Größe gleicht sie einer Schwarzdrossel, und ihre Länge ist neun und drey Viertel Zoll. Ihr Schnabel ist acht Linien lang und schwärzlich; Kopf, Hals und Brust sind weinfarbig, der Vorderhals schwarz gefleckt; der Oberrücken braun, und das Ende jeder Feder ins Gelbrothe spielend; die, zunächst am Körper stehenden, Deckfedern der Flügel eben so, die übrigen aschfarben, eben so der Unterrücken und der Steiß; der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes weiß; die Schwungfedern außen aschfarben, inwendig und unten braun; die sechs mittlern Schwanzfedern aschbraun, die drey andern zu beyden Seiten, von der Wurzel bis in die Mitte, dunkel aschfarben: von hier an bis zu den Enden weiß, die untere Fläche des Schwanzes halb schwarz, halb aschfarben an den sechs mittlern Federn, an den andern weiß; die Füße roth; die Klauen braun.

Sie ist in Senegal zu Hause.

54. Die Senegalsche Turteltaube mit dem Halsbande. (Collared Senegal T.)

Columba vinacea. L. I. 2. p. 782. No. 57. *x*)

La

u) Columba coeruleocephala Latham ind. orn. II. p. 610. n. 61. Nach diesen Namen kann der in Gmelins Linneischen System geändert werden, da der Trivialname cyanocephala schon einmal oben Nr. 45. da gewesen ist. B.

v) Latham Ind. orn. II. p. 610. n. 62. B.

w) Uebers. VI. S. 289. B.

x) Latham Ind. orn. II. p. 611. n. 63. B.

La Tourterelle à collier du Senegal. Briss. orn. I. p. 124. No. 24. pl. 11. f. 1. Buff. ois. II. p. 553. y) — Pl. enlum. 161.

Sie hat die Größe der letztern. Ihr Schnabel ist schwärzlich; Kopf, Hals und Brust weinfarbig, am dunkelsten an den obern Theilen; der Rücken, der Steiß und die Deckfedern der Flügel graubraun; der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes schmutzig weiß; die Schwungfedern schwärzlich braun, mit schmutzig weißen Rändern; der Schwanz drey Zoll lang; seine zwey mittlern Federn graubraun, die andern zwey Drittheile ihrer Länge nach schwarz, das Uebrige grau; am Hinterhalse ist ein schwarzes Halsband, das oberwärts an den Seiten des Halses entspringt; die Füße sind röthlich; die Klauen bräunlich.

Sie ist auch in Senegal zu Hause.

55. Die Afrikanische Turteltaube. (African T.)

Columba afra. L. I. 2. p. 786. No. 31. z)
La Tourterelle du Senegal. Briss. orn. I. p. 122. No. 23. pl. 10. f. 2. — Buff. ois. II. p. 553. a) — Pl. enlum. 160.

Diese ist kleiner, als die letzte, und acht Zoll lang. Ihr Schnabel ist röthlich; der Scheitel aschfarben; der Hinterhals, der Rücken, die Deckfedern der Flügel und der Steiß graubraun; die Kehle weißlich; Vorderhals und Brust hell weinfarbig; der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes schmutzigweiß; die obern Deckfedern des Schwanzes graubraun, mit schwärzlichen Spitzen; die Schwungfedern braun, mit gelbrothen, innern Fahnen; an jedem Flügel sind einige Flecken von goldgrüner Farbe, mit violettem Glanze; der Schwanz ist zwey und drey Viertel Zoll lang, seine zwey mittlern Federn schwärzlichbraun, die übrigen graubraun, mit schwärzlichen Endspitzen; die äußerste hat einen weißen Flecken an der Spitze, von unten sind sie alle schwarz, die äußerste ausgenommen, deren äußere Fahne, zwey Drittheile ihrer Länge weiß ist, mit einem Flecken an der Spitze, wie auf der obern Fläche; die Füße sind roth; die Klauen braun.

Sie wird ebenfalls in Senegal angetroffen.

56. Die rothbrüstige Turteltaube. (Red-breasted T.)

Columba cruenta. L. I. 2. p. 785. No. 66. b)
La Tourterelle grise ensanglantée. Sonn. Voy. p. 52. tab. 21. c)

Von der Größe der letzten. Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern rostigroth; der Scheitel weißlichgrau; der Hinterhals violett, mit grauem Glanze; der Vorderhals weiß; an der Brust ist ein blutrother Fleck, der in der Mitte am dunkelsten, und an den Rändern heller ist;

y) Uebers. VI. S. 289.
z) Latham Ind. orn. II. p. 611. n. 64. B.
a) Uebers. VI. S. 289. B.
b) Latham Ind. orn. II. p. 611. n. 65. B.
c) Uebers. von Büffons Vögeln VI. S. 298. B.

iſt; der Bauch iſt grau, mit einem röthlichen Anſtrich; über jedem Flügel laufen drey graue Queerbänder, und zwiſchen dieſen ſind zwey ſchwarze; die Schwungfedern ſind ſchwarz; der Schwanz iſt an der Wurzel grau, und am Ende ſchwarz; die Füße ſind röthlich violet.

Sie iſt in Manilla zu Hauſe.

57. Die blutrothe Turteltaube. (Sanguine T.)

Columba sanguinea. P. I. 2. p. 785. No. 65. *d*)
La Tourterelle blanche ensanglantée. Sonn. Voy. p. 51. tab. 20. *e*)

Sie hat die Größe einer gemeinen Turteltaube. Ihr Schnabel iſt roth; der Augenſtern röthlich purpurfarben; das ganze Geſicht weiß, den untern Theil des Halſes und der Bruſt ausgenommen, die blutroth ſind, eben ſo, wie bey der letztern, gleichſam als wenn ein Meſſer in dieſem Theile geſteckt, und das Blut die Federn beſudelt hätte; die Füße ſind roth.

Sie iſt auch in Manilla zu Hauſe.

58. Die Canadiſche Turteltaube. (Canada T.)

Columba canadensis. L. I. 2. p. 785. No. 30. *f*)
La Tourterelle de Canada. Briss. orn. I. p. 118. No. 21. — Buff. ois. II. p. 552. *g*) — Pl. enlum. 176.
Canada Turtle. Arrt. Zool. II. No. 190. *h*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Dieſe iſt etwas größer, als die gemeine Turteltaube, und dreyzehn Zoll lang. Ihr Schnabel iſt einen Zoll lang und ſchwärzlich; die obern Theile des Kopfs; des Halſes, des Rückens und der Flügel ſind graubraun; der Unterrücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes aſchfarben; Kehle, Vorderhals und Bruſt graubraun, mit einem gelblichen Anſtrich; die Seiten grünlich, Bauch und Schenkel ſchmutzigweiß; die untern Deckfedern des Schwanzes rein weiß; die Deckfedern der Flügel mit ſchwärzlichbraunen Flecken bezeichnet; die Schwungfedern braun, und die großen mit gelblichen äußern Rändern; der Schwanz ſechshalb Zoll lang und am Ende gleich, alle ſeine Federn aſchfarben, mit weißen Spitzen, die zwey mittlern ausgenommen, die einen großen gelbrothen Flecken, gegen die Wurzel hin, haben, unter dem ein anderer, ſchwärzlich brauner ſteht *i*); die Füße roth; die Klauen ſchwarz.

Beym

d) Latham Ind. orn. II. p. 611. n. 66. B.
e) Ueberſ. von Büffons Vögeln VI. S. 299. B.
f) Latham Ind. orn. II. p. 613. n. 72. Hier wird ſie von Latham mit mehrern Recht unter die langgeſchwänzten Tauben geſetzt. B.
g) Ueberſ. VI. S. 285. B.
h) Ueberſ. II. S. 306. n. 105. B.
i) Bey Pennant in der Arkt. Zool. und Latham im Ind. orn. iſt der Schwanz lang und keilförmig, die mittlern Federn ſind aſchgrau, beyde Seiten der äußern Federn weiß, auf der innern Seite aber noch ein rother und unter dieſem ein großer ſchwarzer Fleck. B.

Beym Weibchen haben die Federn des Kopfs, des Halſes, der Bruſt, des Oberrükkens, und die Deckfedern der Flügel, ſchmuzig weiße Spitzen, das dieſen Theilen ein geſtreiftes Anſehen giebt.

Sie iſt in Canada zu Hauſe.

59. Die Erd-Turteltaube. (Ground T.)

Columba passerina. L. l. 2 p 787. No. 34. k) — Scop. ann. I. p. 126. No. 183. l) — Jacquin's Beytr. p. 32. No. 26.
La petite Tourterelle d'Amerique. Briss. orn. I. p. 113. No. 19. pl. 9. f. 1.
Le Cocotzin. Buff. ois. II. p. 559. m)
La petite Touterelle de St. Domingue. Pl. enlum. 243. f. 1. (das Männchen).
— — de la Martinique Pl. enlum 243. f 2. (das Weibchen).
Turtur indicus, seu Cocotzin etc. Ray Syn. p. 61. 62. No. 4. 5. 6.
Indian Turtle, Cocotzin, or least Barbadoes Turtle. Will. orn. p. 184 pl. 36.
Ground Dove. Catesby Carol. I. pl. 26. (das Weibchen.) n) — Sloan. Jam. II. p. 305. No. 32. pl. 261. f. 1. — Brown. Jam. p. 469.
Ground Turtle. Arct. Zool. II. No. 191. o)
Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß iſt eine kleine Art, nicht viel größer, als die Haubenlerche, ſechs und ein Viertel Zoll lang. Ihr Schnabel iſt hellroth, mit einer ſchwärzlichen Spitze, und ſieben Linien lang; der Augenſtern orangenfarben; die obern Theile des Kopfs und des Halſes aſchfarben; der Rücken, der Steiß, und die obern Deckfedern des Schwanzes eben ſo, aber dunkler; die Stirn, die Kehle, der Vorderhals, die Bruſt, die Seiten, der Bauch und die untern Deckfedern des Schwanzes weinfarbig, mit braunen Flecken am Vorderhalſe und Bruſt, indem nämlich die Mitte jeder Feder dieſe letzte Farbe hat; einige Deckfedern der Flügel ſind dunkelaſchfarbig, einige weinfarbig, mit glänzend grünen Flecken; unten ſind ſie gelbroth; die Schwungfedern ſind ebenfalls gelbroth, an den äußern Rändern und an den Spitzen aber ſchwärzlich; die zwey mittlern Schwanzfedern dunkelaſchfarbig, die andern ſchwärzlich; die Füße roth; die Klauen ſchwärzlich.

Das Weibchen geht bloß darin vom Männchen ab, daß ſeine Farben allenthalben verwaſchener ſind (more dilute).

Sie ſind in den wärmern Ländern von Amerika und auf den angränzenden Inſeln zu Hauſe, vorzüglich zwiſchen den Wendezirkeln, ob ſie gleich zuweilen auch in Carolina angetroffen werden. Nach Wilughby ſind ſie in Mexiko ſehr gemein, wo ſie ſich in gebirgigen Gegenden aufhalten, und für eine delikate Speiſe gehalten werden. Bancroft p) ſagt, ſie ſeyen

k) Latham Ind. orn. II. p. 611. n. 67. M.
l) Ueberſ. von Günther S. 151. n. 183.
m) Ueberſ. S. 313. B.
n) Seligmanns Vögel II. Taf. 52. B.
o) Ueberſ. II. S. 306. Nr. 107. Vergl. auch meine N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 493. n. 6. B.
p) Hist. of Guiana.

seyn die einzigen Tauben, die man in Guiana anträfe. Auch in Jamaika sind sie gemein, wo sie, wie Sloane bemerkt, „auf dem Boden fressen, wie die Rebhühner, und eben so, wie „diese hüpfen, sie fliegen nämlich auf, und eine kleine Strecke weg, und lassen sich denn gleich „wieder auf den Boden nieder. Man trifft sehr oft eine Menge beysammen an: sie sind sehr „gut zu essen; sehr gemein auf allen Ebenen der Insel, und leben von Körnern und Gesäame „der Pflanzen." Man fängt sie in Clavanies, oder Fallen, die aus Schilfrohr gemacht, und mit dem Saamen des Wunderbaums, (Ricinus) beködert werden, der daselbst wilde Cassade genannt wird.

Diese q) Art ist sehr häufig auf den Karibäischen Inseln, wo sie eine gewöhnliche Speise auf jeder Tafel ist, und sehr geschätzt wird. Sie hält sich an steinigen Plätzen, unter dem Gebüsche auf. Die Franzosen nennen sie Ortolan; die Engländer, Erdtaube; die Holländer, Steintaube; und die Spanier, Palamito. Ihre Stimme ist täglich und schwach, dem Girren unsrer Turteltaube sehr ähnlich. Auf Carthagena, auf dem festen Lande von Amerika, giebt es einige Spielarten, die größer sind als die andern, einige wenige braune Flecken, und keinen geschupten (scalloped) Bauch haben; und andere, mit einem, auf andere Art geschupten, Bauche, als die gewöhnlichen. Sie pflanzen sich im zahmen Zustande fort, wie der Versuch zu Wien gemacht worden ist.

59. Var. A. Die Sperlings-Turteltaube. (Passerine T.)

Columba minuta. L. I. 2. p. 788. No. 35. r)
La petite Tourterelle brune d'Amerique. Briss. orn. I. p. 117. No. 20. pl. 8. f. 2.
Tlapalcocotli. Will. orn. p. 184.

Diese ist noch kleiner als die vorige, und nur sechshalb Zoll lang. Die obern Theile des Körpers sind braun; die untern mehr oder weniger gelbroth weiß; die Deckfedern der Flügel gelbrothbraun, mit sieben kleinen Flecken von polirter Stahlfarbe, deren drey an den kleinen, und vier an den größern stehn; die Schwungfedern sind wie bey der letztern Art; die zwey mittlern Schwanzfedern braun, die andern an der Wurzel aschfarben, dann schwarz, mit braunen Spitzen; außerdem sind noch an den zwey äußern, die äußern Fahnen, gegen die Spitzen hin, weiß; Füße und Schnabel braun.

Sie ist auf St. Domingo zu Hause, und wahrscheinlich eine Spielart von der letztern.

60. Die Malakkische Turteltaube. (Malacca T.)

Columba malaccensis. L. I. 2. p. 788. No. 68. s)
La petite Tourterelle de Quèda. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 177.

Die-

q) Zus. a. d. Suppl. S. 200. 208. Uebers.
r) Latham Ind orn. II. p. 612. Wird hier wie im Gmelinischen Natursystem als eine besondere Art aufgeführt. B.
s) Latham Ind. orn. II. p. 612. n. 69. B.

Diese ist etwas größer als ein Haussperling, und länger. Ihr Schnabel ist schwarz, an der Spitze und an der Wurzel mit Gelb überzogen; der Augenstern gelb; Stirn und Kehle sind licht aschgrau; der Hinterkopf eben so, und mit schwarzen Linien durchzogen; der Rücken, der Steiß und die kleinern Deckfedern der Flügel hellaschgrau, mit einem schwarzen Bande an der Spitze; die Seiten des Halses weiß und mit zahlreichen, schwarzen Linien durchzogen; Brust und Bauch hell weingrau, die Seiten des letztern mit wellenförmigen, schwarzen Linien gestreift; die Schwungfedern braun; die mittlern Schwanzfedern eben so, die andern nach zwey Dritttheile ihrer Länge braun, und von da an bis an das Ende weiß; die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes auch weiß; die Füße wie gelbes Operment.

Sie ist in Malakka zu Hause, und eine schöne Art, deren Fleisch sehr schmackhaft seyn soll. Man hat sie auf die Insel Frankreich versetzt, wo sie sich außerordentlich vermehrt hat.

61. (60. a. *) Die graue Taube. (Grey P.)

Columba corensis. L. l. 2. p. 783. No. 59. *u*)
— — — Jacquin's Beytr. p. 31. No. 25.

Sie hat die Größe der gemeinen Taube. Ihre Augen sind roth, und mit einer kahlen, schwarzgefleckten Haut umgeben; die Hauptfarbe des Vogels ist grau, die Federn am untern Theil des Halses schillern in verschiedenem Lichte, als wenn sie geschuppt (scalloped) wären, obschon sie in der That keine verschiedenen Farben haben; der Schwanz ist am Ende gleich.

Sie ist auf Coro, im Distrikt Venetzuela, in Südamerika zu Hause, und wird von den Einwohnern, wenn sie noch jung ist, als Speise geschätzt.

62. (60. b) Die purpurschulterige Taube. (Purple-shuldered P.) *x*).

Sie hat die Größe der gemeinen Taube. Ihr Schnabel ist stark, dunkelfarbig, mit blassen Rändern; Kopf und Hals olivengelb; die Stelle zwischen dem Halse und dem Rücken aschfarben; der Rücken und die Deckfedern hell purpurroth, die größern, und die kurzen Schwungfedern nach der Länge schwarz und weiß gestreift; die großen Schwungfedern schwarz, die äußern Ränder der drey ersten aber weiß; Brust und Bauch hell aschfarben; der untere Theil des Schwanzes olivengrün, das Ende dunkelfarbig; die Füße hell pomeranzengelb.

Sie ist in Indien zu Hause. Lady Impey. — Sie scheint sehr mit der Pompadurfarbenen Taube (s. oben No. 12) verwandt zu seyn.

63. (60. c.) Die Asiatische Taube. (Die Indische Taube. Indian P.) *y*)

Ihre Länge ist eilf Zoll. Der Schnabel ist an der Wurzel bläulich, gegen die Spitze hin

z) Diese, und die beyden folgenden (No. 60. b. und c.) sind in den Suppl. S. 201. 202. hinzugekommen. Uebers.

u) Latham Ind. orn. II. 605. n. 46. B.

x) Columba phoenicoptera Latham Ind. orn. II. p. 597 n. 13. B.

y) Latham Ind. orn. II. p. 597. n. 14. B.

weiß; der Kopf aſchfarben; der Hals hell gelblichgrün; der untere Theil des Halſes rings herum, die Mitte der Flügel nahe an der Schulter, und alle untern Theile weiß; der ganze äußere Flügelrand und die Schwungfedern ſind ſchwarz, mit weißlichen Rändern; der Körper oben, und der Schwanz grünlich aſchfarben, das Ende des Schwanzes dunkelfarbig; die Füße bläulich; die Klauen ſchwarz.

Sie iſt in in Indien zu Hauſe. Herr Middleton. — Unter den Gemälden des Herrn Wheeler, bemerke ich eine Taube von obiger Art, an welcher die Füße gelb ſind.

* * Mit langen Schwänzen.

64. (61.) Die Wandertaube. (Passenger P.)

Columba migratoria. L. l. 2. p. 789. No. 36. z) — Frisch tab. 142.
Le Pigeon sauvage d'Amerique. Briss. orn. I. p. 100. No. 12.
Pigeon de Passage. Buff. ois. II. p. 527. *a*)
Pigeon of Passage. Catesby Carol. I. pl. 23. *b*)
Migratory or Passenger Pigeon. Phil. Trancact. Vol. LXII. p. 398.
American migratory Pigeon. Kalm. Trav. Vol. II. p. 82. (die gegenüberſtehende Platte.) Arct. Zool. II. No. 187. *c*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Sie hat ohngefähr die Größe der gemeinen Taube, neun Unzen Gewicht, und vierzehn Zoll Länge. Ihr Schnabel iſt eilf Linien lang, und ſchwarz; die Augenkreiſe ſind karmoiſinroth; der Augenſtern orangefarben; der Kopf, die Kehle, der Hinterhals, der Rücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes aſchgrau; die Deckfedern der Flügel eben ſo, aber mit einigen ſchwarzen Flecken bezeichnet; die Seiten des Halſes glänzend, ſchillernd purpurfarben; Vorderhals und Bruſt weinfarbig; der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes eben ſo, aber heller; die Schwungfedern ſchwarzbraun, mit weißlichen Rändern; der Schwanz ſehr lang, ſeine zwey mittlern Federn ſchwärzlichbraun, die übrigen ſchimmelgrau; die Füße roth; die Klauen ſchwarz.

Dieſer Vogel iſt in Nordamerika, beſonders aber zwiſchen dem 20ſten und 60ſten Grad der Breite, zu Hauſe, bringt den Sommer in den nördlichen Gegenden zu, und zieht, bey Annäherung des Winters, in die mehr gegen Süden gelegenen Provinzen zurück. Auf Fort Mooſe und am Severnfluß wird er Waldtaube genannt. Sie niſten auf Bäume, legen zwey Eyer, gleich andern Tauben, und werden für ein gutes Gericht gehalten. Man kann ſich kaum eine Vorſtellung von den ungeheuren Flügen machen, in denen man ſie von einer Gegend nach der andern ziehen ſieht; oft in zwey Meilen langen, und eine Viertels Meile breiten Schaaren (strings); und wenn ſie über einen Ort wegziehen, ſo verdunkeln ſie die Luft. Sehr oft laſſen ſie ſich auf Bäume nieder, und zuweilen in ſo ungeheurer Anzahl, daß die ſtärkſten Zweige abbrechen. Das Volk in Philadelphia ſchießt ſie von den Gipfeln der Häuſer herunter, und in Neu-

z) Latham Ind. orn. II. p. 612. n. 70. B.
a) Ueberſ. VI. S. 225. B.
b) Seligmanns Vögel I. Taf. 46. B.
c) Ueberſ. II. S. 300. Nr. 103. B.

Neuengland werden ſie des Abends in großer Zahl von ihren Ruheplätzen (roosts) herabgeſchlagen; was auch gar nicht ſchwer iſt, da ſie um dieſe Zeit entweder ſehr zahm, oder ſehr ermattet ſind *d*); und das gemeine Volk nährt ſich zur Wanderzeit (flighttime) hauptſächlich von ihnen.

Das vornehmſte Futter dieſer Art ſind Eckern (acorns) und Eicheln (mavt) aller Art; ſie verheeren aber auch zuweilen Korn und Reis, wenn ſie ihnen in dem Weg ſtehen *e*).

65. (62.) Die Caroliniſche Turteltaube. (Carolina T.)

Columba carolinensis. L. I 2. p. 789 No. 36. *f*)
La Tourterelle de la Caroline. Briss. orn. I. p. 110. No. 18. pl. 8. f. 1. — Pl enlum. 175. (das Weibchen?)
La Tourte. Buff. ois. II p. 557. *g*)
Turtle of Carolina. Catesby Carol I. pl. 24. *b*)
Carolina Pigeon. Arct. Zool. II. No. 188. *i*)

Sie iſt etwas größer, als unſre gemeine Turteltaube, und eilfthalb Zoll lang. Ihr Schnabel iſt acht Linien lang, und ſchwärzlich; die Augen ſind mit einer kahlen, blauen Haut umgeben; der Augenſtern iſt ſchwarz; Stirn, Vorderhals und Bruſt ſpielen ins Röthliche, und die letzte hat einen goldgrünen und violetten Glanz; Hinterkopf und Hals ſind bräunlichaſchfarben; der Rücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes und der Flügel, die zunächſt am Körper ſtehn, eben ſo, aber unregelmäſſig mit Gelbroth melirt, die übrigen Deckfedern der Flügel aſchbraun; der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes ſpielen ins Gelbrothe; an jedem Flügel, an den Spitzen der großen Deckfedern, ſind einige ſchwarze Flecken; die Schwungfedern ſind ſchwärzlich-aſchfarben, mit weißlichen Rändern; die Schwanzfedern ſind ungleich, die zwey mittlern fünfthalb Zoll lang, die äußern ſehr kurz, die

d) In Louiſiana hat man auch noch eine andere Art ſie zu fangen. Eine Geſellſchaft von ſechs oder ſieben Perſonen geht des Abends in den Wald, und nimmt verſchiedene Schüſſeln oder andere flache Gefäße mit ſich, auf welchen ſie Schwefel anzünden, unter ſolchen Bäumen, auf denen dieſe Vögel am liebſten ruhen. Dieſer Geruch betäubt ſie ſo, daß ſie zur Erde fallen müſſen; wo man denn nichts weiter zu thun hat, als die Säcke zu füllen, die man zu dieſer Abſicht mitbringt. Bey einem ſolchen Spaziergange leiſten wohl auch oft Frauenzimmer Geſellſchaft, die dies für eine angenehme Abendbeluſtigung halten. — Hist. des Ois

e) In Lathams Ind. orn. I. c. 8. wird eine Varietät angegeben, von welcher er folgende Beſchreibung giebt: Der Oberleib iſt bräunlich; der Unterleib gelbröthlich weiß; der Vorderhals etwas weinfarbig; die vordern Schwungfedern ſind dunkelbraun, äußerlich an der Spitze gelbröthlich gerändet, und mit kaſtanienbraunen Schäften; die zwey mittlern Federn des keilförmigen Schwanzes ſind dunkelbraun, die Seitenfedern aſchgrau, gegen die Wurzel zu inwendig mit einem zugerundeten ſchwarzen Fleck verſehen, die äußerſte äußerlich und an der Spitze, die zweyte nur an der Spitze weißlich, unten alle Seitenfedern von der Wurzel bis zur Mitte auf der innern Fahne ſchwarz und der übrige Theil aſchgrau.

Latham ſagt: Es iſt vielleicht eine Spielart der Wandertaube; mit der ſie Aufenthalt und Größe gemein hat. B.

f) Latham Ind. orn. II p. 613. n. 71. B.

g) Ueberſ. VI. S. 307 B.

h) Seligmanns Vögel. I. Taf. 48. B.

i) Ueberſ. II. S. 304. B.

zwey mittlern gänzlich aschbraun, die zwey nächsten auf jeder Seite aschfarben, am Ende weißlich, mit einem schwarzen Flecken zwischen diesen beyden Farben, auf der untern Fläche sind die zwey mittlern eben so, wie auf der obern, die zwey nächsten auf jeder Seite an der hintern Hälfte schwarz, und an der Endhälfte aschfarben, die übrigen eben so, die Endhälfte aber weiß; die Füße roth; die Klauen schwarz.

Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch den Mangel der violetten, glänzenden Farbe an der Brust.

Sie sind in Carolina, Brasilien, St. Domingo und andern Orten zu Hause. In Carolina trifft man sie das ganze Jahr hindurch an, und sie brüten also natürlich daselbst.

66. (63.) Die gerändete Turteltaube. (Marginated T.)

Columba marginata. L. I. 2. p. 791. No. 10. k)
La Tourterelle d'Amerique. Briss. orn. I. p. 101. No. 13. — Buff. ois. II. p. 552. l)
Long-tailed Dove. Edw. pl, 15. m)

Ihre Größe ist wie bey der gemeinen Turteltaube, und ihre Länge eilf Zoll. Der Schnabel ist hornfarben, an der Spitze am dunkelsten, und acht Linien lang; der Augenstern matt gelbroth; von den Mundwinkeln nach den Augen hin läuft ein weißer Streifen; der vordere Theil des Kopfs und die Kehle sind gelbrothbraun; der Hinterkopf bläulich aschfarben; zwischen diesen zwey Farben unter den Ohren ist ein schwarzer Fleck, so groß als eine Zähre; der Hinterhals, der Rücken, die Schulterfedern und die Deckfedern der Flügel mattbraun; die Schulterfedern aber, und die größern zunächst am Körper stehenden Deckfedern sind mit eyrunden, schwarzen Flecken, von verschiedener Größe bezeichnet; der Unterrücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes spielen ins aschfarbene; Vorderhals und Brust sind rosenfarben, das stufenweise, so wie es sich den Seiten nähert, heller wird; der Bauch, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes braun, mit Aschfarbe melirt; die Schwungfedern dunkelbraun, mit gelbrothen, äußern Rändern; die Schwanzfedern von ungleicher Länge, die zwey mittlern schwärzlich, die andern aschfarben, mit weißen Spitzen n), zwischen diesen zwey Farben ist ein schwarzes Band; die Füße sind roth; die Klauen schwarz o).

Sie ist in Amerika zu Hause. Diejenige, von der Edwards seine Beschreibung nahm, kam aus Westindien.

67. (64.) Die Amboinische Turteltaube. (Amboina T.)

Columba amboinensis. L. I. 2. p. 790. No. 38. p)
La Tourterelle d'Amboine. Briss. orn. I. p. 127. No. 26. pl. 9. f. 3. — Buff. ois. II. p. 557. q)

Sie

k) Latham Ind. orn. II. p. 614. n. 73. B.
l) Uebers. VI. S. 286. B.
m) Seligmanns Vögel I. Taf. 29. B.
n) Linné.
o) Latham hält diese und die Carolinische Taube für einerley Art. B.
p) Latham Ind. orn. II. p. 614. n. 74.
q) Uebers. VI. S. 303. 4.

Sie kommt der gemeinen Turteltaube an Größe gleich, und ihre Länge ist vierzehn Zoll, wovon der Schwanz allein acht beträgt. Ihr Schnabel ist zehn Linien lang, und roth; der Kopf, der Hals, die Brust, der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes sind gelbroth; von den Federn am Scheitel, am Halse und an der Brust, hat jede an der Spitze ein schwärzliches Querband; der Oberrücken und die Deckfedern der Flügel sind dunkelbraun, mit gelbrothen Spitzen; der Unterrücken, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes gelbroth; die Schwungfedern dunkelbraun; der Schwanz sehr ungleich, indem die äußern Federn sehr kurz, und durchaus von gelbrothbrauner Farbe sind; die Füße sind roth; die Klauen braun.

Das Weibchen hat so ziemlich die nämliche Farbe, aber nicht so lebhaft, als das Männchen.

Sie sind auf der Insel Amboina zu Hause.

68. (65.) Die Capsche Turteltaube. (Cape T.)

Columba capensis. L. l. 2. p. 790. No. 39. r)
La Tourterelle du Cap de bonne Esperance. Briss. orn. I. p. 120. No. 22. pl 9 f. (das Männchen.)
La Tourtelette. Buff. ois. II. p. 554. s)
La Tourterelle á cravate du Cap de bonne Esperance. Pl. enlum. 140. (das Männchen.)

Lev. Mus.

Dieß ist eine sehr kleine Art am Körper nicht größer, als eine Feldlerche, inzwischen ist ihre Länge doch zehnthalb Zoll, wovon aber der Schwanz allein fünf und ein Viertel mißt. Ihr Schnabel ist roth, und sieben Linien lang; Kehle und Vorderhals sind sehr schön schwarz t); der übrige Kopf, der Hals, die Brust, der Rücken, der Steiß und die obern Deckfedern der Flügel und des Schwanzes graubraun; die größern Deckfedern der Flügel haben schwarze Spitzen; der Bauch, die Seiten, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes sind schmutzigweiß; an jedem Flügel ist ein lebhafter Fleck, gleich politirtem Stahl; die großen Schwungfedern sind inwendig gelbroth, und an den äußern Fahnen und Spitzen braun, die kürzern braun, mit grauen, äußern Rändern; der Schwanz ist sehr ungleich, indem seine äußerste Feder sehr kurz ist, die zwey mittlern sind schwärzlichbraun, mit gelbrothem Anstrich, und die Seitenfedern an den Wurzeln graubraun, und an den Enden schwärzlich, auf der untern Fläche sind sie alle schwarz, die äußerste ausgenommen, die an der Außenseite und an der Spitze weiß ist; die Füße sind roth; und die Klauen braun.

Das Weibchen unterscheidet sich dadurch, daß bey ihm Kehle und Vorderhals von einerley Farbe mit dem übrigen Kopfe sind, und die größern Deckfedern der Flügel keine schwarze Spitzen haben.

Die-

r) Latham Ind. orn. II. p. 614. n. 75. B.
s) Uebers., VI. S. 293. B.
t) In den Pl. enlum. sind auch Scheitel und Stirn schwarz.

Dieſer Vogel findet ſich in Afrika. Man hat ihn vom Vorgebirge der guten Hoffnung und aus Senegal gebracht, und ohne Zweifel iſt er in allen ſüdlichen Ländern dieſes Viertels der Erdkugel zu Hauſe.

Ich habe verſchiedene Spielarten von dieſer Art bemerkt; bey einigen iſt die Stirn ſchwarz, bey andern nicht; die eine hat einen weißen Streifen queer über den Kopf, und an jeder Seite des Halſes herab; einen weißen Streifen queer über den Steiß, und die Flecken an den Flügeln ſind blaugrün, ſtatt ſchwarz, und bey einem andern Exemplar war ein ſehr hell aſchfarbner halber Mond an der Bruſt, und die Schläfe (ſides) unter den Augen waren aſchgrau und ſchwarz geſprenkelt.

69. (66.) Die langſchwänzige Turteltaube. (Great-tailed T.)

Columba macroura. L. l. 2. p. 790. No. 71. *u*)
Le Tourocco. Buff. ois. II. p 353 *v*)
La Tourterelle à large queue du Senegal. Pl. enlum. 329.

Ihre Länge iſt zwölf Zoll. Der Schnabel iſt roth, und ſeine Wurzel mit einer weißen Wachshaut bedeckt; der Kopf, der Hals und die obern Theile des Körpers ſind röthlich zimmetfarben; Bruſt, Bauch und Schenkel ſchmutzig weiß; der Schwanz ſehr lang, denn er nimmt die Hälfte der Körperlänge ein; er iſt keilförmig und an der Spitze weiß; die Füße ſind roth.

Sie bewohnt Senegal und ſoll den Schwanz eben ſo tragen, wie der gekrönte Hocko *w*).

Zuſätze.

70. Die Bantamſche Taube.

Columba bantamensis. Carls. Mus. III. No. 67.
— — Latham. Ind. orn. II. p. 615. No. 77.

An Größe gleicht ſie dem gemeinen Wendehals, und iſt 7 Zoll lang; der Schnabel iſt grade, der Oberkiefer länger, und an der Spitze etwas gebogen, die Farbe ſchwarz, an den Seiten grünlichweiß; die länglichen Naſenlöcher ſtehen in der Mitte des Schnabels; die Zunge iſt ganz; der Augenkreiß nackt und fleiſchfarben; Stirn, Wangen und Kehle ſind weißgrau; Scheitel und Nacken aſchgrau; Hals, Bruſt, Weichen und Bauch weiß, ſchwarz bandirt, weil jede weiße Feder drey ſchwarze Bänder hat; Rücken, Deckfedern der Flügel und Steiß aſchgrau mit ſchwarzen Queerbinden, weil die Federn aſchgrau und an den Spitzen ſchwarz ſind; der After weiß; von den neun vordern Schwungfedern iſt die zweyte bis zur fünften gleich, die erſte aber länger und die übrigen nach und nach kürzer, der hintern Schwungfedern ſind zehn, ſie ſind alle

u) Latham Ind. orn. II. p. 615. n. 76.
v) Ueberſ. VI. S. 292. B.
w) Crested Carassow. Crax Alector L. S. 59ſte Gatt. Nr. 1. Ueberſ.

le schwarz, am vordern Rande schmal aschgrau gerändet, die vordern inwendig an der Wurzel rostfarbig; die Unterflügel rostfarbig; der Schwanz hat die Länge des Körpers und ist keilförmig; er besteht aus vierzehn Federn, die sechs mittlern sind schwarz und die übrigen acht gegen die Spitze zu weiß; die Füße haben halbe Schwanzlänge und sind roth.

Sie ist auf der Insel Java zu Hause, und ist bey Banta sehr gemein, wo sie in den Palmwäldern mit ihren melancholischen Liedern die Einwohner erfreut.

71. Die schwarzflügelige Taube.

Columba melanoptera. Molin. hist. natur. Chil. p. 300. — Id. (ed. Gall.) p. 215.
— — — L. I. 2. p. 790. No. 70.

Der Schwanz keilförmig; der Körper himmelblaulich und die Schwungfedern sind schwarz.

Sie wohnt in Chili.

72. Die Turteltaube von St. Domingo.

Tourterelle de St. Domingue. Pl. enlum. 487.
Columba dominicensis. Latham. Ind. orn. II. p. 615. No. 79.

Sie ist eilf Zoll lang. Der Schnabel ist schwarz; die Füße sind roth; der Oberleib aschgrau, der Rücken etwas gewölbt; die Flügel haben schwarze Flecken; die Brust ist weinfarbig; Stirn, Kehle und Seiten des Kopfs und von da ein Halsband hinter dem Nacken weg, weiß; ein Fleck auf dem Scheitel, und eine Binde von den Nasenlöchern an, unter den Augen weg, die sich hinten erweitert, und ein Halsband an der Mitte des Halses schwarz; der After weiß; der Schwanz keilförmig, grau, die äußersten Federn weiß.

Sie wohnt auf der Insel St. Domingo.

Hieher gehören auch noch folgende Tauben mit mittelmäßigen Schwänzen.

73. Die Taube von Tanna.

Columba tannensis. Latham Ind. orn. II. p. 600. No. 26.

Sie ist eilf Zoll lang; der Schnabel mäßig gekrümmt (vergl. Nr. 23.); die Füße sind roth; die Hauptfarbe grün; die Deckfedern der Flügel weiß gefleckt; die hintern Schwungfedern an der Spitze mit einem gelben Rand.

Sie wohnt auf der Insel Tanna, und es ist noch nicht außer Zweifel, ob sie nicht eine Spielart von der haakenschnäbligen Taube Nr. 23. ausmacht.

74. Die braune Taube.

Columba brunnea. Latham. Ind. orn. II. p. 603. No. 38.

Der Schnabel und die Füße ſind fleiſchfarben; der Scheitel, Oberhals, Rücken und die Deckfedern der Flügel braun; die Bruſt, der Unterhals und Steiß glänzend grün.

Sie iſt in Neu-Seeland zu Hauſe.

75. Die goldflügelige Taube.

Columba chalcoptera. Latham Ind. orn. II. p. 605. No. 39.
Bronze-winged Pigeon. Phillip. p. 162.
Golden-winged Pigeon. White Voy. to new South Wales. t. p. 146.

Sie hat die Größe der Holztaube. Schnabel und Füße ſind hellroth; Stirn und Zügel weiß; die Kehle grauweiß; der Oberleib aſchgraubraun, der Unterleib aſchgraulich, alle Federn am Rande gelbroth; die kleinen Deckfedern der Flügel dunkelbraun, mit eyrunden einzelnen kupfergoldglänzenden Flecken, die übrigen an der Spitze mit einem ſolchen eyrunden Fleck, woher eine geſpaltene Queerbinde entſteht; die Schwungfedern dunkelbraun, unten gelbroth; die zwey mittlern Schwanzfedern dunkelbraun, die übrigen blaß bleyfarben und an der Spitze eine ſchwarze Binde.

Sie bewohnt die Norfolkinſel, Neuſüdwales und Port-Jackſon.

76. Die Aegyptiſche Taube.

Columba aegyptiaca. Latham Ind. orn. II. p. 607. No. 49.
— — Forsk. Faun. arab. p. 5. No. 15.

Der Schnabel iſt ſchwarz; der Kopf violetfleiſchfarben; die Augenkreiſe nackt und blaulich; die Kehle hat ſchwarze keilförmige Federn, die an der Spitze in zwey linienförmige Lappen getheilt ſind, auseinander ſtehen, abgeſtutzt und faſt ganz fleiſchrothroſtfarben ſind; der Rücken iſt aſchgrau; die Bruſt violetfleiſchroth; der Bauch weißlich, ſo wie die Hüften; ein großer Theil der Flügel dunkelbraun; die zwey äußerſten Schwanzfedern an der Wurzel aſchgrau, in der Mitte ſchwarz, übrigens weiß, die beyden folgenden an der Wurzel aſchgrau, in der Mitte ſchwarz, übrigens aſchgrau, doch an der Spitze weißlich; die fünfte auf beyden Seiten vom Rand an gerechnet, dunkelbraun, in der Mitte undeutlich ſchwarz, die zwey mittlern endlich ganz dunkelbraun; die Füße fleiſchroth.

Sie wohnt in Aegypten, und hält ſich häufig bey den Häuſern auf.

77. Die Waalia-Taube.

Columba Waalia. Gmelin. Anhang zu Bruce Reisen. p. 31.
Waalia. Bruce Volkmanns Uebers. Th. 5. p. 188. No. 8. Pl. 38.
— Meyers Zool. Entdeck. S. 128.

Die

Die Waalia-Taube, iſt kleiner als die gemeine Taube, aber größer als eine Turtelkaube. Der ganze Rücken, und einige von den kurzen Flügelfedern, ſind von einem ſchönen, nicht glänzenden Grün, heller und lebhafter als Olivengrün; Hals und Kopf ſind noch dunkler und noch weniger glänzend; der Schnabel iſt blaulich weiß, mit großen Naſenlöchern; das Auge ſchwarz, mit einem dunkel pomeranzenfarbnen Stern; die äußerſte Flügelſpitze iſt ſchön Pompadour, die großen Schwungfedern ſind ſchwarz, die äußere Kante des Flügels iſt dicht mit Weiß gezeichnet; der Schwanz iſt blaß und ſchmuzig blau, unter dem Schwanze ſind braune Flecken; der Bauch iſt lebhaft gelb; die Schenkel ſind weiß, mit kleinen braunen Flecken; Beine und Füße ſind gelblich braun; der Fuß iſt ſtärker als ein gewöhnlicher Taubenfuß.

Bruce ſchoß dieſe Taube in Abyſſinien auf dem Wege nach Tſcherkin.

Uebrigens lebt die Waalia-Taube in den niedrigen Gegenden von Abyſſinien, wo ſie ſich auf die höchſten Bäume ſetzt, und während der Hitze am Tage ruhig ſitzen bleibt, ſo daß man ſie ſchwerlich entdeckt, wenn man ſie nicht niederfallen ſieht. Sie ſteigt ebenfalls ſehr hoch, in großen Schaaren und liebt vorzüglich eine Art Buche, von deren Früchten ſie ſich beſonders nährt. In den bergigen Gegenden Abyſſiniens trifft man ſie ſelten an, es müßte denn auf ihrem Striche ſeyn, weil ſie zu Anfang der Regenzeit in der Kolla gegen Süden und Südweſten gehn. In dieſer Richtung ſieht man ſie einige Tage lang. Vermuthlich iſt ihnen, ſelbſt in der ſchönen Jahrszeit, das Hochland zu kalt, deßwegen ſuchen ſie einen wärmern, weniger regenhaften Aufenthalt gegen das Atlantiſche Meer zu.

Gewöhnlich ſitzen ſie auf den Bäumen zu hoch, als daß das Abyſſiniſche Pulver ſie erreichen könnte, aber ſie ſitzen ſo dichte beyſammen, daß oft ſechſe auf einen Schuß fallen, und weil viele überdem, ſich beym Knall herunterſtürzen, ſo kann ein fertiger Schütze viele von ihnen treffen. Nur muß man ſchnell ſeyn, denn ſie erheben ſich bald wieder, und fallen, ſo weit man ſehen kann, nicht von neuem nieder, ſobald ſie nicht verwundet ſind. Sie ſind ungemein fett und bey weiten die beſten von allen Tauben. Bruce ſahe, daß ſich ihr Fleiſch auf jeder Seite des Bruſtknochens, von der Erſchütterung trennte, wenn ſie todt von der Höhe auf den Rücken herabfielen. Das Fett am Leibe war, durch dieſe Erſchütterung, ſo gequetſcht und breyartig, als das Innere einer Pomeranze.

Die Abyſſinier eſſen dieſe Taube nicht, aus Furcht ſich zu verunreinigen und rühren eine todte ſo wenig als ein todtes Pferd an. B.

Fünfte Ordnung. Hausvögel.

Sieben und vierzigſte Gattung. Pfau.

Der Schnabel iſt bey den Vögeln dieſer Gattung ſtark, erhaben und etwas gekrümmt. Die Naſenlöcher ſind groß. Der Kopf klein und mit einem Federbuſch geziert. An den Füßen ſind Sporen. Die obern Deckfedern des Schwanzes ſind ſehr lang, breit, können ausgebreitet werden (expanſible), beſtehen aus verſchiedenen Reihen (ranges), und ſind an ihrer Spitze mit ſchönen augenförmigen Flecken geziert.

1. Der gemeine Pfau. (Crested Peacock.)

Pavo cristatus. L. l. 2. p. 729. No. 1. *a*) — Faun. Suec. No. 197. — Scop. ann. I. No. 162. *b*) — Bäünn. orn. p. 58. — Frisch tab. 118. — Kram elench. p. 355.
Le Paon. Briss. orn. I. p. 281. pl. 27.
— Buff. ois. II. p. 288. pl. 10. *c*)
— Pl. enlum. 433. (das Männchen.)
— — 434. (das Weibchen.)
Peacock. Ray Syn. p. 51. A. 2. — p. 184. No. 18. — Will. orn. p. 158. pl. 27. — Sloal. Jam. p. 302. No. 23. — Brown. Jam. p. 470. *d*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Er hat die Größe eines mittelmäßigen Truthahns, und ſeine Länge von der Schnabelſpitze bis ans Ende des Schwanzes, iſt drey Fuß, acht Zoll. Sein Schnabel iſt beynahe zwey Zoll lang, und braun; der Augenſtern gelb; am Scheitel iſt eine Art von Federbuſch, der aus vier und zwanzig Federn beſteht, die faſt ohne Fahnen ſind, außer an den Enden, wo ſie goldgrün glänzen; über die Augen läuft ein weißer Streifen, und unter denſelben ein anderer; Rücken und Steiß ſind goldgrün, mit Kupferglanze, und die Federn ſo regelmäßig, daß ſie über einander liegen, wie Schaalen; über dem Schwanze entſteht eine unvergleichliche Reihe von langen, ſchönen Federn, deren jede am Ende mit einem bunten Auge geziert iſt, dieſe Federn reichen beträchtlich weit über den Schwanz hinaus, und bey vielen Vögeln meſſen die längſten fünfthalb

a) Latham Ind. orn. II. p. 616. n. 1. B.
b) Ueberſ. von Günther. S. 130. Nr. 162. B.
c) Ueberſ. V S. 144. B.
d) Vergl. auch Meyers Thierbuch II. Taf. I. S. 1. Meine N. G. Deutſchlands III. S. 392. Nr. 1. N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 45. 7. Nr. 1. B.

halb Fuß. Dieſer prächtige Schweif (train), oder Schwanz, wie er fälſchlich genannt wird, kann nach der Willkühr des Vogels ganz perpendikulär aufgerichtet werden. Der wahre Schwanz iſt unter dieſer Federngruppe verſteckt, und beſteht aus achtzehn graubraunen, anderthalb Fuß langen, und an den Seiten gelbröthlichgrau bezeichneten Federn; die Schulterfedern und die kleinern Deckfedern der Flügel ſind röthlich milchrahmfarben, mit ſchwarz melirt; die mittlern Deckfedern dunkelblau, mit goldgrünem Glanze, die größten und die Afterflügel gelbroth; die Schwungfedern auch gelbroth, einige davon gelbroth, ſchwärzlich und grün geſchäckt; Bauch und After grünlich ſchwarz; die Schenkel gelblich; die Füße ſtark, beym Männchen mit einem ſtarken, drey Viertel Zoll langen Sporn verſehen, und graubraun von Farbe.

Das Weibchen iſt etwas kleiner. Der Schweif iſt ſehr kurz, viel kürzer als der Schwanz, kaum länger als ſeine Deckfedern, und ſeine Federn ohne Augen; der Federbuſch auf dem Kopfe iſt der nämliche; die Seiten des Kopfs haben mehr Weißes; Kehle und Hals ſind grün; der übrige Körper und die Flügel aſchbraun; die Bruſt weiß eingefaßt; der Schnabel der nämliche; der Augenſtern bleyfarben; die Füße wie beym Männchen, doch fehlt ihnen gewöhnlich der Sporn, wiewohl man bey einigen eine Spur deſſelben ſieht. Bey einigen Pfauhähnen ſind die ganzen Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern ſchön dunkel blaugrün, ſehr glänzend; der äußere Rand der Flügel und Schwungfedern aber hat die gewöhnliche Farbe.

Dieſer Vogel, der jetzt ſo gemein iſt in Europa, iſt ein Morgenländiſcher, und war die Bewunderung aller Zeitalter, von Salomons Zeiten an [e]), bis auf die gegenwärtige.

Man findet ihn wild in vielen Ländern von Afrika und Aſien [f]); nirgends aber ſo groß und ſo ſchön, als in Indien, in der Nachbarſchaft des Ganges, von wo aus ſie ſich nach und nach in alle Länder verbreitet haben, und in den wärmern Himmelsſtrichen als wilde Vögel ſich vermehren [g]); in kältern Gegenden aber einiger Sorgfalt bedürfen. Bey uns kommt dieſer Vogel nicht vor dem dritten Jahr zu ſeinem vollkommenen Gefieder. Das Weibchen legt fünf bis ſechs grünlichweiße Eyer [h]), ſo groß wie Truthühner-Eyer [i]). Dieſe legt es, wenn man es allein gehn läßt, an einen geheimen Ort, etwas von ſeinem gewöhnlichen Aufenthalt entfernt, um zu verhüten, daß ſie das Männchen nicht zerbricht, welches es gern thut, wenn es dieſelben findet. Die Zeit des Bebrütens iſt ſieben und zwanzig bis dreyßig Tage. Die Jungen kann man mit geronnener Milch, gehacktem Lauch, feucht gemachtem Gerſtenmehl u. d. gl. füttern; ſie lieben auch Heuſchrecken und einige andre Inſekten. Nach fünf oder ſechs Monaten freſſen ſie, wie die Alten, Waizen oder Gerſte, nebſt allem, was ſie ſonſt noch in dem Umfang ihres Aufenthaltes auftreiben. Zum Aufſitzen bey der Nacht, ſcheinen ſie die aller höchſten Plätze vor-

e) Alle drey Jahre Einmal kamen die Schiffe von Tarſchiſch, und brachten Gold und Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen.“ 2. Chron. IX. 21.

f) In China iſt er nicht einheimiſch. Hist. des Ois.

g) Man findet ſie wild auf St. Helena, auch auf Barbuda und andern weſtindiſchen Inſeln.

h) In heißen Himmelsſtrichen bis zwanzig.

i) Sie legt bey uns in Thüringen 8 bis 12 Eyer, die braungelb ſind mit dunklern ſchmutzigen Flecken und Punkten, die ſich beſonders am dickern Ende häufiger befinden. Doch legen auch einige ſtrohgelbe oder gar weißliche Eyer mit dergleichen Flecken und Punkten. B.

vorzuziehen, z. B. hohe Bäume, die Gipfel der Häuſer u. d. gl. Ihr Geſchrey iſt laut, unangenehm, und ſteht in einen großen Contraſt mit ihrer äußerlichen Schönheit. In Indien fängt man ſie, indem man Lichter an die Bäume trägt, auf denen ſie ſitzen, und ihnen zugleich gemalte Abbildungen von ihrem Geſchlechte vorhält. So bald ſie hier den Hals ausſtrecken, um die Figur zu beſchauen, ſo wirft ihnen der Jäger eine Schlinge über den Kopf, und iſt dadurch ſeines Fangs gewiß [k]). Faſt zu allen Zeiten hat man ſie für eine vortreffliche Speiſe gehalten. Hortenſius gab das erſte Beyſpiel in Rom, wo dieſe Speiſe bis zur höchſten Schwelgerey getrieben, und theuer bezahlt wurde [l]), und ein junges Pfauhuhn wird heut zu Tage noch für einen Leckerbiſſen gehalten. Das Lebensalter dieſes Vogels wird von einigen auf fünf und zwanzig, von andern auf hundert Jahre geſchätzt [m]).

1. Var. A. Der bunte Pfau. (Variegated P.)

Pavo cristatus. L. I. 2. p. 729. No. 1. β. [n])
Le Paon panaché. Briss. orn. I. p. 280. — Buff. ois. II. p. 327. [o]) — Frisch tab. 110.

Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß iſt nichts anders, als eine Baſtardbrut, von dem gemeinen und weißen (1. Var. B.) Pfau, und man kann ihn gewöhnlich in allen Spielarten und Abſtufungen der Farben zwiſchen dieſen beyden Vögeln ſehen [p]).

1. Var. B. Der weiße Pfau. (White P.)

Pavo cristatus. L. I. 2. p. 729. No. 1. γ. [q])
Le Paon blanc. Briss. orn. I. p. 288.
— — Buff. ois. II. p. 323. [r]) — Ray Syn. p. 51. A. 2. — Frisch tab. 120.

Lev. Mus.

Die-

k) Tavernier's Trav. vol. III. p. 57. — Die Bergbewohner an beyden Seiten des Ganges fangen ſie mit einem Vogelleim, der aus dem milchigen Safte zweyer Arten von Bäume (Ficus indica und religiosa Linn.) bereitet, und mit Oel zu einer gewiſſen Dicke gekocht wird, bis er ſo zähe iſt, daß er ſie, oder auch wohl die gröſten Vögel feſt halten kann. Phisosoph. Transact. vol. LXXI. p. 376.

l) Sie müſſen demohngeachtet in Menge vorhanden geweſen ſeyn, oder der Kaiſer Vitellius konnte nicht genug von ihnen bekommen, zu ſeiner großen Schüſſel, die der Schild der Minerva, genannt wurde, und, wie die Geſchichte lehrt, mit aus den Lebern der Seebraſſen (Scari), Flamantzungen, und Faſanen, und Pfauenhirn beſtand.

m) Willughby.

n) Latham Ind. l. c. β.

o) Ueberſ. V. S. 200. B.

p) Er fällt nicht bloß von dieſen beyden Varietäten aus, ſondern auch von dem gemeinen allein. Ich habe auch einmal eine ſchön hierher gehörige Spielart geſehen, an welcher Flügel und Schwanz weiß, die übrige Farbe aber wie gewöhnlich, nur etwas lichter war. Wenn man einen weißen und gemeinen Pfau zuſammenpaart, ſo kann man es ſchon an den Eyern ſehen, aus welchen bunte Pfauen kommen; denn ſie ſind heller als die übrigen. B.

q) Latham Ind. orn. l. c. γ.

r) Ueberſ. V. S. 195. B.

Eine Hahnfederige Pfauhenne.

Dieſer iſt ganz weiß, ſelbſt die Augen am Schweife nicht ausgenommen; doch können dieſe durch verſchiedene wellenförmige Schattirungen (undulation of ſhade) an den Federn bemerkt werden, ob ſie gleich bey einem flüchtigen Blick von der nämlichen, rein weißen Farbe ſind. Ich glaube dieſe Spielart iſt in England gemeiner, als ſonſt irgendwo.

Ich kann dieſe Abhandlung nicht ſchließen, ohne vorher eines Umſtandes zu erwähnen, der hier und da bey den Pfauhennen vorkommt, daß ſie nämlich die äußeren Zeichen des Gefieders der Hähne haben. Es ſind mir zwey Exemplare hiervon vorgekommen, eines, bey einem meiner Freunde in dieſer Gegend, und das andere iſt jetzt noch im Leverſchen Muſeum zu ſehen.

(Siehe die ein und ſechzigſte Kupfertafel).

Dieſer letzte, prächtige Vogel gehörte der Lady Tynte, und hat vor einigen Jahren gebrütet, nachdem er aber aufgehört hatte Eyer zu legen, fieng er an die Augenfedern des Hahnes zu verlieren, und um die Zeit ſeines Todes glich er einem jungen Hahne.

2. Der Japaniſche Pfau. (Japan P.)

Pavo muticus. L. I. 2. p. 731, No. 3. *s*)
— japanensis. Aldrov. Av. II. pl. 33. 34. (Hahn und Henne.) — Johnston Av. Pl. 23.
Le Paon du Japan. Briss. orn. I. p. 289.
Le Spicifere. Buff. ois. II. p. 366. *t*)

Er hat die Größe des gemeinen Pfauen; ſein Schnabel iſt aber größer, und aſchfarben; die Augenkreiſe ſind roth; der Augenſtern gelb; am Scheitel ſteht ein aufrechter Federbuſch, vier Zoll lang, und an Form einer Kornähre nicht unähnlich, von Farbe blau und grün gemiſcht; Scheitel und Hals ſind grünlich, mit blauen Flecken bezeichnet, die einen weißen Streifen längs der Mitte herab haben; der Rücken iſt grünlichblau; die Bruſt blau und goldgrün melirt; Bauch, Seiten und Schenkel aſchfarben, mit ſchwarzen Flecken und am Bauch mit weißen Streifen; die Deckfedern der Flügel und die kurzen Schwungfedern faſt wie der Rücken; die großen Schwungfedern grün, mit ſchwarzen Queerlinien, gegen die Endſpitzen hin aber werden ſie gelblich, und dieſe ſelbſt ſind ſchwarz; der obern Deckfedern des Schwanzes ſind weniger, als beym gemeinen Pfauen, aber ſie ſind viel länger, als der Schwanz, ihre Farbe iſt kaſtanienbraun, mit weißen Schäften, und am Ende hat jede einen breiten Flecken, der in der Mitte vergoldet, dann blau und grün eingefaßt iſt; die Füße ſind aſchfarben, und mit keinen Sporn verſehen *u*).

Das Weibchen iſt kleiner, und unterſcheidet ſich durch einen ganz ſchwarzen Bauch, und viel kürzern obern Deckfedern des Schwanzes; der Schwanz iſt grün mit blauen Rändern und weißen Schäften.

Er

s) Latham Ind. orn. II. p. 617. n. 2. B.
t) Ueberſ. V. S. 272. B.
u) Es iſt möglich, daß ſie der Maler überſehen hat (bey Aldrovand nämlich B.)

Er ist in Japan zu Hause. In Europa kennt man ihn nur aus einem Gemälde, das der Kaiser von Japan dem Pabst geschickt hat.

3. Der Pfaufasan. (Iris P.)

Pavo bicalcaratus. L. I. 2. p. 730. No. 2. v)
Le Paon de la Chine. Briss. orn. I. p. 201. No. 9.
L'Eperonnier. Buff. ois. II. p. 368. w). — Pl. enlum. 492. 493.
Le petit Paon de Malacca. Sonn. Voy. Ind. II. p. 173. pl. 99.
Peacock-Pheasant. Edw. pl. 67. 69. x)
Lev. Mus.

Dieser ist am Körper größer, als der gemeine Fasan (No. 4.). Sein Schnabel ist schwärzlich, aber von den Nasenlöchern bis zur Spitze der obern Kinnlade roth; der Augenstern gelb; die Federn auf dem Scheitel sehr lang, so daß sie einen Federbusch bilden, und von mattbrauner Farbe; die Stelle zwischen dem Schnabel und den Augen kahl, nur mit einigen zerstreuten Haaren besetzt; die Schläfe weiß; der Hals lebhaft braun, mit dunkelbraunen Streifen; der Oberrücken, die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern matt braun, mit hellern braunen und gelblichen Tüpfeln; außer diesem ist noch jede Feder am Ende mit einem runden, großen, goldpurpurfarbenen Fleck bezeichnet, der bey verschiedenem Lichte ins Blaue und Grüne spielt; der Unterrücken und der Steiß weiß punktirt; alle untern Theile braun, mit schwarzen Queerstreifen; die Schwungfedern dunkelfarbig, die kurzen mit dem nämlichen Fleck bezeichnet, wie das übrige der Flügel; die obern Deckfedern des Schwanzes sind länger als der Schwanz, und jede mit einem Flecken am Ende bezeichnet, wie die Flügelfeder, von denen jeder zuerst mit einem schwarzen, und dann mit einem orangefarbnen Kreiß umgeben ist; Füße und Klauen sind braun, und hinten an jedem Fuß zwey Sporen, einer über den andern.

Das Weibchen ist um ein Drittheil kleiner. Der Kopf, der Hals und die untern Theile sind braun; der Kopf glatt; die obern Theile auch braun, und jede Feder mit einem mattbraunen Flecken bezeichnet, der schmutzig orangefarben ist; die Federn, die den Schwanz bedecken, sind die nämlichen; am Ende aber mit einem unscheinlich verlohren eyrunden, blauen Fleck bezeichnet; die Füße ohne Sporen.

Sie sind in China zu Hause, woher man sie lebendig nach England brachte, und wo sie einige Zeit in dem Besitze des Dr. Jakob Monro gewesen sind. Das Männchen ist jetzt sehr schön aufbewahrt im Leverschen Museum.

Sonnerat bemerkt, der Vogel, von dem er seine Beschreibung genommen, habe an einem Fuß zwey, und am andern drey Sporen gehabt. Dieß ist zuverlässig ein Naturspiel, besonders da er sagt, es sey der nämliche, den Edwards (pl. 67.) abgebildet habe.

4. Der

v) Latham Ind. orn. II. p. 612. n. 3. B.
w) Uebers. V. S. 275. B.
x) Seligmanns Vögel III. Taf. 29. und 33. f. 1. Vergl. meine N. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 458. Nr. 2. B.

4. Der Tibetiſche Pfau. (Thibet P.)

Pavo tibetanus. L. l. 2. p. 731. No. 4. *y*)
Le Paon du Tibet. Briss. orn. I. p. 294. No. 10. pl. 28. A. f. 2.
Le Chinquis. Buff. ois. II. p. 365. *z*)

Er hat die Größe des Perlhuhns, und iſt zwey Fuß und dritthalb Zoll lang. Sein Schnabel iſt über anderthalb Zoll lang, und aſchgrau; der Augenſtern gelb; der Hals und die untern Theile aſchfarben, mit ſchwärzlichen Linien durchzogen; die Deckfedern der Flügel, der Rücken und der Steiß grau, mit kleinen, weißen Tüpfeln, außer dieſen ſind an den Deckfedern der Flügel und am Rücken große, runde Flecken von ſchöner, brauner Farbe, die bey verſchiedenem Lichte ins Violette und Goldgrüne ſchillern; die Schwungfedern und die obern Deckfedern des Schwanzes ſind auch grau, mit ſchwärzlichen Linien bezeichnet, von den Schwungfedern hat jede zwey runde, blaue Flecken, gleich denen auf den Deckfedern; an den äußern Fahnen und an jeder Schwanzfeder ſind vier Flecken von der nämlichen Art, an jeder Seite der Fahne zwey, die mittlern Deckfedern ſind die längſten, die andern werden ſtufenweiſe kürzer; die Füße ſind grau, hinten mit zwey Sporen verſehen, wie die letzte Art; die Klauen ſchwärzlich.

Er iſt im Königreiche Tibet zu Hauſe. Die Chineſer nennen ihn Chin-tchien-Khi.

Acht und vierzigſte Gattung. Truthuhn.

Der Schnabel iſt erhaben, kurz und ſtark. Die Naſenlöcher ſind offen, an einem Ende ſpitzig, und liegen in einer Haut. Kopf und Hals, oder Kehle, (bisweilen alle drey) ſind mit nackten, lappenartigen Fleiſch bedeckt; die Haut der letzten iſt runzlich (flaccid) und häutig (membranaceous). Der Schwanz iſt breit und ausdehnbar (extenſible).

1. Das Amerikaniſche Truthuhn. (American Turkey.)

Meleagris Gallopavo. L. I 2. p. 732. No. 1. *a*) Faun. Suec. No. 198. — Faun. Arrogan. p 80.
Le Dindon sauvage. Briss. orn. I. p. 162. B. *b*).
New England Wild Turkey. Ray Syn. p. 51. No. 3. — Phil. Transact. Vol. LXXII. p. 67.
Wild Turkey. Arct. Zool. No. 178. *c*)
Lev. Mus.

Der

y) Latham Ind. orn. II. p. 617. n. 4. B.
z) Ueberſ. V. S. 269. B.
a) Latham Ind. orn. II. p. 618. n. 1. N.
b) Buffon II. p. 132 Ueberſ. IV. S. 210. B.
c) Ueberſ. II. S. 273. Nr. 94. Vergl. auch meine N. G. Deutſchlands III. S. 306. Nr. 1. und N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 459. B.

Der **Truthahn** wird im zahmen Zuſtande ſelten über vierthalb Fuß lang; im Zuſtande der Natur aber [d]) iſt er beträchtlich größer, und ſpielt ſtark ins Schwarze, das bey gewiſſem Lichte, wie das allerſchimmerndſte vergüldete Kupfer glänzt, bey anderm glänzendgrün iſt, und an einigen Theilen ins Purpurfarbne zieht; die größern Deckfedern der Flügel ſind glänzend braun; die Schwungfedern goldgrün, gegen das Ende hin ſchwarz, und an den Spitzen weiß; der Schwanz beſteht aus achtzehn braunen, ſchwarz geſprenkelten Federn, die Endſpitzen ſind ſchwarz und weiß gewellt (waved); an der Bruſt iſt ein Büſchel von ſchwarzen Haaren, der volle acht Zoll lang iſt. In andern Stücken gleicht er den gemeinen Truthühnern, als z. B. daß er einen kahlen, rothen, mit Lappen beſetzten Kopf und Hals hat; daß ihm ein fleiſchiges Anhängſel über den Schnabel herüber hängt, das ſich ausſtrecken läßt (dilatable), und daß er einen kurzen, ſtarken, ſtumpfen Sporn, oder vielmehr Knopf hinten am Fuße hat.

Dem **Weibchen** fehlt mehrentheils der Haarbüſchel an der Bruſt, obſchon man ihn hier und da an alten Truthennen ſieht, aber kaum halb ſo lang und dicht, als beym **Männchen**. So fehlen dem **Weibchen** auch die Sporen an den Füßen.

Ein Vogel, der mit obiger Beſchreibung übereinkommt, iſt im **Leverſchen Muſeum**, und dieſer ſoll aus **Georgien** gekommen ſeyn.

Es iſt außer allen Zweifel, daß die **Truthühner** urſprünglich aus **Amerika** kommen [e]), und zwar in den nördlichen Gegenden dieſes Landes [f]), wo man ſie oft zu hunderten in einem Fluge antrifft. Bey Tage halten ſie ſich in Wäldern auf, wo ſie von Eicheln leben, und bey Nacht kehren ſie in die Moräſte zurück, um aufzuſitzen, das ſie auf Bäumen thun. Man fängt ſie häufig mit Hunden, obſchon ſie auf eine Strecke weit ſchneller laufen; wenn aber die Hunde fortfahren ſie zu verfolgen, ſo werden ſie bald abgemattet, und nehmen auf die höchſten Bäume ihre Zuflucht, wo ſich einer nach dem andern ſchießen läßt, wenn ihn der Jäger erreichen kann.

Die

d) Neuere Naturforſcher ſagen, der wilde Truthahn ſey eine ganz beſondere Art. Bertrams ſagt in ſeinen travels through North and South Carolina etc. Philadelphia 1791. 8. p. 14. „Die Amerikaniſchen Truthühner ſind von den Aſiatiſchen und Europäiſchen als Art verſchieden. Sie ſind größer und ſchwerer, wiegen 20 bis 40 Pfund; ſind ſchlanker gebaut, Hals und Beine ſind länger, und ſtehen mehr aufrecht. Männchen und Weibchen ſind beſtändig dunkelbraun; die Federn des Männchens glänzend und ſchillernd.“ Wie man ſieht, ſo ſind dieß noch keine Charaktere, die über dieſe Sache entſcheiden; indeſſen verdient die Sache doch einer genauern Unterſuchung. Die Hauptfrage bleibt immer, wie hat man dieſe Vögel in einen ſo allgemeinen zahmen Zuſtand gebracht, welche auch noch bey unſern wilden Gänſen und Enten nicht beantwortet iſt, ob wir gleich für gewiß annehmen können, daß dieſe die Stammältern der zahmen Gänſe und Enten ſind. B.

e) Fermin bemerkt, ſie wögen in Surinam fünf und zwanzig Pfund. Catesby ſpricht von dreyßig und mehr Pfunden in Carolina, obgleich andere vierzig und darüber angeben. In unſerm Clima habe ich noch keinen von größerm Gewicht, als fünf und zwanzig Pfund, angetroffen, und das iſt ſelten.

f) Phil. Trans. — Nach England ſind ſie, wie man glaubt, ums Jahr 1524. gebracht worden. Gewiß iſt es, daß ihr Name nicht auf der Liſte von des Erzbiſchoffs Nevil Gaſtmahl vorkommt, auch wird ihrer nicht in des Grafen von Northumberland Haushaltungs-Buch gedacht, das heißt, bis zum Jahr 1512.

Die Truthenne fängt zeitig im Frühjahr an Eyer zu legen, deren ſie oft eine große Menge legt *g*), ſie ſind weiß, und mit röthlichen oder gelben Flecken, oder vielmehr Sprenkeln (frekles). Sie brütet gut, und iſt ſehr beſorgt für ihre Jungen, deren ſie in dieſem Clima oft vierzehn bis ſiebenzehn auf eine Brut hat; ſie brütet aber nicht leicht öfter, als einmal des Jahrs *h*), außer wenn man ſie dazu zwingt, indem man ihr, ſo wie die erſten ausgekrochen ſind, friſche Eyer unterlegt; denn, als eine gute Bruthenne, bleibt ſie gern zwey Monate über dem Neſte ſitzen, obgleich dieſe Behandlungsart, wie man vorgiebt, dem Vogel großen Nachtheil bringt (to injure).

In den nördlichen Theilen von England wird eine Menge Truthühner ausgebrütet, und gegen den Herbſt nach London zum Verkauf getrieben, und zwar in Zügen von mehrern Hunderten, die in verſchiedenen Bauernhütten (cottages) um Norfolk, Suffolk und den angränzenden Landſchaften, geſammelt werden, deren Bewohner es für der Mühe werth halten, ſie ſehr ſorgfältig zu warten; denn dieſe Vögel machen während der Brütezeit einen Theil ihrer Familie aus. Es iſt angenehm zu ſehen, mit welcher Leichtigkeit ihre Treiber ſie behandeln, nämlich vermittelſt eines Stückchen rothen Tuches, das am Ende eines Stocks befeſtigt iſt, und das, wegen der Anthipathie dieſer Vögel gegen dieſe Farbe, die nämliche Wirkung thut, als eine Peitſche bey vierfüßigen Thieren. Es iſt unnöthig, noch weiter etwas über ihre Lebensart im Allgemeinen hier zu ſagen; wer Luſt hat, mehr hiervon zu wiſſen, der wird hinlänglich durch das befriedigt werden, was Herr Pennant in den Philoſophiſchen Transaktionen hierüber geſagt hat; wer aber eine weitläuftigere Abhandlung wünſcht, dem kann ich die ausführliche Nachricht in Büffons Naturgeſchichte der Vögel ganz vorzüglich empfehlen.

1. Var. Das zahme Truthuhn. (Domestic T.)

Meleagris Gallopavo. L. I. 2. p. 732. No. 1. *β*. — Frisch tab. 122.
Le Dindon. Briss. orn. I. p. 158. No. 1. pl. 16. — Buff. ois. II. p. 136. pl. 3. Pl. enlum. 97. *i*)
Turkey. Ray Syn. p. 51. A 3. — Will. orn. p. 159. pl. 27. — Albin. III. pl. 35. Br. Zool. I. No. 97. — Phil. Trans. Vol. LXXII. p. 67. Br. Mus. Lev. Mus.

Unter dieſe Aufſchrift können alle die Spielarten begriffen werden, die aus der Zähmung entſtanden ſind. Die allgemeinſte iſt dunkelgrau, ins Schwarze ſpielend, oder ſchmutzig weiß und ſchwarz geſtreift.

So giebt es auch eine ſchöne Spielart von dunkler Kupferfarbe *k*), mit rein weißen, großen Schwungfedern, und einem ſchmutzigweißen Schwanze; dieß iſt, wenn er alt iſt, ein äußerſt ſchöner Vogel.

Eine Spielart von rein weißen Gefieder *l*) iſt jetzt auch nicht ſelten *m*), und hat ein ſehr

g) Ich habe ihrer einmal 52 Stück erhalten. B.
h) In Weſtindien ſoll ſie des Jahrs dreymal brüten.
i) Ueberſ. a. a. O.
k) Meleagris Gallopavo L. I. c. No. 1. *δ*.
l) Meleagris Gallopavo L. I. c. No. 1. *ε*.
m) Den Büſchel, von langen Haaren an der Bruſt

ſchönes Anſehen, man hat ſie ehedem für eine große Seltenheit gehalten, und geglaubt, dieſe Brut ſey urſprünglich in Holland entſtanden *n*).

Im Leverſchen Muſeum iſt auch ein gemeiner Truthahn mit einem großen Federbuſch *o*) auf dem Kopfe, und einem bey Albin *p*) abgebildeten ſehr ähnlich *q*).

Sie *r*) werden in Schweden und auch in Norwegen gezogen; wo ſie aber in der Größe ausarten. Sie ſind auch in allen Theilen von Rußland gemein, in Sibirien wollen ſie aber nicht fortkommen *s*).

2. Das gehörnte Truthuhn. (Horned T.)

Penelope Satyra. L. I. 2. p. 733. No. 1. *t*)
Meleagris Satyra. Syst. Nat. ed. XII. Vol. I. p. 269. No. 3.
Le Faisan cornu de Bengale. Briss. orn. App. p. 14. No. 17.
Le Napaal, ou Faisan cornu. Buff. ois. II. p. 362. *u*)
Horned Pheasent. Edw. pl. 16. *v*)

An Größe ſteht er zwiſchen einem Haushuhn und einem Truthahn in der Mitte. Sein Schnabel iſt braun; die Naſenlöcher, die Stirn und die Augenkreiße ſind mit dünnen, ſchwarzen, haarartigen Federn bedeckt; der Scheitel iſt roth; hinter jedem Auge entſpringt eine fleiſchige,

Bruſt ausgenommen, der bey allen Spielarten ſchwarz, und bey dieſer ſo ſichtbar iſt, als bey irgend einer andern.

n) Phil. Trans. — Wahrſcheinlich iſt dies keine ſpätentſtandne Spielart, denn in einem Gemälde von Baſſan (welche von beyden Baſſan's, iſt nicht angegeben: der Eine ſtarb 1540, der Andere 1594.) werden ein Paar weiße Truthähne vorgeſtellt wie ſie, nebſt andern Thieren, in den Kaſten Noä gehn. — Barrington's Miscell.

o) Meleagris Gallopavo L. l. c. No. 1. *γ*.

p) Vol. II. pl. 35. — Briss. orn. II. p. 161.

q) Das Baſtardtruthuhn.
M. G. hybridus.
Edwards redet von einem Baſtard, den er für die Frucht der Vermiſchung von der Truthuhn- und Faſanengattung hält. Der Vogel, nach welchem er ſeine Beſchreibung gemacht hat, war in dem Walde bey Hanford in der Provinz Dorſet geſchoſſen worden, wo man ihn im October 1759 mit zwey oder drey andern Vögeln von der nämlichen Gattung antraf. Seiner Größe nach war er zwiſchen dem Faſan und Truthahn. Ueber der Wurzel des Oberſchnabels erhob ſich ein kleiner Buſch von ziemlich langen ſchwarzen Federn. Die Augen ſtunden in einem Kreiſe von rother Haut, der aber nicht ſo breit wie beym Faſan war.
Es wird nicht geſagt, ob dieſer Vogel mit dem Schwanze ein Rad mache; aus der Abbildung ſieht man nur, daß er ihn, wie ein in Ruhe ſich befindender Truthahn trägt. Uebrigens muß man merken, daß der Schwanz nur aus ſechszehn Federn beſtand, wie der vom Auerhahn. Außerdem kam jede Feder doppelt aus einer einzigen Wurzel hervor, eine war groß und feſte, die andere klein und dunenartig, welches weder beym Faſan noch Truthahne, wohl aber beym gemeinen und Auerhahne, angetroffen wird. Buffon glaubt daher auch, wenn dieſer Vogel ja ein Baſtard ſeyn ſollte, ſo ſey er es eher vom Auerhuhn und Truthuhn, als von dem letztern und dem Faſan.

r) Zuſ. a. d. Suppl. S. 203. Ueberſ.

s) Arct. Zool.

t) Meleagris Satyra Latham Ind. orn. II. p. 619 n 2. B.

u) Ueberſ. V S. 259. B.

v) Seligmanns Vögel V. Taf. 11. S. auch N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 461. B.

schige, schwielige blaue Substanz, gleich einem Horn, das rückwärts gerichtet ist; am Vorderhals und an der Kehle hängt eine schlaffe Haut, von außerordentlich schöner blauer Farbe, mit orangefarbnen Flecken, der untere Theil derselben ist mit einigen Haaren besetzt, und in der Mitte ist sie schlaffer, als an den Seiten, und runzlich; Brust und Oberrücken sind tief (full) roth; Hals und Brust ziehen sich ins Orangenfarbne; die übrigen Theile des Gefieders und der Schwanz sind gelbrothbraun, über und über mit weißen, schwarz eingefaßten Flecken bestreut; die Füße weißlich, und jeder hinten mit einem Sporn versehen.

Ein Kopf dieses Vogels wurde Herrn Dr. Mead aus Bengalen, nebst einer Abbildung des Vogels geschickt; er war Napaul-Fasan genannt.

Ich w) habe kürzlich Gelegenheit gehabt ein Männchen dieser Art in ganz vollkommenen Gefieder zu sehen, das von Mstes. Wheeler aus Indien gebracht worden war. Ich kann nichts zur oben gegebenen Beschreibung dieses Geschlechts hinzuthun, als die Bemerkung, daß der Schwanz abgerundet ist, und aus zwanzig, am Ende schwärzlichen Federn besteht.

Im Leverschen Museum befindet sich ein ungemein schönes und vollständiges Exemplar vom Weibchen. Diesem Geschlechte fehlen die Hörner, die beym Männchen so ansehnlich sind. Die Federn des Kopfs und eines Theils des Halses sind seidenschwarz, mit blauem Glanz, und an den Seiten der Kehle mit einem unregelmäßigen, rothen Flecken (patch) bezeichnet; die Federn am Hinterkopf und Nacken sind karmoisinroth, und der ganze Scheitel ist mit langen, lockern, rückwärts gerichteten Federn geziert; die Zeichnung des Körpers ist so ziemlich wie beym Männchen, aber nicht so lebhaft; der Rücken und ein Theil der Deckfedern der Flügel ist, außer den weißen Flecken, bey beyden mit schwarzen und karmoisinrothen Streifen, auf laubgelbem (fillemot) Grunde, äußerst schön melirt; der Steiß und die Schwanzfedern sind diesen einigermaßen ähnlich, indem das Karmoisinrothe gegen den Schwanz hin abnimmt, und die Endspitzen desselben dunkelschwarz sind; die Füße sind hinten mit einem stumpfen Sporn versehen.

Mstrss. Wheler sagt mir, sie habe beyde Geschlechter lebendig besessen, und wäre ein Zufall an Bood des Schiffes nicht gewesen, so hätte sie obenerwähntes Männchen nach England gebracht. Dieser Vogel kann bey Lebzeiten die Haut an seiner Kehle erweitern und verlängern, so daß sie fast bis über die Brust herabhängt, fast eben so, wie der Truthahn es mit seinen Fleischlappen am Halse und mit seiner Haut am Kopfe macht, und um diese Zeit sind die Farben sehr erhöht, und erscheinen sehr schön dunkelblau, mit karmoisinrothen Querstreifen.

Diese Vögel sind nichts weniger, als gemein, obschon nicht selten, auf Indischen Gemälden, und besonders gut abgebildet in denen des Herrn Middleton und der Lady Impey. Sire Elijah sagt mir, man kenne sie in Indien unter zwey Namen, erstens Singhee Moory, oder marmorirtes Huhn, und dann Moory Manmoor, oder glänzendes Huhn.

w) Zus. a. d. Suppl. S. 203. 204.

3. Der Guan. (Guan T.)

Penelope cristata. L. l. 2. p. 733. No. 2. x)
Meleagris cristata. Syst. Nat. ed. XII. p. 269. No. 2.
Le Dindon du Bresil. Briss. orn. I. p. 162. No. 2.
Jacupema. Ray Syn. p. 56. No. 2. — Will. orn. p. 165. pl. 28.
Guan, or Quan. Edw. pl. 13. y)
Lev. Mus.

Er hat die Größe eines Haushuhns, und ist zwey Fuß, sechs Zoll lang. Sein Schnabel ist zwey Zoll lang, und schwarz; der Augenstern schmutzig orangefarben; die Schläfe sind mit einer kahlen, purpurblauen Haut bedeckt, in welcher die Augen liegen; anderthalb Zoll unter Kehle ist die Haut schlaff, schön roth, und bloß mit einigen Haaren bedeckt; der Scheitel ist mit langen Federn geziert, die der Vogel nach Willkühr wie einen Federbusch aufrichten kann; die Hauptfarbe des Gefieders ist bräunlich schwarz, mit Kupferglanz bey gewissem Lichte; die Deckfedern der Flügel aber haben einen grünlichen und violetten Glanz; die Schwungfedern spielen stark ins Purpurrothe; der Vorderhals, die Brust und der Bauch sind mit weißen Flecken bezeichnet; die Schenkel, die untern Deckfedern des Schwanzes und der Schwanz selbst bräunlich schwarz; die Füße sind roth; die Klauen schwarz.

Einige dieser Vögel haben nur einen ganz kleinen, oder gar keinen Federbusch, und diese werden für die Weibchen gehalten.

Sie sind in Brasilien zu Hause, wo sie oft zahm gemacht werden. Sie geben häufig ein Geschrey von sich, das dem Worte Jacu gleicht. Ihr Fleisch wird sehr geschätzt.

4. Der Jaku. Yacou T.)

(s. die zwey und sechzigste Kupfertafel.)

Penelope cumanensis. L. l. 2. p. 734. No. 3. z)

L'Ya-

x) Penelope cristata Latham Ind. orn. II. p. 619. n. 1. Hier ist er, so wie die folgenden Vögel dieser Gattung unter ein besonderes Genus, das Penelope heißt, gebracht, wovon die Kennzeichen folgende sind: der Schnabel ist an der Wurzel nackt; der Kopf mit Federn bedeckt; die Kehle nackt; der Schwanz aus zwölf Federn bestehend; die Füße sind ohne Sporn. B.

y) Buff. ois. II. p. 289. Uebers. V. S. 302. Büffon hält diesen Vogel für eine bloße Varietät des folgenden. Er sagt: Ich zweifle gar nicht, daß nicht der Guan oder Quan des Hrn. Edwards (Taf. 13.), der seiner Aussage nach in Westindien, ohnstreitig von einem wilden Völkerstamme, diese Benennung erhalten, eine Varietät unsers Jaku sey, von welchem er sich bloß durch die etwas höhern Beine und verschiedene Farbe der Augen unterscheidet. Man vergl. ferner Penelope Iacupema Merrems Beyträge, II. S. 42. Taf. 11. und Seligmanns Vögel I. Taf. 25. B.

z) Hier ist ein System auch das Jacquinsche Synonym: Crax cumanensis, citirt, das aber Latham erst in den Suppl. S. 205. bey Cumana Curussow (50ste Gatt. No. 5.), anführt. Penelope cumanensis Latham Ind. orn. II. p. 620. n. 3. B.

Der Faku.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

L'Yacou. Buff. ois. II. p. 387. *a*) —
— Mem. sur Cayenne. Vol. I. p. 398. pl. 5. *b*)

Etwas größer, als ein **Haushuhn**. Der Schnabel iſt ſchwarz; die Federn des Kopfs ſind lang, und ſpitzig, und bilden einen Federbuſch, der nach Willkühr aufgerichtet werden kann; der Augenſtern iſt hell gelbroth; die Augenkreiße kahl bläulich, und faſt wie beym Truthahn; er hat auch eine kahle Haut, oder eine Art von Lappen (wattle) von matt ſchwarzer Farbe; die blaue Haut reicht vor bis an den Schnabel, kann aber ihre Farbe nicht verändern, wie beym Truthahn; das Gefieder hat nicht viele Abwechſelung; er iſt hauptſächlich braun, mit einigen weißen Zeichen am Halſe, an der Bruſt, den Deckfedern der Flügel und am Bauche; der Schwanz beſteht aus zwölf ziemlich langen, und am Ende gleichen Federn; die Füße ſind roth.

Er findet ſich in **Cayenne**, iſt aber ein ſeltner Vogel, dem man nur in den innern Theilen oder um das **Amazonenland** antrifft; doch in viel größerer Menge den Strom **Oyapoc** hinauf, beſonders gegen **Camouvi**; denn wirklich ſind faſt alle diejenigen, welche man in **Cayenne** ſieht, zahme. Es ſind ſehr verträgliche Vögel, die im zahmen Zuſtande brüten, und ſich mit andern Federvieh vermiſchen. Ihr Neſt bauen ſie auf den Boden, und da brüten ſie auch ihre Jungen aus, außerdem ſieht man ſie meiſtentheils auf Bäumen. Sie richten ihren Federbuſch ſehr oft auf, wenn ſie vergnügt ſind, oder ſie etwas unerwartetes bemerken. Sie tragen auch den Schwanz aufrecht, und fächerförmig ausgebreitet, wie der Truthahn. Ihr Laut iſt von doppelter Art; der eine, wie das Piepen eines jungen Truthahns, der andere tiefer, und kläglicher; jener drückt nach der Vorſtellung der **Indianer** das Wort **Couyorois**, dieſer das Wort **Jaku** aus.

5. Der Marail. (Marail T.)

Penelope Marail. L. l. 2. p. 734. Buff. ois. II. No. 5. *c*)
Le Marail. Buff. ois. II. p. 390. *d*)
Faisan verdatre de Cayenne. Pl. enlum. 338.
Le Maraye. Mem. sur Cayenne. Vol. I. p. 383. pl. 3. 4. — Fermin Surin. Vol. II. p. 149.

Er hat die Größe eines **Haushuhns**, dem er auch an Körperbau nicht unähnlich iſt. Schnabel und Augenſtern ſind ſchwärzlich; die Augenkreiße kahl, und hellroth; Kinn, Kehle und Vorderhals ſparſam mit Federn bedeckt; die Kehle ſelbſt aber kahl, und die Haut über einen halben Zoll verlängert; ſowohl dieſe als die Haut, die die Augen umgiebt, verändern ihre Farbe, und werden dunkler und dicker, wenn der Vogel gereizt iſt; die Kopffedern ſind etwas lang, ſo daß ſie einem Federbuſche gleichen, wenn ſie aufgehoben ſind, was der Vogel oft thut, wenn er zornig gemacht wird (agitated); wo er denn auch die Federn des ganzen Kopfs aufrichtet und ſich ſo verſtellt, daß man ihn kaum kennt; die Hauptfarbe des Gefieders iſt grünlich ſchwarz; der Vorderhals mit weißen Spitzen; die Flügel ſind kurz; der Schwanz lang, und beſteht

a) Ueberſ. V S. 300. B.
b) Vergl. auch Merrems Beytr. II. p. 43. t 12 Penelope leucolophas. B.
c) Latham Ind. orn. II. p. 620. n. 4. B.
d) Ueberſ. V. S. 306. B.

ſteht aus zwölf Federn, die am Ende gleich ſind, gewöhnlich iſt er herabhängend, er kann aber aufgehoben und ausgebreitet werden, wie beym Truthahn; Füße und Zehen ſind lebhaft roth; die Klauen braun, und etwas ſcharf e).

Dieſe Art iſt in den Wäldern von Guiana, in einiger Entfernung von der See gemein, obgleich viel weniger bekannt, als man glauben ſollte. Man trifft ſie meiſtens in kleinen Flügen an, die Brütezeit ausgenommen, wo man ſie nur Paarweiſe ſieht, und dann gewöhnlich auf der Erde, oder auf niedrigem Gebüſch; zu anderer Zeit auf hohen Bäumen, wo ſie die Nacht zubringet. Das Weibchen macht ſein Neſt auf einen niedrigen, buſchigen Baum, ſo nahe an den Stamm, als möglich, und legt drey oder vier Eyer. Wenn die Jungen ausgebrütet ſind, ſo ſteigen ſie nach zehn bis zwölf Tagen mit ihrer Mutter herab. Dieſe beträgt ſich wie andere Hühner, kratzt auf der Erde wie eine Henne, und füttert die Jungen, die ihre Wärterin dann verlaſſen, wen ſie für ſich ſelbſt ſorgen können. Sie brütet des Jahrs zweymal, einmal im December oder Jänner, das anderemal im May oder Juny. Die beſte Zeit dieſe Vögel anzutreffen, iſt Morgens und Abends, denn da ſitzen ſie auf ſolchen Bäumen, von deren Früchten ſie leben, und entdecken ſich dadurch, daß ſie einige davon auf die Erde fallen laſſen. Die Jungen laſſen ſich leicht zähmen, und verlaſſen ſelten den Ort, wo ſie aufgezogen worden ſind. Man braucht ſie nicht im Hauſe zu halten, denn ſie ziehen das Sitzen auf ſchlanken Bäumen jedem andern Orte vor. Ihr Geſchrey iſt nicht unharmoniſch, außer wenn ſie gereizt, oder verwundet ſind, wo es dann rauh und laut klingt. Ihr Fleiſch wird ſehr geſchätzt.

Büffon behauptet, dieſer Vogel ſey das Weibchen vom Jaku, oder wenigſtens eine Spielart; daß dieß aber nicht ſeyn kann, ſetzt die Zergliederung außer allen Zweifel. Die Luftröhre dieſes Vogels iſt von ſonderbarem Bau; ſie läuft den Hals herab, bis an die Bruſthöhle, ſchlägt ſich dann an die äußere Seite der Muſkeln (fleſh), und nachdem ſie eine Strecke noch herabgeſtiegen, geht ſie wieder rückwärts, und ſteigt dann erſt in die Höhle zu den Lungen. An der Außenſeite wird ſie durch ein muſkulöſes Band feſt gehalten, das man bis ans Bruſtbein verfolgen kann. Dieß iſt ſowohl beym Männchen als beym Weibchen der Fall, und zeigt offenbar, daß ſie vom Jaku verſchieden ſind, deſſen Luftröhre bey keinem von beydem Geſchlechtern eine ſolche Krümmung (circumvolution) hat.

Wenn dieß der Vogel iſt, deſſen Fermin f) erwähnt, ſo hat er nach ihm, einen keilförmigen ſchwarz- und weißen Schwanz, und iſt in Surinam ſelten g).

Ban-

e) In einer Sammlung aus Cayenne war, wie es mir ſchien, ein Vogel, von der nämlichen Art. Er war acht und zwanzig Zoll lang; ſein Schnabel, wie ein Hühnerſchnabel, braun, und etwas gekrümmt; die Augenkreiſe kahl; der Kopf mit einem Federbuſch geziert; die Federn am Vorderhalſe hatten weiße Spitzen; Bruſt und Bauch waren gelbrothbraun; das übrige Gefieder grünlichbraun; der Schwanz eilf Zoll ang, und am Ende abgerundet; die Schwungfedern reichten gerade bis an den Steiß; die Füße waren braun; die Klauen krumm.

f) Hist. Guian. p. 176.

g) Es iſt nicht ganz gewiß, ob er dieſe, oder die letzte Art meynt.

Bancroft erwähnt eines Guianiſchen Vogels, unter dem Namen Marrodee, der, wie er ſagt, durchaus bräunlich ſchwarz iſt; der Schnabel eben ſo; die Füße grau. Dieſe Vögel, ſagt er, ſind gemein, und machen, wenn ſie auf den Bäumen ſitzen, ein Geſchrey, das ihren Namen nicht unähnlich klingt. Dieſes Geſchrey ahmen die Indianer ſo vollkommen nach, daß ſie, indem ihnen die Vögel darauf antworten, dadurch die Plätze entdecken, wo ſie ſich aufhalten. Ihr Fleiſch ſchmeckt wie Hühnerfleiſch. — Ich glaube, dieß iſt kein anderer Vogel, als der Marail.

Neun und vierzigſte Gattung. Perlhuhn.

Die Kennzeichen dieſer Gattung ſind: Ein erhabener ſtarker und kurzer Schnabel; an der Wurzel deſſelben eine lappige (corrunculated) Wachshaut, in der die Naſenlöcher liegen. Kopf und Hals ſind kahl, und ganz ſparſam mit Borſten beſezt. Auf dem Kopf iſt ein groſſes, zurückgebogenes Horn *b*). Von den Wangen hängen Fleiſchlappen herab. Der Schwanz iſt kurz, und abwärts gerichtet.

1. Das gemeine Perlhuhn. (Guinea Pintado.)

Numida Meleagris. L. l. 2. p. 744. No. 1. *bb*) — Mus. Adolph. Frid. Vol. II. p. 27. — Scop. ann. I. No. 165. *i*) — Hasselq. Voy. p. 274. No. 24. Frisch tab. 126.

La Peintade. Briss. orn. I. p. 176. pl. 18. — Buff. ois. II. p. 163. pl. 4. k) — Pl. enlum 108.

Guiney Hen. or Pintado. Ray Syn. p 528. — p. 182. No. 17. — Will. orn. p. 162. pl. 26. 27. — sloan. Jam. p. 302. — Brown Jam. p. 470. *l*) Br. Mus. Lev. Mus.

Es iſt größer, als ein großer Haushahn, und zwey und zwanzig Zoll lang. Sein Schnabel iſt fünf Viertel Zoll lang und röthlich hornfarben; der Kopf unbefiedert, und bläulich; und auf dem Scheitel am hintern Theile ſteht eine bläulichrothe Erhöhung von kegelförmiger Geſtalt, die an den Seiten eingedruckt iſt; an beyden Seiten der obern Kinnlade, an der Wur-

b) Die lezte Art hat einen Federbuſch, ſtatt des Horns.

bb) Latham Ind. orn. II. p. 621. n. 1. B.

i) Ueberſ. von Günther. S. 135. Nr. 165. B.

k) Ueberſ. IV. S. 238. B.

l) Vergl. auch Meyers Thierbuch I. S. 49. Taf. 79. Meine N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 462. und N. G. Deutſchlands III. S. 455. B.

Wurzel, hängt ein bläulichrother Fleiſchlappen; der Oberhals iſt einzeln mit haarartigen Federn beſezt, und die Haut, die zwiſchen denſelben durchſcheint, iſt bläulich aſchfarben; der Unterhals iſt befiedert, und ſpielt mehr ins Violette; das übrige Gefieder iſt ſchwarz, mit runden, weißen Flecken von verſchiedener Größe bezeichnet, die in ihren Zwiſchenräumen mit Grau durchzogen ſind, auch Flügel und Schwanz nicht ausgenommen; die Füße ſind gräulichbraun.

Beym Weibchen ſind die Fleiſchlappen etwas kleiner, und roth, da ſie beym Männchen ins Blaue ſpielen. *m*).

Das Vaterland dieſes Vogels iſt ohne Zweifel Afrika, und er ſelbſt iſt die Meleagris der Alten *n*) Man glaubt, er käme urſprünglich aus Nubien *o*). Er war bey den Römiſchen Gaſtmahlen ſehr geſchäzt. Verſchiedene Reiſende haben ihn wild, in Flügen von zwey bis drey hundert angetroffen. Dampier fand ihn in Menge auf der Inſel Mayo *p*), und Forſter ſagt, er ſey häufig auf St. Jago *q*); nach Weſtindien *r*) und Amerika *s*) iſt er aber verpflanzt worden, ob er ſich gleich jezt in dieſen Ländern, ſowohl im wilden, als zahmen Zuſtande, befindet.

Dieſe Art iſt auch ſehr gemein in Europa, und das Fleiſch der jungen Vögel wird ſehr geſchäzt. Das Weibchen legt eine Menge Eyer in Einem Jahre *t*) Einige legen ſie den Hennen unter, weil ſie viele Sorgfalt erfordern, wenn man ſie aufbringen will, ob ſie ſchon in gewiſſen Jahren ohne Schwierigkeiten aufgebracht werden. Sie lieben einen geräumigen Hühnerhof (range); und wenn ſich in dieſem viele Schlupfwinkel (shelter) befinden, ſo macht das Weibchen im Verborgenen ein Neſt, und erſcheint dann unverhofft mit einem Gefolge von mehr als zwanzig Jungen *u*). Ich weiß daß ſich dieſes verſchiedenemal zugetragen hat.

Ihr Ey iſt kleiner, als ein Hühnerey, und mehr rundlich, von Farbe röthlich weiß, mit unſcheinlichen Flecken von dunklerer Farbe.

Dieſe Art ſchreyt den Tag über unaufhörlich; ſie hat eine knarrende, rauhe Stimme, die einigermaßen der knirrenden Thüre und ihrer roſtigen Angel, oder einer ungeſchmierten Wagenachſe gleich kommt; und wenn ſie aufſizt, und geſtört wird, welches ſehr leicht geſchieht, ſo wird ſie ſo laut, daß ſie durch ihr Geſchrey eine ganze Familie im Schlafe ſtöhrt.

Sparr-

m) Das Weibchen iſt von gleicher Größe, hat aber einen weniger hohen, mehr abgeſtumpften und weniger übergekrümmten Helm, die Backenlappen an den Seiten der Kiefer ſind roth, kleiner, am Schnabel ſchmäler, ſtehen enger zuſammen und lezen ſich einwärts. Auch trägt es ſeine Flügel im Laufen nicht in die Höhe, wie das Männchen. B.

n) Pallas Spicileg. Zool. IV. p. 15. — Hist. des Ois. II. p. 172. Note (o)

o) Haſſelquiſt. — Woher auch, wie er ſagt, Affen, Papageyen u. ſ. w. nach Cairo und andere Länder von Afrika gebracht worden ſind.

p) Damp. Voy. III. pt. I. p. 23. —

q) Forster Voy. p. 39. —

r)) Sloane.

s) Kalm.

t) Hundert bis hundert und fünfzig, auf St. Domingo. Hist. des Ois. II p. 185.

u) Drey oder vier und zwanzig ganz gewöhnlich, und oft bis ſieben und zwanzig.

Sparrmann v) sagt, sie sey gemein in der Nachbarschaft des Vorgebirges der guten Hoffnung w) wo er sie in ganzen Flügen an der Landstraße von Seekuhfluß bis zum Sonntagfluß angetroffen habe; sie sey sehr schön, fliege niedrig und gerade vorwärts, wie ein Rebhuhn; sie ruhe des Nachts auf Bäumen, in großen Gesellschaften, so daß Herr Sparrmann einst sechs auf einmal geschossen und noch einige verwundet hat.

1. Var. Das weißbrüstige Perlhuhn. (White-breasted P.)

Numida Meleagris. L. I. 2. p. 744. No. 1. β. x)
La Peintade á poitrine blanche. Briss. orn. I. p. 180. A.
Guinea Hen. Albin. II. pl. 36.
White-breasted Guinea Hen. Bsown. Jam. p. 470.

Dieß unterscheidet sich bloß durch eine weiße Brust, die mit schwarzen Flecken bezeichnet ist, in welchen sich kleinere, weiße befinden; die vier erstern Schwungfedern, und eben so viele der äußersten, größern Deckfedern, sind auch weiß.

Es soll in Jamaika angetroffen werden, und ist in der That weiter nichts, als eine bloße Spielart, von der sich wiederum viele andere in England finden, weil sie sehr abändert. Bey einigen ist der Grund des Gefieders bläulich, statt schwarz; bey andern so hell, daß die weißen Flecken fast gar nicht sichtbar werden; und nicht selten sind sie durchaus rein weiß y). Von allen diesen kann man Exemplare im Leverschen Museum sehen.

2. Das gehörnte Perlhuhn. (Mitred P.)

Numida mitrata. L. l. 2. p. 745. No. 2. z).
— — Pallas Spicil. IV. p. 18. t. 3. f. 1. (der Kopf.)

Es hat die Größe des gemeinen Perlhuhns. Sein Schnabel ist gelblich; der Kopf ist mit einem Helm geziert, der aber kleiner ist, als der des lezteren; der ganze Scheitel und die Stelle um den Schnabel herum, sind von tief, aber schmuzigrother Farbe; zu beyden Seiten des Schnabelwinkels ist ein längliches, am Ende zugespiztes, Stück Fleisch, beym Männchen am größten, und an der Spize roth; unter der Kehle ist eine Art von Fleischlappen (wattle), von länglicher Gestalt, wodurch es einigermaßen mit dem Truthahne verwandt zu seyn scheint;

v) Zus. a. d. Suppl. S. 204. Uebers.
w) Sparrm. Voy. vol. 11. p. 19.
x) Latham l. c. β
y) Dieß lezterе wird in Ind. orn. I. c. zu einer besondern Varietät gemacht.
Nur. B. Das weiße gemeine Perlhuhn.
Ger. orn. II. t. 231.
Es ist am ganzen Körper weiß.'
Var. C. Der Perlhuhnbastard.
N. M. hybrida.
Es entsteht aus einer Vermischung des Perlhuhns mit der Haushenne, und hat daher auch in Gestalt und Gefieder eine Mischung von diesen beyden.
Diese Bastardart pflanzt sich nicht fort, und die Eyer sind daher alle unfruchtbar. B.
z) Latham Ind. orn. II. p. 622. n. 2 Vergl. auch Uebers. von Büffons Vögeln IV. S. 278. und meine N. G. Deutschlands III. S. 468. B.

der obere Theil des Halſes bläulich, und kahl; der Körper ſchwarz; die Federn am untern Theil des Halſes ſind nach der Queere wellenförmig geſtreift, und der Körper iſt eben ſo gefleckt, wie beym gemeinen, die Grundfarbe aber mehr ſchwarz, und die Flecken größer; die Füße ſind ſchwärzlich.

Dieſe Art iſt in Madagaſkar und Guinea zu Hauſe. Pallas ſcheint ſie für diejenige zu halten, deren Columella [a]) als eines Vogels erwähnt, der von dem gemeinen Perlhuhn verſchieden ſey, und hiermit ſtimmt Plinius [b]) überein, welcher die Numida und die Meleagris auch für verſchiedene Vögel ausgiebt. — Dieſe Art iſt nicht gemein.

3. Das gehäubte Perlhuhn. (Crested P.)

(ſ. die erſte Figur der drey und ſechzigſten Kupfertafel.)

Numida cristata. L. l. 2. p. 745. No. 3. c)
— — Pallas spicil. IV. p. 15. tab. 2.

Dieſes ſteht an Größe zwiſchen dem gemeinen Perlhuhn und einem Rebhuhn in der Mitte. Sein Schnabel iſt hornfarben, an der Wurzel mit einer Art von Afterwachshaut verſehen, in der die Naſenlöcher liegen; es hat keine Fleiſchlappen, an den Mundwinkeln aber iſt eine Art von Falte; Kopf und Hals, bis über die Mitte hinaus, ſind kahl, mattblau, und nur mit wenigen, hier und da zerſtreuten Haaren beſetzt; die Stelle um die Ohren iſt am meiſten bedeckt; der Vorderhals, von der Kehle an, blutroth; auf dem Kopf iſt ein großer Federbuſch, der aus dick beſetzten, ſchmalen, ſchwarzen Federn beſteht, der größte Theil derſelben iſt rückwärts gekehrt, der vordere Theil aber fällt vorwärts über den Schnabel hinüber; das ganze Gefieder iſt ſchwarz, der Hals und der vordere Theil des Körpers ungefleckt, das Uebrige mit bläulichen Flecken, von der Größe der Hirſenkörner, bedeckt, an einigen Federn ſind deren vier, an andern drey an jeder Fahne; die großen Schwungfedern ſind ſchwärzlich braun, die kurzen eben ſo, mit vier Flecken an jeder Seite der Schäfte, zwey oder drey derſelben an den äußern Rändern ſind breit und weiß; der Schwanz iſt mit wellenförmigen Queerlinien durchzogen; die Füße ſind ſchwärzlich; die hintere Klaue von der Erde erhaben und ſtumpf.

Auch dieſe Art iſt in Afrika zu Hauſe. Vielleicht hat ſie einige Verwandtſchaft mit der gehaubten Art, die Markgraf geſehen hat, und die aus Sierra Leona kam. Dieſe hatte eine Art von hängenden, bläulich aſchfarbenen Halsbande um den Hals, und einen großen rundlichen ſchwarzen Federbuſch.

Zuſatz.

a) De re rustica l. VIII. c. 2.
b) Hist. Nat. l. X. c. 8.
c) Latham Ind. orn. II. p. 623. n. 3. und Ueberſ. von Büffons Vögeln IV. S. 276. B.
d) Caput tegit crista rotunda, multiplex, constans pennis eleganter nigris. Marcgr. Hist. Nat. Brasil. p. 192.



1. Das gehaubte Perlhuhn 2. Das Kragenrebhuhn

Zuſatz.

4. Das Aegyptiſche Perlhuhn.

Numida aegyptiaca. Larham Ind. orn. II. p. 622. No. 4.
Meleagris altera, Gerini orn. II. p. 80. t. 232.

Der Schnabel iſt röthlich; Kopf und Hals ſind gelbroth mit einzelnen Haarfedern, und auf dem Scheitel ſtehen längere aufgerichtete Federn; die Wangen und kurzen Kehllappen auf beyden Seiten ſind bläulich; der Körper iſt ſchwarz mit etwas großen bläulichen Flecken.

Dieſer Vogel, das Aegyptiſche Huhn genannt, war 1728 in der königl. Menagerie zu Verſaille. Ob er wohl von dem gehaubten Perlhuhn Nr. 3. verſchieden iſt?

Funfzigſte Gattung. Hocko.

Der Schnabel iſt erhaben, ſtark, und dick; die Wurzel deſſelben mit einer Wachshaut bedeckt, die oft mit einem großen Knopf verſehen iſt. Die Naſenlöcher ſind blau, und liegen in der Wachshaut. Der Kopf iſt zuweilen mit einem Federbuſch verſehen, deſſen Federn an den Endſpitzen gekräuſelt ſind. Der Schwanz iſt groß, gerade und kann ausgebreitet werden.

1. Der gekrönte Hocko. (Crested Curassow.)

Das Männchen.

Crax Alector. L. I. 2. p. 735. No. 1. e) — Scop. ann. I. No. 163. f) — Frisch tab. 121.
Le Hocco de la Guiane. Briss. orn. I. p. 298. pl. 29. Buff. ois. II. p. 375. pl. 13. g) — Pl. enlum. 86.
Mituporanga. Ray Syn. p. 52. No. 6. — p. 183. No. 19. — Will. orn. p. 161. pl. 28. (der Kopf.)
Peacock Pheasant of Guiana. Bancroft Guian. p. 173.
Quirizai, or Curasso. Brown Jam. p. 470. Sloan. Jam. p. 302. pl. 2. 60.
Curreso. Damp. Voy. II. pl. 2. p. 67. — III. pl. I. p. 75.
Lev. Mus.

Er hat die Größe eines kleinen Truthahns, und ſeine Länge iſt beynahe drey Fuß; ſein Schnabel iſt einen und drey Viertel Zoll lang, dunkel oder hornfarben, und von der Mitte an, mit einer Art von Wachshaut bedeckt, die ſich rückwärts ganz um die Augen herum, und hinter denſelben wegzieht; die Hauptfarbe des Gefieders iſt tief ſchwarz; die Federn des Halſes ſind

e) Latham Ind. orn. II. p. 622. B.
f) Ueberſ. von Günther S. 131. Nr. 163. B.
g) Ueberſ. V. S. 281. B.

weich und sammetartig; auf dem Scheitel steht eine Art von aufrechtem Federbusch, der aus zusammengerollten (twisted) schwarzen Federn besteht, die längsten unter ihnen sind drey Zoll lang, die übrigen viel kürzer; der unterste Theil des Bauchs, der After und die Schenkel sind weiß; der Schwanz ist eilf Zoll lang, und besteht aus vierzehn, etwas abgerundeten, schwarzen Federn; die Füße sind stark, und dunkelfarbig oder braun.

Er variirt darin, daß er einen weißgestreiften Bauch, und der Schwanz weiße Federspizzen hat.

Diese Vögel sind häufig in **Guiana**, und werden von den Eingebohrnen **Powese** genannt, von ihrem Geschrey das diesem Wort einigermassen gleich kommt. Sie sind sehr zahlreich in den Wäldern, und machen kein geringes Nahrungsmittel derjenigen Personen, die in den Plantagen arbeiten, aus. Sie werden und die von den **Indianischen** Jägern damit versehn. Man hält auch ihr Fleisch für delikat, und schätzt es dem Truthahnfleisch gleich.

Man kann sie sehr leicht zahm machen, und man findet sie daher häufig in den **Holländischen** Besitzungen von **Berbice, Essequebo** und **Demerary**. In **Brasilien** heißen sie **Curasso**.

1. Var. A. Crax Alector. Mitu. L. l. 2. p. 735. No. 1. β. *b*)
Le Hocco du Bresil. Briss. orn. I. p. 296. No. 11.
Mitu, vel Mutu. Ray Syn. p. 52. No. 4 — Will. orn. p. 158. pl. 28.

Er hat die Größe der andern. Sein Schnabel ist gekrümmt, nicht dick, anderthalb Zoll lang, die obere Kinnlade fast viermal so groß, als die untere, fleischfarbig, mit einer weißlichen Spitze; hinter dem Ohr ist ein kahler, weißer Fleck; auf dem Kopfe stehen lange Federn, die zu einem ansehnlichen Federbusche aufgerichtet werden können; und die Federn des Kopfs, des Halses und der Brust sind dem Sammet ähnlich; das ganze Gefieder ist schwarz, den Bauch und die untere Fläche des Schwanzes ausgenommen, die braun sind, fast wie beym Rebhuhn; der Schwanz ist einen Fuß lang.

Dieß ist eine bloße Spielart vom **Männchen**, das, so wie das **Weibchen** in seinem Gefieder außerordentlich variirt, besonders im zahmen Zustande, als Hausvogel.

1. Var. B. Crax Alector. L. I. 2. p. 735. No. 1. γ.
Hocco, Faisan de Guiane. Pl. enlum. 86.

Diese unterscheidet sich durch eine weiße Schwanzspitze.

1. Var. C. Crax Alector. L. l. 2. p. 735. No. 1. δ.
Lev. Mus.

Eine andre Spielart vom **Männchen**, hat einen weißen Federbusch, mit schwarzen Spizzen; der Hals ist wechselsweise schwarz und weiß gestreift; die Brust mit schmalen, weißen, drey

b) Latham l. c. Crax Mitu Linn. Syst. XII. 1. p. 270. n. 3. B.

Das Weibchen des gekrönten Hocko.

drey Viertel Zoll von einander entfernten Streifen bezeichnet; der Vorderhals braun, bis an den Bauch; die Schenkel eben ſo; der After weiß. Dieſe Spielart iſt im Leverſchen Muſeum, wo ſich auch noch eine, faſt von der nämlichen Farbe, befindet, nur hat ſie einen abwechſelnd ſchwarz und weiß geſtreiften Schwanz.

1. Der gekrönte Hocko. (Crested C.)

Das Weibchen.

Crax Alector. rubra. L. I. 2. p. 735. No. 1. b. *i*)
Le Hocco de Perou. Briss. orn. I. p. 305. No. 16.
— — Buff. ois. II. p. 375. pl. 14. *k*)
— — Pl. enlum. 123.
Coxilitli. Ray Syn. p. 57?
Red Peruvian Hen. Albin. III. pl. 40.
Br. Mus. Lev. Mus.

Es hat die Größe des Männchens. Der Schnabel iſt aſchfarben; der Augenſtern roth; die Wachshaut und der Federbuſch, wie beym Männchen; die Federn der lezten weiß, mit ſchwarzen Spitzen; Kopf und Hinterhals dunkel aſchfarben; der Vorderhals und das übrige Gefieder rothbraun; der Schwanz einfarbig dunkelſchwarz; die Füße braun.

Var. A. Crax Alector. L. l. 2. p. 735. No. 1. *a*. *l*)

Auch das Weibchen variirt ſehr. Bey einem bemerkte ich, daß der Hals abwechſelnd ſchwarz und weiß geſtreift war, wie bey einigen Männchen; der unterſte Theil des Bauchs und der After weiß; der Schwanz einfärbig braun.

Var. B. Crax Alector. L. l. 2. p. 735. No. 1. *ß*. *m*)

Im Leverſchen Muſeum iſt noch ein anderes von röthlichbrauner Farbe, und über und über milchrahmfarben geſtreift.

Var. C. Crax Alector. L. I. 2. p. 735. No. 1. *γ*. *n*)

(ſ. die vier und ſechzigſte Kupfertafel.)

Die ſchönſte Spielart aber, die ich jemals geſehen habe, iſt in meiner eignen Sammlung. Bey dieſer iſt die Hauptfarbe rothbraun, am hellſten an den untern Theilen; der Schnabel gelb ocherfarben, mit einer braunen Spitze; die Schläfe ſind mit Federn bedeckt und ſchwarz; der Federbuſch weiß, mit ſchwarzen Spitzen; der ganze Hals mit abwechſelnden ſchwarzen und wei-

i) Latham l. c. *a*. Crax rubra Lin. XII. 1. p. 270. 2. B.
k) Ueberſ. a. a. O.
l) Latham l. c. *γ*.
m) Latham l. c. *γ*.
n) Latham l. c. *ε*.

weißen Ringen eingefaßt; der Schwanz röthbraun, mit acht oder neun gelblich weißen Streifen durchzogen, mit dunkelfarbigen Flecken getiegert (ermined), und oben und unten schwärzlich eingefaßt; die Füße gelblich; die Klauen dunkelfarbig.

Der Höcker, der mehr oder minder an der Wurzel der obern Kinnlade sichtbar wird, ist in den obigen Beschreibungen nur ganz oberflächlich berührt worden; er scheint aber bey allen Exemplaren, die ich gesehen habe, so außerordentlich verschieden zu seyn, daß ich mit Edwards glaube, ein größerer Höcker sey die Wirkung des Alters, und er sey immer bey Weibchen verhältnißmäßig kleiner, als bey Männchen; und bey leztern ist er, wenn sie noch jung sind, nur sehr wenig erhaben. Die kahlen Augenkreise ändern auch sehr ab; bey Einigen sind sie gänzlich von Federn entblößt, und haben einerley Farbe mit dem Schnabel; bey Andern sind sie zwar auch kahl, aber schwarz; und bey vielen Individuen sind sie ziemlich mit kurzen Federn bedeckt.

Diese Vögel sind in Mexiko und Peru zu hause, und im Stande der Natur haben sie vielleicht solche Farben, wie das zuerst beschriebne Männchen und Weibchen; da sie sich aber bald gewöhnen lassen, so hält man sie in allen wärmern Gegenden von Amerika und Westindien, wie wir in England Truthähne halten; und hiedurch erscheinen sie, wie diese in unzähligen Spielarten. Im wilden Zustande halten sie sich auf bergigen Plätzen auf, und sind so außerordentlich zahm, daß sie sich zu manchen Zeiten schießen lassen, ohne nur die Flucht zu versuchen. Sie leben von Früchten, und sitzen des Nachts auf Bäumen. Ihr Fleisch wird für eine sehr gute Speise gehalten.

Man hält sie sehr häufig in unsern Menagerien in England, wo sie sich sehr leicht mit anderm Federvieh vermischen, und von Brod und Körnern leben; aber unser Clima ist nicht warm genug für ihre Natur, daher können sie die Feuchtigkeit des Grases auf unsern Wiesen nicht vertragen, wodurch sie sehr zu wunden Zehen geneigt werden. In diesem Zustande leben sie oft noch einige Zeit lang; und ich habe einen Fall gesehen, wo der ganze Fuß verlohren gegangen, und am andern nur noch ein Theil einer Zehe übrig war, ehe das Thier starb.

2. Der Kugelträger. (Globose C.)

Crax globifera. L. I. 2. p. 736. No. 4. o)
Le Hocco de Curussou. Briss. orn. I. p. 300 No. 13.
Gallus indicus alius Aldrov. Ray Syn. p. 52, No. 7.
Another Indian Cock. Will. orn. p. 162.
Curassow Cock and Hen. Albin. II, pl. 31. 32.
Curassow Bird. Edw. pl. 295. f. 1. p)

Er hat die Größe der andern. Die Schnabelspitze ist aschfarben, der übrige Schnabel gelb, auf dem Rücken desselben, über den Nasenlöchern, ist ein runder Knopf, wie eine Kirsche, sehr hart und schön gelb; der Augenstern roth; die Augenkreise sind weiß; die Kopffedern lang,

o) Latham Ind. orn. II. p. 624. n. 2. B. p) Seligmanns Vögel VIII. Taf. 85. B.

lang, und bilden einen Federbuſch, deſſen Spitze vorwärts gekehrt iſt, die Federn deſſelben ſind ſchwarz, mit weißen Spitzen, die etwas gebogen ſind; das übrige Gefieder iſt ſchwarz, der untere Theil des Bauchs, der After und die Schenkel ausgenommen, die alle weiß ſind; die Füße hellroſtigroth.

Das Weibchen hat einen ſchwarzen Kopf und Hinterhals; ſein Federbuſch iſt ſchwarz und mit einem weißen Bande durchzogen; einige Halsfedern haben weiße Spitzen; der Vorderhals, die Bruſt, der Rücken und die Flügel ſind mattbraun; der obere Theil des Bauchs iſt weiß, und einige ſeiner Federn haben ſchwarze Spitzen; der untere Theil deſſelben, der After und die Schenkel ſind hellgelblichbraun; der Schwanz iſt ſchwarz, und mit vier breiten, weißen Bändern durchzogen; der Kopf am Schnabel gelb, wie beym Männchen; der Schnabel ſelbſt aber, und die Füße aſchfarben.

Er iſt in Guiana, beſonders um Curaſſow, zu Hauſe, und vielleicht, bey genauer Unterſuchung, eine bloße Spielart von einem der vorigen.

3. Der Pauxi. (Cushew C.)

Crax Pauxi. L. I. 2. p. 337. No. 5. *q*)
Le Hocco de Mexique. Briss. orn. I. p. 302. No. 14. — Buff. ois. II. p. 348. *r*)
Le Pierre de Cayenne. Pl. enlum. 78.
Pauxi. Ray Syn. p. 52. No. 5. — Will. orn. p. 161. 394.
Cushew Bird. Edw. pl. 295. f. 2. *s*)
Lev. Mus.

Er hat die Größe der andern, iſt aber von etwas ſchönern Bau. Sein Schnabel iſt roth; am unterſten Theil der Stirn ſitzt ein ſehr großer Höcker, ſo groß als eine kleine Birn, der er auch an Form nicht unähnlich iſt; er iſt ſehr hart und von ſchöner blauer Farbe; die Wurzel der Kinnlade iſt auch blau; das Gefieder iſt glänzend purpurfarbig blauſchwarz, der untere Theil des Bauchs, die untern Deckfedern des Schwanzes, und die Schwanzſpitze ausgenommen, die weiß ſind; die Füße ſind hellroth; die Klauen ſchwarz.

Das Weibchen unterſcheidet ſich bloß dadurch, daß die Theile welche beym Männchen roth ſind, bey jenem braun ſind.

Sie ſind in Mexiko zu Hauſe.

4. Der ſchreyende Hocko. (Coping C.)

Penelope vociferans. L. I. 2. p. 735. No. 6. *t*)
Le Chacamel. Buff. ois. II. p. 393. *u*)
Chachalacamell. Fernand. Hist. Av. Hist. chap. 41. — Ray. Syn. p. 163.

Der

q) Latham Ind. orn. II. p. 292. n. 3. B.
r) Ueberſ. V. S. 293. B.
s) Seligmanns Vögel. VIII. Taf. 85 f. 2. B.
t) Crax vociferans Latham Ind. orn. II. p. 625. n. 5.
u) Ueberſ. V. S. 312. B.

Der Vogel, von dem hier die Rede ist, wird von Fernandez erwähnt, der eine sehr kurze Beschreibung von ihm giebt, nämlich: Sein Schnabel ist bläulich; der Rücken braun; die Brust blau; der Bauch weißlichbraun; und der Vogel hat einerley Größe mit den andern.

Er ist in Mexiko zu Hause, und schreyt wie andere Hühner, oder vielmehr wie die ganze Familie des Hühnerhofs zusammen, denn er schreyt so laut, und so in Einem weg, daß Einer oft mehr Lerm macht, als alle übrigen zusammen. Sein Mexikanischer Name, Chachalakametl, bedeutet Schrey-Vogel. Er soll sich in bergigen Gegenden aufhalten, wie die Hockos, und daselbst auch seine Jungen aufziehen.

5 v). Der Cumanische Hocko. (Cumana C.)

Penelope cumanensis. L. I. 2. p. 735. No. 3. w)
Crax cumanensis. Jacquin's Beytr. No. 19. p. 25. tab. 10.

Er hat die Größe der Truthenne. Sein Schnabel ist dunkelfarbig; die Hauptfarbe des Gefieders ist schwarz; die Federn auf dem Scheitel sind weiß und lang, und bilden einen Busch, der hinten herabhängt; die Brust ist mit weißen Flecken bezeichnet; die Füße sind roth; die Klauen schwarz.

Er ist in der Nachbarschaft des Broonoko, in Südamerika, besonders um Cumana, zu Hause.

6. Der pfeifende Hocko. (Piping C.)

Penelope Pipile. L. I. 2. p. 734. No. 4. x)
Crax Pipile. Jacquin's Beytr. No. 20. p. 26. tab. 21.

Dieser Vogel ist, an Größe und Hauptfarbe des Gefieders, dem vorigen nicht unähnlich; die Wachshaut, die Augenkreiße und der Scheitel sind weiß; der Kopf aber ohne Federbusch; unter der Kehle hängt ein Fleischzapfen von dunkelblauer Farbe; der Rücken ist rothbraun, mit schwarzen Flecken; an den großen Deckfedern der Flügel ist eine große Mischung von Weißem; der Bauch ist schwarz; die Füße sind roth.

Er findet sich an einerley Orten mit dem lezten, von dem er vielleicht, bey genauern Bekanntschaft eine Spielart oder Geschlechtsverschiedenheit seyn kann. Er hat eine pfeifende Stimme.

7. Die

v) Dieser und die beyden folgenden, sind in d. Suppl S. 205. 206. hinzugekommen.

w) Penelope cumanensis Latham Ind orn. II. p. 620. Nach diesen Synonym ist der Vogel zweymal aufgeführt, und zwar steht er oben als Jaku Nr. 4. unter den Penelopearten, die aber in der Synopsis noch nicht von den Truthühnern getrennt sind, am rechten Orte, und hier fällt er weg. B.

x) Penelope pipile. Latham Ind. orn. II. p. 620. n. 2. B.

7. Der gehelmte Hocko. (Galeated C.) *)

Le Hocco à tête calleuse. Briss. orn. I. p. 87. ed. 8vo.

Dieser hat beynahe die Größe des Truthahns. Seine Hauptfarbe ist schwarz, der After und die untern Deckfedern des Schwanzes ausgenommen, die weiß sind; auf dem Scheitel sizt eine hornartige Substanz, ohngefähr zwey Zoll hoch, und am untern Theile breit; oben endigt sie sich in eine stumpfe Spitze, fast wie ein Helm; Schnabel und Füße sind roth.

Er ist in Curassao zu Hause.

Zusatz.

8. Der nacktstirnige Hocko.

Crax nudifrons. Lichtensteins Hamburgisches Naturalienverzeichniß 1793. S. 37. No. 338.

— — Meyers Zool. Annalen. Bd. I. S. 158.

Er ist drey Fuß, drey Zoll lang. Die Wachshaut fehlt; der Schnabel ist roth, mit einem Oberkiefer, welcher sich über den Nasenlöchern halbherzförmig erhebt; der Leib ist schwarz, grün güldisch überlaufen; der Steiß braun; die Spitzen der äußern Schwanzfedern sind weiß; Füße und Nägel schmuzig grau.

Bewohnt Brasilien.

Es ist keine bloße Spielart des Pauxi, ob er gleich demselben im Ganzen ähnlich ist. Mehr scheint er sich der Art Penelope zu nähern, wenn nur die Kehle nackt wäre.

Vielleicht daß er gar das Weibchen vom vorhergehenden Vogel ist. B.

Ein und funfzigste Gattung. Fasan.

Diese Gattung hat einen erhabenen kurzen und harten Schnabel; der Kopf ist an den Seiten mehr oder weniger mit kahlen Fleischlappen versehen, die sich bey einigen aufwärts bis an den Scheitel hinziehen, und unten so weit, daß sie unter jeder Kinnlade herabhängen. Die Füße sind (mehrentheils) hinten mit einem Sporn versehen.

1. Das wilde Huhn. (Wild Cock.)

Phasianus Gallus. L. I. 2. p. 737. No. 1. z)
Coq et Poule sauvages des Indes. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 153. pl. 94. p. 160 pl. 95. a)

Die Länge dieses Vogels ist zwey Fuß, ein Zoll. Der Schnabel ist fünf Viertel Zoll lang; der Körper um ein Drittheil kleiner, als beym Haushahn; der Kamm ist groß, gezähnelt und lebhaft roth; die Lappen (wattles) wie beym gemeinen Hahn; die Schläfe und eine längliche Linie zwischen dem Federbusch und dem Auge kahl, und alle kahlen Theile sind fleischfarben; hinter den Augen ist ein perlfarbner Fleck, von der Größe und Gestalt des Nagels am kleinen Finger, der aus sehr kurzen Federn besteht; die Federn am Kopf und Hals sind lang und schmal, und die längsten stehn unten, ihre Fahnen sind zu beyden Seiten gleich, die Schäfte breit, und so sichtbar, daß sie der Feder das Ansehen geben, als wäre sie die Mitte herab gestreift, an der Wurzel ist die Farbe grau, in der Mitte schwarz und am Ende weiß, wo der Schaft ausgebreitet ist, und wie ein gelblicher Fleck, von glänzendem Aussehen, von hornigter Substanz, wie an den Flügeln des Seidenschwanzes, erscheint; die Federn an den obern Theilen des Körpers sind lang und schmal, graulich, und mit Weiß durchzogen; an jeder Seite eines weißen Streifs ist ein schwarzer; die Brust, die Seiten und die Schenkel sind gleich den obern Theilen, an den Schenkeln aber sind die Federn am breitsten; die Federn an der Brust spielen ins Gelbrothe, und haben ein glänzendes häutiges Ansehen, wie jene des Halses; die Flügel reichen bis an den Anfang des Schwanzes; die Schwungfedern sind dunkelschwarz; die kleinern Deckfedern, wie der Rücken, die größern lang, schmal und steif, von Farbe gelbroth, ins kastanienbraune spielend, mit schwarzen und weißen Queerstreifen; die Deckfedern des Schwanzes violet, mit polirtem Glanze; der Schwanz selbst, wie gewöhnlich bey den Hähnen;

y) Crax galeata. Latham Ind. orn. II. p. 624. n. 4. B.
z) Latham Ind. orn. II. p. 625. n. 1. B.
a) Uebers. von Büffons Vögeln. IV. S. 156. 3. Meine N. G. Deutschlands. III. S. 395. N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 463. B.

nen; die Füße fünf Zoll lang, und hinten mit einem großen gebogenen, einen Viertels Zoll langen Sporn versehen.

Die Henne ist um ein Drittheil kleiner, als der Hahn, und hat weder Kamm noch Lappen. Kopf und Hinterhals sind grau; Wangen und Kehle weißlich; der untere Theil des Halses bräunlich, mit gelbröthlich weißen Querstreifen; die vordern Theile, die Brust und der Bauch braun, mit schmutzigweißen Streifen; die Seiten des Körpers grau; die Federn am Rücken hellbraun, mit Braun überzogen; längs den Schäften hinab hell gelbroth; die Deckfedern der Flügel eben so; die Schwungfedern inwendig schwärzlich, und außen bräunlich, mit grauen Tüpfeln; der Schwanz graulich; die Füße schuppig und grau; statt des Sporns ist hinten ein hervorstehender Knopf.

Dieß ist, nach Sonnerat wahrscheinlich der Hauptstamm, von dem alle unsere zahmen Spielarten entsprungen sind. Sie sind in den Wäldern von Indien anzutreffen.

Es sind nur wenige Orte, wo die Reisenden nicht Hähne und Hennen entweder wild oder zahm, angetroffen hätten; besonders wird gesagt, daß sie sich auf St. Jago, Pulo Condore [b]) der Insel Timor, den Philippinischen und Molukkischen Inseln, Sumatra und Java [c]), Neuguinea [d]) Tinian [e]), und den meisten Inseln der Südsee [f]) fänden.

Was Europa betrifft, so ist hierüber wenig zu sagen nöthig, weil man allenthalben Spielarten ohne Ende sieht, und ihre Lebensart jedermann hinlänglich bekannt ist. Inzwischen hat man doch bemerkt, daß sie am liebsten im wärmern Gegenden brüten. In sehr kalten, wo sie zwar auch leben und gedeihen, hören sie aber auf, sich fortzupflanzen [g]).

b) Sie sind wie die unsrigen, aber viel kleiner; nur so groß, als eine Krähe. Die Hähne krähen wie unsere, aber viel feiner (more small) und schärfer. Damp. Voy. Vol. I p. 392. — Unsere letztern Reisenden haben zwey wilde daselbst geschossen. Ellis's Narrat. II. p. 340.

c) Die von Sumatra und Java sind beträchtlich groß, (man nennt sie die St. Jago Zucht) und die Hähne so schlank, daß sie mit dem Schnabel auf einen gewöhnlichen Speisetisch picken können. Wenn sie müde sind, so lassen sie sich auf das erste Fußgelenk nieder, und sind dann doch noch höher, als die gemeinen Hühner. Hist. sumatr. p. 98.

d) Aber nicht zahm. — Bey Gelegenheit der Eyer wird gesagt: „sie tödten einen Hahn, der mit Schwierigkeit verschafft worden ist, und dann ist es eine Seltenheit.“ Forst. Voy. p. 105.

e) Die Hühner, die wild angetroffen wurden, „liefen ohne vieles Geräusch herab, denn sie konnten kaum weiter als hundert Ellen auf einem Flug fliegen.“ Ansons Voy. p. 416.

f) Forster sagt, sie seyen in Menge auf der Osterinsel, den Societäts- und freundschaftlichen Inseln, auf beyden letztern von bewundernswürdiger Größe. Nicht selten auf den Marquesas, den Hebriden, und in Neukaledonien; auf den Low-Inseln aber hätten sie gar keine. Observ. p. 193. — Enten und Hühnervieh ist zahlreich auf den Sandwichinseln. Cook's Journal. p. 229.

g) In den nördlichen Theilen Sibiriens brüten sie nicht, und in Grönland hat man sie bloß als Seltenheiten. Faun. Groenl.

1. Var. A. Das Haushuhn. (Domestic C.)

Phasianus Gallus, domesticus. L. I 2. p. 737. No. 1. β. *h*).
Phasianus Gallus. Faun. Suec. No. 199.
Le Coq et la Poule. Briss. orn. I. p. 166. No. 1.
Coq commun. Buff. ois. II. p. 116. pl. 2. *i*)
— — Pl. enlum. 1.
Dunghill Coq et Hen. Ray Syn. p. 51. A. 1. — Will. orn. p. 154. pl. 26. — Albin. III. pl. 32. *k*)
Br. Mus. Lev. Mus.

Hievon giebt es so viele Spielarten, daß es ein endloses Geschäfte wäre, sie zu beschreiben; inzwischen scheint die hier von oben angeführten Schriftstellern erwähnte, den größten Kamm von allen, mit acht oder neun zahnförmigen Einschnitten zu haben; die kahle Stelle um die Augen herum ist breiter, und die Kehllappen hängen sehr tief herab; der Kopf, der Hals, der Rücken und die Deckfedern der Flügel sind orangefarben; die größern Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern und die untern Theile weiß; die langen sichelförmigen Schwanzfedern blauschwarz.

Die Vögel dieser Art variiren unendlich im Colorit, und sind außerordentlich schön; zuweilen ganz weiß. An der Spitze derselben sollte derjenige stehen, der unter dem Namen Kampfhahn (Gamecock) bekannt ist, und der wegen seines Muthes ausgesucht wird, worin er sich bloß von den übrigen unterscheidet, und hauptsächlich zu der Ergötzlichkeit des Hahnengefechts gebraucht wird *l*). Denn es ist gewöhnlich, vor dem Kampfe sein Gefieder so zu verstümmeln, daß diejenigen, die das Thier nur in seinem vollkommenen Zustande gesehen haben, es gar nicht mehr kennen. Die Absicht dieses Abstutzen des Vogels (trimming), wie es genannt wird, ist sowohl ihn leichter, folglich thätiger an sich selbst zu machen, als auch seinem Gegner weniger Berührungspunkte zu geben.

Die Beförderer dieses Spiels wenden große Sorgfalt auf die Brut, so wie nachher auf das Füttern derselben, wie die Dorfjunker (Gentlemen of the turf) in Rücksicht ihrer Wettrenner.

Die Englischen Kampfhähne *m*) übertreffen unstreitig die Hähne aller andern Nationen. Das Hahnengefecht ist in England in größerm oder geringern Grade ausgeübt worden, seitdem es die Römer *n*) zuerst eingeführt haben. Unter einigen Regierungen *o*) hat man sich

b) Latham Ind. orn. I. c. *e*. B.
i) Uebers. IV. S. 78. B.
k) S. auch die oben Note *a*) citirten Schriften. B.
l) Eine artige Abhandlung über diesen Gegenstand von Herrn Poppe, in Archaeol. Vol. III. n. 19
m) Coq d'Angleterre Briss. orn. I. p. 171. — Buff. ois. II. p. 120. — Frisch. tab. 129. 130. — „Le Coq d'Angleterre est superieur à celui de France pour le combat.“ Hist. de Ois.
n) Die ursprüngliche Einführung desselben soll griechisch seyn. Archaeol.
o) Edward III. mißbilligte und verbot das Hahnengefechte. Oliver Cromwell that das Nämliche 1654.

ſich Mühe gegeben, es zu unterdrücken, da man es hingegen unter andern vollkommen ſanktionirt hat, indem man ein Theater *p*), zur Bequemlichkeit der Zuſchauer errichtete.

Ich finde auch, daß andere, von uns weit entfernte Nationen, dieſes Spiel lieben; ſo wird es z. B. in China und vielen Ländern Indiens *q*), zum Zeitvertreib vorgenommen. In Sumatra ſtutzen (trim) ſie die Hähne *r*) zu dieſem Spiele nicht, wie in England, auch bedienen ſie ſich nicht der nämlichen Art von künſtlichem Sporn, (oder gaffle, wie er genannt wird), ſondern er iſt flach und ſcharf geränder, gleich einer krummen Lanze, oder vielmehr gleich einer Säbelklinge *s*), und eine äuſſerſt ſchädliche Bewaffnung. Dieſer Sporn iſt nicht auf einen beſondern Theil des Fußes eingeſchränkt, ſondern er ſteht höher oder tiefer, nach dem Gewicht oder der Größe der Vögel, die auf einander losgelaſſen werden, damit keines mit irgend einem Vortheil gegen den andern fechten könne; und man verſichert, dieſes Spiel werde zu Sumatra zu einem ſo hohen Preiſe geſpielt, daß man Beyſpiele weiß, wo ein Vater ſeine Kinder oder ſein Weib, und ein Sohn ſeine Mutter und Schweſtern auf dem Ausgang eines Kampfes geſetzt hat *t*).

Es ſcheint ganz unnöthig zu ſeyn, ſich über die Lebensart unſrer gemeinen Hähne und Hennen weitläuftig herauszulaſſen, da jede gute Hauswirthin ſich ſelbſt im Stande befindet, einen Verſuch mit dem Ausbrüten der jungen Hühnchen unter den Hennen zu machen; vielleicht iſt es aber nicht ſo allgemein bekannt, daß ſie in warmen Ländern ohne den Beyſtand der Hennen, mittelſt beſonders hiezu regulirter Hitze, ausgebrütet werden. Dieß geſchieht in Oefen, oder vielmehr in geheizten Kammern, vorzüglich in Egypten *u*), wo ſie zu Tauſenden ausgebrütet werden; und dann kommen zur beſtimmten Zeit Leute aus allen Gegenden, um ſie zu kaufen, und ziehen ſie mit geringer Sorgfalt, vom Ey aus, auf. Ob dieß auch in kältern Climas angehe, iſt, wie ich glaube, bisher noch nicht ernſtlich verſucht worden; es iſt aber zu fürchten, daß es ohne glücklichen Erfolg geſchehen möchte.

Die

p) Das Cockpit zu Whitehall, das Heinrich VIII. errichtete. König Jacob I. war ein groſer Liebhaber von Hahnengefechten.

q) Sonnerat bemerkt, es gäbe zwey Racen von Hähnen in Indien; die eine hielt man bey den Häuſern, bloß der Seltenheit wegen, (weil die Einwohner kein Fleiſch eſſen;) die andere werde zum Kampf aufgezogen, wovon ſie ſehr große Liebhaber ſind. Dieß kann aber gewiß nicht allgemein ſeyn; wenigſtens iſt es nicht wahrſcheinlich, daß es eine Beluſtigung derer ausmache, die an die Seelenwanderung glauben.

r) Auch thaten dieß die Alten nicht. Dieß beweiſen zwey alte Gemmen, die ſich auf dieſes Spiel beziehen, ſ. Archaeol. Vol. III. pl. 9. Inzwiſchen ſieht man Hähne mit vollem Gefieder auf vielen Gemmen, obſchon nicht in der nämlichen Bedeutung, wie die zwey obigen. ſ. Wild's Gemms select. No. 110. 111. 143. — August. Gemm. No. 199. 202. 203. — Auch drey hieroglyphiſche, die an den Füßen der Hähne angebracht, und aus M. Angelo's Gemme Antiche genommen ſind, in Gentl. Magaz. 1747. p. 388.

s) Vielleicht iſt dieß das Inſtrument, das Fryer ein Scheermeſſer nennt: er ſagt, im Königreiche Viſapou, in Oſtindien, pflege man Gefechte mit Hähnen anzuſtellen, die ſo groß, als Truthähne ſeyen, und die man mit Scheermeſſern, welche man ihnen mit der Fläche (flat) unter die Klauen binde, bewaffne. ſ. Fryer's Trav. p. 175.

t) Hist. Sumatr. p. 238. — Gentl. Magaz. 1770 p. 564.

u) Pococke's Trav. I. p. 38. No. 60. pl. 71.

Die *v*) Veränderungen in dem Gefieder der Hühner, ſind in der Synopſis erwähnt worden; ich finde aber, daß dieß nicht bloß bey ſolchen Weibchen der Fall iſt, die gelegt oder über dem Neſte geſeſſen haben. Herr L. Porter ſagt mir, er habe einmal ein ſchwarzes Kampfhuhn gehabt, das ein Jahr grau gefleckt und das folgende ganz weiß war. Man bemerkte, daß Sporen an ſeinen Füßen wuchſen, und es krähte zuweilen wie ein Hahn. Dem ungeachtet legte es Eyer, und brütete einige Jahre nachher. Was ihr Alter betrifft, ſo würde das Hühnervieh, wenn man es ihm geſtattete, ohne Zweifel ſehr lange leben. Zu Highberries, in Cumberland, lebte eine Henne, die Ao. 1777. dreyßig Jahr alt, von vollem Gefieder und ſehr fett war; ſie hatte aber ſchon ſeit ſechs oder ſieben Jahren keine Eyer mehr gelegt *w*).

1. Var. B. Das Haubenhuhn. (Crested C.)

Phaſianus Gallus, cristatus. L. l. 2. p. 737. No. 1. γ. — Faun. Suec. No. 199. B. — Ray Syn. 31. A. 1. Var. 1.
Le Coq huppé. Briss. orn. I. p. 169. A. — Buff. ois. II. p. 116. — Pl. enlum. 49.
Copped Hen. Will. orn. p. 156.

Dieſes unterſcheidet ſich von dem gemeinen dadurch, daß es einen Buſch von Federn, ſtatt des Kamms auf dem Kopfe hat; die Lappen aber ſind wie gewöhnlich *x*). Dieſe Spielart iſt gemein in England, und hat immer einen bald größern, bald kleinern Federbuſch; bey einigen iſt er ſo groß, daß er über die Augen herabhängt, und dadurch faſt das Geſicht verſteckt. Sie iſt etwa ſo verſchieden am Colorit, als die erſte Art.

1. Var. C. Das fünfzehige Haushuhn. (Carking C.)

Phasianus Gallus, pentadactylus. L. l. 2. p. 737. No. 1. δ.
Le Coq à cinque doigts. Briss. orn. I. p. 169. B.
— — Buff. ois. II. p. 124.
— — Frisch tab. 127. 128.
Lev. Mus.

Dieſe Spielart hat zwey Zehen rückwärts, ſtatt einer; außerdem iſt ſie von andern nicht unterſchieden. Man muß dieß für ein bloßes Naturſpiel anſehen; denn es iſt kein einziger Vogel von dieſer Ordnung bekannt, der in ſeinem natürlichen Zuſtande zwey Zehen rückwärts hätte *y*). Dieſe Race iſt gemein in England, vorzüglich aber glaubt man in Darking, ſin

v) Zuſ. aus dem Suppl. S. 207.
w) Herr Tunſtall.
x) Sie müſſen einen Bart haben, ſtatt der Lappen, wenn ſie ſchön ſeyn ſollen. B.
y) Das Seidenhuhn (Silk-Fowl) hat oftmals zwey Hinterzehen, wie auch hin und wieder andere Arten. Ich beſitze einen Fuß von einem Huhn dieſer Art, der drey Hinterzehen hat; das, wie mir geſagt wurde, nicht ſelten iſt. — In Sire A. Levers Muſeum iſt ein Sperlings-Hahn mit ſieben Klauen an jedem Fuße.

in Surray [z]), daher sie auch den Namen: Hühner von Darking, erhalten hat.

Die [a]) Hühner von Darking sind, wie man bemerkt, viel größer als die von andern Orten in England, und wiegen oft sieben bis acht Pfund, wenn sie gerupft sind, obschon sie hier und da noch viel mehr wiegen. Einer meiner Freunde schickte eine Ladung solcher Hühner nach Schottland, wo einer von den Hähnen beynahe vierzehn Pfund wog.

1. Var. D. Das Strupphuhn. (Frizzled C.)

Phasianus Gallus, crispus. L. I. 2. p. 737. No. 1. ε. — Faun. Snec. No. 199. D.
Le Coq frisé. Briss. orn. I. p. 273. No. 3. pl. 17. f. 1. (der Hahn) — Buff. ois. II. p. 121. No. 13. — Frisch tab. 135. (die Henne.)
Crisped or Friesland Hen. Ray Syn. p. 51. A. 1. No. 4. — Will. orn. p. 156. — Bancroft Guian. p. 175. — Fermin. Surin. II. p. 159.
Br. Mus. Lev. Mus.

Diese Spielart variirt auch an Colorit, wie die andern, und unterscheidet sich durch die Federn, indem das Ende einer jeden aufgekräuselt ist, so daß sie in der Entfernung wie Wolle aussehen, oder vielmehr, als wenn der Vogel aus dem Wasser käme.

Sie befindet sich in Java, Japan, und durch ganz Asien, wo sie wahrscheinlich einheimisch ist, besonders weil diese jungen Hühnchen viel empfindlicher gegen die Kälte, und viel schwerer aufzuziehen sind, als andere in England; doch sind sie gemein genug, werden aber selten gehalten, außer der Abwechselung wegen.

Man trifft sie auch in Surinam und Guiana an, und sie scheinen die einzige Art zu seyn, die Fermin und Bankroft vorgefunden haben. Der letzte sagt, sie seyen kleiner, als unsere Hühner, und wurden aus dem Innern des Landes gebracht, wo sie die Indianer aufziehen, und für gewiß glauben, daß sie diesem Theile von Amerika eigen seyn. Ihr Fleisch soll fest und schmackhaft seyn.

1. Var. E. Das Kluthuhn (Rumpleſs C.)

Phasianus Gallus, ecaudatus. L. I. 2. p. 737. No. 1. ζ. — Faun. Suec. No. 199. γ.
Le Coq sans croupion, ou de Perse. Briss. orn. I. p. 174. No. 5. — Buff. ois. II. p. 122. No. 16. — Frisch tab. 131. 132.
Persian Fowl, or Rumkin. Ray Syn. p. 51. A. 1. No. 3. — Will. orn. p. 156. No. 6. pl. 26.

Dieser seltsamen Spielart (denn sie sieht sonderbar genug aus,) fehlt so gar die Spur eines Schwanzes [b]); und bloß hiedurch unterscheidet sie sich von andern. Wie diese Abänderung

z) Sie werden in Thüringen auch angetroffen; auch ich habe davon mehrere besessen. Sie pflanzen sich in dieser Abart fort und ich habe sie mit sechs Zehen bekommen. B.

a) Zus. aus dem Suppl. S. 207.

b) Wenn man Eyer von einem beschwänzten Hahne

derung in England entſtanden iſt, weiß ich nicht; man hat aber bemerkt, daß die von England nach Virginien übergebrachten Hühner, die Schwänze verloren haben c).

1. Var. F. Das Zwerghuhn. (Divarf C.)

Phasianus Gallus, pumilio. L. I. 2. p. 737. No. 1. γ.
Le Coq nain. Briss. orn. I. p. 171. No. 2.
— Buff. ois. II. p. 116. No. 5.
— Frisch tab. 133. 134.
Creaper, or Dwarf Hen. Ray Syn. p. 51. A. 1. — Will. orn. p. 156. pl. 26.

Dieſe haben außerordentlich kurze Füße, und werden deßwegen Zwerge genannt; auch ſind ſie außerdem noch beträchtlich kleiner, als andere Hühner, und einige nicht größer, als eine große Taube. Mit dieſer Race ſind der Ucoho, oder der Madagaskariſche Hahn d). und die Henne von Iſthmus, von Darien e) verwandt, die gleichfalls ſehr klein iſt, einen Kreis von Federn um die Füße herum, einen dicken Schwanz, den ſie gerade trägt, und ſchwarze Flügelſpitzen hat.

Andere Hühner, die aus Kamboge f) kommen ſollen, und jetzt auf der Philippinen ſich befinden, haben ſo kurze Füße, daß ſie die Flügel auf der Erde ſchleppen.

1. Var. G. Das Huhn von Bantam. (Bantam C.)

Phasianus Gallus, pusillus. L. I. 2. p. 737. No. 1. δ.
Le Coq de Bantam. Briss. orn. I. p. 172. B. — Buff. ois. II. p. 119. No. 8.
Bantam Cock et Hen. Albin. III. pl. 33. 34. — Brown. Jam. p. 471.

Dieß iſt eine kleine Race, und ſehr mit der letztern verwandt; bey einigen aber ſind die Federn an den Füßen und Zehen ſo lang, daß ſie den Vogel ganz am Gehen hindern.

Einige ſchätzen dieſe Race ſehr, in Rückſicht der Menge Eyer, die ſie legt, ohne zu ſizzen (without sitting); aber die Kleinheit derſelben, ſo wie die geringe Menge Fleiſch, die ein Vogel von ſolcher Größe hat, haben es verhindert, daß ſie nicht allgemein zur Tafel eingeführt wurde. Einige nennen ſie geſtiefelte Hühner (booted Fowls).

Ich

ne und einer Kluthenne ausbrüten läßt, ſo entſtehen oft monſtröſe Schwänze, und man trifft daher auf den Bauernhöfen viele Kluthühner an, die einzelne kurze herabhangende Schwanzfedern haben. B.

c) Phil. Trans. Vol. XVII. p. 992.

d) Le Coq de Madagascar. Hist. des Ois. II. p. 117. No. 4. Dieſer ſoll dreyßig von ſeinen eignen Eyern auf einmal bedecken.

e) La Poule de l'Isthme de Darien. Hist des Ois. II. p. 118. No. 6.

f) Hist. des Ois. II. p. 118. — Büffon erwähnt auch einer Henne in Brittanien die immer hüpfen muß, weil ihre Füße ſo kurz ſind. Sie hat die Größe der gemeinen Henne, und wird ihrer großen Fruchtbarkeit wegen gehalten.

Ich habe einige ohne alle Federn an den Füßen geſehen; dergleichen aber nennen die Kenner in dieſem Fache Baſtarde [g]). Die geſtiefelten Füße ſieht man auch an großen Hühnern; vielleicht durch eine vermiſchte Brut.

1. Var. H. Das rauhfüßige Huhn. (Rough-footed C.)

Phaſianus Gallus. plumipes. L. I. 2. p. 737. No. 1. *.
Le Coq patu. Briss. orn. I. p. 272. A. — Frisch. tab. 136. (der Hahn) 137. (die Henne.)
Rough-footed Cock et Hen. Will. orn. p. 156.

Dieſe kleine Art unterſcheidet ſich bloß dadurch, daß ſie Federn an den Füßen hat, bis an die Zehen.

Die drey letztern verlohnt es kaum der Mühe zu trennen [h]).

1. Var. I. Das Türkiſche Huhn. (Turkish C.)

Phasianus Gallus, turcicus. L. I. 2. p. 737. No. 1. κ.
Le Coq de Turquie. Briss. orn. I. p. 170. D.
— — Buff. ois. II. p. 120. No. 11.
Turkish Coq et Hen. Will. orn. I. p. 156. — Aldrov. Av. Vol. II. p. 314. (der Hahn.) p. 315. 316. (die Henne.) — Johnston Av. pl. 30.

Alles, was wir von dieſem Vogel wiſſen, iſt, daß er von unſern Hähnen vorzüglich in der Mannigfaltigkeit und Schönheit ſeines Colorits verſchieden iſt.

1. Var. K. Das Paduaniſche Huhn. (Paduan C.)

Phasianus Gallus, patavinus. L. I. 2. p. 737. N. 1. λ.
Le Coq de Padove. Briss. orn. I. p. 170. C.
— Coux, ou de Padove, Buff. ois. II. p. 125. No. 9.
Gallina vertice tuberoso. Pallas spicil. IV. p. 20. tab. 3. fig. 2.? i)
Padua Cock et Hen. Will. orn. p. 156. — Aldrov. Av. II. p. 310. (der Hahn. p. 311. (die Henne.) — Johnston. Av. tab. 29.

Dieß ſind ſehr große Hühner, die oft acht bis zehn Pfund wiegen. Sie haben einen großen Kamm auf dem Kopfe, der oft gedoppelt iſt, in Form einer Krone; außerdem noch ei-

g) Ich habe ſie von befiederten ſo kahl ausfallen ſehen, und beſitze ſelbſt ein Weibchen mit befiederten Füßen, das dergleichen ausbrütet. B.
h) Man ſieht auch faſt keinen Unterſchied. B.
i) Dieſe ſteht im Syſtem l. c. als eine eigene Spielart: Ph. G. tophaceus. No. 1. ξ. (So auch in Latham Ind. orn. II. p. 628. I. v. Hier ſteht auch noch Var. ξ. Ph. G. cornutus.) Sie iſt auf dem Kopfe mit Hörnern verſehen. Ger. orn. II. t. 213. „So macht man bey uns die Kapaunen, deren es auch wohl einer iſt, indem man ihnen den Kamm abſchneidet, und den Sporn in die friſche Wunde eindrücket, wo er fortwächſt. B.

ne Art von Federbuſch, der bey den Hennen am ſichtbarſten iſt. Ihre Stimme iſt ſtärker und rauher, als bey andern Hühnern.

Es iſt bemerkenswerth, daß die großen Hühner von Baha [k]) ihr volles Gefieder nicht bekommen, bis ſie halb gewachſen ſind. Eben ſo verhält ſichs mit dem Paduaniſchen Hahne, daß er ſein Gefieder ſpäter bekommt, als andere Hühner.

Was die Paduaniſche Brut mit den großen Köpfen betrifft, ſo hat Pallas dargethan, daß dieſe durch eine Krankheit veranlaßt werden; denn als er dem Kopf im Waſſer macerirte, ſo ſchien die Höhle gröſſer, als gewöhnlich, und die Knochen der Hirnſchaale waren mit kleinen Löchern durchbohrt, als wenn ſie kariös wären. Das Gehirn ſelbſt war auch gröſſer, als gewöhnlich, und füllte den ganzen Raum aus. Man hat auch bemerkt, daß dergleichen Vögel ſehr dumm ſind, und nicht lange leben.

1. Var. L. Das Mohrenhuhn. (Negro C.)

Phasianus Gallus, morio. L. I. 2. p. 737. No. 1. *β*.
Le Coq negre, ou le Mozambic. Briss. orn. I. p. 174. No. 4. — Buff. ois. II. p. 122. No. 15.
Blackamoor Pullet. Fryer's Trav. p. 53.
Mozambic Hen. Will. orn. p. 387.

Bey dieſer Spielart ſind der Kamm, die Kehllappen, die Haut und die Knochenhaut ſchwarz; das Gefieder gröſtentheils eben ſo, und das Fleiſch ſelbſt, wenn es gekocht iſt, ſoll ſo ſchwarz, wie Dinte, ſeyn [l]).

Man findet dieſe Vögel in der Provinz Mozambique, in Afrika, an der Küſte von Malabar, in Siam, u. ſ. w. und ſie ſollen ſehr gut zu eſſen ſeyn, obſchon ſie aufs erſtemal einen Europäiſchen Gaumen beleidigen müſſen [m]).

Bey einigen ſoll das Fleiſch weiß ſeyn [n]).

1. Var. M. Das Wollhuhn. (Silk C.)

Phasianus Gallus, lanatus. L. I. 2. p. 737. No. 1. *γ*.
Le Coq du Japon. Briss. orn. I. p. 175. pl. 17. fig. 2.

La

k) Damp. Voy. III. p. 76. — Hist. Sumatr. p. 98.

l) „Celles qui ont la chair et les os noirs sont les meilleurs.“ Voy. de Siam. Vol. I. p. 279.

m) Sie ſind in Deutſchland keine Seltenheit mehr. Von ihrer Abſtammung ſ. meine N. G. Deutſchlands. III. S. 409. Note **) B.

n) „Die äußere Haut war vollkommen ſchwarz; die Knochen auch ſo ſchwarz, wie Achat; aber weißer, zärter und ſchmackhafter konnte nichts ſeyn, als das Fleiſch unter der Haut.“ Fryer Voy. de Siam. Vol. I. p. 279. — Es giebt auch Hühner mit ſchwarzem Kamm und ſchwarzer Haut in Siam, die weißes Fleiſch haben. Harris's Coll. Voy. II. p. 468.

La Poule à duvet du Japon. Buff. ois. II. p. 121. — Pl. 98.
Lev. Mus.

Der Körper dieſer Spielart iſt gänzlich mit Federn bedeckt, deren Fahnen ſo getrennt (disunited) ſind, daß ſie wie Haare ausſehen; die Hauptfarbe iſt weiß; und die äußere Seite der Füße bis an die Zehen mit Federn bedeckt.

Sie iſt in Japan *) zu Hauſe, und wird ſelbſt in China für ſelten gehalten, wo ſie die Cantoneſer in Käſten zum Verkauf an die Europäer herumtragen.

Sie ſcheint zu variiren. Ich habe einige rein weiße geſehen; andere ſchmutzig braune; alle aber hatten dunkel gefärbte Füße, an denen mehrentheils ein dicker, ſtarker und kurzer Sporn ſich befindet, ob ich gleich einen Hahn ohne denſelben geſehen habe; die Füße ſind nicht immer befiedert.

In der Sammlung Karl Boddam's Esq. iſt ein ſolcher, mit zwey Hinterzehen *), und einem ſtumpfen, flachen, über einen Zoll langen Sporn.

2. Der prächtige Faſan. (Superb Pheaſant.)

Phasianus superbus. L. l. 2. p. 744. No. 7. *q*)
— — Linn. Mantiss. 1771. p. 526.

Der Schnabel iſt roth; an der Stirn iſt ein rother Fleiſchlappen (caruncle), von etwas rundlicher Form, und zwey bluthrothe Kehllappen unter dem Kinne, wie beym Haushahn; der Scheitel iſt grün; am Hinterkopfe iſt ein zuſammengefalteter, blauer Federbuſch; der Hinterhals iſt grün, und zu beyden Seiten mit langen, bunten Federn geziert, die vom Halſe abſtehen, und ſich rückwärts biegen; die Schultern ſind grün, mit weißen Flecken; die Flügel roth; die großen Schwungfedern blau; der Körper roth; der Schwanz lang und keilförmig, ſeine Federn blau und roth melirt, die Deckfedern deſſelben von verſchiedenen Farben, und fallen über die Seiten deſſelben herüber; die Füße ſind gelb und ohne Sporne.

Dieß iſt ein von Linné, nach verſchiedenen gemahlten Abbildungen auf Papiertapeten und Chineſiſchen Porzellan (Chinaware) beſchriebener Vogel; und eine fernere Abbildung und Beſchreibung in einem Chineſiſchen Buche, das ihm zu Geſichte kam, beſtätigte dieſes.

Ich habe kürzlich die Abbildung einer Schwanzfeder eines Vogels aus der Faſangattung geſehen, die über ſechs Fuß lang war und wahrſcheinlich irgend einen, bisher noch nicht bekannt gewordenen Vogel gehört hatte. Die Abbildung beſitzt Major Davies, der ſie von der Originalfeder nahm, deren zwey ein Herr aus ſeiner Verwandſchaft beſaß, und die aus China gebracht worden waren. Sie gleichen an Struktur vollkommen den zwey mittlern Schwanz-

*) In Japan iſt eine Strafe darauf geſetzt, wenn man einen Hahn tödtet. Kaempfer Japan. p. 581.

p) Osbeck bemerkte dieſen Umſtand bey den Hühnern von Siam. Voy. Vol. II. p. 255.

q) Latham Ind. orn. II. p. 628. n. 2. B.

Schwanzfedern des Goldfasans (No. 5.) die Hauptfarbe derselben war blaugrau, an den Seiten gelbrothmilchrahmfarben gerändet, und zu beyden Seiten des Schaftes mit zahlreichen, schwarzen Streifen bezeichnet, zwischen siebenzig und achzig Streifen in allen; und die an den entgegengesetzten Seiten des Schaftes paßten selten zusammen.

3. Der Argus-Fasan. (Argus Ph.)

Phasianus Argus. L. l. 2. p. 742. No. 4. r)
L'Argus, ou le Luen. Buff. ois. II. p. 161. s)
The Argus, or Luen. Phil. Trans. Vol. LV. pl. 3. p. 88. — Lond. Magaz. 1766. pl. in p. 473. — Gentl. Magaz. 1768. pl. in p. 421.
Br. Mus. Lev. Mus.

Er hat die Größe eines Truthahns. Sein Schnabel ist, wie bey unserm Fasan, hellgelb; die Stirn und der Anfang der Kehle sind mit einer gekörnten (granulated) Haut von schöner scharlachrother Farbe bedeckt; der Augenstern ist orangefarben; die Haut um die Augen herum dunkelfarbig, und eine Art von schwarzem Knebelbart an jeder Seite der untern Kinnlade; der Scheitel, der Hinterkopf und der Hinterhals schillernd blau; am Hinterkopf ein gabelförmiger Federbusch; der untere Theil des Halses, der Rücken und die Deckfedern der Flügel dunkelfarbig, mit unregelmäßigen, röthlichbraunen Queerstreifen; die neun äußern Schwungfedern hellgelbbraun, mit kleinen dunkelfarbigen Flecken, von der Größe der Zähren, an den äußern und mit noch kleinern, weißen Flecken an den innern Fahnen bezeichnet, die übrigen eilf Schwungfedern dunkelbraun, mit runden und länglichen Flecken an beyden Fahnen, und an der äußern, nahe an den Schäften, eine Reihe von großen Augen, zwölf bis funfzehn an der Zahl, die größten einen Zoll im Durchmesser, und denen am Schweife eines Pfauen einigermaßen ähnlich; die Kehle, die Brust, der Steiß und die obern Deckfedern des Schwanzes matt orangefarben, mit runden, dunkelfarbigen Flecken; der Schwanz besteht aus vierzehn Federn, die zwey mittlern sind drey Fuß lang, die nächste achtzehn Zoll, und so werden sie stufenweise kürzer, bis zu den äußern herab, die nur zwölf Zoll lang sind, ihre Farbe ist dunkelbraun, mit weißen Punkten, und die zwey mittlern haben runde, weiße, schwarz eingefaßte Flecken an den äußern und braune unregelmäßige, dunkel eingefaßte an den innern Fahnen; der untere Theil des Bauchs und der After sind dunkelfarbig, mit einer unregelmäßigen Mischung vom Weißen; die Füße wie beym Truthahn, grünlichaschfarben *).

Er ist in China zu Hause, und die Abbildung wird für sehr getreu gehalten. Kopf und Füße fehlten bey dem überschickten Vogel; wurden aber aus der zugleich mit gesandten Figur ergänzt. Ein solcher Vogel ist jetzt im Leverschen Museum aufgestellt zu sehen; und einzelne Parthien von Federn sind auch noch in England, namentlich im Brittischen Museum, bey Sire Joseph Banks, Herrn Boddam und anderswo.

Er

r) Latham Ind. orn. II. p. 629. n. 3. B.
s) Uebers. V. S. 257. B.
*) In der Abbildung haben die Füße keine Sporne; in einer Zeichnung vom Herrn Edwards aber sind sie mit einem Sporn bewaffnet, wie der Hahn.

Er ist aber auch in den Wäldern von Sumatra *t*) zu Hause, wo er Coo-ar genannt wird. Man findet es äußerst schwer, ihn eine beträchtliche Zeitlang nachher, nachdem er in den Wäldern gefangen worden, beym Leben zu erhalten; niemals länger, als einen Monat. Er scheint eine Antipathie gegen das Licht zu haben, da er bey hellem Tage ganz leblos ist; wenn man ihn aber in einem dunkeln Orte hält, so scheint er ganz bey Laune zu seyn, und läßt zu weilen seine Stimme oder seinen Laut hören, wovon er den Namen hat, und der etwas kläglich und nicht so rauh ist, wie die Stimme des Pfauen. Sein Fleisch gleicht dem des gemeinen Fasanen.

4. Der gemeine Fasan. (Common Ph.)

Phasianus colchicus. L. I. 2. p. 741. No. 3. *v*). — Scop. ann. I. No. 166. *w*) — Brünn. orn. No. 58. — Nov. Comm. Acad. Petrop. Vol. XV. p. 451. No. 7. Fuisch tab. 123. Olina uccell. p. 49.

Le Faisan. Briss. orn. I. p. 262. No. 1.

— Buff. ois. II. p. 328. pl. 11. *x*)

— Pl. enlnm. 121. 122.

Pheasant. Ray Syn. p. 56. A. 1. — Will. orn. p. 163. pl. 28. — Albin. I. pl. 25. 26. *y*)

Br. Mus. Lev. Mus.

Er hat die Größe eines Haushuhns, und ist zwey Fuß und drey Viertel Zoll, bis drey Fuß lang; sein Gewicht ist zwölf Unzen, bis drey Pfund. Der Schnabel ist hell hornfarben; der Augenstern gelb; die Seiten des Kopfs sind dunkel karmoisinroth, körnig (granulated), und laufen hinten in eine Spitze aus; bey alten Vögeln sind sie bis über jede Kinnlade verlängert, wie die Fleischlappen des Hahns, übersteigen aber die Länge der Federn dieser Theile nicht, die stark damit bedeckt sind (which is full); diese rothe Stelle ist mit kleinen, schwarzen Flecken getüpfelt; von den Nasenlöchern entspringt ein Strich von grünlich schwarzen Federn, der unter den Augen weg, und etwas über sie hinaus geht; der übrige Kopf und Hals sind goldgrün, bey gewissen Lichte ins Violette und Blaue spielend; der untere Theil des Halses, die Brust und die Seiten sind glänzend röthlich kastanienbraun; jede Feder am Ende schwarz geründet, das bey den Halsfedern, wo es etwas in dem Schaft aufwärts steigt, der Feder das Ansehen giebt, als wenn sie am Ende entzwey gespalten wäre; jede Feder an den Schultern und Deckfedern der Flügel hat mehr oder weniger von einem büffellederfarbenen, krummen Zeichen in der Mitte, und ist inwendig und auswendig mit einer schwarzen Linie eingefaßt; der Unterrücken ist eben so, aber minder deutlich; der Steiß ist einfarbig schillernd röthlichbraun, mit grünem Glanze; die Deckfedern der Flügel braun, mit gelblichweiß melirt; die Schwungfedern braun, an beyden Fahnen gelblichweiß gefleckt; Bauch und After dunkelfarbig; der Schwanz besteht aus achtzehn Federn, deren längste zwanzig, die kürzeste nicht ganz fünf Zoll ist,

t) Hist. of Sumatr. p. 97.
v) Latham Ind. orn. II. p. 629. n. 4. B.
w) Ueberf. von Günther. S. 133. B.
x) Ueberf. V. S. 201. B.
y) Vergl. auch meine N. G. Deutschlands III. S. 413. Nr. 2. N. G. des In- und Auslands des. I. 1. S. 470. Nr. 2. B.

ist, wodurch er sehr keilförmig wird, alle haben an beyden Seiten der Schäfte schwarze Queerstreifen, die zwey mittlern ohngefähr vier und zwanzig, die übrigen nach Verhältniß; die Füße sind dunkelfarbig, zwischen den Zehen mit einer starken Haut und über der Hinterzehe mit einem stumpfen, einen Zoll langen Sporn versehen.

Das **Weibchen** ist kleiner; seine Hauptfarbe braun, mit Grau, Gelbroth und Schwärzlich melirt; der Schwanz viel kürzer, aber gestreift wie beym **Männchen**; um die Gegend der Augen mit Federn bedeckt.

Dieser Vogel findet sich gegenwärtig im Zustande der Natur fast in der ganzen **alten Welt**; sein ursprünglicher Wohnort war, wie man annimmt, die Gegend um das alte **Colchis**, und von da aus wurde er nach und nach in die übrigen Weltgegenden versetzt. In ganz **Amerika** findet man keinen [z]). Da er kurze Flügel hat, so ist er nicht zu weiten Flügen eingerichtet; und daher ist es sehr wahrscheinlicher, daß er mit Fleiß an jeden Ort, wo man ihn jetzt vorfindet, gebracht worden sey, als daß er freywillig dahin gekommen wäre [a]). In verschiedenen Gegenden **Englands** ist er in Menge, und brütet häufig daselbst, besonders wo Wälder sind, die er liebt, und überhaupt häufig genug, um eine reiche Beute für die Jagdliebhaber abzugeben.

Sie brüten auf der Erde, wie das Rebhuhn, und legen zwölf bis funfzehn Eyer, die kleiner als Hühnereyer, denen des Rebhuhns ähnlich, aber blässer sind; die Jungen folgen ihrer Mutter wie junge Hühnchen. Den **Hahn** hört man in den Wäldern krähen, beynahe wie den Haushahn, und oft kommt er in die nahe an Wäldern gelegenen Hühnerhöfe, und erzeugt Bastarde mit den Hennen.

Herr **Salerne** bemerkt, die **Fasanenhenne** bekäme, nachdem sie ausgelegt und gebrütet habe, das Gefieder des **Hahns**, und werde nachher so wenig von diesem geachtet, daß er sie mit eben der Unhöflichkeit behandele, die er einem von seinem Geschlechte erzeigen würde. Er giebt dieß für eine neue **Beobachtung** aus; sie ist aber viel gemeiner, als man gewöhnlich glaubt, und lange vorher schon von **Edwards** [b]) angestellt worden. Einer meiner Verwandten

z) **Anson** spricht von **Fasanen**, die er auf St. **Catharinen** an der Küste von **Brasilien** (s. Vog. p. 62.) und wiederum zu **Chequetan**, dreyßig Meilen westwärts von **Acapulco**, in der Provinz **Mexiko**, angetroffen hat. (s. Voy. p. 364.) Dieß können aber keine wahren Fasanen seyn.

a) Auf der Insel **Madre**, im Lago Maggiore zu **Turin**, sind sie vollkommen eingeschlossen, weil sie nicht über den See fliegen können; denn wenn sie einen Versuch dieser Art machen, so ertrinken sie, wofern sie nicht Bootsmänner wieder auffangen. **Keysler's** Trav. Vol. I. p. 378.

b) Dieser Autor giebt ein Beyspiel von einem Fasanen in der Menagerie des **Herzogs** von **Leeds**; und bemerkt, diese Veränderung erfolge sehr wahrscheinlich im Zustande der Gefangenschaft. Auch ist der Umstand, daß die Henne nach einiger Zeit das Gefieder des **Hahns** bekommt, nicht bloß auf den Fasan eingeschränkt; denn der Fall von der **Pfauhenne** der Lady **Tynte** (s. unsere 61ste Tafel), die jetzt im Leverschen Museum ist, beweist das Gegentheil; und diese bekam, nachdem sie oft gebrütet hatte, sehr viel von dem schönen Gefieder des **Hahns**, selbst die schönen

ten, der sehr lange todt ist, und der diese Vögel zu seinem Vergnügen zu halten pflegte, theilte mir die nämliche Bemerkung mit, und der scharfsinnige Herr Johann Hunter hat eine gut geschriebne Abhandlung des nämlichen Inhalts in die Philosophischen Transaktionen [c]) geliefert; aber als Zusatz zu diesem, füge ich noch bey, daß ich gewiß weiß, daß es nicht immer das reife Alter erfordere, um der Fasanhenne das Ansehen des Hahns zu geben, indem zuweilen auch junge Vögel mit dem schönen Gefieder desselben geziert werden. Ich will nicht bestimmen, wie dieß zugehe, noch auch, ob es dieser Art eigenthümlich ist, früher unfruchtbar zu werden, (wenn dieß die Ursache seyn sollte,) als irgend eine andre Art aus der Familie der Hühner; aber ich bin versichert, daß verschiedene dieser ungespornten, hahnähnlichen Hennen, beym Essen, an der Saftigkeit und dem delikaten Geschmacke ihres Fleisches, als junge Vögel befunden worden sind [d]).

4. Var. A. Der Ringfasan. (Ring Ph.)

Phasianus colchicus, torquatus L. [e]) I. e. p. 741. No. 3. β.

Eine schöne Spielart dieses Vogels ist jetzt nicht selten in unsern Vogelhäusern (aviaries). Sie unterscheidet sich durch einen rein weißen Ring um den Hals, und die Farben ihres Gefieders sind deutlicher, besonders die Federn am untern Theil des Halses und an der Brust, die tiefer hinein gezähnelt sind, als beym gemeinen Fasane, und deren jede am Ende doppelt zu seyn scheint.

Diese Vögel sind gemein in den Wäldern einiger Provinzen von China. In einigen Abbildungen derselben bemerkte ich einen weißen Streifen über jedem Auge. Sie sind um den Caspischen See ebenfalls gemein, und in dem südlichen Theil der Wüsteney zwischen dem Don und der Wolga; auch in der großen Tatarey, und in Süden der Mongolischen Wüste [f]), wo sie kleiner, als der gemeine Fasan seyn sollen. Auch auf St. Helena [g]) sind sie sehr zahlreich.

Ich [h]) zweifle kaum, daß diese Vögel in unserm Königreiche nicht mit der Zeit eben so häufig werden sollten, als der gemeine Fasan [i]). Es ist bekannt, daß verschiedene Herren und Edelleute viele Paare, des Brütens wegen, in ihre benachbarten Wälder ausgesetzt haben.

Ich

nen Federn im Schweife (train). Eben so soll auch das Weibchen des Felsenhahns (s. oben S. 516. No. 1.) nach einigen Jahren das Gefieder des Männchens bekommen, und vielleicht findet sich bey fernerer Beobachtung, daß dieß auch der Fall bey vielen andern Vögeln sey.

c) Vol. XXX. p. 527.

d) Dieß ist, deucht mir, kein gültiger Beweiß; ein guter Koch kann auch alte Auerhähne so zurecht machen, daß man sie für Junge ißt. B.

e) S. bey diesen und den folgenden Varietäten allzeit die oben angeführten Deutschen Synonymen. B.

f) Herr Pennant.

g) Sie sind von dem Gouverneur eingesetzt worden. Es sollen fünf Pfunde Strafe darauf stehen, wenn man einen schießt. Forst. Voy. vol. II. p. 567.

h) Zus. a. d. Suppl. S. 208. Uebers.

i) In Deutschland sind sie auch hinlänglich bekannt. B.

Ich habe von verschiedenen gehört, die von den Jägern in einigen Gegenden von Kent wild angetroffen worden sind, und zwey davon sind mir im vorigen Jahre zu Gesichte gekommen.

4. Var. B. Der bunte Fasan. (Variegated Ph.)

Phasianus colchicus, varius. L. I. 2. p. 741. No. 3. γ.
Le Faisan panaché. Briss. orn. I. p. 267. A. pl. 25. f. 3.
Le Faisan varié. Buff. oiſ. II. p. 352. —— Frisch tab. 124.
Lev. Mus.

Dieſer ist weiß, und an verschiedenen Theilen mehr oder weniger mit denen, an den gemeinen Fasanen gewöhnlichen, Farben bezeichnet.

4. Var. C. Der weiße Fasan. (White Ph.)

Phasianus colchicus, albus. L. l. 2. p. 741. No. e. δ.
Le Faisan blanc. Briss. orn. I. p. 268. β.
Lev. Mus.

Dieser ist ganz gewiß, einige wenige kleine schwarze Flecken um den Hals, und einige gelbrothe Flecken an den Schulterfedern ausgenommen.

Im Leverschen Museum ist ein ganz weißer.

4. Var. D. Der Bastard-Fasan. (Hybridal Ph.)

Phasianus colchicus, hybridus L. l, p. 741. No. 3.*.
Le Faisan batard. Briss. orn. I. p. 268. C.
Le Coquar. Buff. oiſ. II. p. 353. pl. 12. —— Frisch. tab. 125.
Lev. Mus.

Dieß ist eine Bastardbrut vom Fasan und Haushahn; ein Umstand der sich oft ereignet, wo die Hühnerhöfe nahe an Wäldern sind, in denen sich Fasanen aufhalten [k]). Die Augen sind mit einer rothen Haut umgeben, und auf dem Scheitel einige wenige, weiße Flecken; der Oberrücken ist gelbroth, mit Braun und Weiß melirt; von hier an bis zum Schwanze ist die Farbe aschgrau, mit schwarz durchzogen; der Bauch, die Schenkel und die untern Deckfedern des Schwanzes sind hellbraun, aschfarbig und dunkelfarbig melirt; die Deckfedern der Flügel fast wie der Rücken; die großen Schwungfedern hellbraun, die kleinern weiß, außen mit Schwarz gemischt, und inwendig schwarz, mit gelbrothen Rändern; der Schwanz ist in der Mitte schwarz; die Füße und der Schnabel grau. --- Dieß ist Brisson's Beschreibung.

Der

k) Im Freyen mag diese Bastardart wohl selten entstehen, öfter in umzingelten Fasanerieen, wo man es drauf anlegt, sie zu zeugen. B.

Der im Leverschen Museum hat wenig Zeichnung, und ist fast durchaus von schmutzig röthlichbrauner Farbe *l*).

4. Var. E. Der Truthahn-Fasan. (Turkey Ph.)

Phasianus colchicus. gallopavonis L. I. 2. p. 741. No. 3. ξ.
Faisan Dindon. Buff. ois. II. p. 160.
Turkey Pheasant. Edw. pl. 337.

An Größe steht er zwischen dem Truthahn und dem Fasan in der Mitte; die Breite seiner Flügel ist zwey und dreyßig Zoll; um die Augen herum steht eine kahle, rothe Haut; der übrige Kopf ist befiedert; das Gefieder ist eine Mischung, die sowohl mit dem Truthahn, als mit dem Fasan Aehnlichkeit hat.

Drey solche Vögel wurden bey Hanford, in Dorsetshire angetroffen, wovon einer getödet, und von H. Seymer Esqr. an Herrn Edwards geschickt worden ist.

In Büffons Naturgeschichte der Vögel *m*) finde ich einen Vogel unter dem Namen Demi Poule d'Inde, der vom Haushahn und vom Truthahn kommen soll. Er ist grösstentheils von dunkler Farbe, wie ein Geyer, hat weder Kamm noch Fleischlappen, trägt den Schwanz wie der Truthahn, und steht sehr hoch auf den Füßen *n*).

Er soll der Insel Java eigen seyn, wo er blos zum Hahngefechte gehalten wird.

5. Der Goldfasan. (Painted Ph.)

Phasianus pictus L. I. 2. p. 743. No. 5. *o*) — Amoen. Acad. I. p. 362. t. 1.
Le Faisan doré de la Chine. Briss. orn. I. p. 271. No. 4. — Buff. ois. II. p. 355. *p*). — Pl. enlum. 217.
China Pheasant. Albin III. pl. 36. Edw. pl. 68. 66 *q*).
Br. Mus. Lev. Mus.

Dieser ist kleiner, als der gemeine Fasan, und zwey Fuß, zehnthalb Zoll lang. Schnabel und Augenstern sind gelb; die Hauptfarbe des Gefieders karmoisinroth; auf dem Kopf sitzt ein äußerst schöner, glänzend gelber Federbusch, dessen Federn seidenähnlich sind, und rückwärts fallen; die Wangen sind beynahe kahl, und fleischfarben; die Federn des Hinterkopfs orangefarben, an den Enden viereckig, und mit schwarzen Linien durchzogen; sie sind lang, und

l) Man lobt das Fleisch von diesen Vögeln als sehr delikat. B.
m) Hist. des ois. II. p. 116.
n) Vergl. meine N. G. Deutschlands III. S. 411. B.
o) Latham Ind. orn. II. p. 632. n. 5. B.
p) Uebers. V. S. 245. B.
q) Seligmanns Vögel III. Taf. 31. Naturforscher XIV. S. 204. Meine N. G. Deutschlands III. S. 443. Nr. 3. N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 472. Nr. 3. B.

können nach Willkühr aufgerichtet werden, wie die Halsfedern des Haushahns, unter diesen sind die Federn grün, und ein wenig abgerundet an den Enden, und mit schwarzen Spitzen; Rücken und Steiß gelb; die obern Deckfedern des Schwanzes lang, schmal und karmoisinroth, und fallen an jede Seite des Schwanzes herüber; die Deckfedern der Flügel kastanienbraun und braun melirt; die Schulterfedern braun, mit gelblichen Flecken; der Schwanz lang, und keilförmig; seine längste Feder ist drey und zwanzig Zoll lang, und die äußerste sehr kurz, ihre Farbe ist eine schöne Mischung aus Kastanienbraun und Schwarz; die Füße sind gelb, und mit einem und ein Viertel Zoll langen Sporn versehen.

Das Weibchen ist kleiner, und hat das bunte Gefieder des Männchens nicht. Der Augenstern ist nußbraun; die Kopffedern sind etwas lang; die Hauptfarbe des Gefieders braun, gelblichbraun gemischt; der Schwanz ist kürzer, aber dem des Männchens nicht unähnlich; die Füße haben keine Sporen.

Der Geburtsort dieser schönen Art ist China, wo sie Kin-ki genannt wird. Sie erträgt die Gefangenschaft gut, und brütet leicht in diesem Zustande, so daß es ganz unnöthig ist, eine Lieferung aus ihrem Vaterlande kommen zu lassen. Ihre Eyer sind röther, als die unsers Fasans und einigermaßen denen des Perlhuhns ähnlich. Sie vermischt sich auch mit unserm gemeinen Fasan, wie Büffon einen Fall anführt, wo zwey Hähne erzielt wurden; einer davon paarte sich mit der gemeinen Fasanhenne, und brachte ein Junges hervor, das auch eine Henne war.

Sie scheinen dauerhafte Vögel zu seyn, und ich würde mich keineswegens wundern, wenn die künftigen Generationen sich eben so in unserm Clima naturalisirten, als die gemeine Art. Der Geschmack ihres Fleisches soll alles andere Fasanenfleisch übertreffen *r*).

Auch diese Art pflegt, wie von der vorigen erwähnt worden ist, den äußerlichen Geschlechts-Charakter zu verändern. Edwards bemerkt dieß von einigen, die die Lady Essex gehalten hat, wo die Hennen, in einer Zeit von sechs Jahren, stufenweise die Hahnenfedern bekamen, und ich habe auch noch gehört, es sey bey den Hennen nicht ungewöhnlich, wenn sie ohngefähr vier oder fünf Jahre alt wären, und von den Hähnen vernachlässigt würden, daß sie nach und nach das Hahngefieder bekämen.

6. Der Silberfasan. (Pencilled Ph.)

Phasianus nycthemerus L. I. 2. p. 743. No. 6. *s*). Scop. ann. I. No. 167. *t*)
Le Faisan blanc de la Chine. Briss. orn. I. p. 277. No. 5. — Pl. enlum. 123. 124.
Le Faisan noir et blanc de la Chine. Buff. oiſ. II. p. 359 *u*).

Black

r) Du Halde.
s) Latham Ind. orn. II. p. 631. n. 6. B.
t) Ueberſ. von Günther. S. 136. Nr. 167. B.
u) Ueberſ. V. S. 252. B.

Der gekrönte Fasan

BRITISH MUSEUM
ZOOLOGY
NATURAL HISTORY

Black et white Chineſe Pheaſant. Edw. pl. 60. (Hahn und Henne) *v*) — Albin Ill. pl. 37.

Br. Mus. Lev. Mus.

Er iſt größer, als der gemeine Faſan, und dritthalb Fuß lang. Schnabel und Augenſtern ſind gelb; die Seiten des Kopfs ſind mit einer lappenförmigen, karmoiſinrothen, kahlen Haut bedeckt, wie bey unſerm Faſane, die über beyde Augen hinaufſteigt, wodurch ſie das Anſehen von Hörnern bekommt, und bey einigen Vögeln auch an beyden Seiten der Kinnladen ſo tief herunter hängt, daß ſie Kehllappen (wattles) ähnlich ſieht; der Kopf iſt mit einem Federbuſch verſehen, und ſo wie alle untern Theile des Körpers tief purpurſchwarz; die obern Theile ſind weiß, und jede Feder mit drey oder vier Linien, eine in der andern bezeichnet, die alle mit dem Rande parallel laufen; der Schwanz iſt keilförmig, und ſeine Federn ſind ſchief ſchwarz geſtreift, die zwey mittlern ausgenommen, die einfärbig weiß ſind; die Füße ſind roth, und hinten mit einem weißen Sporn verſehen.

Das Weibchen iſt etwas kleiner. Sein Schnabel iſt braun; der Augenſtern gelbbraun; die Augen ſind mit einer rothen Haut umgeben, die ſchmäler und minder lebhaft iſt, als beym Männchen; der Kopf hat einen kleinen Federbuſch, und iſt braun; Kehle und Wangen ſind weißlich; der Hals, der Rücken, die Bruſt, der Steiß und die Deckfedern der Flügel gelbrothbraun; der untere Theil der Bruſt, der Bauch und die übrigen untern Theile weiß, unregelmäſig mit Braun untermiſcht, und mit ſchwarzen Queerbändern durchzogen; die großen Schwungfedern ſchwärzlich, die kurzen wie der Rücken, die zunächſt am Körper ſtehenden weiß getüpfelt; der Schwanz kürzer, als beym Männchen, ſeine zwey mittlern Federn braun, die übrigen braun und weiß melirt, und ſchief ſchwarz geſtreift; die Füße roth, ohne Sporen.

Dieſe Art iſt mit der letzten in China zu Hauſe, und wird ebenfalls in unſern Menagerien ausgebrütet (bred). Ihre Eyer ſind gelblich aſchfarben, mit einer rothen Schattirung (bluſh).

7. Der gekrönte Faſan. (Crested Ph.)

(ſ. die fünf und ſechzigſte Kupfertafel.)

Phaſianus cristatus L. I. 2. p. 741. No. 10 *w*).
Le Hocco brun du Mexique. Briss. orn. I. p. 304. No. 15.
Faiſan huppè de Cayenne. Pl. enlum. 337.
L'Hoazin. Buff. oiſ. II. p. 385 *x*).
Hoactzin. Raii Syn. p. 163. — Will. orn. p. 389.
Lev. Mus.

v) Sellgmanns Vögel. II. Taf. 27. Meine N. G. Deutſchlands III. S. 451. Nr. 4. M. G. des In- und Auslands. I. 1. S. 472. Nr. 4. B.

w) Latham Ind. orn. II. p. 631. B.

x) Ueberſ. V. S. 297. B.

Seine Länge ist ein Fuß und zehn Zoll. Sein Schnabel ist schwarz; der Kopf mit einem Federbusche geziert, dessen Federn von verschiedener Länge sind, die längsten, drey Zoll lang, ihre Farbe ist schmutzig bräunlichweiß, unten schwarz; die Augenkreiße sind kahl und röthlich; die obern Theile des Körpers braun; die untern, bis an den Bauch gelbrothweiß, Bauch und After gelbroth; vom Hinterkopf bis zum untern und hintern Theil des Halses hat jede Feder einen weißen Streifen längs der Mitte herab; die Spitzen der mittlern und größern Deckfedern der Flügel sind weiß, und bilden zwey Streifen an den Flügeln; der Flügelrand, zur Hälfte vom Buge an, weiß; die Schwungfedern gelbroth; der Schwanz keilförmig, zehn Zoll lang, und von einerley Farbe mit dem Rücken, alle seine Federn haben gelbe Spitzen; die Füße sind schwarz, und ohne Sporen.

Er ist in Mexiko, und den angränzenden Ländern zu Hause, wo er von Schlangen lebt; er macht ein heulendes Geschrey, und wird auf Bäumen an den Flüssen angetroffen. Man hält ihn für einen Unglück bringenden Vogel. Vorzüglich sieht man ihn im Herbst, und er soll einen Ton von sich geben, der dem Wort: Hoatzui nicht unähnlich ist. Von andern höre ich, daß er zahm gemacht werden kann, in welchem Zustande man ihn bey den Einwohnern gesehen hat; ferner, daß er von Würmern, Ameisen und andern Insekten, so wie von Schlangen lebe.

8. Der Motmot. (Motmot Ph.)

Phasianus Motmot L. I. 2. p. 740. No. 2. *y*)
Le Faisan de la Guiane Briss. orn. I. p. 270. No. 3. — Pl. enlum. 145.
Le Katraca. Buff. oiſ. III p. 364. *z*)
Motmot. Seba Theſ. vol. I. p. 103. pl. 67. f. 2.
Lev. Mus.

Von der Größe eines Haushahns, und achtzehn Zoll lang. Die Kopffedern sind lang, und gelbroth; der Schnabel ist röthlich; der Kopf dunkelbraun; der Hals und die obern Theile olivenbraun; Brust, Bauch, Seiten und Schenkel gelbrothbraun; die untern Deckfedern des Schwanzes kastanienbraun; die Schwungfedern und die zwey mittlern Schwanzfedern, wie der Rücken, die übrigen schwärzlich, die äußerste ausgenommen, die gelbroth ist; die Füße schwärzlich; die Klauen braun.

Er ist in Brasilien und Guiana zu Hause. Der Schwanz ist sowohl bey Brisson, als in dem Pl. enlum. keilförmig; sonst sollte man glauben, er sey einer und eben derselbe mit dem folgenden Vogel.

9. Der Parraka. (Parraka Ph.)

Phasianus Parraqua L. I. 2. p. 740. No. 8. *a*)
Le Parraka. Buff. oiſ. II. p. 394. *b*)

Le

y) Latham Ind. orn. II. p. 632. n. 9. B.
z) Uebers. V. S. 262. B.
a) Latham Ind. orn. II. p. 632. n. 12. B.
b) Uebers. V. S. 313. B.

Le Parraqua. Mem. sur Cayenne. vol. I. p. 378. pl. 1. 2.
Hannequau. Bancroft Guian. p. 176.

Er hat die Größe eines kleinen Haushuhns, dem er auch an Schnabel, Füßen und Körper gleicht; seine Länge ist drey und zwanzig Zoll. Der Schnabel ist dunkel gelbroth; die Augen sind braun; die Hauptfarbe des Gefieders ist dunkelbraun am Rücken, und rothgelb unter dem Bauch; der Scheitel ist rothgelb, und seine Federn sind etwas lang, aber doch nicht lang genug, um einen wirklichen Federbusch zu bilden; die Flügel sind kurz; die Fahnen einiger Schwungfedern spielen ins Gelbrothe; der Schwanz besteht aus zwölf Federn, ist am Ende gleich, einen Fuß lang, und wird mehrentheils hängend getragen; die Füße sind dunkel gelbroth, ins Schwarze spielend; die Klauen wie bey einem Huhn.

Sein innerer Bau ist in Rücksicht der Luftröhre sonderbar; diese, statt, wie bey den meisten Vögeln, gerades Weges in die Brust zu gehn, läuft an der Seite des linken Schlüsselbeins, und an der Außenseite des fleischigen Theils der Brust, weg, wo sie nur mit der Haut bedeckt ist, bekommt dann eine Beugung nach oben, geht über dem rechten Schlüsselbein in die Brust, und ist dann auf die gewöhnliche Art in die Lungen vertheilt. Das Weibchen hat diese Krümmung der Luftröhre nicht.

Der Hannequaw, dessen Bankroft erwähnt, ist wahrscheinlich der nämliche Vogel. Er sagt von ihm, daß er schwarz sey, auf Bäumen sitze, und sich sehr früh des Morgens hören lasse, wo er deutlich, aber rauh und sehr laut, das Wort Hannequaw c) wiederhohle.

Diese Vögel finden sich in den unbesuchten Wäldern der innern Theile von Cayenne und Guiana, und in vielen Ländern von Südamerika. Mit Sonnenaufgang erheben sie ein sehr lautes Geschrey, das für das lauteste von allen Vögeln der neuen Welt gehalten wird; und um diese Zeit erscheinen ihre Augen, und eine kleine Haut unter der Brust, die man gar nicht sieht, außer wenn der Vogel dergleichen Bewegungeg macht, oder zornig ist, roth. Dieser Schrey ist dem Wort Parraqua sehr ähnlich, und wird oft nach einander wiederhohlt; oft schreyen ihrer viele zugleich, oder antworten einander, besonders zur Brütezeit, die des Jahrs zweymal statt findet. Sie legen jedesmal vier bis sechs Eyer, machen ihr Nest auf niedere Zweige, oder auf Baumstrünke, und benehmen sich mit ihren Jungen eben so, wie die Hennen. Sie leben von Körnern, Saamen und Kräutern; ihre Jungen im Neste aber füttern sie mit Würmern und kleinen Insekten. Sie halten sich, nebst vielen andern Vögeln, den Tag über, in Wäldern auf, und kommen des Morgens und Abends auf die offenen Haiden, um zu fressen um welche Zeit sie vorzüglich von den Einwohnern und Nachbarn erlegt werden. Man kann sie zähmen, und ihr Fleisch wird sehr geschäzt.

10. Der Courier = Fasan. (Courier Ph.)

Phasianus mexicanus L. l. 2. p. 751. No. 9. d).
L'Hoitlallotl. Buff. oiſ. II. p. 395. e) Fermand. Hist. N. Hiſp. Ch. LII. p. 25.

Dieſen

c) Das leicht mit Parraquaw verwechſelt werden kann.

d) Latham Ind. orn II. p. 632. n. 10. B.

e) Ueberſ. V. S. 313. B.

Diesen Vogel hat Fernandez sehr unvollkommen beschrieben. Er soll achtzehn Zoll lang seyn. Die Hauptfarbe seines Gefieders ist weiß, ins Rothgelbe spielend, um den Schwanz herum schwarz, mit einigen weißen Flecken; der Schwanz selbst ist lang, grün, und schillert bey gewissem Lichte, wie die Pfaufedern; die Flügel sind kurz.

Er ist in den heissern Gegenden von Mexiko zu Hause, fliegt langsam, soll aber das schnellste Pferd im Laufen übertreffen *f*).

II. *g*) Der Fasan mit dem Federstrauße. (Der Impeyische Fasan). (Impeyan Ph.)

(S. die sechs und sechzigste Kupfertafel.)

Lev. Mrs.

Er ist größer als ein **Haushuhn**, und zwey Fuß lang. Sein Schnabel ist braun, zwey Zoll lang, sehr gekrümmt, indem sich die obere Kinnlade beträchlich über die untere herunterbeugt, und diese versteckt; die Augenkreiße sind kahl, und grünlichblau; auf den Kopfe ist ein aufrecht stehender Federbusch, der aus siebenzehn oder achtzehn Federn von verschiedener Größe besteht, und wovon die längste viereinhalb Zoll lang ist; sie sind fast ganz Schaft, das Ende ausgenommen, wo sie eyrund sind, mit einer lanzettförmigen Spitze; die Federn des Halses sind lang und loose, fast wie beym Haushahn; die am Kopf und an der Kehle grün bronzefarben; die Mitte des Halses purpurfarbig, mit Kupferglanze, und der untere Theil desselben gelb Kupferbronze, alle außerordentlich prächtig, und in verschiedenem Lichte schillernd; der Rücken und die Deckfedern der Flügel schön purpurfarbig, mit grün bronzefarbnen Spitzen; die großen Schwungfedern schwarz; die untern Theile des Körpers, vom Kinn bis zum After, mattschwarz, hier und da mit grünlichem Glanze; die Schenkel eben so; die Füße bis unter die Knie befiedert; der Schwanz bräunlich zimmetfarben, mit dunkelfarbiger Endspitze, und abgerundet, vierzehn Federn in demselben; die Füße stark, rauh und schuppig, von Farbe dunkelbraun; die Zehen lang, und zwischen ihnen, an der Wurzel, eine dünne Haut, an der hintern Seite der Füße ein dicker, kurzer Sporn.

Das **Weibchen** ist kleiner, als das **Männchen**, und von minder schönem Bau; seine Länge ein und zwanzig Zoll. Der Schnabel und die kahlen Augenkreiße sind wie beym Männchen; die Hauptfarbe des Gefieders ist braun; die Mitte jeder Feder heller, oder sohlenlederfarben, dunkelbraun gesprenkelt und gestreift, dem Rücken des **großen Uhu** *b*) nicht sehr unähnlich; unter den Augen ist ein breites, schmutzig weißes Band; die großen Schwungfedern sind

schwarz,

f) Hist. des ois.

g) Dieser, und die beyden folgenden, sind in dem Suppl. S. 208 — 211 hinzugekommen. Uebers.

b) Great-eared Owl. Strix Bubo L. s. Allg. Uebers. I. B. 1. Th. S. 109. No. 1. Uebers.

Der Fasan mit dem Federstrauß

MUSEUM
ZOOLOGY
NATURAL HISTORY

ſchwarz, die kurzen ſchwarz und roſtigroth geſtreift; der Schwanz ſehr kurz, kaum länger, als die Schwungfedern, die Farbe ſeiner Federn iſt der des Rückens ähnlich; die Füße, wie beym Männchen, ſtatt des Sporns aber mit einem ſtumpfen Knopfe verſehen.

Dieſe Vögel ſind in Indien zu Hauſe, aber nicht ſehr häufig, und werden von den Hügeln im nördlichen Theil von Hindoſtan, als Seltenheiten nach Calcutta gebracht. Lady Impey hat es mit einem wahrſcheinlich guten Erfolg verſucht, einige mit ſich nach England zu bringen; nachdem ſie aber zwey Monate lang am Bord des Schiffes geſund geweſen waren, erbten ſie eine Krankheit von dem andern Federvieh, die den Pocken ähnlich war, und ſtarben. Ihr Futter während der Reiſe war Reiß in den Hülſen. Sire Elijah ſagt mir, man kenne ſie in Indien unter dem Namen: Monaul, das thörichter Weiſe durch Mundſtück (Mouth Piece) überſetzt worden iſt, und das Männchen werde von einigen Goldhuhn (Golden Fowl) genannt. Sie vertragen Kälte, können aber die Hitze nicht leiden. Den Hahn hat man niemals krähen gehört; er hat aber ein ſtarkes, rauhes Gackern (Cackle), das dem des gemeinen Faſanen nicht unähnlich iſt. Exemplare von den Hähnen ſind jetzt im Leverſchen Muſeum.

12. Der geſchäckte Faſan. (Coloured Ph. [i]).

Seine Größe iſt die eines Haushuhns, und ſeine Länge zwey und zwanzig Zoll. Der Schnabel iſt graulichweiß, und ſehr ſtark gekrümmt; die Seiten des Kopfs ſind kahl, mit Fleiſchlappen beſetzt (carunculated) und roth, ſo ziemlich, wie beym Silberfaſan (Nr. 6.); die Federn am Hinterkopf ſind ſehr lang, und bilden einen Federbuſch, der hinten herabhängt; Kopf, Kehle und Hinterhals ſind ſchwarz; der Rücken, der Steiß und die Deckfedern der Flügel eben ſo, und ganz ſchmal (ſlightly) weiß geränder; die großen Schwungfedern dunkelbraun; der Schwanz etwas lang, am Ende gleich, und ſchwarz; Vorderhals, Bruſt und Bauch mit langen, ſcharf zugeſpitzten Federn bedeckt, die in der Mitte ſchwarz, und an den Seiten tief hinein weiß geränder ſind; die Schenkel ſind ſchwarz, an der hintern Seite eines jeden ein Sporn von mittelmäßiger Länge; die Klauen krumm, und ſchwarz.

Er iſt in Indien zu Hauſe, wo er das gefärbte Huhn (Coloured Fowl) genannt wird. — Aus den Gemälden der Lady Impey.

13. Der Afrikaniſche Faſan. (African Ph. [k]).

Br. Mus.

Seine Länge iſt neunzehn Zoll. Der Schnabel iſt vollkommen ſo gebaut, wie des gekrönten Faſans (Nr. 7.) ſeiner, ſtark, kurz und gelb; der Kopf hat ebenfalls einen Federbuſch, wie

i) Phasianus leucomelas Latham Ind. orn. II. p. 633. n. 13. B.

k) Phasianus africanus Latham Ind. orn. II. p. 631. n. 8. B.

wie bey jenem, und die Federn, die ihn bilden, sind alle in der Mitte braun, und an den Seiten weiß; der Scheitel ist schwärzlich; der Rücken bläulich aschfarben, jede Feder am Schaft herab schwärzlich gestreift; Kinn und Vorderhals rostbraun; die Seiten des Halses weißlich, und ein wenig mit dunkelbraun gesprenkelt; Brust und Bauch weiß, an den Schäften herab schwarz gestreift; die Flügel bläulich aschfarben, Schäfte und Spitzen schwärzlich; die Bastardflügel schwarz; die acht ersten Schwungfedern an den innern Fahnen, zur Hälfte von der Wurzel an, weiß, das übrige ihrer Länge, so wie die andern ganz bleyfarbig braun; der Schwanz ist neun und drey Viertel Zoll lang, und am Ende abgerundet, seine zwey mittlern Federn braun, mit schwarzen Enden, die übrigen ganz schwarz; die Füße auch schwarz.

Dieß Exemplar ist im Brittischen Museum gut conservirt, und kommt aus Afrika. Es hatte nur zehn Schwanzfedern, aber, nach dem Ansehen des Schwanzes, wenn er ausgebreitet ist, zu schließen, scheinen ihrer ursprünglich eine große Anzahl gewesen zu seyn.

Zusatz.

14. Der Haubenfasan.

Phasianus coronatus.
Phasianus cristatus. Mus. Carl. III. n. 64.

Er ist fast zehn Zoll lang; der Schnabel schwarz, unten an der Wurzel gelblich; die Stirn schwarz, mit vier bis fünf langen rückwärts stehenden Borsten, die an der Spitze etwas gefiedert sind; der Scheitel weiß; der Hinterkopf besteht aus einem zusammengelegten purpurfarbenen Federbusch, der sich vorne etwas sichelförmig erhebt, hinten aber herabwärts doppelt ausbreitet; Nacken, Schultern, Rücken und Steiß sind seidenartig braungrün; die Flügel sind schwarz, die hintern Deckfedern an der Spitze rostfarben, die Schwungfedern schwarz, am äussern Rande rostfarben mit schwarzen Punkten; die Füße gelblich; Gurgel, Kehle, Brust, Bauch, Hüften und After schwarz; der Schwanz schwarz, kurz und unter sich gebogen.

Auf Macao ist er nicht selten, und soll auch auf der Insel Celebes angetroffen werden.

Zwey und funfzigste Gattung. Tinamu.

Der Schnabel ist länglich, am Ende stumpf. Die Nasenlöcher liegen in der Mitte. Die Oeffnung des Rachens ist weit. Die Seiten des Kopfs und die Kehle sind nicht stark mit Federn bekleidet. Der Schwanz ist sehr kurz, und oft von den obern Deckfedern desselben versteckt. Die hintere Zehe ist kurz, und wird beym Gehen nicht gebraucht. Die Klauen sind unten ausgehöhlt.

Die Lebensart der ganzen Gattung ist der vorherbeschriebenen sehr ähnlich.

Das Weibchen ist bey allen bekannten Arten am größten.

1. Der große Tinamu. (Great Tinamou.)

Tetrao major L. l. 2. p. 767. No. 63. *l*).
Le Perdrix du Breſil. Briss. orn. p. 227. No. 4.
La grosse Perdrix du Breſil. Ibid. No. 5. *m*).
Le Magoua. Buff. ois. IV. p. 507. pl. 24.
Tinamou de Cayenne. Pl. enlum. 476.
Macacagua. Raii. Syn. p. 53. No. 9. Will. orn. p. 165. pl. 26.
Grosse Perdrix de la Guiane. Mem. ſur Cayenne. Vol. II. p. 269.
Great Pertridge. Fermin. Surin. II. p. 188.
Lev. Mus.

Er hat die Größe eines Haushahns, und achtzehn Zoll Länge. Sein Schnabel iſt fünf Viertel Zoll lang, am Ende ſtumpf, mit einer Art von Furche an jeder Seite der obern Kinnlade, in deren Mitte die Naſenlöcher liegen, von Farbe ſchwarz; der Scheitel iſt dunkel gelbroth; die Hauptfarbe des Gefieders am übrigen Körper iſt graulichbraun, ins Olivenfarbene ſpielend, mit einer Miſchung von Weißem an dem obern Theil des Bauchs, und an den Seiten, und von Graulichem am Halſe; der Oberrücken, die Deckfedern der Flügel und der Schwanz ſind mit dunkeln, queerſtehenden Flecken bezeichnet, wovon der letzte die wenigſten hat; die Seiten des Kopfs, die Kehle und der Vorderhals ſind nicht ſtark mit Federn bekleidet *n*); die kurzen Schwungfedern haben eine Miſchung von Gelbrothem, und die großen ſind einfärbig aſchfarben; der Schwanz iſt kurz; die Füße ſind gelblichbraun; die hintere Fläche derſelben ſehr rauh, mit abſtehenden Schuppen, wodurch ſie das Anſehen der Tannenrinde bekommen.

Dieſe Art wird in den Wäldern verſchiedener Länder von Südamerika, beſonders in Cayenne und Guiana angetroffen, und bringt die Nächte auf niedrigen Baumzweigen ſitzend zu, zwey oder drey Fuß hoch vom Boden. Das Weibchen legt zwölf bis funfzehn Eyer, von der Größe der Hühnereyer, und von ſchöner, grüner Farbe. Es macht ſein Neſt auf den Boden, an dem Strunk eines großen Baums, und wenn es geſtört wird, ſo rollt es ſeine Eyer auf einen andern Platz, in einer ziemlichen Entfernung. Die Jungen folgen ihrer Mutter, ſobald ſie ausgekrochen ſind, und verſtecken ſich ſelbſt bey der geringſten Gefahr. Sie ſoll des Jahrs zweymal brüten. Ihre Nahrung ſind Früchte und Körner aller Art, ſo wie Würmer und Inſekten. Die Indianer töden ſie häufig des Nachts auf den Bäumen. Ihr Fleiſch wird für ſehr wohlſchmeckend gehalten, und auch ihre Eyer ſind ein großer Leckerbiſſen.

Die Stimme, oder den Ruf dieſer Vögel kann man ſehr weit hören. Es iſt eine Art von tiefen (dull) Pfeifen, das ſie genau bey Untergang der Sonne jedes Abends, und bey Anbruch des Tages hören laſſen; durch Nachahmung deſſelben locken ſie die Einwohner zum Schuß oder in das Netz.

l) Tinamus brasiliensis Latham Ind. orn. II. p. 633. n. 1. B.

m) Ueberſ. XIII. S. 235. 1. B.

n) In den Pl. enlum. ſind die Seiten des Kopfs roth illuminirt, und ſcheinen unbefiedert zu ſeyn, bey den Exemplaren aber, die ich geſehen habe, waren dieſe Theile mit kurzen Federn, von der nämlichen Farbe, wie das übrige Gefieder, dünn beſetzt.

2. Der aſchgraue Tinamu. (Cinereous T.)

Tetrao cinereus. L. l. 2. p. 768. No. 64. o).
Le Tinamou cendré. Buff. ois. 10. p. 510. p).)

Dieſer iſt zwölf Zoll lang. Sein Schnabel iſt ſechzehn Linien lang; das Gefieder ein einfärbiges Aſchbraun, Kopf und Hinterhals ausgenommen, die einen gelbrothen Anſtrich haben; der Bau des Vogels kommt vollkommen mit dem des vorigen überein.

Man findet ihn an einerley Orten mit dem letzten; er iſt aber ſeltener.

3. Der gefleckte Tinamu. (Variegated T.)

(ſ. die ſieben und ſechzigſte Kupfertafel.)

Tetrao variegatus. L. l. 2. p. 768. No. 65 q).
Le Tinamou varié. Buff. ois. IV. p. 511 r). Pl. enlum. 828. — Mem. ſur Cayenne. vol. II. p. 272.

Seine Länge iſt eilf Zoll. Der Schnabel iſt fünf Viertel Zoll lang, und dunkelfarbig, die untere Kinnlade gelblich; der Kopf und der obere hintere Theil des Halſes ſind ſchwarz; die übrigen obern Theile ſind nach der Queere röthlichbraun und ſchwarz geſtreift; die Augenkreiße blaß, und nicht ſtark mit Federn bekleidet; die Kehle und die Mitte des Bauchs weiß; der Hals, die Bruſt und der obere Theil des Bauchs gelbroth; die Seiten und die Schenkel braun, gelbroth und weiß geſtreift; die Schwungfedern einfärbigbraun; der Schwanz iſt nur ein klein wenig länger, als die zuſammengelegten Flügel; die Füße dunkelfarbig.

Er iſt ziemlich gemein in Guiana, aber doch ungleich weniger, als die erſte Art. Das Weibchen legt zehn bis zwölf Eyer, von ſchöner Lilafarbe, und etwas kleiner, als die Faſaneneyer.

Herr Bajou ſagt, dieſe Art ſetze ſich nie auf die Bäume, und unterſcheide ſich dadurch, daß die Jungen längere Zeit mit der Mutter laufen.

4. Der kleine Tinamu. (Little T.)

Tetrao Sovi. Buff. ois. IV. p. 512 s),
Le Sovi ou petit Tinamou de Cayenne Pl. enlum. 829.

Dieß

o) Tinamus cinereus Latham Ind. orn. II. p. 633. n. 2. B.
p) Ueberſ. XIII. S. 239. 2. B.
q) Tinamus variegatus Latham Ind. orn. II. p. 634. n. 3. B.
r) Ueberſ. XIII. S. 240. 3. B.
s) Tinamus Soui Latham Ind. orn. II. p. 634. n. 4. B
t) Ueberſ. XIII. S. 243. 4. B.

Der gefleckte Tinamú

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

Dieß iſt eine kleine Art, die nicht über neun Zoll mißt. Ihr Schnabel iſt drey Viertel Zoll lang, und gelb; Scheitel und Hinterhals ſind ſchwarz; von hier an ſind die übrigen obern Theile des Körpers braun, mit einer unſcheinlichen, dunkelfarbigen Miſchung; die Kehle iſt gelbroth, mit Weiß gemiſcht, und die übrigen untern Theile einfärbig gelbroth; die Deckfedern der Flügel haben eben ſolche Ränder; die Schwungfedern ſind einfärbig braun; der Schwanz iſt kurz, und die Deckfedern ſind länger, als der Schwanz ſelbſt; die Füße dunkelgelb.

Auch dieſer iſt in Guiana zu Hauſe, wo er wegen der Kürze ſeines Schwanzes, das Rebhuhn mit dem runden Hintern, (Perdrix cul rond) genannt wird. Er unterſcheidet ſich dadurch von den andern, daß er ſein Neſt auf niedere Baumzweige baut. Es iſt halbkugelrund, etwan ſechs Zoll breit, und fünfe tief, und beſteht aus Laub. Er legt drey bis ſechs, faſt runde Eyer, ſo groß, wie Taubeneyer. Sein Fleiſch wird ſehr geſchäzt.

Drey und funfzigſte Gattung. Waldhuhn.

Der Schnabel dieſer Gattung iſt erhaben, ſtark und kurz. Die Augen ſind mit einer nackten, ſcharlachrothen Haut bedeckt *). Die Naſenlöcher klein, in Federn verſteckt. Die Zunge am Ende ſpizig. Die Füße ſtark, bis an die Zehen, zuweilen bis an die Klauen befiedert. Die Zehen einiger Arten an den Seiten kammförmig eingeſchnitten (pectinated).

* Mit vier Zehen.

1. Das Auerhuhn. (Wood Grous.)

Tetrao Vrogallus L. I. 2. p. 746. No. 1 *v*). — Faun. Suec. No 200. — Scop. ann. I. No. 169 *w*). — Brun. orn. No. 194. 95. — Muller Zool No. 122. — Frisch tab. 107. 108. — Kram. elench. p. 356. No. 1. — Georgi Reise p. 172.

Le Coq de bruyere. Briss. orn. I. p. 182. No. 1.

Le grand Coq de bruyere ou le Tetras. Buff. oiſ. II. p. 191. pl. 5. *x*) — Pl. enlum. 73. 74.

*) Drey oder vier der lezten Arten ausgenommen.

v) Latham Ind. orn. II. p. 634. n. 1. B.

w) Ueberſ. von Günther S. 137. Nr. 168. B.

x) Ueberſ. V. S. 7. B.

Mountain Cock and Hen. Albin II. pl. 29. 30.
Cock of the wood. Ray Syn. p. 53. A. I. — Will. orn. p. 172. pl. 36.
Wood Grous. Br. Zool. I. No. 92. pl. 40. 41. y) — Tour in Scotl. 8vo. p. 79. pl. 15. 16. — Arct. Zool. II. p. 311. A. z).
Lev. Mus.

Diese Art ist so groß, als ein **Truthahn**, und zwey Fuß, neun Zoll lang. Ihr Schnabel ist fast zwey Zoll lang, sehr stark und hornfarben; über den Augen ist eine nackte, rothe Haut; der Augenstern nußbraun; die Nasenlöcher sind mit kurzen Federn bedeckt; die Federn am Kinn und an der Kehle schwarz, und länger als die übrigen; Kopf und Hals aschfarben, sehr fein mit schmalen, schwärzlichen Queerstrichen bezeichnet; die obern Theile des Körpers und die Flügel kastanienbraun, unregelmäßig mit schwärzlichen Strichen bezeichnet; die Federn am Ursprung der Flügel weiß; die Brust sehr glänzend schwärzlichgrün; die übrigen untern Theile schwarz, der Bauch aber, und die Federn über den Schenkeln, nebst dem After, sind mit Weiß bezeichnet; die Seiten eben so wie der Hals; der Schwanz besteht aus achtzehn Federn, ist abgerundet, und zu beyden Seiten mit einigen wenigen, weißen Flecken bezeichnet; die Füße sind stark, und mit braunen Federn bedeckt; die Ränder der Zehen kammförmig eingeschnitten.

Das **Weibchen** ist gar sehr verschieden, weit kleiner, und nur sechs und zwanzig Zoll lang. Sein Schnabel ist dunkelfarbig; die Kehle roth; Kopf, Hals und Rücken mit schwarzen und rothen Queerstreifen bezeichnet; die Brust hat einige weiße Flecken, und der untere Theil derselben ist einfärbig orangefarben; der Bauch hell orangefarben und schwarz gestreift, die Federspitzen weiß; Rücken und Schulterfedern schwarz, die Ränder der Federn schwarz und hellröthlichbraun gesprenkelt; die Schulterfedern haben weiße Spitzen; die innern Fahnen der Schwungfedern sind dunkelfarbig, die äußern dunkelfarbig und hellbraun gesprenkelt; der Schwanz dunkel rostfarben, schwarz gestreift, mit weißen Spitzen, und besteht aus sechzehn Federn a).

Dieser Vogel ist größtentheils nur in kältern Ländern zu Hause, oder, wenn man ihn auch in wärmern antrifft, so wählt er sich erhauene Gegenden, wo die Temperatur der Luft frisch und kalt ist. Unter dieser Einschränkung findet er sich in verschiedenen Ländern der alten Welt, von nördlichen **Rußland** an, bis nach **Italien**, und in verschiedenen **Alpengegenden**. Ehemals hat man ihn in **Irrland** und **Schottland** gefunden; in ersterm, glaubt man, sey er jetzt ausgerot-

y) Ueberf. S. 85. Taf. 34. 35. B.
z) Ueberf. II. S. 292. A. Vergl. auch Zorns Pethinoth, II. S. 79. 114. 277. 712. Meyers illum. Thiere I. Taf. S. 19. Taf. 16. 17. Meine N. G. Deutschlands III. S. 420. Nr. 1. N. G. des In- und Auslands, I. 1. S. 473. Nr. 1. Von Wildungen Neujahrsgeschenk für Förster ꝛc. 1794. S. 113. B.
a) Ich folge hier Pennanten. Brisson nimmt auch beym Männchen nur sechszehn an. Schwenkfeld will gar nur zwölfe haben; ohne Zweifel hat sein Vogel die übrigen verloren; aber, im Gegentheil, giebt er dem Weibchen achtzehn. Daher es sehr wahrscheinlich wird, daß achtzehn die Zahl sey, die die Natur beyden Geschlechtern zugedacht hat; besonders da ich mich auf keine andere Vögelart entsinnen kann, wo Männchen und Weibchen in der Zahl der Schwanzfedern verschieden wären. Linné erwähnt in den Faun. Suec. achtzehn Federn; beschreibt aber nur das Männchen. (Der Schwanz hat bey Männchen und Weibchen achtzehn Federn. B.)

ortet; und in letztem ist bey Inverneſſ einer geſchoſſen worden, das als eine Seltenheit angeführt wird *b*). Er legt ſechzehn bis achtzehn weiße Eyer, die größer ſind, als unſre Hühnereyer; ſie liegen auf Moos, an einer trocknen Stelle, auf der Erde; das Weibchen allein ſitzt während der ganzen Brütezeit über ihnen, und verſteckt die Stelle, wenn ſie ſie auf einige Zeit verlaſſen muß, indem ſie die Eyer mit Laub bedeckt. Die Jungen laufen der Mutter nach, ſobald ſie ausgekrochen ſind, und oft noch mit einem Stückchen Eyerſchaale, die ihnen anklebt, wie die Rebhühner bekanntlich thun.

Männchen und Weibchen leben abgeſondert bis zum Anfang des Februars, wo das Männchen Morgens und Abends, den Strunk einer alten Fichte *c*) beſteigt, mit ausgebreitetem Schwanze, bis zu den Füßen herabhängenden Flügeln, vorgeſtrecktem Halſe, und aufgeſträubten (ruffled) Kopffedern. Das Geſchrey, das er erhebt, iſt dem Wetzen einer Senſe nicht unähnlich *d*), das er einmal ums andere mal, und ſo laut wiederhohlt, daß man es ſehr weit hören kann; zugleich macht er ſelbſt die lächerlichſten Poſituren. Dieſer Ruf gilt dem Serail ſeiner Weiber, die die Aufforderung erwarten; und er fährt bis zu Ende des Märzes, oder Anfang des Aprils damit fort.

Ihre Nahrung beſteht aus vielerley Arten von Pflanzen, jungen Baumknoſpen, und vor allen, von Saamen der Fichten und Kiefern, derentwegen ſie bekanntlich zuweilen alle Zapfen von einem Baum abſtreifen *e*), während der zunächſt daran ſtehende unberührt bleibt.

In größter Menge findet man dieſe Vögel in Rußland und Sibirien, wo man ſie in allen Wäldern des Nordens, beſonders in den Fichtenwäldern antrifft. Sie ſind gemein ſowohl um Moskau, als Petersburg, woher ſie nebſt weißen Haaſen, Schneehühnern u. d. gl. während der kalten Jahrszeit, als Geſchenke nach London geſchickt werden; und mehrentheils kommen ſie noch gut conſervirt in die Küche, denn ihr Fleiſch wird ſehr geſchätzt.

Man hat mir geſagt, es gäbe eine viel kleinere Spielart, als die gemeine Art iſt *f*).

2. Das

b) Br. Zool. — Der letzte Vogel dieſer Art in Schottland, wurde in dem groſſen Walde bey Chicholm, in Strathglaſſ, gefunden; und ich weiß gewiß, daß das Neſt auf einer Schottländiſchen Fichte angebracht war. (Hier iſt gewiß ein Irrthum. Sie niſten allzeit auf den Boden, können gar kein künſtliches Neſt bauen, das auf einen Baum ſtehen könnte, ſondern legen nur etwas Geniſt zuſammen, damit das Weibchen die Eyer beym Aufſtehen bedecken kann. B.)

c) Es iſt nicht immer eine alte Fichte, ſondern es können auch andere Bäume ſeyn. Am liebſten freylich Tannen oder Fichten. B.

d) Das Wetzen iſt nur der Ausgang des Falzen, wie man dieſen Lockgeſang nennt, wo er ganz betäubt iſt, und vor Affect weder hört noch ſieht. Es beſteht eigentlich aus folgenden Sylben: Dött, dött, dött; dödel, dödel, dödel, dödelrrr! glack — hedelhedehe, hedel, hedehei. B.

e) Dieß habe ich nie gehört noch geſehen. Die Zapfen nicht, wohl aber die Knoſpen gehen ſie an. B.

f) Herr Pennant. — Man hat bemerkt, daß die Vögel aus der Waldhühnergattung in Lappland kleiner ſind, als mehr gegen Süden; woran der größere Grad der Kälte Schuld

ſey

2. Das langschwänzige Waldhuhn. (Long-tailed Gr.)

Tetrao Phasianellus L. l. 2. p. 747. No. 7. g)
Hudson's Bay Phaseant Grous. Phil. Trans. vol. LXIII. p. 396. b)
Long-tailed Grous from Hudson's Bay. Edw. pl. 117. i)
Sharp-tailed Grous. Arct. Zool. II. No. 181. k)

Es ist etwas größer, als ein Fasan, siebenzehn Zoll lang, und vier und zwanzig Zoll breit. Sein Schnabel ist schwarz; der Augenstern nußbraun; der Kopf, der Hals und die obern Theile ziegelfarbig (testaceous), mit schwarzen Queerbinden, die am Rücken am breitesten sind; zwischen dem Schnabel und den Augen ist ein weißer Fleck; die Seiten des Halses sind mit rundlichen, weißen Flecken bezeichnet; der Steiß ist schimmelgrau; Brust und Bauch sind weißlich, und mit herzförmigen, muschelbraunen Flecken bezeichnet, die am Bauch am dunkelsten sind; an den Deckfedern der Flügel sind runde, weiße Flecken, wie auch Streifen; die Schwungfedern sind schwarz, mit weißen Flecken am äußern Rande, die kürzern braun, am äußern Rande und an der Spitze mit weißen Binden; der Schwanz kurz, seine Seitenfedern hellbraun, mit weißen Spitzen, die zwey mittlern um einen halben Zoll länger, und ziegelfarbig gefleckt.

Männchen und Weibchen sind an Farbe wenig verschieden, und verändern sie auch nicht nach den Jahrszeiten. Die Brust des Männchens ist schokolatebraun, und der Fleischlappen über den Augen ungleich größer, einen Zoll lang, und drey Achtel Zoll hoch l).

Dr. Forster ist der Meynung, dieser Vogel sey gänzlich vom Auerhahn verschieden, und Edwards Platte stelle sehr wahrscheinlich eher eine Spielart, als das Weibchen dieses Vogels vor. Der keilförmige Schwanz ist das wahre specifische Unterscheidungszeichen; und ausserdem sind auch die Schulterfedern nicht weiß, wie bey der Auerhenne.

Er wird auf Hudson's Bay angetroffen, wo er von den Einwohnern Oi-kiss-cow genannt wird.

Der m) Schwanz dieses Vogels besteht aus achtzehn Federn. Ich bemerke, daß bey einigen Vögeln die mittlern Schwanzfedern um anderthalb Zoll, und darüber, bey andern aber kaum um einen halben Zoll länger sind, als die übrigen; ein Unterschied, der im Geschlecht oder im Alter seinen Grund hat.

Das

seyn mag. Ob diese kleine Spielart in den nördlichen Gegenden sehr gemein sey, wird nicht gesagt. — Amoen. Acad. III. p. 162. (Außer dieser kleinen Varietät habe ich auch einen bunten Auerhahn (Tetr. Ur. varius.) gesehen. Er hat gelblichweiße Deckfedern der Flügel und einige weiße Federn am Schwanz. B.)

g) Latham Ind. orn. II. p. 635. n. 2. Lin. Syst. I. p. 273. I. Var. g. B.

b) Coq de Bruyeres à longue queue Buff. II. p. 286. Uebers. V. S. 139. B.

i) Seligmanns Vögel IV. Taf. 12. B.

k) Uebers. II. S. 286. Nr. 97. B.

l) Büffon irret sich, wenn er diesen Vogel für das Weibchen vom gefleckten Waldhuhn hält. B.

m) Zus. a. d. Suppl. S. 212. Uebers.

Das Weibchen soll sich dadurch vom Männchen unterscheiden, daß es weniger von der nackten rothen Haut über den Augen hat.

Diese Vögel halten sich das ganze Jahr hindurch, auf den mit Wachholderbüschen besetzten Ebenen, Paarweise oder in kleinen Flügen beysammen auf, und leben abwechselnd bald von den Knospen, bald von den Beeren derselben. Mehrentheils sieht man sie auf dem Boden, wenn sie aber aufgescheucht worden, so fliegen sie auf die Gipfel der höchsten Bäume. Sie legen ihre Eyer auf die Erde, und bauen ein lockeres Nest von Gras, mit Federn ausgelegt. Die Eyer sind weiß gefleckt, und kriechen in der Mitte des Junius aus. Die Vögel sollen mit ihren Schwanzfedern ein Geräusch machen, das dem Knarrrn eines Fähnchens gleicht. Ihr Fleisch ist von hellbrauner Farbe, fett (plump), und sehr saftig *n*).

3. Das Birkhuhn. (Black Gr.)

Tetrao Tetrix L. l. 2. p. 748. No. 2. *o*). — Faun. Suec. No. 202. — Scop. ann. I. No. 169. *p*) Brünn. orn. No. 196. 197. — Müller Zool. No. 222. — Frisch tab. 109. — Kram. elench. p. 356. No. 2. Georgi Reise p. 172. — Sepp Vog. pl. in p. 165.

Le Coq des bruyeres à queve fourchue. Briss. orn. I. p. 186. No 2.

Le Coq des bruyeres, ou le petit Tetras. Buff. ois. II. p. 210. pl. 6. *q*) — Pl. enlum. 172. 73.

Black Cock, Black Game, or Black Grous. Raii Syn. p. 53. A. 2. — Will. orn p. 173. pl. 31. — Albin. pl. 22. — Br. Zool. I. no. 93. pl. 42. *r*) — Arct. Zool. II. p. 314. C. *s*),
Br. Mus. Lev. Mus.

Es ist etwas größer, als ein Haushuhn, und vier und zwanzig Zoll lang. Sein Schnabel ist schwarz; so ist auch der ganze Körper schön glänzend blauschwarz; die Deckfedern der Flügel sind dunkelbraun; die vier ersten Schwungfedern schwarz, die nächsten an der Wurzel weiß; die untere Hälfte und die Spitzen der kurzen Schwungfedern, und die innern Deckfedern der Flügel weiß; Schenkel und Beine dunkelbraun; an jenen einige weiße Flecken; der Schwanz besteht aus sechzehn schwarzen Federn, die äußern krümmen sich auswärts, und ihre Enden sind viereckig; die mittlern sind viel kürzer, wodurch der Schwanz selbst gabelförmig *t*) wird; die untern Deckfedern desselben sind weiß; die Füße und die Zehen kammförmig eingeschnitten, wie bey der ersten Art.

Das

n) Arct. Zool.
o) Latham Ind. orn. II. p. 625. n. 3. B.
p) Uebers. von Günther S. 139. B.
q) Uebers. V. S. 32. B.
r) Uebers. S. 86. Taf. 36. 37. B.
s) Uebers. II. 293. C. Vergleiche meine N. G. Deutschlands III. S. 483. Nr. 2. N. G. des In- und Auslandes I. S. 475. Nr. 2. und von Wildungen Neujahrsgeschenke für Forst- und Jagdliebhaber fürs Jahr 1795. S. 37. B.
t) Auseinandergezogen, wie es in der Kunstsprache heißt. B.

Das Weibchen iſt ſo ſehr vom Männchen verſchieden, wie beym Auerhahn, und ebenfalls viel kleiner.

Dieſe Art iſt in allen nördlichen Theilen von Großbrittanien, beſonders aber in Schottland und Wales gemein; aber nur hin und wieder zerſtreut, ſo wie man weiter gegen Süden kommt. Sie liebt Wald- und Berggegenden. In Cumberland trifft man auch einige an, und in den Moräſten von Yorkſhire ſind ſie in ziemlicher Menge. Außerordentlich häufig ſind ſie auch in Staffordſhire, beſonders in das Lord's Paget Gebiete, und in großer Menge in den neuen Waldungen von Hampſhire, beſonders in den Lägern (lodges) Bouldernood und Rindfield. Auch in Suſſex hat man ihrer viele angetroffen, und einige in Surrey.

Die Weibchen verſammeln ſich auf das Falzen des Männchens, eben ſo, wie beym Auerhahn geſagt worden iſt *). Sie legen ſechs bis acht gelblichweiße Eyer, mit roſtigrothen Sprenkeln, und mit eben ſolchen Flecken, die am ſpitzigen Ende am größten ſind.

Die Hähne ſtreiten und kämpfen oft unter ſich, wie die Kampfhähne, und während des Gefechtes ſind ſie ſo außer ſich (off their guard), daß man ſie mit Prügeln todſchlagen kann.

Dieſe Vögel ſind gleichfalls häufig in allen nördlichen Ländern Europens, ohne Ausnahme, und in geringerer Zahl gegen Süden; denn hier findet man ſie nur in bergigen und offenen (bleak) Gegenden. Außerordentlich gemein ſind ſie in den nördlichen Theilen von Rußland und Sibirien, wo Birken wachſen. Sie lieben auch die Sibiriſche Pappel *), die ihrem Fleiſch einen äußerſt guten Geſchmack geben ſoll.

Dieſer *) Vogel wird, wie mir neuerlich geſagt wurde, nach und nach immer ſeltner durch das ganze nördliche England, ſo wie in Schottland, und zwar aus verſchiedenen Gründen: nämlich, die großen Fortſchritte, die man ſeit einigen Jahren in der Kunſt im Flug zu ſchieſſen (Shooting flying) gemacht hat; die Gewohnheit viele Moräſte und Gemeinplätze einzuſchließen, nebſt dem Unglück, das ſie durch das Abbrennen des Heidekrauts (heath) auf den Moräſten, um ſie fruchtbar zu machen, betroffen hat, und das ſich nicht wohl vermeiden läßt, da gewöhnlich bey Nacht angebrannt wird, und dieſer Brand ſich oft auf einige Meilen erſtrecket; endlich ſind beſonders im Frühjahr viele Neſter, mit den Alten auf denſelben, zerſtört worden. Vielleicht trägt auch die große Leichtigkeit, dieſe Vögel, mittelſt unzähliger Fuhrwerke, nach der Hauptſtadt, oder nach den großen Handelſtädten, zu bringen, viel zu ihrer Seltenheit bey.

Dieſe Vögel leben in Menagerieen im Zuſtande der Gefangenſchaft, haben aber bisher, ſo viel man weiß, in dieſem Stande noch nicht gebrütet.

Das

*) Dieſes ſein Falzen, das aber ſehr von dem des Auerhahns verſchieden iſt, und nicht auf dem Baum, ſondern auf dem Boden mit wunderbaren Sprüngen geſchieht, hört man viel weiter.

B.

*) Sibirian Poplar. Populus balſamifera L.

*) Zuſ. a. d. Suppl. S. 213. Ueberſ.

Das Fleiſch verſchiedener Vögel aus der Waldhuhngattung ſpielt mehr oder weniger ins Braune; demungeachtet aber iſt es ſehr wohlſchmeckend; bey dieſer Art aber iſt ein Theil des Fleiſches an der Bruſt weiß, wird in Norden weißes Fleiſch (white Muſcle) genannt, und macht einen ſonderbaren Contraſt mit den Theilen die es umgeben, und die dunkel gefärbt ſind. Dieſen Umſtand bemerkt man weder beym Auerhahn, deſſen Bruſt durchaus gleichförmig dunkel gefärbt iſt, noch bey irgend einer andern Art, die wir bisher kennen.

Weder dieſe Art, noch das Schneehuhn (Nr. 10.) ſind zur Zeit in Irrland, obſchon ſich das rothe Waldhuhn (Nr. 13.) häufig in den Gebirgen und Sümpfen dieſes Königreichs aufhält.

3. Var. A. Das Baſtard-Waldhuhn. (Spurious Gr.)

Tetrao Tetrix L. I. 2. p. 718. No. 3. V. *x*)
— — hybridus Faun. Suec. 201. — Sparm. Mus. Carlſ. pl. 15.
Le Coq des bruyeres piqueté. Briss. orn. I. p. 191. A.
Spurious Grous. Arct. Zool. II. p. 314. B. *y*).

Eine bloße Spielart von letztem. Das Männchen ſoll röthliche Flecken an Hals, Bruſt, Flügeln und Schenkeln haben; und das Weibchen von grauer Farbe, und ſchwarz gefleckt ſeyn.

Sie ſoll in Schweden und Schottland angetroffen werden. Wir *z*) ſind bisher ſehr im Dunkeln in Rückſicht dieſes Vogels geweſen. Herr Sparrmann fügt unſern bisherigen unvollkommenen Kenntniſſen von demſelben folgende Bemerkungen bey: Er hat die Größe einer Auerhenne, und iſt vermuthlich eine Brut von dieſer und dem Birkhahn; er variirt ſehr im Colorit, und man findet kaum zwey, die vollkommen überein ſind. Es iſt ein äußerſt dummer Vogel. Seine Stimme iſt der des Auerhahns am ähnlichſten, aber lauter, rauher und in alle Wege unangenehmer. Sparrmann bemerkt ferner, daß die Vögel, die man bisher angetroffen habe, ſie mogten ſich mit Männchen oder Weibchen zuſammenhalten, allezeit männlichen Geſchlechts geweſen ſind. Dieſe Art iſt nicht ſelten in den Wäldern von Schweden und Finnland.

Herr Tunſtall ſagt mir, es hätten ihm einige alte Schottiſche Herrn erzählt, daß beyde, ſowohl der Auerhahn, als das Baſtard-Waldhuhn ſeit ihrem Gedenken in Schottland vorhanden geweſen wären *a*).

x) Latham l. c. *δ*.
y) Ueberſ. II. S. 293. B. Vergleiche auch meine N. G. Deutſchlands III. S. 497. B.
z) Zuſ. a. d. Suppl. S. 214. Ueberſ.
a) Wenn man dieſen Vogel in Sparrmans Muſ. Carlſ. ohne Namen anſieht, ſo muß man ihn für einen Birkhahn halten; ſo ſehr gleicht er ihm in allen. Ich würde daher ſagen, daß es eine große Varietät des Birkhahns ſey, wobey die kleinen Abweichungen in den Federn nicht in Betracht kommen.

Im Thüringerwald hat man von dieſem Vogel

4. Das bunte Waldhuhn. (Nemesian Gr.)

Tetrao nemesianus. L. I. 2. p. 748. No. 20. *b*).
— — Scop. ann. I. No. 171. *c*).
— — Aldrov. Av. lib. XIII. cap. 8.

Von der Größe des Birkhuhns. Der Körper ist schwarz und gelbroth melirt; der Schwanz gelbroth, mit schwarzen Spitzen und Flecken, und die kurzen Schwungfedern haben weiße Spitzen *d*).

Beym weiblichen Geschlecht sind der Hals, die Wangen und die Brust einfarbig gelbroth.

5. Das kleine Birkhuhn. (Birch Gr.)

Tetrao betulinus. L. l. 2. p. 749. No. 22. *e*)
— — Scop. ann. I. No. 172. *f*)
— — Aldrov. Av. lib. XIII. cap. 9.

Der Körper dieses Vogels ist schwarz und gelbroth gemischt; der Steiß weißlich, mit schwarzen Binden; die Brust hell aschgrau; die Schwungfedern haben weiße Spitzen; der Schwanz ist schwarz, mit gelbrothen, nach der Queere stehenden Flecken; Schnabel und Füße schwarz; die Augenbraunen nicht roth *g*).

6. Das gelbgefleckte Waldhuhn. (Spotted Gr.)

Tetrao canadensis. L. l. 2. p. 749. No. 3. (Mas) *h*)
— canace. ibid. No. 3. b. (Femina.)

La

gel noch nichts bemerkt, obgleich auch, wie unter allen Vögeln, oft sehr große Birkhähner ausfallen.

Herr Beseke in seinen Beyträgen zur N. G. Kurlands S. 69. hat diesen Vogel auch in Kurland angetroffen. Wenn es also keine Varietät ist, so muß er wirklich eine verschiedene Art ausmachen; denn ich sehe gar nicht ein, welche Noth diese Vögel, besonders in jenen Gegenden, wo beyde Arten so häufig sind, antreiben soll, sich so zu verpaaren. Bey wilden Vögeln ist ja dieß ein äußerst seltner Fall, und alsdann müßten sich auch die verschiedenen paarenden Arten wenigstens eins ander in der Größe ähnlich seyn, welches aber hier der Fall nicht ist.

Herr Beseke sagt, mein Exemplar hat die Gestalt eines Birkhahns, nur ist es noch einmal so groß. In der glänzend schwarzen Farbe ist es dem Birkhahne ganz ähnlich, nur unterscheidet es sich von diesem, theils durch den fächerförmigen, auerhahnartigen Schwanz, theils durch die schwarzgefleckten untern Deckfedern des Schwanzes, die beym Birkhahne ganz weiß sind. Hierzu kömmt noch, daß der Birkhahn eine Art eines kleinen Spiegels, und weißliche Kiele in den Schwungfedern hat, welche an den Rockelhanar (so nennt man in Schweden diesen Vogel) fehlen. Uebrigens ist diese Bastardart durch die Mittelhaltung zwischen Auerhuhn und Birkhuhn in Größe sowohl als Gestalt nicht zu verkennen. B.

b) Latham Ind. orn. II. p. 637. n. 4. B.
c) Uebers. v. Günther. S. 141. N. 171. B.
d) Dieß ist wohl keine eigne Art, sondern ein Haselhuhn, dessen Balg beym Ausstopfen so erweitert worden ist, daß er die Größe des Birkhuhns erreicht hat. B.
e) Latham Ind. orn. II. p. 637. n. 5. B.
f) Uebers. von Günther S. 141. N. 172. B.
g) Ich halte diesen Vogel für ein junges Haselhuhn. B.
h) Latham Ind. orn. II. p. 637. n. 6. B.

La Gelinotte de la Baye d'Hudson. Briss. orn. I. p. 201, No. 6.
La Gelinotte de Canada. ibid. p. 203. No. 7. pl. 20. f. 1. 2. — Buff. ois. II. p. 279. *i*) — Pl. enlum. 131. 132.
Black and spotted Heath Cock. Edw. pl. 118. (das Männchen.) *k*)
Brown and spotted Heath Cock. id. pl. 71. (das Weibchen.)
Spotted Grous. Phil. Trans. Vol. LXII. p. 389.
— — Arct. Zool. II. p. 307. No. 82. *l*).
Lev. Mus.

Es hat die Größe des Schneehuhns (Nr. 10.), und dreyzehn und einen halben Zoll Länge. Der Schnabel ist schwarz; die obern Theile des Kopfs, des Halses und des Körpers, nebst dem Steiß, sind nach der Queere schwärzlich und graubraun gestreift; die Nasenlöcher mit schwarzen Federn bedeckt; an jeder Seite derselben ein kleiner, weißer Fleck, und ein anderer unter den Augen, oder vielmehr hinter denselben; über den Augenliedern ist eine nackte, lappenförmige, rothe Stelle; Kehle, Brust und Bauch sind schwarz, letzter weiß gefleckt, ausgenommen in der Mitte; die Seiten nach der Queere schwärzlich und graubraun gestreift, mit einem großen weißen Fleck (dash) an den Spitzen; die untern Deckfedern des Schwanzes schwarz und weiß; der Schwanz schwarz, mit gelbrothen Spitzen; die Füße mit graubraunen Federn bedeckt; die Klauen grau; die Zehen kammförmig eingeschnitten.

Das Weibchen ist kleiner, und nur zwölfthalb Zoll lang. Alle obern Theile sind mit gelbrothen, schwärzlichen und graubraunen Streifen durchzogen, und bilden große Flecken von eben dieser Farbe am Rücken; der Vorderhals und die Seiten desselben sind gelbroth und schwärzlich gestreift, mit schmutzig gelbröthlichweißen Spitzen; der Bauch und die untern Deckfedern des Schwanzes schwärzlich und gelbröthlichweiß gestreift, mit schmutzigweißen Spitzen; die Schwungfedern, wie beym Männchen; der Schwanz gelbroth und schwarz gestreift; die Zehen kammförmig eingeschnitten.

Diese Vögel halten sich in der Hudson's Bay auf, wo sie Wald- oder Fichten-Rebhühner (Wood - or Spruce - Partridges) genannt werden. Im Winter leben sie von Fichtenschößlingen (Spruce-cones) und Wachholderbeeren. Man ißt sie zu allen Zeiten, obschon sie im Sommer für viel beßer gehalten werden. Die Eingebohrnen erhalten sie den Winter hindurch, indem sie sie dem Froste aussetzen, sie beym Schnabel aufhängen, und während der ganzen rauhen Jahrszeit gut konserviren, so daß sie sie blos ins Wasser legen dürfen, um sie aufthauen zu lassen, ehe sie zugerichtet werden. Sie sind leicht in großer Menge zu bekommen, weil es sehr dumme Vögel sind, und sich mit einen Stock vor dem Kopf schlagen lassen; oft werden sie in einer um einen Stock gebundenen Schlinge gefangen. Ihr Nest machen sie auf den Boden, und legen fünf Eyer *m*). Wenn sie sehr in die Enge getrieben werden, so fliegen sie oft auf Bäume, und wenn der Jäger einen kleinen Hund bey sich hat, der sie beobachtet (steht), so kann er einen Vogel nach dem andern, bis auf den letzten herabschießen.

i) Uebers. XIII. S. 121. B.
k) Seligmanns Vögel V. Taf. 13. Männchen. III. Taf. 37. das Weibchen. B.
l) Uebers. II. S. 287. Nr. 89. B.
m) Hierbey bemerkt Pennant (l. c.) daß wenn es wahr sey, daß diese Art nur fünf Eyer lege, so mache dieß eine sonderbare Ausnahme von der fruchtbaren Natur dieser Gattung. B.

Herr *) Hutchins hat neuerlich meine Sammlung mit einer äußerst schönen Spielart eines Vogels bereichert. Ihre Länge ist sechzehn Zoll. Die Hauptfarbe des Gefieders ist rostigroth-milchrahmfarben, nach der Queere mit brauner und gelber Thonfarbe marmorirt und gestreift; Vorderhals und Brust ziehen stark ins Gelbe; die untern Theile des Körpers sind weiß, mit abgebrochenen, aschbraunen Streifen bezeichnet; die Schwungfedern einfarbig bräunlich milchrahmfarben; der Schwanz gelblichbraun, stark mit dunklerm Braun gesprenkelt; die Spitze aller seiner Federn rostigroth, aber blaß.

7. Das Kragen-Waldhuhn. (Shoulder-knot Gr.)

Tetrao togatus. L. l. 2. p. 732. No. 8. o).
La Grosse Gelinotte de Canada. Briss. orn. I. p. 267. pl. 21. f. 1. — Buff. ois. II. p. 281. — Pl. enlum. 104.
Shoulder-knot Grous. Phil. Trans. Vol. LXII. p. 393.
Br. Mus. Lev. Mus.

(Weibchen.)

Es hat die Größe eines kleinen Haushuhns, und ist funfzehn und einen halben Zoll lang. Sein Schnabel ist braun; der Kopf und die obern Theile sind gelbroth, braun, schwärzlich und aschfarben melirt; Kehle und Vorderhals gelbroth, mit kleinen, braunen Flecken und Bändern; der obere Theil der Brust ist schwärzlich und grau, woraus sich ein Band bildet, das sich zu beyden Seiten mit einem Büschel (packet) langer, schwarzer Federn vereinigt, die über die Flügel herüber fallen; die übrigen untern Theile sind gelbroth, braun und schmutzig weiß gestreift; die Schwungfedern braun und ihr äußerer Rand schmutzigweiß gemischt; der Schwanz fast wie der Rücken, mit fünf oder sechs schmalen, schwarzen Streifen, und einem breiten am Ende durchzogen, die eigentlichen Federspitzen grau; die Füße befiedert, und grau; die Zehen nackt, und braun.

Es ist auf Hudso'ns Bay zu Hause, und wird von den Eingebohrnen Puschee, oder Pupushee genannt. Sein Fleisch ist etwas trocken, aber weiß, und, wenn es gut zubereitet wird, eine schmackhafte Speise.

Sie bleiben das ganze Jahr hindurch da, und leben im Winter von Wachholdern, im Sommer aber von Stachelbeeren, Himmbeeren, Rauschbeeren (cranberries p) und Johannisbeeren. Die Jungen folgen der Mutter, wie unsere Küchelchen.

Männchen und Weibchen sind sich ziemlich gleich.

8. Das

*) Zus. aus dem Suppl. S. 214.

o) Tetrao Umbellus. Latham Ind. orn. II. p. 638. n. 7. β. Hier hat Herr Latham, wie er auch schon in dem Suppl. unten zu dem Kragenwaldhuhn Nr. 8. bemerkt, durch Herrn Pennants Ansehen und den eigenen Augenschein diese Art vertilgt, da sie nichts anders als das Weibchen des Kragenwaldhuhns ist. B.

p) Empetrum. L.

8. Das Kragen-Waldhuhn. (Ruffed Gr.)

Tetrao Umbellus. L. I. 2. p. 752. No. 6. *q*)
La Gelinotte huppée de la Pensilvanie. Briss. orn. I. p. 214. No. 11.
Le Coq des bruyeres à fraise. Buff. ois. II. p. 281. *r*).
Ruffed Heathcock. Edw. pl, 245. *s*)
— — Phil. Trans. Vol. XLVIII. p. 499. pl. 15.
— Grous. Arct. Zool. II. No. 179. *t*)
Br. Mus. Lev. Mus.

(Männchen.)

An Größe ſteht es zwiſchen dem **Faſan** und dem **Rebhuhn** in der Mitte, und ſeine Länge iſt zwanzig Zoll. Sein Schnabel iſt bräunlich hornfarben; der Kopf mit einem Federbuſch geziert, dieſer, und alle obern Theile ſind aus mannichfaltigen Braun geſchäckt, und mit Schwarz gemiſcht; die Federn des Halſes ſind lang und loſe, und können aufgerichtet werden, wie beym Haushahn; Kehle und Vorderhals ſind orangebraun; die übrigen untern Theile gelblichweiß, mit einigen krummen, ſchwarzen Zeichen an der Bruſt und an den Seiten; die untern Deckfedern des Schwanzes hell orangefarben, mit weißen Flecken; die Schwungfedern hellbraun gefleckt, auſſerdem gleich dem Rücken; eben ſo der Schwanz, der aus achtzehn Federn beſteht, die alle mit ſchmalen, ſchwarzen Streifen, und einem breiten Band von der nämlichen Farbe an der Spitze durchzogen ſind, das Ende ſelbſt iſt aſchfarben; die Füße ſind bis an die Zehen mit weißlichen Haaren bedeckt; die Zehen fleiſchfarben, und an den Seiten kammförmig eingeſchnitten.

Ein Vogel dieſer Art, den ich gegenwärtig beſitze, und für ein **Weibchen** halte, hat ein viel bläſſeres Colorit; ſein Schwanz iſt aſchfarben, mit dunkeln Streifen durchzogen, und zwiſchen jedem Streifen mit der nämlichen Farbe geſprenkelt (mottled); das breite Band am Ende iſt kaſtanienbraun, ſtatt ſchwarz.

Dieſe Art iſt in **Penſylvanien, Neuyork, Neuſchottland** und andern Ländern von **Nordamerika** zu Hauſe, und keinesweges das **Männchen** des **Mantelhuhns** (Nr. 7.), wie **Büffon** vermuthet *u*), und gehört auch durchaus nicht zu der folgenden, ſondern alle drey ſind ganz verſchiedene Arten.

Ihre Lebensart ſcheint ſo ziemlich mit dem **Birkhahn** und **Auerhahn** überein zu kommen; das **Männchen** ſtellt ſich auf einen erhabenen Strunk (stump), und ſchlägt eine Minute lang ſeine Flügel aneinander (hurping); dieſes wiederhohlt es immer nach einen Zwiſchenraum von ſieben bis acht Minuten, und richtet zugleich den Federbuſch und den Halskragen in die Höhe, welche Stellung Edwards glücklich nachgeahmt hat. Dieſes wird Morgens und Abends, um neun Uhr und um vier Uhr wiederhohlt; und die **Weibchen** reſpektiren dieſes Falzen, wie bey den obenerwähnten Vögeln. Während dieſer Entzückung iſt der Hahn blind bey der Annäherung des Jägers, der ſeinen Zweck mit Muſe abwarten kann, indem ihn der Vogel durch ſein

q) Latham Ind. orn. II. p. 638. n. 7. **B.**
r) Ueberſ. XIII. S. 128. **B.**
s) Seligmanns Vögel. VII. Taf. 38.
t) Ueberſ. II. S. 282. Nr. 95. **B.**
u) Hist. de Ois. Vol. II p. 282. — (Latham widerruft dieß ſelbſt unten. **B.**)

ſein eignes Geſchrey leitet, das man auf eine Meile hören kann. Im Herbſt wiederhohlt er ſein Schlagen mit den Flügeln v).

Das Weibchen ſoll zwölf bis ſechzehn Eyer auf den Boden, auf eine trockne Stelle zwiſchen die Blätter legen. Die Jungen folgen der Mutter, gleich den jungen Hühnern, und die ganze Brut hält ſich ſo lange zuſammen, bis die Natur ſie treibt, für eigne Nachkömmlinge zu ſorgen. Sie leben von allen Arten Körnern und Früchten, und vor allen ſollen ſie die Epheubeeren lieben. Ihr Fleiſch iſt eine ſchmackhafte und gute Speiſe. Einige nennen ſie Trommel-Rebhühner (Drumming Partridges).

Ich w) bitte um Erlaubniß meine Meynung, daß das Kragen-Waldhuhn (Ruffed) und das Mantel-Waldhuhn (Shoulder-knot Gr.) verſchiedene Arten ſeyen, zurücknehmen zu dürfen. Herrn Pennant's Beobachtungen hierüber haben das verdiente Gewicht bey mir, und werden dadurch noch beſtätigt, daß ich letzthin, durch Herrn Hutchins's Gefälligkeit, Exemplare von beyden Arten erhalten habe.

Ich habe mich überzeugt, daß beyde Geſchlechter, in verſchiedenen Stufen ihres Lebens, ſehr variiren. Die Grundfarbe des Gefieders iſt bey beyden Geſchlechtern nicht unähnlich, der Schwanz aber kommt bey beyden vollkommen überein. Nur das Männchen hat den Kragen und den Federbuſch, und das Weibchen keine Spur von demſelben, hingegen hat dieſes wieder bloß das Schwarze an der Wurzel der Flügel, oder an der Schulter.

9. Das geflügelte Waldhuhn. (Pinnated Gr.)

Tetrao Cupido. L. l. 2. p. 751. No. 5. *w*)
La Gelinotte huppée d'Amerique. Briss. orn. I. p. 212. No. 10. *x*)
Urogallus minor, fuscus, cervice plumis alas imitantibus donata. Catesby Carol. Append. tab. 1. *y*)
Pinnated Grous, Arct. Zool. II. p. 305. No. 180. *z*)
Lev. Mus.

Dieſe Art iſt um ein Drittheil größer, als das gemeine Rebhuhn. Ihr Schnabel iſt braun; der Augenſtern nußbraun; das ganze Gefieder röthlichbraun, nach der Queere mit ſchwarzen und weißen, wellenförmigen Strichen bezeichnet; die Kopffedern bilden einen Buſch, und zu beyden Seiten des Hinterhalſes entſpringen zwey Büſchel von fünf langen Federn; wovon eine über der andern liegt (lapping), und die längſte iſt drey Zoll lang; die großen Schwungfedern

v) Major Davies ſagt mir, das Männchen thue dieß auch zu andern Zeiten, und fange zuerſt ganz ſachte an zu flattern, dann immer ſtärker, bis es daſſelbe zu einer erſtaunenden Heftigkeit bringt, worauf es dann aufhört und kräht, wie unſer Faſanenhahn, und nach einer Pauſe fängt es wieder an. Dieß geſchieht bloß bey Sonnenaufgang und Untergang, und ſelbſt auch, wenn es im Hauſe gezähmt herum läuft.
w) Zuſ. aus dem Suppl. S. 215.
x) Latham Ind. orn. p. 638. n. 8. B.
y) Ueberſ. von Büffons Vögeln. XIII. S. 135. B.
z) Seligmanns Vögel. IV. Taf. 104. B.
z) Ueberſ. II. S. 285. B.

federn sind schwärzlich, am äußern Rande gelbroth gefleckt; der Schwanz ist unten schwarz; die Zehen sind gelb.

Das Weibchen ist kleiner, als das Männchen, von minder lebhaften Farben, und hat die Flügelfedern am Halse nicht.

Diese sonderbare Art bewohnt Carolina, Neu-Jersey und andere Länder von Nordamerika, vorzüglich aber die buschreichen (bushy) Ebenen der langen Insel, wo sie sehr zahlreich ist. Sie legt vermuthlich viele Eyer, weil man sie in Familien von vier und zwanzig und fünf und zwanzig, Alte und Junge, unter einander sieht. Sie brütet im Julius. Ihr hauptsächlichstes Futter sind Hockelbeeren (hockle berries) und die Früchte der Zwergreiche. Im September und October versammeln sie sich in Flügen von zwey Hunderten, und darüber, und sobald als Schnee fällt, besuchen sie die Plätze, wo Fichten wachsen. Das Männchen kräht bey Tages-Anbruch eine halbe Stunde lang, und um diese Zeit richtet es die Flügel-ähnlichen Federn am Halse vollkommen in die Höhe, die ausserdem gewöhnlich zu beyden Seiten herabhängen *a*). Man hat bemerkt, daß mehr Männchen als Weibchen zu Markte gebracht werden, ohne Zweifel, weil sie sich den Jägern durch ihr Geschrey verrathen.

10. Das Schneehuhn. (Ptarmigan Gr.)

Tetrao Lagopus L. l. 2. p. 749. No. 4. *b*) — Faun. Suec. No. 213. — Scop. ann. I. No. 170. *c*) — Raii. Syn. p. 55. No. 5. — Brünn. oru. p. 59. — Müller Zool. No. 223. — Phil. Trans. vol. LXII. p. 390. — Frisch tab. 110. 111. — Kram. elench. p. 356. — Faun. Groenl. No. 80. — Georgi Reise p. 172.

La Gelinotte blanche. Briss. orn. l. p. 216. No. 12. — Pl. enlum. 129. (im Wintergefieder) — 494. (im Sommergefieder).

Le Lagopede. Buff. ois. II. p. 264. pl. 9. *d*)

White Game. Will. orn. p. 176. pl. 32.

Ptarmigan. Br. Vool. I. No. 95. *e*) — Genzl. Magaz. 1772. pl. in p. 74. — Tour in Scotland 1771. p. 16. fi 1. — Arct. Zool. II. p. 315. D. *f*) Br. Mus. Lev. Mus.

Seine Länge ist von vierzehn bis zu funfzehn Zoll. Der Schnabel ist schwarz; das Gefieder hellbraun oder aschfarben, sehr schön mit kleinen, dunkeln Flecken und Streifen durchzogen oder gesprenkelt; Kopf und Hals mit breiten, schwarzen, rostfarbenen und weißen Streifen; die Flügel sind weiß, die Schäfte der großen Schwungfedern schwarz; der Bauch weiß. Beym Männ-

a) Catesby's Figur scheint im mittlern Zustande zwischen diesen beyden zu seyn.

b) Latham Ind. orn. II. p. 639. B.

c) Uebers. von Günther S. 140. Nr. 170. B.

d) Uebers. XIII. S. 101. B.

e) Uebers. S. 88. Taf. 39. B.

f) Uebers. II. S. 294. D. Vergl. auch meine N. G. Deutschlands III. S. 508. Nr. 4. und N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 477. Nr. 4. B.

Männchen ſticht das Graue vor, Kopf und Hals ausgenommen, wo eine ſtarke Miſchung von Rothem, mit weißen Streifen iſt. Die Weibchen und die jungen Vögel haben viel Roſtfarbnes in ihrem Gefieder; beyde kommen aber in ihren Winterfedern überein, die ſchneeweiß ſind, auſſer daß beym Männchen eine ſchwarze Linie zwiſchen dem Schnabel und den Augen durchläuft, und die Schäfte der ſieben erſten Schwungfedern ſchwarz ſind; der Schwanz beſteht aus ſechzehn Federn; die zwey mittlern ſind im Sommer aſchfarben, und im Winter weiß, die zwey nächſten haben nur ganz wenig Weißes an den Enden, und die übrigen ſind ganz ſchwarz; die die obern Deckfedern bedecken den Schwanz faſt.

Die Schneehühner ſind in den meiſten nördlichen Ländern Europens, ſelbſt in Grönland, zu Hauſe, und ſehr gemein in Rußland und Sibirien; auch halten ſie ſich auf den hohen Gebirgen Savoyens, auf den Alpen [g]) und dem Berge Cenis auf. Bey uns trifft man ſie vorzüglich auf den Gipfeln der höchſten Berge in den Schottiſchen Hochländern an; auch auf den Hebridiſchen und Orkadiſchen Inſeln ſind ſie nicht ſelten; und einige wenige bewohnen noch die lüftigen Hügel bey Köſwick, in Cumberland, ſo wie in Wales.

Das Weibchen legt acht bis zehn rothgefleckte Eyer, von der Größe der Taubeneyer, auf die Erde, auf einem ſteinigen Platz, ohngefähr in der Mitte des Junius, wie die übrigen aus dieſer Gattung zu thun pflegen. Im Winter trifft man ſie oft in ganzen Flügen an, und ſie ſind einfältige, dumme Vögel, die ſich gar leicht vor den Kopf ſchlagen, oder in eine Schlinge treiben laſſen, die man ihnen gelegt hat. Ihre Nahrung beſteht aus Baumknoſpen, jungen Sproſſen der Fichten, Heidekraut, Früchten und Beeren, zuweilen auch von verſchiedenen Arten des Leberkrauts. Vermuthlich leben ſie in Monogamie, denn wenn die Henne getödet iſt, ſo verläßt ſie der Hahn nicht, ſo daß auch er leicht getödet werden kann. Die Grönländer haben die Methode, ſie mit Schlingen, die an einem langen Seile befeſtigt ſind, zu fangen, die von zwey Leuten getragen werden. In Neuſchottland werden ſie Birk-Rebhühner (Birch-Partridges) genannt.

II. Das weiße Waldhuhn. (White Gr.)

Tetrao albus L. I. 2. p. 750. 23. *h*)
Le Lagopede de la Baye d'Hudſon. Buff. ois. II. p. 276. *i*)
White Partridge. Hist. Hudſ. Bay. vol. pl. I. — Edw. pl. 72. *k*) — Arct. Zool. p. 308. 183. No. kk)

Außer den oben beſchriebenen, trifft man eine viel größere Art auf Hudſon's Bay an, die Dr. Forſter für einen und eben denſelben Vogel zu halten ſcheint, obſchon Büffon und Pen-

g) Sie iſt allgemein auf den beſchneyten Stellen der Alpen. Acta Taloſana I. B.
h) Latham Ind. orn. II. p. 639. n. 10.
i) Ueberſ. XIII. S. 115. B.
k) Seligmanns Vögel III. Taf. 39. B.
kk) Ueberſ. II. S. 288. Nr. 99. Meine N. G. Deutſchlands III. S. 513. Nr. 5. N. G. des In- und Auslands I. 1. S. 477. Nr. 5. Dieſer und der vorhergehende Vogel werden oft mit einander verwechſelt. B.

Pennant ſie für verſchieden halten. Ich kann dieſen Streit nicht ſchlichten: inzwiſchen iſt ſie um zwey Zoll länger, und ſcheint im Wintergefieder vollkommen die nämliche zu ſeyn; aber nach Hrn. Pennant iſt ſie in ihren Sommergefieder ſehr verſchieden, denn Edwards's Vogel iſt mit groſſen, weißen und matt orangefarbnen Flecken bezeichnet, da das Schneehuhn hingegen hellbraun oder aſchfarben iſt. Dem ſey, wie ihm wolle, ſo habe ich doch eine ſolche Mannigfaltigkeit von Vögeln in ihrem Sommergefieder geſehen, daß ich nichts gewißes hierüber zu ſagen im Stande bin.

Dr. Forſter ſagt, dieſe Art ſey häufig in Hudſon's Bay *l*) halte ſich im Winter in ganzen Flügen zuſammen, und lebe von den Weidenknoſpen; daher ſie auch das Weiden-Rebhuhn (Willow-Partridges) heißt. Sie ſind gut zu eſſen, und in ſolcher Menge vorhanden, daß zum Gebrauch der Colonie, in einem Winter zehn tauſend Stücke ſind gefangen worden, indem man ſie in eigne hiezu gelegte Netze trieb. Sie haben neun bis eilf Junge, und brüten allenthalben an den Küſten. Man nennt ſie auch Schneehühner (Snow Hens), und die Franzoſen, weiße Rebhühner (White Partridges *m*).

12. Das Haſelhuhn. (Hazel Gr.)

Tetrao Bonaſia L. I. 2. p. 753. No. 9. — *n*) Faun. Suec. N. 170. — Scop. ann. I. No. 173. *o*) — Brünn. orn. p. 59. — Müller Zool. p. 224. — Kram. elench. p. 356. No. 4. — Georgi Reiſe p. 173.

La Gelinotte. Briss. orn. p. 191. No. 3. — Buff. ois. II. p. 233. pl. 7. *p*). Pl. enlum. 474. (Das Männchen) 475. (Das Weibchen).

Hazelhuhn (Attagen of Geſner) Rai Syn. p. 55. No. 6. — Will. orn. p. 175. pl. 31.

Hazel Grous. Arct. Zool. II. p. 317. G. *q*).

Lev. Mus.

Es hat die Größe des Europäiſchen Rothhuhns *r*) und iſt vierzehn Zoll lang. Sein Schnabel iſt kurz, und ſchwarz; die Augenkreiſe ſind nackt, runzlich und dunkel karmoiſinroth; der Kopf hat einen kleinen Federbuſch; die obern Theile des Kopfs, des Halſes und des Körpers ſind nach der Queere gelbrothbraun und aſchfarben geſtreift, am Unterrücken und am Steiß ſehr in dieſe letzte Farbe ſpielend; die Federn an der Wurzel der obern Kinnlade ſind ſchwarz; an beyden Seiten der Naſenlöcher iſt ein kleiner, weißer Fleck, zwiſchen dem Schnabel und den Augen ein zweyter, und hinter jedem Auge ein dritter; Kinn und Kehle ſind ſchwarz, und weiß eingefaßt; der Vorderhals gelbrothgrau, und ſchwarz gebändert; Bauch und Schenkel ſpielen mehr ins Aſchfarbne, und ſind mit ſchwarzen halben Monden bezeichnet; gegen den After hin iſt die Farbe hellgrau; die Deckfedern der Flügel ſind gelbroth marmorirt, braun beſtäubt, und

l) Auch in Lapland. Amoen. Acad. vol. I. p. 349. de Betula nana.

m) Kalm. Trav. vol. III. p. 58.

n) Latham Ind. orn. II. p. 640. n. 14. B.

o) Ueberſ. von Günther S. 142. Nr. 573. B.

p) Ueberſ. V. S. 62. B.

q) Ueberſ. II. S. 296. F. Vergl. auch Zorns Pethinoth. II. 280. Meine N. G. Deutſchlands III. S. 500. Nr. 3. N. G. des In- und Auslands II. 1. S. 476. Friſch Taf. 112. (Weibchen.) B.

r) Guernsey Partridge. ſ. die folgende Gattung No. 12. Var. A. T. rufus β L. Ueberſ.

ſchwarz melirt, hier und da mit einem weißlichen Streifen; die Schwungfedern inwendig graubraun, und an den Spitzen gelbroth; der Schwanz beſteht aus ſechzeyn Federn, die zwey mittlern ſind wie der Rücken; alle andern grau, mit braun marmorirt, und an der Spitze mit einem breiten, ſchwarzen Streifen bezeichnet; Füße und Klauen grau; die Schienbeine an der vordern Seite zur Hälfte ihrer Länge beſiedert.

Das Weibchen unterſcheidet ſich dadurch, das ihm das ſchwarze Kinn und Kehle fehlen, und daß die nackte, lappenartige Stelle um die Augen herum kleiner, und nicht ſo ſchön roth iſt.

Dieſe Art iſt in den Wäldern Deutſchlands zu Hauſe *), vorzüglich in jenen am Fuß der Alpen, und in den hohen Gebirgen Schleſiens, Polens u. ſ. w. Sie iſt auch häufig in der Gegend um Nürnberg, und in ſolcher Menge auf einer kleinen Inſel im Meerbuſen von Genua, daß ſie davon den Namen Haſelhuhn-Inſel (Gelinotte Island) bekommen hat.

Linné zählt ſie unter ſeine Schwediſchen Vögel, und ſowohl Müller als Brünnich ſagen, ſie fände ſich in ihrem Lande. Sie iſt auch häufig in verſchiedenen Gegenden Rußlands, obſchon minder zahlreich, als viele andere dieſer Gattung; in Sibirien wird ſie ſeltner, beſonders gegen Oſten.

Das Weibchen legt gewöhnlich ſeine Eyer, die größer, als Taubeneyer ſind, zwölf bis funfzehn, oder noch mehr, an der Zahl, auf den Boden an den Fuß einer Haſelſtaude, oder eines großen Farrenkrautsbuſches (Mountain Fern), und ſitzt drey Wochen über denſelben, brütet aber ſelten mehr, als ſieben oder acht Junge aus, die weglaufen, ſobald ſie ausgekrochen ſind. Sie ſitzen ſehr oft auf Bäumen, aber nur auf den niedrigſten Zweigen, zunächſt an der Erde.

Ihre Nahrung beſteht aus verſchiedenen Beeren und Früchten, hauptſächlich aus den Käzchen der Haſelſtaude und der Birke, und in Ermangelung dieſer aus Wachholderbeeren und Knoſpen, aus den Sproſſen der Birken **), Tannen, und anderer immergrüner Bäume. In der Gefangenſchaft freſſen ſie auch Körner. Ihr Fleiſch wird ſehr geſchätzt, auch auf fürſtlichen Tafeln. Die Böhmen ſchätzen ſie beſonders um Oſtern ſehr hoch, wo ſie ſich dieſelben als Geſchenke zuſchicken. In Rom hat man ſie ehehin für eine Seltenheit geachtet, und in Käfigen gehalten. Man fängt ſie oft mittels eines Vogelrufs, der ihre Stimme nachahmt ***).

13. Das

*) Sie iſt gemein um Wien und wird ſehr geſchäzt. Brown's Trav. p. 1521. Auf dem Thüringer Walde trifft man ſie auch allenthalben an. B.

**) Das Haſelhuhn ſoll nur zwey Junge bringen, ein männliches, und ein weibliches und ſich in den Gebirgen von Forez vorfinden. Hist. de Lyons I. p. 220.

**) Beſonders der Zwergbirke. Amoen. Acad. l. c.

***) Hr. Beſeke beſchreibt in ſeinen Beyträgen zur N. G. der Vögel Kurlands S. 70. eine Varietät, die ich das bunte Haſelhuhn (T. B. varia) nennen möchte.

Es iſt weißröthlichgrau mit dunklern, fuchsrothen, muſcheligen Flecken, in eben der Zeichnung, wie beym gemeinen Haſelhuhne. Die Weichen ſind eben ſo fuchsroth, wie beym Haſelhuhne. Was beym Haſelhuhne ſchwarz iſt,

13. Das rothe Waldhuhn. (Red Gr.)

Tetrao Lagopus L. l. 2. p. 749. No. 4. vel δ. *w*)
La Gelinotte d'Ecasse. Briss. orn. I. p. 199. pl. 22. f. 1. — Buff. ois. II. p. 242. *x*)
La Gelinotte hupée. Briss. l. c. p. 209. No. 9.
L'Attagas. Buff. l. c. p. 252. *y*)
Red Game, Moor Cock, or Goroock. Raii Syn. p. 54, A. 3. — Will. orn. p. 177. — Albin vol. I. pl. 23. 24.
Red Grous. Br. Zool. I. No. 94. pl. 43. *z*) — Arct. Zool. *a*) Lev. Mus.

Das Männchen wiegt neunzehn Unzen, und iſt funfzehn und einen halben Zoll lang. Sein Schnabel iſt ſchwarz; die Naſenlöcher ſind mit rothen und ſchwarzen Federn bedeckt; der Augenſtern iſt nußbraun; über den Augen iſt eine kahle, gefranzte, rothe Haut; an der Wurzel der untern Kinnlade ein weißer Fleck; die Kehle iſt roth; Kopf und Hals ſind hell lohgelblichroth, jede Feder mit verſchiedenen ſchwarzen Streifen bezeichnet; der Rücken und die Schulterfedern ſind von dunklern Roth, mit einem breiten ſchwarzen Flecken in der Mitte jeder Feder; Bruſt und Bauch ſind matt purpurfarbigbraun, mit zahlreichen, ſchmalen, dunkeln Strichen durchzogen; die Schwungfedern dunkelfarbig; der Schwanz iſt gleich, und beſteht aus ſechzehn Federn, die vier mittlern ſind roth geſtreift, alle andern ſchwarz; die Füße bis an die Klauen mit weichen, weißen Federn bedeckt; die Klauen ſelbſt weißlich, breit und ſtark.

Das Weibchen iſt kleiner, und wiegt nur funfzehn Unzen; ſein Colorit iſt minder lebhaft als des Männchens ſeines, und die kahle, rothe Stelle über den Augen iſt minder ſichtbar.

Dieſe Vögel halten ſich meiſtentheils in den nördlichen Theilen unſrer Inſel auf, ſind ſehr häufig auf dem ganzen wüſten Boden und den Gebirgen von Cumberland, und auch in Yorkſhire, Derbyſhire, Lancaſhire und Wales gemein. Sie paaren ſich im Frühjahr, und legen ſechs bis zehn Eyer; die junge Brut folgt der Henne den ganzen Sommer hindurch; im Winter vereinigen ſie ſich in Flügen von vierzigen oder funfzigen, und werden ſehr ſcheu und wild.

iſt, das iſt hier weiß; was dort braun iſt hier weißröthlich. Man gab es Hrn. Beſeke für eine Baſtardart von einem Haſel- und Rebhuhne an, wovon er aber den Grund nicht einſieht; denn es hatte nicht die geringſte Spur von einem Rebhuhne, aber alle Kennzeichen des Haſelhuhns. Man vergleiche die Beſchreibung des weißen Birkhuhns in den Neuen Schwediſchen Abhandl. B. VI. S. 225, wo ſtatt weißes Birkhuhn (Tetrao tetrix) wohl weißes Haſelhuhn ſtehen ſollte. Die Hauptfarbe iſt hier von Hr. Blom wohl zu unbeſtimmt angegeben worden. Alles übrige ſtimmt mit dem Exemplar, das Hr. Beſeke vor ſich hatte, vollkommen überein. B.

w) Tetrao scoticus Latham Ind. orn. II. p. 641. n. 15. B.

x) Dies iſt T. Lagopus γ. L. l. c. Ueberſ.

y) Ueberſ. V. S. 88. B.

z) Ueberſ. S. 87. Taf. 38. B.

a) Hier finde ich es nicht. Hr. Latham citirt ſo wie Büffon friſch Taf. 112. Allein hier iſt ein Weibchen des Haſelhuhns abgezeichnet. Ueberhaupt ſcheint mir dieſe Species noch zweifelhaft. Mit Zuverſicht kann ich freylich nichts entſcheiden; allein es deucht mir doch, das Männchen das hier beſchrieben wird, ſey das Weibchen des Haſelhuhns und das Weibchen, ein junges Haſelhuhn. B.

Sie halten sich stets auf den Gipfeln der Berge auf, selten sieht man sie auf den Seiten, und niemals steigen sie in die Thäler herab. Ihre Nahrung sind Bergbeeren, und die Knospen des Heidekrauts [b]).

Büffon spricht von einem weißen Vogel dieser Art, den er L'Attagas blanc nennt [c]) und sagt, er fände sich in den Schweizergebürgen und in denen von Vicenza vor; es ist aber noch sehr zweifelhaft, ob er zu dieser Art gehört. Die einzige Spielart, deren ich mich entsinne, ist im Leverschen Museum. Sie ist sehr blaß um den Kopf herum, und hat viele weiße Federn unter die übrigen Streifen gemengt, aber keineswegs weiße Flecken; daher scheint sie eine größere Verwandschaft mit dem Schneehuhn, als mit dem rothen Waldhuhn zu haben.

Obiger Schriftsteller erwähnt auch eines Vogels aus Rzakcynski, der viel Weißes an den Flügeln und am Bauche hat, übrigens aber geschäckt ist, und sagt, man träfe ihn häufig ganz weiß um Novogrod, in Moskau, an, ich wage es aber nicht, hier mit Gewißheit von diesen Vögeln zu sprechen, noch sie als besondere Arten zu bestimmen, wenn es keine Schneehühner sind.

Man [d]) hat mich belehrt, daß die südlichste Entfernung dieser Art, in unserm Königreiche Staffordshire ist [e]), Ihre Anzahl hat sich aber allenthalben aus den nämlichen Ursachen, wie beym Birkhuhn vermindert. Sie wird nicht so häufig in London gegessen, als die zuletzt erwähnte, weil ihr Fleisch viel eher verdirbt. Das gewöhnliche Gewicht des Männchens ist achtzehn bis neunzehn Unzen; bey Rühmond, in Yorkshire, ist aber eines erlegt worden, das fünf und zwanzig Unzen wog [f]). — Diese Art hat in der Menagerie der vortrefflichen und gelehrten Naturforscherin und Sammlerin der verstorbenen, verwittweten Herzogin von Portland gebrütet. Man hat die Bemerkung gegen mich geäussert, sie habe vieles dadurch bewirkt, daß sie fast täglich Töpfe mit frischem Heidekraut in die Menagerie setzen ließ.

14. Das nadelschwänzige Waldhuhn. (Pin-tailed Gr.)

Tetrao Alchata L. I. 2. p. 754. No. 11. *g*) — Hasselq. Voy. p. 281.
La Gelinotte des Pyrenées. Briss. orn. I. p. 195. pl. 19. f. 1. 2.
Le Ganga. Buff. ois. II. p. 244. pl. 8. *b*) Pl. enlum. 105 (Das Männchen) 106. (Das Weibchen.)

Par-

b) Ich habe mich oft darüber verwundert, daß weder dieser Vogel noch der Birkhahn im Verzeichnisse des famösen Festes des Erzbischoffs Nevil vorkommt, besonders da beyde in Yorkshire angetroffen werden; doch vielleicht hatte man sich damals noch nicht an den Geschmack derselben gewöhnt, oder dazumal für keinen Leckerbissen gehalten; heut zu Tage werden sie sehr geschätzt, und, sowohl frisch, als eingemacht, als Geschenke nach Süden versandt.

c) Hist. des Ois. II. p. 262. — Vermuthlich der nämliche mit Einem, von dem Gesner spricht.

d) Zus. a. d. Suppl. S. 216. Uebers.

e) Herr Tunstall.

f) Herr Tunstall.

g) Latham Ind. orn. II. p. 641. n. 16. B.

b) Uebers. V. S. 76. B.

Partridge of Damaſcus. Will. orn. p. 178. pl. 29. — Rauryn. p. 55. No. 7.
Kitiwiah, or African Lagopus. Shaw's Trav. pl. in p. 253.
Kata. Russel Alepp. p. 64. pl. 9. *i*)
Little Pintailed Grous. Edw. pl. 249.

Er hat die Größe eines gemeinen Rebhuhns, dreyzehn und einen halben Zoll lange. Sein Schnabel iſt braun; die Augenkreiße ſind ſchwarz, das ſich eine Strecke nach hinten hinzieht; der Kopf, der Oberhals, und der Rücken ſind mit einer Miſchung aus Olivenfarbnem, Hellgelblichem, lohgelbem und Schwarzem geſchäckt; die Seiten des Kopfs und der Vorderhals gelblichaſchfarben; Kinn und Kehle ſchwarz; der Unterhals und die Bruſt orangefarben, oben und unten mit einer ſchwarzen Linie eingefaßt; von der Bruſt bis zum After iſt die Farbe weiß; die Deckfedern der Flügel ſind orangefarben und kaffebraun geſtreift, und mit Weiß melirt; die Schwungfedern aſchgrau; der Schwanz braun, mit ſchwarzen Strichen durchzogen, die zwey mittlern Federn viel länger, als die übrigen, und an den Enden ſpitzig; der Theil, der über die andern Federn hinausſteht, iſt ſchwarz; der übrige Schwanz iſt abgerundet, und ſeine Federn an den Enden weiß; die Füße aſchgrau, und mit kurzen, pflaumartigen, weißen Federn an der vordern Fläche bedeckt; die Zehen an den Seiten kammförmig eingeſchnitten, und die hintere ſehr kurz *k*).

Das Weibchen iſt bläßer, an den ober Theilen, und bunter; es fehlt ihm das Schwarze an der Kehle, und die zwey mittlern Schwanzfedern ſind verhältnißmäßig nicht ſo lang; es hat an der Kehle zwey ſchwarze Queerſtriche, die den obern Theil des Orangefarbnen einfaſſen.

Dieſer Vogel iſt in den meiſten wärmern Ländern Europens zu Hauſe, z. B. im ſüdlichen Frankreich *l*), Spanien, Italien; in Afrika, als in der Barbarey, und in Senegal. Er iſt auch in in Aſien häufig, und eine äußerſt ſchöne Art, beſonders das Männchen. Einige wenige findet man zu jeder Jahrszeit in Aleppo; im May und Junius aber kommen ſie in Menge aus den Arabiſchen und Syriſchen Wüſteneyen; und um dieſe Zeit fängt man ihrer eine ſolche Menge auf einem einzigen Netzzug, daß man einen Eſel damit beladen kann. Sie dienen aber bloß den Eingebohrnen zur Speiſe; denn ihr Fleiſch iſt ſo hart und trocken, daß es die Europäer nicht eſſen mögen *m*).

14. Var. A. Tetrao Alchata L. I. 2. p. 754. No. 11. *β*) *n*) — Senegalus. Linn. Mantiss. 1771. p. 526.
La Gelinotte de Senegal. Pl. enlum. 130.

Dieſe

i) Seligmanns Vögel VII. Taf. 39. B.
k) Und zwar ſo ſehr, daß ſie Schaw irre führte, und er behauptete, der Vogel habe gar keine Hinterzehe. Ruſſel nennt die Hinterzehe nur einen Sporn.
l) Obgleich Büffon dieſen Vogel das Pyreneiſche Haſelhuhn nennt, ſo ſagt doch La Petrouſe (ſ. Neue Schwed. Abh. III. von Kaſten. S. 108.) daß ſich derſelbe nur bey Narbonne in einen ganz kleinen Strich befinde, aber weder bey Montpellier, noch auf den Pyreneen, oder ſonſt in Frankreich. B.
m) Hist. Alepp. — In Menge bey den Pyramiden und andern öden Plätzen. — Ihr Arabiſcher Name iſt Kata. Haſſelquiſt.
n) Tetrao senegalus Latham Ind. orn. II. p. 642. n. 17. Hier wird dieſer Varietät unter dem Namen des Senegalſchen Waldhuhns als eine beſondere Art erwähnt. B.

Diese Varietät ist kleiner, als die vorige, und kaum zwölf Zoll lang. Ihr Schnabel ist dunkelfarbig; die Hauptfarbe des Gefieders hell lohgelblichroth; über den Augen ein bläulicher Streifen; Kinn und Kehle gelb; Vorderhals und Brust hellblau gesprenkelt; die Deckfedern der Flügel sind mit dunkeln Flecken bezeichnet, und die kurzen Schwungfedern, nebst den Enden der großen, auch dunkelfarbig; die zwey mittlern Schwanzfedern länger, als die übrigen, wie beym nadelschwänzigen Waldhuhn; die übrigen werden stufenweise kürzer, und sind so ziemlich von eben der Farbe, wie bey jenem; die Füße hellbraun, an der vordern Fläche befiedert, wie bey letzterm; die Hinterzehe klein, und steht über der Ferse.

Sie ist in Senegal zu Hause, und scheint eine Spielart von der letzten zu seyn.

Ich habe zwey Exemplare gesehen, die sich bloß durch ein gelbrothes Band an der Brust unterschieden, ihr Colorit, obschon vollkommen das nämliche, war viel matter, als in den Pl. enlum.

15. Das Namaqua-Waldhuhn. (Namaqua Gr.)

Tetrao Namaqua L. l. 2. p. 754. No. 27. o)

Kleiner, als ein gemeines Rebhuhn, und neun Zoll lang p). Der Schnabel ist dunkelblau; Kopf, Hals und Brust aschgrau, an den Seiten des Kopfs und an der Kehle ins Gelbrothe ziehend; am obern Theil der Brust ist ein schmaler, weißer halber Mond; unter diesem ein breiterer, schokolatebrauner; von da an bis zum After herrscht eine dunkle aschgraue, fast schwarze Farbe; der untere Theil des Bauchs, die Schenkel und der After sind hell aschgraulichweiß; der Flecken und die obern Theile schokolatebraun, die Ränder der Federn am dunkelsten; die kleinern Deckfedern der Flügel weiß, mit schokolatefarbnen Rändern, die größern von letzter Farbe, an den Rändern bläsſer, die Spitze jeder Feder mit einem bläulichen Flecken bezeichnet; die großen Schwungfedern dunkelfarbig, die Spitzen der kürzern inwendig weiß, und die Schäfte der großen auch weiß; der Schwanz sehr keilförmig, seine zwey mittlern Federn spitzig, wie bey der vorigen Art, alle andern mit weißen Spitzen; die Füße an der vordern Fläche bis an die Zehen befiedert, bläulich aschfarben, und hinten mit einem kleinen Sporn versehen, der inwendig steht; die Zehen schwarz.

Beym Weibchen sind Kopf und Hals, wie beym Männchen, ein wenig schwarz gestreift; die obern Theile des Körpers sind schwarz und gelbroth eingelegt (tesſellated); der Bauch nach der Queere schwarz und weiß gestreift; außerdem ist es wie das Männchen, nur daß es an den Füßen keinen Sporn hat.

Sie sind in dem Lande der Namaqua-Hottentotten zu Hause, und halten sich den Tag über in den dürren Wüsteneyen auf; sind aber sehr leicht zu schiessen, wenn man sich an den Quel-

o) Latham Ind. orn. II. p. 642. n. 19. B. p) Diese Größe und Länge hat es in der Figur.

Quellen anstellt, zu denen sie zuweilen zu drey Hunderten auf einmal kommen, um zu trinken, weil das Wasser in diesen Ländern sehr selten ist. Sie unternehmen sehr weite Flüge, wie die Tauben, und ihre Stimme ist von den Tönen, die alle andere Arten ihrer Gattung von sich geben, verschieden. Sie nähren sich von Pflanzensaamen; fressen aber auch Getraide. In ihrem Vaterlande kennt man sie unter dem Namen: Namaqua-Rebhühner (Namaqua Partridges).

Aus den Papieren des Sire Jos. Banks.

Dr. Sparrmann *q*) erwähnt zweyer Arten von Waldhühnern (Tetrao), *qq*) die er bey dem warmen Bade der Hottentotten-Holländer angetroffen hat, und die Größe unsers Rebhuhns hatten; das eine wurde Rebhuhn, das andere Fasan genannt. Er bemerkt, daß sie gesellschaftlich leben, und daß es nicht schwer sey, ihnen beyzukommen, besonders Morgens und Abends, um welche Zeit sie ihren Aufenthalt durch ein scharfes, knurrendes (nurring) Geschrey verrathen. Eine von diesen Arten ist sehr wahrscheinlich das Namaqua-Waldhuhn; die andere läßt sich, aus Mangel einer nähern Beschreibung, nicht bestimmen.

16. Das Sand-Waldhuhn. (Sand Gr.)

Tetrao arenarius L. l. c p. 755. No. 29. *r*)
— — arenaria. Pallas in nov. Comment. Acad. Petrop. vol. XIX. p. 418. pl. 8. *s*)

Dieses ist größer, als das gemeine Rebhuhn, und über neunzehn Zoll lang. Sein Schnabel ist blaugrau, die Spitze schwarz; der Kopf hell aschfarben, Scheitel und Nacken gelblichgrau gewölkt; das Kinn dunkelgelb, und endigt sich mit einem dreyeckigen, schwarzen Zeichen, ohngefähr in der Mitte des Halses; die Federn des Halses sind grau, sonderbar abgestumpft (truncated), und glänzend, wie Taubenfedern; die obern Theile des Halses und Körpers ziegelfärbig weiß, jede Feder mit einem braunen Saum eingefaßt, der einen eyrunden, gelblichen Flecken umgiebt; am untern Theil des Halses ist ein schwarzer halber Mond; die Brust ist weiß; Bauch, After und Schenkel sind schwarz; die Flügel schimmelgrau (hoary), mit einem dunkelgelben Fleck an den kurzen Schwungfedern; die großen Schwungfedern bräunlich, an der Wurzel nach einer schiefen Richtung weiß; der Schwanz hat sechzehn Federn, die zwey mittlern sind spitzig, gelblich, und mit braunen Strichen durchzogen, die andern braun, mit grauen Strichen, die Spitzen weiß; die Füße schlank, bis an die Zehen befiedert, die Zehen selbst kurz, nackt, und unten schwielig (callous), die Klauen schwarz; hinten ist ein Sporn, der sich einwärts kehrt, hervorsteht, und spitzig ist.

Das Weibchen ist etwas größer, durchaus von hellerer gelblicher Farbe, an Kopf, Hals, und Kehle schwarz punctirt, und am Rücken eben so gebändert; außerdem ist es dem Männchen sehr ähnlich, seine Zeichnungen (markings) aber sind minder deutlich.

Diese

q) Zus. a. d. Suppl. S. 215. Ueberf.
qq) Voy. vol. I. p. 153.
r) Latham Ind. orn. II. p. 642. n. 18. B.
s) Tetrao subtridactyla Hasselqu. It. p. 250. Ueberf. von Büffons Vögeln V. S. 142. B.

Diese Art findet sich blos mitten in den Wüsteneyen, die sich bis an die Kaspische See hin erstrecken. Im Sommer ist sie sehr häufig gegen Astrachan hin; den Winter aber bringt sie in Persien hin. Ihre Nahrung besteht aus den Saamen verschiedener Arten von Tragant [t]). Im Junius sieht man sie Paarweise. Sie trinken viel Wasser, und müssen sich immer in der Nähe solcher Plätze aufhalten, wo sie dieses antreffen; so daß ein Reisender gewiß seyn kann, Wasser zu finden, wenn er diese Vögel sieht. Sie gehen des Tages dreymal zu den Teichen, um zu trinken; und dann sind sie so begierig, daß sie den Jäger nicht gewahr werden, ob sie gleich sonst sehr scheu sind. Nirgends sind sie so zahlreich, als an den Sandquellen zu Barlu-Chuduk. Sie fliegen wie die Tauben; haben einen lauten, doch nicht unangenehmen Ruf; ihre Eyer sind größer, als Taubeneyer, und weiß; man findet sie vollkommen ausgebildet, zu Anfang des Junius, in dem Bauche der Weibchen, aber ihr Nest hat man bisher noch nicht entdeckt.

17. Das Indische Waldhuhn. (Indian Gr.)

Tetrao indicus L. I. 2. p. 755. No. 28. *u*)
La Golinotte des Indes Sonn. Voy. Ind. vol. II. p. 164. pl. 96.

Es ist von der Größe des nadelschwänzigen Waldhuhns. Sein Schnabel ist gelblich; die Stirn weiß, mit einem schwarzen Bande, das sie am Hintertheile umgiebt, von der Wurzel des Schnabels an; der Hinterkopf ist hell gelbroth, und an jeder Feder ein länglicher, schwarzer Streifen; der Hals gelbrothgrau; die Brust lebhaft bräunlichroth, jede mit einem weißen Querbande an der Spitze, und mit Grau und Schwarz gemischt; der Rücken, der Steiß, der Schwanz und die kleinen Deckfedern der Flügel sind gelbroth ins Gelbe ziehend, und mit halbcirkelrunden, schwarzen Zeichen durchzogen; die kurzen Schwungfedern sind zur Hälfte schmutziggrau, das übrige ihrer Länge mit vier Querbändern durchzogen, wovon das erste schwarz, das zweyte weiß, das dritte wieder schwarz, und das vierte röthlichgelb (rufous yellow) ist, die großen Schwungfedern sind bräunlich schwarz; unten sind die Flügel grau; der Bauch ist schmutziggrau, mit schwarzen Queerbändern durchzogen; die Füße braun.

Diese Art findet sich an der Küste von Coromandel, wo sie Chinesische Wachtel (Caille de la Chine) genannt wird.

18. (17. a.) *v*) Das Lapländische Waldhuhn. (Rehusak Gr.)

Tetrao lapponicus L. I. 2. p. 751. No. 25. *w*).
Rehusac Grous. Arct. Zool. II. p. 316. E. *x*)

Er

t) Astragatus L. Besonders die Arten: alopecaroides, Cicer und physodes.

u) Perdix indica Latham Ind. orn. II. p. 650. n. 23 Hier setzt es Latham unter die Rebhühnerarten, und es heißt daher: das Indische Rebhuhn. B.

v) Diese, und die beyden folgenden Arten, (No. 17. a — c.) stehen im Suppl. S. 216 — 218.

w) Latham Ind orn. II. p. 640. n. 12. B.

x) Uebers. II. S. 294. E. B.

Es hat die Größe einer kleinen Henne. Sein Hals ist rostfarbig, und schwarz gefleckt; der Rücken und die Deckfedern des Schwanzes sind schwarz, mit rostfarbigen Streifen durchzogen; die Brust ist vom untern Theil des Halses durch eine dunkle Schattirung getrennt; das übrige derselben und der After sind weiß.

Das Weibchen ist gelb gefleckt; die großen Schwungfedern sind weiß; der Schwanz schwarz, sein Ende weißlich; die Schenkel weiß, mit einigen rostfarbigen Flecken bezeichnet; die Füße bis an die Zehen herab befiedert, und diese mit großen, braunen Schuppen bedeckt.

Es ist in den Wäldern und auf den hohen Gebürgen Laplands zu Hause, legt vierzehn oder funfzehn röthliche, mit langen braunen Flecken bezeichnete Eyer. Wenn es aufgescheucht wird, fliegt es mit einem lauten Geschrey, das einem heisern (coarse) Gelächter gleicht, davon.

Der Keron oder das gemeine Schneehuhn, hingegen ist still, und bewohnt nur die Alpengebürge.

19. (17. b.) Das Felsen-Waldhuhn. (Rock Gr.)

Tetrao rupestris L. I. 2. p. 751. No. 24. *y*)
Rock Grous. Arct. Zool. II. No. 184.

Auf Hudson's Bay hat man ein weißes Waldhuhn (No. 11.) beobachtet, das wahrscheinlich eine, von dem gemeinen verschiedene Art ist. An Größe steht es ihr um ein Drittheil nach. Es gleicht vollkommen dem andern an Farbe, außer daß es einen schwarzen Strich vom Schnabel nach dem Auge hin hat.

Seine Lebensart ist etwas verschieden, denn es hält sich alle Jahrszeiten hindurch auf felsigen Orten, oder mit Wachholdern besetzten Ebenen auf. Es streckt sehr oft den Hals aus, und giebt ein schnarchendes (croaking) Geschrey von sich. Diese Vögel sind sehr zahlreich an den beyden äußersten Spitzen der Bucht, kommen aber niemals in die südlichen Gegenden, außer bey sehr strenger Witterung. Die Eingebohrnen nennen sie Uscathachisch, und die Engländer, Felsen-Rebhuhn (Rock Partridge), da hingegen die andere Art (No. 11.) durch den Namen: Wapatheu unterschieden wird.

20. (17. c.) Das Helsingische Waldhuhn. (Helsingian Gr.)

Tetrao canus L. I. 2. p. 753 No. 26. *a*).
— — Sparrm. Mus. Carls. No. 16.

Seine Länge ist funfzehn Zoll. Der Schnabel schwarz; das ganze Gefieder graulichweiß (houry White), mit undeutlichen braunen Wellenlinien, indem nämlich die Enden der Federn

y) Latham Ind. orn. II. p. 640. n. 11. *a*) Latham Ind. orn. II. p. 641. n. 13. B.

dieſe Farbe haben; die Deckfedern der Flügel ſind bräunlich, mit einem weißlichen Flecken an den Enden; der After weiß; der Schwanz iſt oben ſchimmelgrau, weiß und braun gewölkt; die Füße ſind ſchwarz.

Ein Exemplar von obigem Vogel iſt Herrn Sparrmann aus der Provinz Helſing in Schweden, geſandt worden, wo er auf einer gewiſſen Stelle ſehr häufig ſeyn ſoll. Der Farbe des Schwanzes wegen, kann er keine Spielart vom Schneehuhn, in irgend einer Altersſtufe, ſeyn; auch glaubt Sparrmann nicht, daß er mit dem Haſelhuhn verwandt ſey, ob er ihm ſchon etwas ähnlich ſieht; daher iſt es ſehr wahrſcheinlich eine beſondere Art.

Im Manuſcript des Herrn Anderſon's finde ich ein Waldhuhn (grous) mit befiederten Füßen (von Farbe braun, mit Schwarz melirt), das auf Terra del Fuego zu Hauſe ſeyn ſoll; ferner eines, mit nackten Füßen von der nämlichen Farbe, das in Neucaledonien angetroffen wurde: von keinem iſt aber die Größe bemerkt.

** Mit drey Zehen.

21. (18.) Das dreyzehige Waldhuhn. (Heteroclitous Gr.)

Tetrao paradoxus L. I. 2. p. 755. No. 30. *b*)
— paradoxa. Pallas's Reiſen B. II. S. 712. No. 25. Taf. F. *c*)

Der Schnabel dieſer Art iſt dünner, als er gewöhnlich bey der Gattung Waldhuhn (Grous) zu ſeyn pflegt; die obere Kinnlade nicht gewölbt, noch in die untere eingreifend; Kopf und Hals, bis an die Kehle, ſind ſchimmelgrau; das Kinn aber gelblich; zu beyden Seiten des Halſes ſteht ein orangefarbner Fleck; rings um die Kehle läuft ein cirkelförmiger Streifen der aus zahlreichen, dünnen, ſchwarzen Querſtrichen beſteht; der Rücken, zwiſchen den Flügeln, und bis an den Schwanz hinunter, iſt ſchwarz und grau, wellenförmig geſtreift, wie beym Trappen; die Bruſt iſt hellröthlich aſchfarben, über dieſe hinaus, bis an den After, iſt die Farbe ſchwarz, mit hellen Flecken; die Afterflügel ſind wellenförmig ſchwarz geſtreift, und mit großen, bräunlichblutfarbnen Flecken an den Federſpitzen bezeichnet; die großen Deckfedern der Flügel, und die kurzen Schwungfedern ſind roſtigweiß, mit einer breitlichen Spur von Schwarzen, die, mit dem Schafte parallel, bis an die Spitze hinläuft; die großen Schwungfedern ſind braun, und ſpitzig, die äußern derſelben gegen die Wurzel hin ſchimmelgrau; inwendig weiß bis an die Spitze, das an den äußern am wenigſten ſichtbar iſt; die Füße faſt bis an die Klauen befiedert, und ſehr kurz; nur drey Zehen, die alle vorwärts ſtehen, ſehr kurz, und alle miteinander verbunden ſind, außer an der Spitze, wo ſie die Klauen theilen; die Fußſohle mit hornartigen Schuppen ziegelförmig belegt (imbricated).

Es iſt in den öden Gegenden der ſüdlichen Tatarey zu Hauſe, woher Pallas ein ausgeſtopftes Exemplar erhalten hat.

b) Latham Ind. orn. II. p. 643. n. 20. B. *c*) Ueberſ. von Büffons Vögeln V. S. 140. B.

Vier und funfzigste Gattung. Rebhuhn.

Der Schnabel ist erhaben, stark und kurz; die Nasenlöcher sind oben mit einem hervorstehenden, häutigen Rande bedeckt. Ueber den Augen ist keine nackte Haut; aber sie sind bey vielen Arten mit kleinen, warzigen Auswüchsen umgeben. Die Füße sind unbefiedert. Verschiedene Arten haben hinten Sporne. Der Schwanz ist kurz.

* Mit vier Zehen.

1. Das Capsche Rebhuhn. (Cape Partridge.)

Tetrao capensis L. I. 2. p. 759. No. 37. *d*)

Es hat die Größe des rothen Waldhuhns, und neunzehn Zoll Länge. Sein Schnabel ist stark, und von hellröthlicher Hornfarbe; das Gefieder überhaupt dunkel aschfarben; mit unregelmäßigen, krummen, grauen Reihen durchzogen; der Kopf beynahe einfarbig; die Brustfedern sind längs der Mitte herab weiß gestreift; die Füße roth, und stark, einen Zoll hoch über der hintern Klaue, steht ein scharfer Sporn, nur einen Zoll höher die Spur eines zweyten; die Klauen sind schwarz.

Es ist auf der Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause, wo es Fasan genannt wird, und ist wahrscheinlich diejenige Art, auf die Forster in seiner Reise *e*) anspielt, und sagt, man sähe sie in großen Gesellschaften (coveys), sie sey nicht sehr scheu, und werde oft lebendig gefangen, und gezähmt *f*).

2. Das Senegalische Rebhuhn. (Senegal P.)

Tetrao bicalcaratus L. I. 2. p. 759. No. 15. *g*)
La Perdrix de Senegal Buff. orn. I. p. 231. pl. 24. f. 1. — Pl. enlum 137.
Le Bis-Ergot. Buff. ois. II. p. 443. *h*)

Etwas größer, als das Griechische Rothhuhn (No. 12.) und dreyzehn Zoll lang, der Schnabel ist einen Zoll lang, und hornfarben; der Scheitel lohgelb; von den Nasenlöchern

d) Perdix capensis Latham Ind. orn. II. p. 641. n. 1. B.

e) Vol. II. p. 551.

f) „Sie nahmen verschiedene Paare, tauchten sie ins Wasser, bestreuten sie hierauf mit Asche, und steckten sie dann unter das Gebüsche, mit den Köpfen unter den Flügeln.“ Auf diese Art besetzten sie diejenigen Plätze mit ihnen, wo sie sonst von Natur nicht brüten. Forster a. a. O. — Masson gedenkt auch zweyer Arten Rebhühner und Wachteln, die häufig auf dem Cap sind, (s. Phil. Trans. LXVI. p. 306.) aber keiner von beyden giebt die mindeste Beschreibung.

g) Perdix bicalcarata Latham Ind. orn. II. p. 643. n. 2. B.

h) Uebers. VI. S. 67. Adonsons Reise nach Senegal. S. 37. 38. 71. 217.

nach den Augen hin läuft ein schwarzer Strich, der über den Augen weg und etwas über dieselben hingeht; über diesem ist ein röthlichweißes Band, und wieder über diesem ein schwarzes, das sich nach dem Hinterkopf hinzieht; die Seiten des Kopfs, unter den Augen sind weiß, mit schwarzen Streifen; der Hals lohgelb, mit braunen und schmutzigweißen Flecken; die obern Theile des Körpers, und die Flügel braun, lohgelb und schmutzigweiß gemischt, die untern Theile, von der Brust an, zum Theil eben so, aber weniger lohgelb; der Schwanz lohgelb und braun bandirt; die Schwungfedern braun, mit hellern Flecken; die Füße braun, unbefiedert, mit zwey Sporn versehen, einer über dem andern, die beyde stumpf sind. *i*)

Es ist in Senegal zu Hause, und der Vogel, von dem die Beschreibung genommen ist, war ein Männchen. Es scheint eben derselbe zu seyn, den Adanson eine Auerhenne *k*) nennt, und wenn es so ist, so ist sein Fleisch eben nicht delikat.

3. Das Zeylanische Rebhuhn. (Ceylon P.)

Tetrao Zeylanensis L. I. 2. p. 759. No. 35. *l*)
Perdix bicalcarata. Zool. Ind. p. 25. pl. 14.

Seine Größe ist nicht angegeben, die Länge (auf der Platte) ist ohngefähr sieben Zoll; dem Ansehen nach, scheint es etwas größer zu seyn als eine Wachtel. Der Schnabel ist roth; von hier an bis zu den Augen, und eine Stelle um sie herum, ist der Vogel kahl, und roth; der Kopf ist schwarz und weiß geschuppt; der Hals, die Brust, der Oberrücken und die Deckfedern der Flügel sind schwarz, jede Feder längs der Mitte herab mit einem pfeilförmigen, weissen Streifen bezeichnet; der Unterrücken ist rostigroth; der Schwanz abgerundet und braun; die Füße sind roth, unbefiedert, und mit zwey langen, scharfen Sporen, einen über den andern, versehen *m*).

Beym Weibchen *n*) ist der Kopf schwarz und aschfarbig geschäckt; Brust, Bauch und Flügel sind rostigbraun; die Federn des Rückens und der Flügel in der Mitte mit Braun bezeichnet, und die an der Brust gelb gerändet; der Schwanz ist braun; die Füße ohne Sporen.

Diese

i) Lichtenstein gedenkt im Hamburgischen Naturalienverzeichnisse S. 38. Nr. 345. unter diesen Namen eines Rebhuhns mit doppelten Sporen, dessen Länge 16 1/2 Zoll war und dessen Füße weißlich aussahen und ohne Sporen waren. Er meynt, es möchte wohl das Weibchen seyn. B.

k) Wenn er von dem Fleisch der Haasen in Senegal spricht, das er lobt, so fügt er hinzu: „Von ihren Rebhühnern kann man dieses nicht sagen. Ich bin aber sehr in Zweifel, ob man sie nicht vielmehr Kurhennen nennen sollte; denn sie haben die nämliche Größe, und ohngefähr auch eben solche Farben. Sie sind hinlänglich von andern Vögeln dieser Art, durch zwey starke Sporen an ihren Füßen, unterschieden.“ — Adanson's senegal. ed. 800. p. 44.

l) Perdix ceylonensis Latham Ind. orn. II. p. 644. n. 3. B.

m) An Einem Fuße ist nur Ein Sporn sichtbar, woran, wie ich vermuthe, ein Irrthum des Zeichners Schuld ist, weil sich dieser Umstand nirgends bemerkt findet.

n) Chittygong Partridge n. 36? B.

Diese Art ist in Zeylan zu Hause, und bey Columbo auf dieser Insel, gefangen worden. Die Zeylaner nennen sie Haban-kukella.

4. Das Madagaskarische Rebhuhn. (Das braune, Afrikanische Rebhuhn. Brown African P.)

Tetrao spadiceus L. I. 2. p. 759. No. 39. o)
Le Perdrix rouge de Madagascar. Sonn. Voy. Ind. vol. II. p. 169.

Es hat die Größe des gemeinen Rebhuhns (Nr. 8.). Sein Schnabel ist gelb; der Augenstern schön roth; die Hauptfarbe des Gefieders schmuzig rothbraun; Scheitel und Hinterhals am dunkelsten, und stark ins Braune ziehend; die Füße schön roth, und hinten mit zwey Sporen versehen p).

Es ist in Madagaskar zu Hause.

5. Das kahlhälsige Rebhuhn. (Bare-necked P.)

Tetrao nudicollis L. I. 2. p. 759. No. 40. q)
Le Gorge-nuë Buff. ois. II. p. 444. r)

Alles, was von diesem Vogel gesagt wird, ist, daß er minder geschäckt ist, als der Frankolin (Nr. 6.); Kehle und Vorderhals unbefiedert, und nur mit einer rothen Haut bedeckt sind; daß er seinen Schwanz gleich einem Fächer ausbreitet; daß die Füße roth und mit einem doppelten Sporn versehen sind, wie bey der letzten Art.

Ein solcher Vogel war lebendig in Paris; es sind aber keine hinlänglichen Beobachtungen über ihn angestellt worden, so daß man außer dem obigen, nichts weiter von ihm sagen kann, als daß er auf Bäumen zu sitzen pflegt.

6. Der Frankolin. (Francolin P.)

Tetrao Francolinus L. I. 2. p. 736. No. 10. s)
— orientalis. Hasselq. Voy. p. 273. No. 43.
Le Francolin Briss. orn I. p. 245. pl. 23. f. 2.
— — Buff. ois. II. p. 436. — t) Pl. enlum. 147. 148.

Franco-

o) Perdix spadicea Latham Ind. orn. II. p. 644. n. 4. B.

p) Hierher gehört alle Wahrscheinlichkeit nach Lichtensteins Hamburg. Naturalienverz. S. 38. Nr. 346. Tetrao spadiceus. Er sagt: Kopf, Brust und Oberschenkel sind kaffebraun; Nacken und Weichen schwarz mit Weiß gewellt; der Rücken ist braun mit schwarzgeränderten Federn; die Schwungfedern dunkelbraun mit großen schwarzen Flecken; die Schwanzfedern dunkelgrau, rothgrau gewellt; der After weißlich. Die ganze Länge beträgt 11 Zoll. — Es bewohnt Ostindien. B.

q) Perdix nudicollis Latham Ind. orn. II. p. 744. n. 5. B.

r) Uebers. VI. §. 69.

s) Perdix francolinus Latham Ind. orn. II. p 644 n. 6. B.

t) Uebers. VI. §. 59. B.

Francolino (Attagen Attdrov.) Rai. Syn. p. 54. No. 4. — Olina ucell. pl. in p. 33. — Will. orn. p. 174. pl. 31.
Francolin. Tournefort Voy. ad. 46. vol. I. pl. in p. 412. — ed. 500. vol. II pl. i. p. III. — Ead. pl. 246. — Gentl. Magaz. vol. XLII. pl. in p. 112 Br. Mus.

Dieſe ſchöne Art iſt ſo groß, als das gemeine Rebhuhn, und mißt zwölf und einen Viertel Zoll in der Länge. Der Schnabel iſt dunkelfarbig; der Augenſtern nußbraun; über den Augen iſt es kahl und roth; die obern Theile des Kopfs, der Hinterhals, der Rücken und die Deckfedern der Flügel ſind ſchwärzlich und gelblich roſtfarben geſchäckt; der Unterrücken aber, und der Steiß ſind mit abwechſelnden ſchwarzen und gelblichweißen Strichen durchzogen; die Seiten des Kopfs, das Kinn, die Kehle, der Hals, die Bruſt und der Bauch ſind ſchwarz; an jeder Kinulade iſt ein weißer Streifen, und hinter jedem Auge ein großer Fleck von der nämlichen Farbe, der in einem Streifen nach den Naſenlöchern vorläuft; um den Hals herum läuft ein roſtfarbig orangengelbes Halsband; die Seiten der Bruſt und des Körpers ſind weiß gefleckt; der untere Theil des Bauchs und die Federn über den Schenkeln ſind mit ſchwarzen Strichen durchzogen; die untern Deckfedern des Schwanzes ſind röthlich; die Schwungfedern dunkelfarbig, mit roſtgelben, queerſtehenden Flecken bezeichnet; der Schwanz abgerundet, ſeine vier mittlern Federn mit ſchwarzen und roſtgelben Streifen durchzogen, die andern, zu beyden Seiten, zwey Drittheile ihrer Länge ſchwarz und weiß, das übrige bis ans Ende ſchwarz; die Füße unbefiedert, röthlich, und mit einem Sporn verſehen.

Das Weibchen iſt kleiner, und hat durchaus eine unregelmäßige Miſchung von ſchwärzlicher und roſtgelber Farbe; am Rücken und Schwanz aber ähnelt es dem Männchen ſehr.

Dieſer ſchöne Vogel iſt bloß in den wärmern Ländern von Europa, als in Spanien, Italien, den Liparischen Inſeln, Sicilien, Maltha und verſchiedenen andern Inſeln des Mittelländiſchen Meeres zu Hauſe. Man findet ihn auch in der Barbarey, in Aegypten *); Aleppo *) und verſchiedenen andern Ländern Aſiens, bis Bengalen**).

Seine Lebensart iſt nicht ſehr bekannt, außer daß er von Körnern lebt, und in Menagerien (aviaries) gehalten werden kann, wo er gern Junge hervorbringt. Sie haben ein lautes Geſchrey, eine Art von Pfeifen, das man in einer großen Entfernung hören kann. Ihr Fleiſch wird ſehr geſchäzt.

7. Das perlhuhnartige Rebhuhn. (Pintado P.)

Tetrao madagascariensis L. I. 2. p. 756. No. 31. *w*)
Le Francolin de l'isle de France. Sonn. Voy. Ind. vol. II. p. 166. pl. 97.

Es hat die Größe des Griechiſchen Rothhuhns (Nr. 12.). Sein Schnabel iſt ſchwarz; der Scheitel hell rothgelb (ruſous yellow), in der Mitte ſchwarz, mit gelbrothen Rändern; zu beyden

x) Haſſelquiſt. Pococke.
y) Eine Tagreiſe von Aleppo. Ruſſel Alepp. p. 65. —
**) Edwards.
w) Perdix madagascariensis Latham Ind. orn. II. p. 645. n. 8. B.

beyden Seiten des Kopfs sind zwey Bänder, das eine läuft zwischen den Augen durch, das andere unter denselben weg, der Raum zwischen ihnen ist weiß, wie die Kehle; der Hinterhals ist ebenfalls weiß, mit einem schwarzen Zeichen an dem Ende jeder Feder; der untere Theil des Halses und die Brust schwarz, mit sechs weißen Flecken an jeder Feder; der Bauch eben so, die Flecken aber größer, und gelbroth; die Schenkel hell gelbroth, mit schwarzen Bändern durchzogen; der Rücken röthlich, die Schulterfedern aber schwärzlich in der Mitte, und unregelmäßig gelbröthlichweiß gefleckt; die kürzern Schwungfedern eben so, aber dunkler, die großen Schwungfedern schwarz, mit weißen Streifen durchzogen; der Steiß und die mittlern Schwanzfedern hellgelbroth, mit schwarzen Bändern durchzogen, die übrigen einfärbig bräunlich schwarz; die Füße hell gelbroth.

Das Männchen hat einen starken Sporn an den Füßen.

Sie sind auf Madagaskar zu Hause, und von da nach der Insel Frankreich übergebracht worden. Sie setzen sich auf Bäume, und ihre Stimme gleicht der des Perlhuhns; daher nennen sie die Einwohner Perlhuhnartige-Rebhühner (Perdrix Pintadie).

7. Var. A *).

Ihre Länge ist eilf Zoll. Der Augenstern braun; der Kopf, der Nacken und der Hinterhals sind zur Hälfte herab gelbroth, die Federn längs den Schäften dunkelfarbig gestreift; die Seiten des Kopfs und das Kinn einfarbig gelbroth; der untere Theil des Halses, die Brust rings herum, und alle untern Theile bräunlichschwarz, jede Feder mit drey weißen Flecken an jeder Fahne; der Unterrücken und der Steiß braun, über den Schenkeln mit zahlreichen, weißen Strichen durchzogen; die Mitte des Bauchs eben so, aber mit breiten Strichen; die Deckfedern der Flügel bräunlichschwarz und gefleckt, wie die untern Theile, die Flecken aber gelbroth, statt weiß; der Schwanz kurz und dunkelschwärzlich braun, seine zwey mittlern Federn an der Wurzel mit hell gelbrothen Strichen durchzogen; die Füße roth.

Ich habe ein Exemplar, das mit obiger Beschreibung überein kam, bey Sire Joseph Banks angetroffen, der mir sagte, er habe es aus Bombay bekommen. Es scheint mir eine Spielart, oder eine Geschlechts-Verschiedenheit von Perlhuhnartigen Rebhuhn zu seyn.

8. Das gemeine Rebhuhn. (Common P.)

Tetrao Perdix L. I. 2. p. 757. No. 13. — z) Faun. Suec. No. 205. — Scop. ann. I No. 175. — a) Brün. orn. 201. — Müller Zool. No 225. — Frisch tab. 114. — Cram. elench. p. 357. N. 6. — Georgi Reise p. 173.

La Perdrix grise. Briss. orn. I. p. 219. No. I. Buef. ois. II. p. 401. b) Pl. enlum. 27. (das Weibchen.)

Common

*) Aus dem Suppl. S. 219.

z) Perdix cinerea. Lath. Ind. orn. II. p. 645. n. 9. B.

a) Ueberf. von Günther S. 143. Nr. 175. B.

b) Ueberf. VI. S. 12. B.

Common Partridge. Rai Syn. p. 57. A. 2. — Will. orn. p. 166. pl. 28. — Albin I. pl. 27. — Br. Zool. I. No. 96. — c) Arct. Zool. II. p. 319. A. d) Br. Mus. Lev. Mus.

Die Länge iſt dreyzehn Zoll. Der Schnabel iſt braun; die Hauptfarbe des Gefieders aſchgrau und ſchwarz ſehr ſchön gemiſcht, und an den Schäften herab ſchwarzlederfarben geſtreift; die Seiten des Kopfs ſind lohgelb; unter den Augen ſtehen rothe, kleine, warzige Auswüchſe, über und hinter den Augen eine nackte, rothe Haut [e]; an der Bruſt iſt ein dunkel gelbrother Halbmond, in Form eines Hufeiſens; die Füße ſind grünlichweiß, und hinten mit einem ſtumpfen Sporn oder Knopf verſehen.

Das Weibchen unterſcheidet ſich dadurch, daß es weniger ausgezeichnete Farben hat, als das Männchen, daß ihm das Hufeiſen an der Bruſt fehlt [f], und daß man keine Spur von Sporn an den Füßen bemerkt.

Dieſe Art findet ſich durch ganz Europa in den gemäßigten Ländern, aber nicht überall gleich häufig; das Uebermaaß an Hitze und Kälte iſt ihr gleich unzuträglich, daher ſie in ſolchen Ländern ſeltner angetroffen wird. Sie iſt häufig in den gemäßigten Gegenden von Rußland und Sibirien; in Lappland und Norwegen aber kennt man ſie nicht [g]; ſie iſt ſeltner in Italien als bey uns, oder in Frankreich; man trifft ſie allen Vermuthen nach nicht bis Griechenland [h], gegen Süden an, und eben ſo wahrſcheinlich iſt es, was Olina [i] bemerkt, daß es eher Flüge von rothen Rebhühnern, als von gemeinen waren, die auf einigen Inſeln des Mittelmeeres zahm gehalten wurden [k]. Und in der That, ſcheint dies aus der Unmöglichkeit dieſe Art im Zuſtande der Gefangenſchaft fortzupflanzen zu erhellen, weil man die Eyer einer Henne unterlegen muß, die ſie dann wie ihre eignen ausbrütet; wovon ich fünf und zwanzig aus Einer Brut geſehen habe.

Die Rebhühner paaren ſich zeitig im Frühjahr, und beſuchen Kornfelder und fette Weiden. Sie leben von grüner Saat und andern Pflanzen, ſo wie von allerley Inſekten; ſie freſſen Körner aller Art, ihr liebſtes Futter aber ſind Ameiſeneyer, und ohne dieſe können die Jungen, die unter ihnen ausgekrochen ſind, nicht leicht aufgebracht werden. Das Weibchen legt ſeine Eyer auf den Boden, und macht kein Neſt, ſondern ſcharrt nur in Eine Höhle etwas dürres Laub, oder Faſern zuſammen; der Eyer ſind gewöhnlich funfzehn bis achtzehn [l] an der Zahl, von grünlich grauer Farbe. Das Weibchen ſizt drey Wochen

c) Ueberſ. S. 88. Taf. 41. Fig. 1. 2. B.

d) Ueberſ II. S. 298. A. Vergl. auch Zorns Pethinoth. II. 119. 287. 507. I. S. 518. 539. 600. Meine N. G. Deutſchlands III. S. 527. Nr. 9. N. G. des In- und Ausl. I. 1. S. 478. Nr. 6. B.

e) Nicht ſehr ſichtbar, außer bey alten Vögeln.

f) Es fehlt nur bey jungen Vögeln ganz; die alten Weibchen haben hier bloß zwey große kaſtanienbraune Flecken. B.

g) Brünnich.

h) Gesner de Av. p. 680.

i) Uccel. p. 57.

k) Willughby erzählt uns von einem Manne in Suſſex, der durch ſeinen Fleiß eine Kette (covy) Rebhühner ſo zahm gemacht hat, daß er ſie, auf eine Wette (upon a wager) aus dieſer Gegend nach London vor ſich hertrieb, ob ſie gleich ganz frey liefen, und unbeſchnittene Flügel hatten.“ Orn. p 167.

l) Bis fünf und zwanzig. Hist. des Ois.

chen, und die Jungen laufen, ſo bald ſie ausgekrochen ſind, oft ſchon wenn ihnen noch ein Stück von der Schaale an den Köpfen anklebt, davon. Bey uns bruten ſie des Jahrs nur Einmal. Olina giebt ihr Lebensalter auf zwölf oder funfzehn Jahre an.

8. Var. A. Tetrao Perdix. L, I. 2. p. 757. No. à3. *l*). *m*).
La Perdix griſe blanche. Briss. orn. I. p. 223. A. — Buff. ois. II. p. 415. *n*) Frisch tab. 115 *o*).

Dieß iſt eine bloße Spielart von dem lezten. Die Hauptfarbe des Gefieders iſt grau, mit den nämlichen Zeichnungen, aber ſchwächer; was aber die Sache vollends außer Zweifel ſezt, iſt, daß man ſie unter Flügen gemeiner Rebhühner gefunden hat, und daß ſie ſich mit ihnen paart.

Büffon erzählt auch, man habe zehn bis zwölf ganz weiße Rebhühner auf Einmal, unter andern von der gemeinen Art geſehen, und dieſe hatten einen rothen Augenſtern, wie es bey den weißen Haaſen, Ratten, Frettchen u. ſ. w. der Fall iſt.

Im Leverſchen Muſeum iſt ein ganz milchbläuliches *p*). Eine zweyte Spielart, ebendaſelbſt, mit bräunlich aſchfarbnen Kopf und halben Halſe, und mit dunklern Streifen; um den Hals herum läuft ein weißes Halsband; die untern Theile ſind auch ganz weiß; der übrige Vogel wie das gemeine Rebhuhn, aber ſehr blaß *q*).

Eine andere Spielart war durchaus braun *r*), und noch eine andere war ſehr bunt und ſehr ſchön; Scheitel und Nacken waren braun, mit gelbrothen Flecken; die Stelle zwiſchen den Augen, das Kinn und die Kehle von lezter Farbe; Vorderhals und Bruſt aſchgrau, mit ganz kleinen ſchwarzen Fleckchen; an der Bruſt ein Hufeiſen; Bauch und After gelblichweiß; die obern Theile faſt wie beym gemeinen Rebhuhn, aber viel ſchöner geſchäckt *s*).

9. Das Damascener Rebhuhn. (Damascus P.)

Tetrao damascenus. L. I. 2. p. 758. No. 32. *t*)
La Perdrix de Damasc. Briss. orn. I. p. 223. B.
La petite Perdrix griſe. Buff. ois II. p. 417. *u*)
Perdix Damascena Aldrov. (Damascus Partridge) Ray Syn. p. 57. No. 3. — Will. orn. p. 167.

Dieß iſt nur ſehr wenig vom gemeinen Rebhuhn verſchieden, die Größe ausgenommen, denn es iſt viel kleiner; auch ſein Schnabel iſt länger, und die Füße ſind gelb.

m) Latham l. c.
n) Ueberſ. a. a. O.
o) In meiner N. G. Deutſchlands a. a. O. findet man dieſe Varietäten genauer beſchrieben; wo ich auch zeige, daß das Bergrebhuhn Nr, 10. hieher gehöre. B.
p) T. Perdix γ. Lin. l. c.
q) T. Perdix δ. Lin. l. c.
r) T. Perdix ε. Lin. l. c.
s) T. Perdix ζ. Lin. l. c.
t) Perdix damascena. Lath. Ind. orn. II. p. 646. n. 10. B.
u) Ueberſ. VI. S. 33. B.

Diese Art sieht man oft in großen Flügen durch Bayern und andern Gegenden Frankreichs, auf ihrer Reise nach andern Ländern ziehen.

Büffon sagt, daß einst hundert und funfzig, oder zwey hundert dieser Vögel durch eine Lockpfeife die man für die gemeine Art braucht, einen ganzen Tag in ihren Zug aufgehalten worden sind, und zieht hieraus einen starken Beweis für ihre Verwandtschaft mit dieser Species. Inzwischen scheint eben ihr Wandern, das die andern nicht thun, sehr dagegen zu sprechen, doch dieß kann nicht bestimmt werden, bis man mit dem Vogel besser bekannt ist v).

10. Das Bergrebhuhn (Mountain P.)

Tetrao montanus L. 1. 2. p. 758. No. 33. w)
La Perdrix de la montagne. Briss. orn. I. p. 224. pl. 21. f. 2. -- Buff. ois. II. p. 419. -- x) Pl. enlum. 136. -- Frisch tab. 114.

Es hat die Größe des gemeinen, und ist zehn und drey Viertel Zoll lang. Sein Schnabel ist roth; Kopf, Kehle und Hinterhals sind röthlich sohlenlederfarben; der Vorderhals, die Brust, der obere Theil des Bauchs, die Seiten und die untern Deckfedern des Schwanzes hell kastanienbraun; die obern Theile des Körpers und die Flügel sind gleichfalls kastanienbraun, die Bänder der Federn aber bräunlich, und der Rücken und die Schulterfedern haben eine graue Mischung; der untere Theil des Bauchs, der After und die Schenkel sind sehr hell sohlenlederfarben; der Schwanz besteht aus zwanzig Federn, wovon die sechs mittlern kastanienbraun sind, mit grauen Spitzen, und die sieben andern zu beyden Seiten hellkastanienbraun; die Füße sind roth y).

Diese Art hält sich in den bergigen Gegenden des festen Landes auf, und wird auch zuweilen unter einem Flug gemeiner Rebhühner angetroffen.

Sie scheint eine Zwischenart zwischen diesem und dem Griechischen Rebhuhn (No. 12.) zu seyn, ist aber in der That weder das Eine, noch das Andere, indem das Erste nur achtzehn, und das zweyte nur sechszehn Federn im Schwanz hat z).

11. Das Kragen-Rebhuhn. (Hackled P.)

(s. die zweyte Figur der drey und sechzigsten Kupfertafel.)

Tetrao ferrugineus L. I. 2. p. 761. No. 44 a)
La grande Caille de la Chine. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 171.
Lev. Mus.

Seine

z) Es ist doch merkwürdig, daß man seitdem nichts genaues wieder von dem Vogel gehört hat. B.

w) Perdix montana. Lath. Index orn. II. p. 645. n. 11. B.

x) Ueberf. VI S. 36. B.

y) Nach Brisson ist der Schnabel grau, und die Füße sind grünlichbraun.

z) Was über diesen Vogel zu sagen ist, habe ich in meiner N. G. Deutschlands III. S. 554. weitläuftig auseinander gesetzt. Es ist mir der größten Wahrscheinlichkeit nach nichts anders als ein sehr altes Männchen des gemeinen Rebhuhns. Vor etlichen Jahren wurde eins unter den Rebhühnern geschossen, das Geschrey, Flug und kurz alle Eigenschaften des gemeinen Rebhuhns hatte. Ich halte daher diesen Vogel für keine besondere Art. B.

a) Perdix ferruginea. Lath. Ind. orn. II. p. 651. n. 26. B.

Seine Länge ist zwölf Zoll. Der Schnabel gleicht dem des gemeinen Rebhuhns, ist aber länger, von brauner Farbe, mit einer schwarzen Spitze; der Scheitel hat eine feine Mischung (minutely mixed) von Dunkelbraun, und Rostigroth. Die Federn am Nacken und Hinterhals sind anderthalb Zoll lang, die Mitte derselben schwarzbraun, etwas glänzend, die Schäfte und Ränder ringsherum gelblich sohlenlederfarben, und an den Enden spitzig; wenn der Vogel diese Federn aufhebt, so gleichen sie den Halsfedern des Kragen-Waldhuhns (s. die vorige Gattung, Nr. 8.) sie sind kürzer und schmäler, als die zunächst am Kopf stehenden; die obern Theile des Körpers sind rostigrothbraun, mit ganz kleinen schwarzen Punkten; die Deckfedern der Flügel und der Rücken hellgelblich sohlenlederfarben gestreift; die Schwungfedern einfarbig braun, und nur die Ränder schwarz getüpft; der Schwanz braunschwarz, seine drey äussern Federn einfarbig, die andern am äussern Rande schwarz getüpfelt; der Vorderhals und die Seiten desselben rostigroth, ein wenig mit einer hellern Farbe gesprenkelt, die Schäfte hell; die Brust einfarbig rothbraun; der Bauch eben so, aber heller; der After dunkelfarbig; die Füße braun, und anderthalb Zoll lang; die Klauen am hellsten.

Im Leverschen Museum, und vermuthlich vom Vorgebürge der guten Hoffnung. Sonnerat's Vogel kam aus China. Er beschreibt ihn mit rothem Augstern; die Federn am Rücken und am Steiß weißlich gestreift, und lang genug, um den Schwanz zu verstecken; runde, schwarze Flecken an den äussern Fahnen der Flügelfedern, und an den Seiten des Bauchs; außerdem ist er nur sehr wenig von obigem verschieden. Es scheint dieß das Männchen zu seyn.

12. Das Griechische Rebhuhn. (Greek P.)

Tetrao rufus L. I. 2. p. 735. No. 12. *b*) --- - Kram. elench. p. 357. No, 5.
La Bartavelle, Briss. orn. I. p. 241. No. 12. pl. 25. f. 1. -- Buff. ois. II. p. 240. *c*) Pl. enlum. 231.
Perdix graeca, seu ruffa major. Raii Syn. p. 57. A. 5.
Greek Partridge, or great red Partridge. Will. orn. 169.
Red Partridge. Albin. p. 27. (die bloße Beschreibung *d*).

Dies ist viel größer, als das gemeine Rebhuhn, und dreyzehn Zoll lang. Schnabel, Auglieder und Augstern sind roth; der obere Theil des Kopfs, der Hals, die Brust, und alle obern Theile des Körpers sind aschgrau, an Rücken und Brust gelbroth überlaufen; Wangen, Kehle und Vorderhals sind weiß, rings herum mit einem schwarzen Halsbande eingefaßt, das an den Nasenlöchern anfängt, und zwischen den Augen durchläuft; vom Bauch bis zum After ist die Farbe gelblich, die Seiten aber sind sehr schön mit orangefarbnen und schwarzen halben Monden geschäckt; die Schwungfedern sind braun, einige der äußern am äußern Rande, unweit der Spitze, gelbroth gefleckt, und die kürzern mit Grau bezeichnet; der Schwanz besteht

b) Perdix rufa. Lath. Ind. orn. II. p. 647. n. 12. B.
c) Uebers. VI. S. 37. B.
d) Vergl. auch meine N. G. Deutschlands III. S. 519. Nr. 8. B.

aus vierzehn aſchgrauen Federn, die fünf äußern haben eine gelbrothe Endhälfte; die Füße ſind roth, und hinten mit einem ſtumpfen Knopf oder Sporn verſehen.

Dieſe Art findet ſich in Menge auf den Cycladiſchen Inſeln, im Archipolagus, in Griechenland, und vorzüglich auf der Inſel Candia, ob man ſie gleich auch zuweilen in Italien und auf den Alpen antrifft. Sie hält ſich an felſigen und bergigen Orten auf, und kommt im May herab um zu brüten. Ihre Eyer legt ſie auf die bloße Erde, unter einen Stein, an der Zahl ſechzehn oder achtzehn, von Farbe weiß, mit zahlreichen kleinen rothen Flecken geſprenkelt. Man hält dieſe Eyer für eine ſehr gute Speiſe, und das Weiße ſoll im Sieden nicht hart werden.

Var. A. Das Europäiſche Rothhuhn. (Das Rebhuhn von Guernſey. Guernsey P.)

Tetrao rufus. L. l. 2. p. 756. No. 12. β. *e*) -- Gmelin in Nov. Comment. Acad. Petrop. vol. XV. p. 448. tab. 13. -- Scop. ann. 1. Oo. 174. *f*) -- Kram. elench p. 375. Oo. 5.

La Perdrix rouge. Briss. orn. 1. p. 236. No. 10. -- Buff. ois. 11. p. 431. pl. 15. *g*) Pl. enlum. 150. (Das Männchen.)

Perdrix ruffa, Red-legged Partridge. Raii syn. p. 57. A. 5. -- Will. orn. p. 157. pl. 29. -- Albin. 1. pl. 29. *b*)

Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß iſt kleiner, als das letzte, und dreyzehn Zoll lang. Schnabel, Augenſtern und Füße ſind wie beym vorigen; die Stirn graubraun; der Hinterkopf gelbrothbraun; Kinn und Kehle weiß, mit Schwarz eingefaßt, wie beym vorigen, und auſſer dieſem läuft noch ein weißes Band über die Augen nach dem Hinterkopf hin; der Vorderhals und die Seiten deſſelben ſind aſchgrau mit zwey ſchwarzen Flecken an jeder Feder; die Federn am Hinterkopf haben jede zwey ſchiefſtehende ſchwarze Flecken; der Hinterhals iſt gelbrothbraun; der Rücken, die Flügel und der Steiß graulichbraun; die Bruſt hellaſchfarben; Bauch, Seiten, Schenkel und After gelbroth; die Seiten mit mondförmigen weißen, ſchwarzen und orangenfarbenen Streifen bezeichnet; die Schwungfedern graubraun, mit gelblichen äuſſern Rändern; der Schwanz beſteht aus ſechzehn Federn, die vier mittlern ſind graubraun, die nächſte an jeder Seite eben ſo, aber an der Auſſenſeite gelbroth, die fünf äußern an beyden Seiten gelbroth; nur das Männchen hat den ſtumpfen Knopf hinten an den Füßen.

Dieſe Art findet ſich in verſchiedenen Ländern Europens, Aſiens und Afrikas; in vielen Gegenden Deutſchlands, *i*) Frankreichs und Italiens; auf den Inſeln Madira *k*), Quernſey und Jerſey; hier und da trifft man ſie auch in England an, aber ſelten, und ſie brütet auch nicht da. Mir ſind zwey Exemplare dieſer Art bekannt, die in Kent, in Freyen

e) Lath. l. c. β.
f) Ueberſ. von Günther S. 143. No. 174. B.
g) Ueberſ. VI. S. 51. B.
h) Vergl. auch meine N. G. Deutſchlands III. a. a. O.
i) Nach Kramern findet ſich keines von dieſer Art in Oeſterreich.
k) Forſter Voy. Vol. I. p. 26. — Er bemerkt auch, daß ſie auf der St. Helenen Inſel zu Hauſe iſt. Vol. II. p. 568.

gen ſind geſchoſſen worden ſind, und wovon ich jetzt eins beſitze *l*). Die Nahrung dieſer Art iſt vermuthlich der des gemeinen Rebhuhns ähnlich; Willugby fand in dem Kropf von einer Raupen und Schnecken.

Dieſe Vögel lieben bergige, dicht mit Wäldern beſetzte Gegenden. Ihr Fleiſch wird ſehr geſchätzt. In einem Stücke gehn ſie inzwiſchen doch von dem gemeinen Rebhuhn ab, darum nämlich, daß man ſie in ganzen Flügen findet; hingegen bey jenen nur die, die zu einer Familie gehören, ſich bekanntlich zuſammenhalten; die Rothhühner ſitzen auch zuweilen auf Bäumen, was unſere Rebhühner nie thun. Die rothen vermehren ſich zuweilen in unſeren Managerien, doch nicht ſo leicht, als Faſanen u. d. gl. denn ſie hängen allzuſehr an der Freyheit, und werden ſelten fett in dieſem Zuſtande; ja viele von den Jungen ſterben, ehe ſie in die Höhe kommen. *m*). Inzwiſchen ſagt doch Tournefort *n*), daß ſie auf der Inſel Scio ſo zahm würden, daß man ſie gleich den Schaafen daſelbſt auf die Felder treiben könne, um ihr Futter zu ſuchen, und jede Familie durch Pfeifen wieder zu ihrem Eigenthümer zurückgetrieben werde. Ferner bemerkt er, ſie ſeyen auf der Inſel Nanſio in ſolcher Menge, daß ſie die Einwohner für eine Landplage hielten, welche dagegen bis auf den heutigen Tag jährlich ſo viele Eyer als möglich ſammelten, um die Brut zu vermindern, die in manchen Jahren die Früchte der Erndte gänzlich aufgezehrt habe.

Man hat ſich der rothen Rebhühner oft ſo bedient, wie wir mit den Hähnen zu thun pflegen, nämlich zu dem unvernünftigen (National) Vergnügen, einen den andern umbringen zu ſehen. Dieſer Zeitvertreib iſt noch jetzt auf der Inſel Cypern gemein.

Da *o*) ſich dieſe Art noch hin und wieder in unſerm Königreiche findet, ſo könnte man leicht auf den Gedanken gerathen, als hätte ſie ſich nach und nach bey uns naturaliſirt. Verſchiedene Edelleute, und vorzüglich der letzte Herzog von Northumberland, haben deßhalb viele Paare ausgeſetzt. Man findet auch angegeben, daß man ſchon zu den Zeiten Königs Karl II., um Windſor verſchiedene Paare ausgeſetzt hat, in der Abſicht, daß ſie ſich vermehren ſollten; vermuthlich ſind ſie aber zuletzt umgekommen, obſchon man einige von ihnen, oder von ihren Nachkömmlingen, einige Jahre nachher noch geſehen hat. Inzwiſchen ſcheinen dieſe Vögel im Zuſtande der Gefangenſchaft ziemlich gut fortzukommen, wie ich ſelbſt geſehen habe. Man hat mir aber auch geſagt, daß, wenn man ſie nachher ausſetzt, und ſie für ſich ſelbſt ſorgen läßt ſie bald ſterben, wie dieß mit einigen geſchah, die Herr Tunſtall beſeſſen hat. Iſt nicht etwan unſer Clima zu feucht, oder zu kalt für dieſe Vögel, oder vielleicht gar beydes Urſache davon? Ich habe einmal ihr Fleiſch verſucht, und es ungemein ſchmackhaft gefunden, ſo wie alle Bewohner der Gegenden, wo ſie zu Hauſe ſind, beſonders in Frankreich, wo man ſie in Paſteten bäckt, und ſehr hochſchätzt.

Ein

l) Andere ſind in Hampſhire und Dorſetſhire erlegt worden; man glaubt aber es ſeyen bloß ſolche geweſen, die die dortigen Landedelleute aus ihren Menagerien in der Nachbarſchaft herausgelaſſen haben, um ſie zu naturaliſiren.

m) Hist. des Ois.

n) In ſeiner Reiſe.

o) Zuſ. aus dem Suppl. S. 220. 221.

Ein Vogel, der dem obigen, oder vielmehr dem Griechiſchen Rothhuhn ähnlich iſt, iſt in Indien zu Hauſe, ſcheint aber etwas größer zu ſeyn, denn er iſt vierzehn Zoll lang. Ich ſehe dieß aus verſchiedenen Abbildungen, beſonders unter des Herrn Middleton's und der Lady Impey. Erſterer ſagte mir, er ſey nichts weniger, als ſelten, und werde häufig gezähmt gehalten. In Indien kennt man ihn unter dem Namen: Cheucquoir; die Engländer nennen ihn Feyerſchläger (Firelock), weil er Funken aus der Erde herausſchlägt.

Herr Boys, von Sandwich, ſagte mir neulich, man habe vor nicht langer Zeit aus Boſton, in Neuengland, durch eine Perſon einige Rebhühner erhalten, die ſie ins Freye auf die Felder ausgeſetzt hatte, und ſie hätten ſehr wahrſcheinlich gebrütet, weil man nachher eine Kette von ihnen geſehen hat. Die Art konnte er aus eigner Beobachtung nicht beſtimmen, weil er ſie nicht geſehen hatte.

12. Var. B. Das Rothhuhn aus der Barbarey.

(Barbary P.)

Tetrao rufus. L. I. 2. p. 736. No, 12. *β p*)
La Perdrix rouge de Barbarie. Briss. orn. 1. p. 236. No. 11, Buff. ois. 11. p. 445. *q*)
Red-legged Partridge from Barbary. Edw. pl. 70.
Barbary Partridge. Schau's Trav. p. 300?

Es iſt kleiner, als das gemeine Rebhuhn, zwölf und einen halben Zoll lang. Sein Schnabel iſt ſcharlachroth; der Augenſtern nußbraun; die Augenlieder und Augenkreiſe ſcharlachroth; der Scheitel lebhaft kaſtanienbraun, das ſich den Rücken herabzieht; die Seiten des Kopfs und die Kehle licht bläulichaſchfarben; hinter den Ohren iſt ein dunkler Fleck; um den Hals herum läuft ein kaſtanienbrauner Ring, der weiß gefleckt iſt; die Schultern ſind blau, mit braun gemiſcht; der Steiß und die mittlern Schwanzfedern aſchfarben; die Seitenfedern halb aſchfarben, halb ſchmutzig orangefarben; die Seiten des Körpers ſind mit ſchönen orangenfarben und ſchwarz geſchäckten Federn bedeckt; der Vorderhals iſt aſchfarben; die Bruſt roſenroth; Bauch, Schenkel und After hellbraun; die Füße roth; die Klauen braun; und das Männchen hat einen ſtumpfen Sporn, wie die andern.

Dieſer Vogel kam aus Sante Crux, in der Barbarey. — Auſſer dieſen Spielarten erwähnt Büffon *r*) noch einer, von röthlichweißer Farbe; der Scheitel gelbrothbraun; die Seiten gelbroth bandirt *s*).

13. Das

p) Lath. I. c. *γ*.
q) Ueberſ. VI. S. 73. B.
r) Orn. Vol. I. p. 328. A. T. rufus. *γ*. Lin. I. c.
s) Salerne erwähnt Flüge Rebhühner, zu Berry und Sologne, die ganz weiß waren, den Scheitel ausgenommen; das Weiße hatte aber einen ſchmutzig gelblichen Anſtrich. Seine Vögel waren achtzehn Zoll lang, zwey und zwanzig Zoll breit, und wogen dreyzehn Unzen. Orn. p. 147.

13. Das rothhälſige Rebhuhn. (Red-necked P.)

Tetrao rubricollis. L. l. 2. p. 758. No. 34 *t*)
La Perdrix rouge d'Afrique. Buff. ois. II. p. 444. *u*) — Pl. enlum. 180.

Es hat die Größe eines kleinen gemeinen Rebhuhns, und dreyzehn Zoll Länge. Sein Schnabel iſt kurz, und roth; um die Augen herum iſt ein kahler, vorn und hinten zugeſpitzter Raum; Kinn und Kehle ſind kahl; die Hauptfarbe des Gefieders iſt braun, oben mit dunklern braunen Flecken; über den Augen iſt ein weißer Streifen, unter denſelben ein anderer, der den obern Theil der kahlen Stelle an der Kehle einfaßt, indem er ſich abwärts krümmt; beyde Streifen entſtehen von der Schnabelwurzel; die Seiten des Halſes und die untern Theile des Körpers ſind weiß, mit braunen Streifen, die braune Zeichnung iſt da am größten, wo ſie am weiteſten von den obern Theilen des Körpers abſteht; die Mitte der Bruſt und des Bauchs ſind größtentheils braun; After und Schenkel weiß; der Schwanz iſt kurz, kaum über einen Zoll lang, und ausgebreitet; die Füße roth, mit einem krummen Sporn verſehen, der ſo lang als die hintere Klaue iſt.

Es iſt in Afrika zu Hauſe. Seine Lebensart iſt unbekannt.

14. Das rothbrüſtige Rebhuhn. (Rufous-breasted P.)

Tetrao petrosus. L. l. 2. p. 758. No. 35. *v*)
La Perdrix de roche, ou de la Gambra. Buff. ois. II. p. 446. (*w*)

Dieß iſt etwas kleiner als das Europäiſche Rothhuhn, hat aber den nämlichen Bau, ſo wie einen rothen Schnabel, Augen und Füße; die Hauptfarbe iſt mattbraun, an der Bruſt iſt ein Fleck von der Farbe des Spaniſchen Tabacks (Spaniols). Es biegt den Schwanz beym Laufen ſtark abwärts, und läuft ſehr ſchnell. Man hält es für eine gute Speiſe. Es hält ſich in felſigen und bergigen Gegenden auf.

15. Das geperlte Rebhuhn. (Pearled P.)

Tetrao perlatus. L. l. 2. p. 758. No. 36. *x*)
— — chinensis. Osbeck. Voy. Vol. II. p. 326.
La Perdrix de la Chine. Briss. orn. I. p. 234. No. 9. pl. 28. A. f. 1.
— — perlée de la Chine. Buff. ois. p. 526. *y*)

Es iſt etwas größer als das gemeine, zwölf und einen halben Zoll lang. Der Schnabel iſt ſchwärzlich, und faſt einen Zoll lang; der Augenſtern nußbraun; über den Augen iſt ein gelb-

t) Perdix rubricollis. Latham Ind. orn. II. p. 648. n. 13. B.
u) Ueberſ. VI. S. 69. B.
v) Perdix petroſa. Latham Ind. orn. II. p. 648. n. 14. B.
w) Ueberſ. VI. S. 74. B.
x) Perdix perlata Latham Ind. orn. II. p. 648. n. 15. B.
y) Ueberſ. VI. S. 75. B.

gelbrother Streifen, der an den Naſenlöchern anfängt; unter dieſem ein breiterer ſchwarzer, der zwiſchen den Augen durchläuft, und unter den Augen ein weißer; auſſer dieſem läuft noch ein vierter, ſchwarzer, mit der untern Kinnlade parallel; der Scheitel iſt braun mit ganz kleinen weißen Flecken; die Kehle weiß; Hals, Bruſt, Bauch, Seiten und After braun, mit runden, gelbrothen und weißen Flecken; Rücken und Steiß gelbroth und braun geſtreift; die Schwungfedern bräunlich, mit krummen weißen Bändern durchzogen; der Schwanz braun, mit ſchwarzen Queerſtreifen und Spitzen; die Füße gelbroth, und beym Männchen hinten mit einem Sporn verſehen.

Es in China z) zu Hauſe, und von Herrn Powre nach dem Leben abgezeichnet worden. Die Chineſer nennen es Tche-cou. Der Vogel, auf den Osbeck anſpielt, ſcheint dieſem ſehr ähnlich, wenn es nicht der nämliche iſt. Er ſagt, die vornehmen Chineſer bedienten ſich ſeiner, ſo wie der gemeinen Wachtel (Nr. 24.), um ihre Hände im Winter daran zu wärmen.

15. Var. A. Tetrao perlatus. L. l. 2. p. 758. No. 36. β. a)

Die Länge iſt dreyzehn Zoll. Der Schnabel iſt fünf Viertel Zoll lang, die obere Kinnlade iſt ſtark gewölbt, und ragt über die untere her, die Farbe braun; der Scheitel dunkelbraun, und jede Feder milchbläulich geränder und geſtreift; die Seiten des Halſes ſind roſtig-milchbläulich, mit dunkelfarbigen Spitzen; über jedem Auge iſt ein ſchöner, ganz klein ſchwarz und weiß getüpfelter Streifen; Kinn und Vorderhals ſind auf die nämliche Art ſchön gezeichnet; die obern Theile des Körpers ſind braun, mit ſchmalen, dunkelmilchbläulichen Strichen durchzogen, und am Schaft herab eben ſo wie der Rücken bey der Wachtel bezeichnet; Bruſt und Seiten ſind roſtigroth, kaſtanienbraun, dunkelfarbig und ſchmutzigweiß geſprenkelt (mottled); die Mitte des Bauchs aber iſt nur mit den zwey letzten Farben bemahlt; die Schwungfedern ſind dunkelfarbig; der Schwanz noch dunkler, und mit weißen Strichen durchzogen; die Füße braun, und mit einem kurzen, dicken Sporn verſehen.

Dieſer Vogel wurde an Sire Joſ. Banks vom Vorgebirge der guten Hoffnung geſandt. Es iſt eine ungemein ſchöne Art.

16. Das Gingiſche Rebhuhn. (Gingi P.)

Tetrao gingicus. L. I. 2. p. 760. No. 41. b)
Le Perdrix de Gingi. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 167.

Er

z) Du Halde ſpricht in ſeiner Geſchichte von China, von ganzen Wolken von Rebhühnern, tauſend in einem Flug; und erwähnt auch der Sand-Rebhühner; da er aber keins von beyden beſchreibt, ſo bleibt man in Rückſicht der Art, im Dunkeln.

a) Perdix afra. Latham Ind. orn. II. p 648. n. 16. Das Caffer ſche Rebhuhn. Hier wird es als eine beſondere Art aufgeſtellt. B.

b) Perdix gingica Latham Ind. orn. II. p 648. n. 17. B.

Es iſt kleiner, als das gemeine. Sein Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern gelb; der Scheitel dunkelbraun; vom Schnabel läuft ein weißer Strich über die Augen faſt bis zum Hinterkopf hin, und jede Feder, die dieſen Strich bildet hat einen ſchwarzen Streifen; die Kehle iſt hell gelbroth; Hals und Wangen eben ſo, mit einem ſchwarzen Längsſtreifen an jeder Feder; an der Bruſt ſind zwey Flecken, ein ſchwarzer und ein kaſtanienbrauner, die beyde durch einen weißen von einander getrennt ſind; der Rücken iſt ſchmuzig gelbrothgrau; die kleinern Deckfedern der Flügel ſind kaſtanienbraun, mit ſchmuzig gelbrothgrauen Rändern, und einem Flecken von eben dieſer Farbe an der Spitze jeder Feder; die mittlern ſind ebenfalls kaſtanienbraun, mit ſchmuziggelben Rändern, und einem runden ſchwarzen Flecken am Ende jeder; die kurzen Schwungfedern ſind faſt eben ſo; die großen ſchwärzlichbraun; Steiß und Schwanz ſind ſchmuzzig gelbrothgrau, mit einem ſchwarzen Flecken an jeder Feder in Form einer Zähre; der Bauch weiß, mit zwey länglichen, hell kaſtanienbraunen Bändern an jeder Feder; die Füße röthlichgelb (rufous yellow).

Das Weibchen iſt kleiner. Scheitel und Hinterkopf ſind ſchmuziggrau; Kehle und Vorderhals dunkelbraun; am oberſten Theil (top) der Bruſt iſt ein großer, grauer Fleck, deſſen Federn alle mit ſchwarzen Strichen wellenförmig durchzogen ſind; die Seiten des Bauchs ſind kaſtanienbraun; der Bauch ſelbſt hell gelbroth; die Seiten der Bruſt ſchwarz gefleckt; die Deckfedern der Flügel drey Viertheile ihrer Länge ſchmuziggrau, mit wellenförmigen ſchwarzen Linien durchzogen, am Ende ein dunkelkaſtanienbrauner Fleck, nebſt einem weißen Flecken an jeder Fahne über dieſem; die kurzen Schwungfedern ſchmuziggrau, mit rothgelben Rändern, und einem runden Fleck von der nämlichen Farbe, an der innern Fahne am Ende; Steiß und Schwanz ſind gelbrothgrau, mit ſchwarzen Strichen durchzogen; die Füße ſchmuziggrau.

Dieſe Art trifft man in der Nachbarſchaft von Gingi, an der Küſte von Coromandel an.

17. Das Rebhuhn aus Pondiſchery. (Pondichery P.)

Tetrao pondicerianus. L. I. 2. p. 760. No. 42. c)
La Perdrix de Pondichery. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 165.

Von der Größe des gemeinen Rebhuhns. Sein Schnabel iſt dunkelfarbig; der Augenſtern roth; der Scheitel matt gelbrothgrau; der Zügel gelblich; die Kehle eben ſo; die untern Federn mit ſchwarzen Spitzen; der Hinterhals grünlich, mit ſchwarzen Bändern; der untere Theil deſſelben, und der Rücken gelbroth, mit weißen Bändern; die Bruſt hell gelbroth, mit ſchwarzen Wellen; der Bauch weiß, mit halbcirkelförmigen, ſchwarzen Bändern durchzogen, die Seiten deſſelben gelbroth gefleckt; die kleinern Schwungfedern ſo ziemlich eben ſo, mit gelbröthlichweißen Bändern, die großen ſehr dunkel ſchmuziggrau; der Steiß grau, mit ſchmuzigweißen Bändern durchzogen, und mit ſchwarzen Linien zu beyden Seiten eingefaßt; die zwey mittlern Schwanzfedern gelbroth, mit zahlreichen, braunen Zik-zakſtreifen durchzogen, und

c) Perdix pondiceriana Latham. Ind. orn. II. p. 649. n. 18. B.

mit vier gelblichweißen Bändern an jeder; die übrigen Federn sind lebhaft bräunlichroth, an den innern Fahnen schwarz bandirt; das Männchen hat einen sehr starken Sporn.

Es ist auf der Küste von Coromandel zu Hause.

Seine [c]) Länge ist zehn Zoll. Der Schnabel ist schwarz; das Kinn, die Augenkreise und die Stelle unter den Augen gelb; der übrige Kopf, der Hals und die Brust hell bräunlichweiß, mit großen, rundlichen schwarzen Flecken bezeichnet; ein Streifen, der aus schmalen, schwarzen und weißen Linien besteht, theilt die Mitte der Brust, und unter diesem ist sie weiß; der Bauch ist braun, mit kurzen, schwarzen Queerstreifen; der Rücken weißlichbraun, mit schmalen, schwarzen, an beyden Enden spitzigen Queerstreifen; die großen Schwungfedern haben schwarze Spitzen; der Schwanz ist röthlich thonfärbig braun, mit neun oder zehn schiefen, schwarzen Streifen durchzogen; die Federspitzen sind weiß; die Füße an der Vorderseite sehr blaß, die hintere Seite und die Zehen schwarz; die hintere Klaue sehr klein; die Füße ohne Sporen.

Es ist in Indien zu Hause, wo es Ghoortectur, oder Stein-Taube genannt wird. Mehrentheils sieht man es Paarweise, selten in Ketten (coveys). Es ist auch überhaupt nicht sehr gemein. Es ist scheu, fliegt hoch, und man kann es nicht leicht zum Schuß kriegen. Einige nennen es Rebhuhn. Sein Geschrey gleicht aber dem des Rebhuhns gar nicht [e]). — Aus der großen Aehnlichkeit in der Zeichnung mit dem Rebhuhn aus Pondischery, und weil es einen Sporn hat, vermuthe ich, das es das Weibchen dieser Art ist.

18. Das Javanische Rebhuhn. (Java P.)

Tetrao javanicus. L. l. 2. p. 761. No. 45. *f*).
Javan Partridge. Brown's illustr. p. 40. pl. 17.

Die Stirn dieses Vogels ist orangefarben; der Scheitel dunkel aschfarben, hinten mit einem orangefarbnen Flecken eingefaßt; die Wangen schwarz, zu beyden Seiten mit einem orangefarbnen Bande eingefaßt, das an jeder Seite des Kinns entspringt; Rücken und Brust aschgrau, mit dunkeln, halbmondförmigen Flecken; die Deckfedern der Flügel, die Schulterfedern, und die kurzen Schwungfedern schwarz und aschgrau, mit gelben Rändern; die großen Schwungfedern grau, mit schwarzen Rändern; der Schwanz aschgrau, mit halbmondförmigen, schwarzen Zeichen; der Bauch matt orangefarben; der After roth, mit einem aschfarbnen und schwarzen Band durchzogen; die Füße fleischfarben.

Es ist auf der Insel Java zu Hause.

19. Das

[d]) Dieß ist die Beschreibung des Weibchens, wie Latham vermuthet, a. d. Suppl. S. 221.
[e]) Herr Middleton.
[f]) Perdix javanica Latham Ind. orn. II. p. 651. n. 27. B.

19. Das Mexicaniſche Rebhuhn. (Mexican P.)

Tetrao naevius. L. l. 2. p. 760. No. 43. *g*)
La Perdrix de montagne du Mexique. Briss. orn. l. p. 226. No. 3.
Le Rollier du Mexique. ibid. Vol. II. p. 84. No. 10.
Ococolin, seu Perdix montana. Ray Syn. p. 57. No. 1. — Buff. ois. II. p. 489.
h). — Seba thesaur. Vol. I p. 100. pl. 64. f. 1.

Dieß iſt viel größer, als das gemeine Rebhuhn, und ein und zwanzig Zoll lang. Sein Schnabel iſt hellroth; der Augenſtern ſchwarz; die Hauptfarbe des Gefieders braun, gelblich und rothgelb gemiſcht; der größeſte Theil des Kopfs und Halſes aber iſt rothgelb, mit grauen und weißen Flecken, und der obere Theil des Kopfs, die Kehle und die Seiten ſind ſchwarz gefleckt; die Flügel ſind grau, oben mit rothgelben und weißen Flecken, unten aſchgrau; die Füße hellroth.

Es iſt in den gemäßigten Gegenden von Mexico zu Hauſe, und wird für eine ſehr gute Speiſe gehalten.

20. Das Guianiſche Rebhuhn. (Guiana P.)

Tetrao gujanensis. L. l. 2. p. 767. No. 62. *i*)
Le Tocro, ou Perdrix de la Guiane. Buff. ois. IV. p. 513?
Partridge of Guiana. Bancroft Guian. p. 177?

Es hat die Größe unſers gemeinen Rebhuhns, und eilf Zoll Länge. Sein Schnabel iſt braun; um die Augen herum ſtehen rothe, warzige Auswüchſe; zwiſchen den Augen und hinter denſelben läuft ein hell gelbrother Streifen; der obere Theil des Gefieders iſt gelbrothbraun; die äußern Fahnen der Schulterfedern ſind aſchfarbig geſprenkelt; die Deckfedern der Flügel bräunlich aſchfarben geſprenkelt; der Rücken aſchbraun, mit ſchwärzlichen Tupfen; die Kehle aſchgrau; die Bruſt aſchbraun, mit undeutlichen hellern Streifen; der Bauch hell orangebraun; die äußern Fahnen der Schwungfedern gelbroth gefleckt; die Füße gelbbraun.

Aus Cayenne und Guiana, denn ich ſah es in einer Sammlung aus letztbenanntem Lande.

Wahrſcheinlich iſt Büffon's oben citirter Vogel dieſe Art; denn er ſagt bloß, er gleiche unſerm Rebhuhn, ſelbſt am Schnabel und Füßen, obſchon er ihn unter ſeinen übrigen Tinamu's aufſtellt. Mit Bankroft's Vogel bin ich nicht ſo ins Reine; denn er ſagt, er ſey zweymal ſo groß, als unſre Rebhühner, und fügt noch hinzu, er laufe auf der Erde herum, verkrieche ſich unter die Gebüſche, wie eine Wachtel, und wenn er aufgeſchreckt werde, ſo fliege er mit einem lauten Geſchrey davon (ein ſtarker Zug von unſerm Rebhuhn). Die Einwohner nennen ihn Mams. — Einer im Britiſchen Muſeum ſtimmt ſo ziemlich mit obiger Beſchreibung überein, außer daß das Kinn ſohlenlederfarben iſt, und die Kopffedern etwas lang ſind. Vielleicht ein männlicher Vogel!

g) Perdix naevia Latham Ind. orn. II. p. 649. n. 19. B.
h) Ueberſ. VI. S. 142. B.
i) Perdix guianenſis Latham Ind. orn. II. p. 650. n. 21 B.
k) Ueberſ. XIII. S. 244? B.

21. Das grüne Rebhuhn. (Green P.)

(ſ. die erſte Figur der acht und ſechzigſte Kupfertafel.)

Tetrao viridis. L. l. 2. p. 761. No. 46. *l*)
Br. Mus.

An Größe ſteht es zwiſchen dem Rebhuhn und der Wachtel mitten inne, und ſeine Länge iſt zwölfthalb Zoll. Die Hauptfarbe ſeines Gefieders iſt ein ſchönes dunkelgrün, das um den Kopf herum ins dunkelfarbige ſpielt; der Schnabel iſt hellroth am Ende ein wenig gebogen; die Stelle zwiſchen dem Schnabel und den Augen iſt kahl und röthlich; die Stelle unter und hinter den Augen iſt eben ſo; Schwanz Schenkel und After ſind dunkelfarbig; die Flügel ſchön röthlichgelbbraun, und ein wenig ſchwarz geſprenkelt; die Schwungfedern am hellſten; die Füße hellroth; die Hinterzehe ohne Klaue.

Ich fand dieſe Art im Brittiſchen Muſeum, ohne irgend eine beygefügte Geſchichte.

22. Das Virginiſche Rebhuhn. (Virginian P.)

Tetrao virginianus. L. l. 2. p. 761. No. 16. *m*)
La Perdrix d'Amerique. Briss. orn. l. p. 230. *n*)
American Partridge. Catesby's Carol. Vol. III. pl. 12.

Kleiner als das gemeine Rebhuhn. Der Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern roth; die Seiten des Kopfs und die Kehle gelblichweiß; an beyden Seiten des Kopfs ſind drey weißliche Bänder, eines über, das andere unter den Augen, und ein drittes das unter der Kehle anhebt, und gegen den Hinterkopf zuläuft, wo es eine Art von Halsband bildet; der Scheitel, der Hals, der Rücken und der Steiß ſind gelbrothbraun, mit Schwarz geſchäckt; die Deckfedern der Flügel gelbroth, braun und ſchwarz; die Schwungfedern mattbraun, mit gelbrothen Rändern, der Schwanz einfarbig mattbraun; die Füße braun.

Es iſt in Amerika zu Hauſe, wo es auf Bäumen ſitzt, und ſich mehr in Wäldern, als an offenen Plätzen aufhält.

23. Das Maryländiſche Rebhuhn. (Maryland P.)

Tetrao marilandus. L. l. 2. p. 761. No. 17. *o*)
La Perdrix de la nouvelle Angleterre. Briss. orn. l. p. 229. No. 6. — Buff. ois. II. p. 447. *p*)
New England Partridge. Albin. I. pl. 28.
— — Brown's Jam. p. 471.
Maryland Partridge. Arct. Zool. II. p. 318. No. 185. *q*)

Auch

l) Perdix viridis Latham Ind. orn. II. p. 650. n. 22. B.
m) Perdix virginiana Latham. Ind. orn. II. p. 650. n. 24. B.
n) La Perdrix d'Amerique Buff. II. p. 399. Ueberſ. VI. S. 10. B.
o) Perdix marilanda Latham Ind. orn. II. p. 651. n. 25. B.
p) Ueberſ. VI. S. 77. B.
q) Ueberſ. II. S. 297. Nr. 108. B.



1. Das grüne Rebhuhn. 2. Die Andalusische Wachtel.

MUSEUM
NATURAL HISTORY

Auch dieß iſt kleiner als unſer Rebhuhn. Sein Schnabel iſt ſtark und ſchwarz; der Augenſtern gelb; der Kopf und die obern Theile gelbrothbraun, ganz klein mit Schwarz geſprenkelt, und einige Schulterfedern mit einem gelben Streifen; die Stirn iſt weiß, und dieß zertheilt ſich, und bildet einen Streifen von der nämlichen Farbe über jedem Auge, der denn hinter daſſelbe hingeht, und eine Strecke am Hinterhalſe herabläuft; über dieſem weißen Streifen ſind die Federn dunkelſchwarz; Kinn und Kehle ſind weiß, rings herum dunkelſchwarz eingefaßt, das vorne am dunkelſten iſt, und die Form eines halben Mondes hat; die untern Theile des Körpers ſind ſchmutzig gelblich weiß, mit krummen ſchwarzen Strichen; Seiten, Schenkel und After kaſtanienbraun melirt; die Füße braun. Einige Vögel haben eine Miſchung von Weißen, hinten an jeder Seite des Halſes, und der ſchwarze Halbmond am Vorderhalſe iſt tiefer und von dunklerer Farbe.

Das Weibchen iſt kaum vom Männchen zu unterſcheiden, auſſer darin, daß das Kinn ſohlenlederfarben iſt.

Dieſe Art findet ſich in Amerika, von Oſtflorida bis nach Neuſchottland, wohin ſie im Frühjahr zieht und in allen den dazwiſchen gelegenen Ländern im Junius brütet. Sie vermehrt ſich erſtaunend, indem ſie zwey und zwanzig bis fünf und zwanzig weiße Eyer legt. Ihr Neſt machen einige wenige dürre zuſammengeſcharrte Kräuter aus. Sie lebt von Indianiſchen Korn und von Beeren. Man findet ſie öfterer an buſchreichen Orten und auf Hecken, als auf offenem Felde, und wenn ſie aufgeſcheucht wird, ſo fliegt ſie oft auf die Bäume. Im Herbſt kehrt ſie nach Süden zurück, und wird für eine gute Speiſe gehalten. Ihre Stimme iſt ein lautes Pfeifen, das zweymal geſchwind wiederhohlt wird. Die Eingebohrnen kennen ſie unter den Namen: Ho-oug *), und die Neuengländer nennen ſie Bob-White. Gegen den Winter zu wird ſie zahm, und dann kommen Flüge von drey bis vier Dutzenden in die Bauernhöfe nach verlohrnen Körnern, oder laufen vor den Reiſenden her, um ſie aus dem Roßmiſte auf der Straße aufzuklauben.

Dieſer Vogel ſoll ſich auch in Schweden *) ſowohl, als in Amerika, aufhalten.

24. Die gemeine Wachtel. (Common Quail.)

Tetrao Coturnix. L. l. 2. p. 765. No. 20. *u*) — Faun. suec. No. 266. — Scop. ann. I. No. 176. *v*) — Brünn. orn. No. 202. — Müller Zool. No. 226. — Kram. eleanch. p. 357. No. 7. — Frisch. tab. 117. — Georgi Reise p. 173. — Sepp. Voy. pl. in p. 143. — Faun. Arragon. p. 83. — Israelitorum. Hasselq. Voy. p. 279. No. 44.

La

r) Pennant ſagt a. a. O., der Kopf des Weibchens hat auch die weißen Flecken des Männchens, aber die Einfaſſungen ſind roſtfarben; es iſt auch mehr roth an der Bruſt, ſonſt die Farben beynahe einerley. B.

s) Hist. Louiſ. vol. II. p. 126.

t) Kalm's Trav.

u) Perdix Coturnix Latham Ind. orn. II. p. 651. n. 28. B.

v) Ueberſ. von Günther S. 144. Nr. 176. B.

La Caille. Briss. orn. I. p. 247. No. 14. — Buff. ois. II. p. 449. pl. 16. 16. *w*) Pl. enlum. 170.
The Quail. Ray Syn. p. 58. A. 6. — Will. orn. p. 169. pl. 29. — Albin. I. pl. 30. — Br. Zool. I. No. 92. *x*). — Arct. Zool. II. p. 320. *y*). Br. Mus. Lev. Mus.

Ihre Länge ist achthalb Zoll. Der Schnabel ist dunkelfarbig; der Kopf schwarz mit gelbroth gemischt; längs der Mitte des Scheitels, und den Hinterhals herab, läuft ein gelblicher Streifen, und ein anderer von der nämlichen Farbe über jedem Auge; die Federn des Rükkens und der Flügel sind rostrothbraun, mit lohgelb und grau geschäckt, und an den Schaft einer jeden Feder läuft ein gelblicher Streifen herab; Kinn, Kehle, Bauch, Schenkel und After sind schmuzig gelblich weiß; der Vorderhals und die Brust hell gelbroth, mit einigen schwärzlichen Flecken, und die Federn längs der Mitte herab gestreift, wie der Rücken, aber heller; die Seitenfedern sind gelbroth, mit kleinen schwärzlichen Flecken, und an den Schäften herab eben so bezeichnet, wie die andern; die Schwungfedern graubraun, auswärts mit gelbrothen Bändern durchzogen; der Schwanz hat zwölf Federn, mit schwarzen und hellgelbrothen Streifen; die Füße sind hellbraun.

Das Weibchen geht darin vom Männchen ab, daß es keine schwarzen Flecken am Vorderhalse, an der Brust und an den Seitenfedern hat, und daß das Gelbrothe bey ihm minder lebhaft ist; einige haben einen langen, braunen Fleck unter der Kehle *z*).

Die Wachtel scheint durch die ganze alte Welt verbreitet zu seyn, wohnt aber nicht in der neuen. Man sieht sie vom Vorgebirge der guten Hoffnung bis nach Island *a*), und durch ganz Rußland, die Tatarey und China *b*); mit einem Worte, sie wird von so vielen Reisenden und in so vielen Ländern erwähnt, daß man sie fast einen Bewohner von allen nennen kann. Man hat auch bemerkt, daß sie nach den Jahrszeiten ihren Aufenthalt verändert, im Frühling nach Norden, und im Herbst nach Süden zieht, und zwar in großen Flügen, wie andere Zugvögel. Sie kommt zweymal des Jahrs in solcher Menge nach Capri, daß der Bischof des Eylandes seine Haupteinkünfte von diesem Vogel zieht, und daher der Wachtel-Bischof genannt wird *c*). Aber dieß ist hier nicht allein so; fast alle Inseln des Archipelagus an den entgegengesetzten Küsten, sind zuweilen mit diesen Vögeln bedeckt und einige haben

w) Uebers. VI. S. 79. B.
x) Uebers. S. 89. Taf. 42. B.
y) Uebers. II. S. 298. 9. Vergleiche auch Zorns Pethinoth. I. 162. 360. 426. 542. II. 65. 83. III. 145. 386. 172. 283. 556. 719. Meine N. G. Deutschlands III. S. 556. Nr. 101. N. G. der Stubenvögel S. 104. Nr. 27. N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 480. Nr. 8. B.
z) Herr Latham hat sich geirret, das was er für das Weibchen ausgiebt, ist das Männchen, und seine Hauptbeschreibung ist vom Weibchen genommen. Beym Männchen steht unter der Kehle allzeit ein schwarzbrauner Fleck und Unterhals und Brust sind hellcarmelet mit einem weißlichen Längsstrich oben auf jeder Feder. Beym Weibchen ist die Kehle blaß weißlich, und die Brust ist auf der hellern Grundfarbe, wie bey einer Singdrossel schwärzlich gefleckt. B.
a) Horrebow. —
b) Sie soll sich auf dem Falklands Inseln, so wie in Neuseeland, vorfinden. s. Forsters observ. p. 196.
c) Hist. des ois.

ben daher ihren Namen *d*). An der westlichen Küste des Königreichs **Neapel** hat man in einen Umfang von vier oder fünf Meilen an einem Tage **Hundert Tausend** gefangen, die, das Hundert für acht Livers, an Kaufleuten vertauscht wurden, die sie zum weitern Verkauf nach **Rom** schickten. So kommt auch zuweilen im Frühjahr eine große Menge an die Küsten von **Provence**, besonders in die **Dioces des Bischofs von Frejus**, die an der See liegt; und diese Wachteln scheinen bey ihrer ersten Landung so ermüdet, daß man sie oft mit der Hand fangen kann *e*). Solche Beyspiele lassen nun keinen Zweifel mehr übrig, daß sie die nämliche Art von Vögeln seyen, die die Vorsehung dahin leitete, in ungeheurer Menge die Felder der murrenden **Israeliten** zu bedecken *f*).

Im Herbst wird oft eine große Menge aus **Frankreich** nach **England** zur Tafel gebracht; ich habe sie auf ihrer Reise nach **London** in den **Landkutschen** gesehen, ohngefähr hundert in einem großen, viereckigen Kasten, der in fünf oder sechs Fächer, eines über dem andern abgetheilt ist, die gerade hoch genug sind, daß die Wachteln aufrecht darin stehen können; diese Kästen haben Dräthe an ihrer vordern Seiten, und jede Abtheilung ist mit einem kleinen Troge, zum Futter, versehen, und man hat mir versichert, sie könnten auf diese Art ohne Schwierigkeiten in die entferntesten Gegenden verführt werden *g*).

Bey uns kann man nicht sagen, daß sie zu irgend einer Zeit in großer Menge vorhanden wären. Doch brüten sie bey uns, und der größte Theil zieht im Herbst nach Süden; die übrigen verändern bloß ihren Aufenthalt, denn man hat sie im Winter an den Küsten von **Essex**, und **Hampshire**, angetroffen, wohin sie im October ziehen *h*).

Sie haben einerley Nahrung mit den Rebhühnern, und machen, wie diese, kein Nest wenn man nicht einige zusammengescharrte, dürre Blätter oder Halmen so nennen will, und zuweilen ist ihnen ein Loch in der bloßen Erde gut genug. Hierein legt das Weibchen sechs bis sieben *i*) weißliche, mit unregelmäßigen, rostfarbenen Flecken bezeichnete, Eyer. Die Jungen folgen der Mutter, sobald sie ausgekrochen sind. Sie haben nur eine Brut des Jahrs.

Man kann diese Vögel, mittelst einer sogenannten Wachtelpfeife, die ihre Stimme, welche den Worten: **Whit, whit, whit**, nicht unähnlich ist, nachahmt, sehr leicht ins Garn locken. In **China** bedient man sich ihrer, nebst dem daß man sie auch ißt, noch zu andern Zwecken; einmal zum **Fechten**, wie bey uns die **Kampfhähne**; und dann zum **Händewärmen** im Winter; hierzu braucht man aber auch andere Arten *k*).

24. Var.

d) Dieß ist der Fall mit einer Insel im Hafen von St. Jago, die die Wachtel-Insel genannt wird. s. Forster's Voy. p. 39.

e) Hist. des Ois.

f) Exod. XVI. 13.

g) Wie sie sich so gut vertragen, weiß ich nicht. Die Alten fanden sie so zänkisch, daß, wenn die Kinder mit einander zerfielen (fellout), sie ein Sprichwort anbrachten: „so zänkisch wie Wachteln in einem Kasten."

h) Br. Zool. Einer meiner Brüder hat im Jänner 1781. bey Erith in Kent, eine Wachtel geschossen.

i) Zuweilen bis auf zwölf; dieß ist aber selten Br. Zool.

k) Beydes sehen wir häufig auf Chinesischen Gemälden, und nicht selten auf den gemeinen Papiertapeten aus diesem Lande.

24. Var. A. Die große Polniſche Wachtel.

Tetrao Coturnix. L. l. 2. p. 765. No. 20. β. *l*)
La grande Caille. Briss. orn. I. p. 251. A.
Le Chrokiel, ou grande Caille de Pologne. Buff. ois. II. p. 476. *m*)

Sie unterſcheidet ſich bloß dadurch, daß ſie größer iſt, und findet ſich in Polen vor. — Ariſtoteles erwähnt auch einer ganz weißen Wachtel *m*).

24. Var. B. Die bunte Wachtel.

Lev. Mus.

Im Leverſchen Muſeum iſt eine Spielart. Ihr Scheitel iſt braun, über den Augen, und rund um ſie herum, bis an den Hinterkopf herum, iſt ſie weiß, mit ſchwarzen Tupfen; der übrige Hals iſt hell röthlich gelb, an den Schäften herab weiß geſtreift; der untere Theil des Halſes, der Rücken rings herum zwiſchen den Flügeln, die Bruſt, der Bauch und der äußere Rand der Flügel ſind weiß; die Deckfedern der Flügel und die Schulterfedern gelbbraun, mit dunkelbraunen Streifen, und jede Feder längs dem Schaft herab, gelb geſtreift; die Schwungfedern gelbbraun; der Schwanz braun geſprenkelt, gegen das Ende hin kaſtanienbraun, die Spitzen ſehr blaß und bunt (mottled), die zwey Seitenfedern weiß; die Füße gelb *o*).

25. Die Chineſiſche Wachtel. (Chinese Q.)

Tetrao sinensis. L. I. 2. p. 765. No. 19. *p*)
La Caille des Philippines. Briss. orn. I. p. 254. pl. 25. f. 1. — Pl. enlum 126. (das Weibchen.)
La Fraise, ou Caille de la Chine. Buff. ois. II. p. 478. *q*)
Chinese Quail. Edw. pl. 247. (das Männchen.)
Br. Mus. Lev. Mus.

Dies

l) Latham l. c.
m) Ueberſ. VI. S. 114. B.
mm) Hist. des Ois. II. p. 476.
n) A. d. Suppl. S 222.
o) Hieher gehören auch zwey Exemplare, die ich geſehen habe. Das Eine hatte einen weißen Kopf, einige weiße Flecken auf dem Rücken und den Deckfedern der Flügel; das andere hatte weiße Schwung- und Schwanzfedern und war an den Seiten beſonders an den Weichen mit großen weißen Flecken gezeichnet.

Ich füge hier noch folgende Varietäten bey.

Var. C. Die weiße Wachtel. Perd. Coturn. alba.

Sie iſt entweder ganz weiß, oder nur gelblich weiß. (Vergl. oben Var. A.

Var. D. Die aſchgraue Wachtel.
Perd. Coturn cinerea.

Sie iſt im Grunde hellaſchgrau mit dunkelbrauner Zeichnung; die Bruſt ſchmutzig weiß.

Var. C Die ſchwarze Wachtel.
Perd. Coturn. nigra.

Sie iſt rußſchwarz; am Unterleibe ſchmutzig aſchgrau; allenthalben ſieht die dunklere Zeichnung durch. Ich habe ſie ſo in der Stube geſehen. B.

p) Perdix chinensis. Latham Ind. orn. II. p 652. n. 29. B.
q) Ueberſ. VI. S. 117. B.

Dieß iſt eine kleine Art, und nur vier Zoll lang *r*). Ihr Schnabel iſt ſchwarz, alle obern Theile ſind ſehr ſchön ſchwärzlich und hellbraun geſchäckt; die Kehle iſt ſchwarz; Wangen und Vorderhals weiß; an den Wangen iſt ein Streifen, der von der Oeffnung des Rachens in der Mitte durchläuft, und ſich vorn mit dem Schwanze an der Kehle vereinigt; die Bruſt iſt dunkel aſchfarben, mit einigen kaſtanienbraunen Flecken; zwiſchen dem Vorderhalſe und der Bruſt iſt ein ſchwarzes Band; Bauch, Schenkel und After ſind kaſtanienbraun; die Schwungfedern hellbraun; der Schwanz ſehr kurz, und kaſtanienbraun; die Füße gelb; die Klauen braun.

Sie befindet ſich ſowohl in China, als auf den Philippinen, und die Chineſer bedienen ſich ihrer häufig um die Hände im Winter damit zu wärmen, wie viele Papiertapeten von daher beweiſen. Die Weibchen werden von den Europäern aufgezogen, um Paſteten auf ihrer Heimreiſe aus ihnen zu machen, und das Stück koſtet drey Kandarin's. Das Männchen iſt größer, und ſeltner *s*). Die Chineſer lieben noch immer das Wachtelgefechte eben ſo ſehr, als wir das Hahnengefechte *t*).

26. Die Haubenwachtel. (Crested Q.)

Tetrao cristatus. L. I. 2. p. 765. No. 18. *u*)
La Caille huppée du Mexique. Briss. orn. I. p. 260. pl. 25. f. 2. — Pl. enlum. 126.
Le Zonecolin. Buff. ois. II. p. 485. *v*)
Quauhtzonecolin. Ray Syn. p. 158. — Will. orn. p. 393. Lev. Mus.

Sie hat die Größe unſrer Wachtel, und ihre Länge iſt ſechs und drey Viertel Zoll. Der Schnabel iſt ſehr ſtark und braun; auf dem Kopf iſt ein ſchmaler, einen Zoll langer Federbuſch; dieſer, der Scheitel und das Kinn ſind rothgelb; die Wangen, der Hals, der Rücken, der Steiß und die Stelle vom Bauch bis zum After ſind gelbroth, braun, ſchwarz und ſchmutzig gelblichweiß, geſchäckt, an den Wangen und am Halſe ſehr ins Schwarze, und an der Bruſt und am Bauch ins Gelbrothe ſpielend; die Schwungfedern ſind braun; der Schwanz iſt braun und grau geſchäckt; die Füße ſind braun.

Sie iſt in Guiana und Mexiko zu Hauſe. Bey der in den Pl. enlum. iſt die Kehle, ſo wie der Raum zwiſchen dem Schnabel und den Augen rothgelb. Ich halte ſie für eine und eben dieſelbe Wachtel mit der von Briſſon beſchriebenen; dort ſcheint aber gar keine Miſchung von Schwarzem in dem Gefieder zu ſeyn.

r) Edwards Vogel mißt faſt ſechs Zoll, und iſt an der Bruſt ſchwarz gefleckt.
s) Osbeck Voy. Vol. I. p. 269. 303.
t) Edw. I. p. 78.
u) Perdix cristata. Latham. Ind. orn. II. p. 652. n. 30. B.
v) Ueberſ. VI. S. 135. Büffon ſagt bloß, ſie ſey von dunkler (obscure) Farbe, und unterſcheide ſich durch ihr Geſchrey, das leiſe und etwas kläglich ſey. Es wird auch noch einer andern, ohne Federbuſch erwähnt, die etwas kleiner und wahrſcheinlich verſchiedenen Geſchlechts iſt. ſ. Fernand. Hist. av. ch. 39.

27. Die Louisianische Wachtel. (Louisiane Q.)

Tetrao mexicanus. L. I. 2. p. 762. No. 14. *x*)
La Caille de la Louisiane. Briss. orn. I. p. 258. No. 20. pl. 22. f. 2. — Pl. enlum 149.
Le Colenicui. Buff. ois. II. p. 487. *w*)
Amerikanisches Haselhuhn. Feisch tab. 113.
Colcuicuiltic, or Quails Jmage. Ray Syn. p. 158. — Will. orn. p. 393. Lev. Mus.

Von der Größe unsrer Wachtel, und acht Zoll lang. Ihr Schnabel ist roth; der Kopf schwarz und kastanienbraun gemischt, indem nämlich die Federspitzen diese letzte Farbe haben; über jedem Auge ist ein weißer Streifen, der nach hinten zu, und ein wenig an den Seiten des Halses herabläuft; die Kehle ist weiß; der Hinterhals kastanienbraun, schwarz und weiß geschäckt; die obern Theile des Körpers, der Steiß und die Flügel kastanienbraun, mit wellenförmigen schwarzen Streifen durchzogen; der Vorderhals bis zum After weiß, mit schwärzlichen Streifen durchzogen, und mit einer Mischung von gelbrothen Flecken am Halse und an den Seiten; die untern Deckfedern des Schwanzes gelbroth, mit hellern Spitzen; die Schwungfedern braun, mit grauen Rändern, und auswärts mit gelbrothen Flecken; die zwey mittlern Schwanzfedern kastanienbraun, mit kleinen schwarzen Streifen durchzogen, die übrigen aschfarben, und haben an den Spitzen mehr oder weniger von den Farben der zwey mittlern; Füße und Klauen sind roth.

Sie ist in Louisiana, Mexiko u. s. w. zu Hause. Ein Vogel dieser Art, im Leverschen Museum kommt mit obiger Beschreibung überein; der Schwanz aber ist ganz dunkelfarbig.

28. Die Maluinische Wachtel. (Malouine Q.)

Tetrao falklandicus. L. I. 2. p. 762. No. 49. *y*)
La Caille des Isles Malouines. Buff. ois. II. p. 477. *z*) — Pl. enlum. 222.

Sie hat die Größe und Länge unsrer Wachtel. Ihr Schnabel ist stark und bleyfarbig; die obern Theile des Gefieders sind hellbraun; die Mitte der Federn dunkelbraun, und gegen das Ende hat jede zwey oder drey krumme Striche von der nämlichen Farbe; die Seiten des Kopfs sind weiß gesprenkelt; Kinn, Vorderhals und Brust bräunlichgelb, mit Flecken und krummen Strichen von brauner Farbe bezeichnet, die aber heller ist, als die obige; der untere Theil der Brust, der Bauch, die Schenkel und der After sind weiß; die Schwungfedern dunkelfarbig, mit hellen Rändern; der Schwanz braun, mit hellern Bändern; die Füße braun.

Sie findet sich auf den Falkands-Inseln.

29. Die

w) Perdix mexicana. Latham Ind. orn. II. p. 653. B.
x) Uebers. VI. S. 135. B.
y) Perdix falklandica. Latham Ind. orn. II. p. 653. n. 32. B.
z) Uebers. VI. S. 116. B.

29. Die große Mexikanische Wachtel. (Mexican Q.)

Tetrao novae Hispaniae. L. l. 2. p. 763. No. 50. *a*)
La grande Caille du Mexique. Briss. orn. l. p. 257. No. 19.
Le grand Colin. Buff. ois. ll. p. 485. *b*)

Diese ist viel größer als unsere Wachtel. Ihr Schnabel ist schwarz; der Kopf hat einen Federbusch; dieser und der Hals sind schwarz und weiß melirt; der übrige Körper ist rothgelb; die Schwungfedern von letzterer Farbe, mit weißen Spitzen; die Füße schwarz.

Sie ist in Mexiko zu Hause.

30. Die kleine Mexikanische Wachtel. (Lesser M. Q.)

Tetrao Coyolcos. L. l. 2. p. 763. No. 51. *c*)
La Caille du Mexique. Briss. orn. l. p. 256. No. 18.
Le Coyolcos. Buff. ois. ll. p. 486. *d*)
Coyolcozque. seu Coli sonalis. Ray Syn. p. 158. — Will. orn. p. 393.

Die Augen sind schwarz; der Scheitel und der Hals schwarz und weiß gemischt, und dieß bildet Bänder an den Seiten des Halses, von den Augen an; der übrige Körper ist oben rothgelb, mit weiß gemischt; die Füße sind rothgelb.

Dieser Vogel ist ebenfalls in Mexiko zu Hause, wo er sich auf den Feldern aufhält. Er hat Stimme und Lebensart mit den andern Mexikanischen Wachteln gemein.

Fernandez erwähnt noch einer andern Wachtel *e*); die, wie er sagt, Größe und Bau unserer Wachtel, und ein Gefieder gleich den andern Mexikanischen Wachteln hat. Es sind dieß aber so unbestimmte Charaktere, als daß sie uns über die Art hinlängliche Belehrung geben könnten.

31. Die Wecker-Wachtel, (Noisy Q.)

Tetrao suscitator. L. l. 2. p. 763. No. 52. *f*)
La Caille de Java. Buff. orn. l. p. 251. No. 15.
Le Reveil matin, ou la Caille de Java. Buff. ois. ll. p. 479. *g*)
Coturnix indica Bontii, (Indian Quail of Bontius). Ray Syn. p. 58. No. 7. — Will. orn. p. 171. pl. 29.

Sie hat die Größe einer Turteltaube, und gleicht vollkommen unserer Wachtel, hat aber einen längern Schnabel.

a) Perdix novae Hispaniae. Lath. Ind. orn. ll. p. 653. n. 33. B.
b) Ueberf. VI. S. 136. B.
c) Perdix Coyolcos. Latham Ind. orn. ll. p. 653. n. 34. B.
d) Ueberf. VI. S. 138. B.
e) Le Cacolin. Hist. des Ois. ll. p. 486.
f) Perdix suscitator. Latham Ind. orn. ll. p. 654. n. 35. B.
g) Ueberf. VI. S. 122. B.

Sie ist auf der Insel Java zu Hause und schreyt in Zwischenräumen, wie unsere Wachtel; dieses Geschrey gleicht aber mehr dem, das die Rohrdommeln in den Sümpfen machen, als dem Wachtelschlage. Sie ist leicht zu zähmen, aber so kalter Natur, daß, wenn sie nicht warm gehalten wird, besonders des Nachts, nicht der Sonne ausgesetzt, und Sand unter sie gestreut wird, sie in Gefahr kommt zu sterben. Die Eingebohrnen schätzen sie, und halten sie in den Häusern; denn in den Augenblick, da die Sonne aufgeht, erhebt sie ihr Geschrey, und zwar so laut, daß sie das ganze Haus wach macht; daher man sie als einen Wecker braucht. Sie soll truppweise, wie die Rothhühner, in den Wäldern leben. Man sieht sie oft gezähmt, das Männchen, das Weibchen und die ganze Brut, wo sie dann, wie anderes Hühnervieh, auf den Haushöfen hin- und hergehen *h*). Die Männchen läßt man oft miteinander fechten, wie Kampfhähne.

32. Die Madagaskarische Wachtel. (Madagascar Q.)

Tetrao striatus. L. l. 2. p. 763. No. 53. *i*)
La grande Caille de Madagascar. Sonn. Ind. Vol. II. p. 169. pl. 98.

Diese ist ohngefähr noch einmal so groß als die gemeine Wachtel. Ihr Schnabel ist schwarz; der Augenstern schmutziggelb; der Scheitel, Hinterhals und der Rücken sind bräunlich gelbroth, auf dem Scheitel mit gelblichweißen Strichen gestreift; die Rückenfedern haben auch die nämlichen Streifen, sind aber mit schwarzen Queerbändern durchzogen; an jeder Seite des Kopfs sind zwey weiße Streifen, der eine über den Augen, und dieser steigt den Hals herab; der andere von der Oeffnung des Schnabels an, und läuft fast parallel mit jenem, der Raum darzwischen ist grau; die Kehle schwarz; über der Brust ist die Farbe kastanienbraun; die Brust selbst und der Bauch sind schwarz mit runden, weißen Flecken bezeichnet; die Federn an den Seiten des Bauchs lang und schmal, und verbergen sowohl den Bauch als die Schenkel, sie sind kastanienbraun, mit gelblichweißen Schäften, und an jeder Seite mit einer schwarzen Linie eingefaßt; die kleinern Deckfedern der Flügel hell gelbroth, mit weißen Streifen, und mit unregelmäßigen, schwarzen Linien durchzogen, die andern eben so, aber mit gelblichweißen Linien durchzogen, die kurzen Schwungfedern schwarz mit gelblichen Bändern bezeichnet, und mit gelblichweißen Schäften; der Schwanz schwarz, mit gelblichweißen Streifen durchzogen, und eben solchen Schäften; die Füße hell gelbroth.

Sie ist in Madagaskar zu Hause.

33. Die graukehlige Wachtel. (Grey-throated Q.)

Tetrao griseus. L. l. 2. p. 764. No. 54. *k*)
La Caille brune de Madagascar. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 171.

Von

h) Willughby.
i) Perdix striata. Lath. Ind orn. II. p. 654. n. 36. B.
k) Perdix grisea. Latham Ind. orn. II. p. 654. n. 37. B.

Von der Größe unſerer Wachtel. Ihr Schnabel iſt ſchwarz; der Augenſtern gelb; Scheitel und Hinterhals ſchwarz und gelbroth, der ſchwarzen Federn ſind die meiſten; die Kehle hell ſchmutziggrau; der Vorderhals, die Bruſt und der Bauch eben ſo, mit zwey weißen Bändern an jeder Feder, die mit dem Rande ſtets parallel laufen; der Rücken, der Steiß, die Flügel und der Schwanz hell ſchmutzig grau, mit ſchwarzen Bändern durchzogen; die großen Schwungfedern braun; die Füße ſchwarz.

Ebenfalls aus Madagaskar.

34. Die Coromandelſche Wachtel. (Coromandel Q.)

Tetrao coromandelicus. L. l. 2. p. 764. No. 55. *l*)
La petite Caille de Gingi. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 172.

Sie iſt um ein Drittheil kleiner, als unſere Wachtel. Der Kopf iſt ſchwarz; der Scheitel röthlichgelb, und zwiſchen den Augen ein Streifen von eben dieſer Farbe; die Kehle weiß und durch einen ſchwarzen Streifen begränzt; Vorderhals, Bruſt und Bauch röthlichgelb, ſchwarz geſtreift, und jeder Streifen an den Seiten weiß eingefaßt; von der Kehle bis zum Bauch läuft ein ſchwarzes Zick-zackförmiges Band; der Hinterhals iſt hellgelbroth, mit einem gelblichen Längsſtreifen an jeder Feder, der an den Seiten ſchwarz eingefaßt iſt; der Rücken, der Steiß und die kleinern Deckfedern der Flügel ſind gelbroth kaſtanienbraun, an jeder Feder iſt ein gelblicher Streifen, der wieder mit Linien von der nämlichen Farbe durchzogen iſt, die an jeder Seite ſchwarz eingefaßt ſind; die Schwungfedern ſind braun.

Das Weibchen iſt an den obern Theilen eben ſo, unten aber matter; die Kehle weiß mit ſchwarz eingefaßt; der Vorderhals röthlichgelb, jede Feder weiß geſtreift und mit zwey runden, ſchwarzen Flecken an den Seiten bezeichnet; der Bauch eben ſo, ſtatt der Flecken aber mit ſchwarzen Bändern durchzogen.

Sie werden an der Küſte von Coromandel angetroffen.

35. Die Neuguineiſche Wachtel. (New Guinea Q.)

Tetrao novae Guineae. L. l. 2. p. 764. No. 56. *m*)
La Caille de la Nouvelle Guinée. Sonn. Voy. Ind. Vol. II. p. 170. pl. 105.

Sie iſt halb ſo groß als die gemeine Wachtel. Ihre Hauptfarbe iſt braun, am lebhafteſten am Kopf und Bauch; die Deckfedern der Flügel ſind ſchmutziggelb gerändet; die Schwungfedern ſchwarz; Augenſtern und Füße graulich.

Sie iſt in Neuguinea zu Hauſe.

36. Die

l) Perdix coromandelica. Latham Ind. orn. II. p. 624. n. 38. B.

m) Perdix novae Guineae. Latham Ind. II. p. 655. n. 39. B.

36. Die Manillische Wachtel. (Manille Q.)

Tetrao manillensis. L. I. 2. p. 764. No. 57. *n*)
La petite Caille de l'Isle de Luçon. Sonn. Voy. p. 54. pl. 24. *o*)

Sie hat die Größe eines Haussperlings, und ist nur vier Zoll lang. Ihr Schnabel ist dunkelfarbig; Scheitel und Hintertopf sind schwarz; Rücken und Flügel eben so, mit länglichen, grauen Streifen an den letzten; die Kehle weiß; die Seiten gelbroth überzogen; die Brust graulich, nach der Queere schwarz gefleckt; der Bauch gelb, mit schwarzen Bändern; die Füße dunkelfarbig.

Sie ist auf der Insel Manilla zu Hause.

(36.) a. Das Rebhuhn von Chittygong. (Chittygong P.)

Es hat die Größe des Fasans, und ist siebenzehn Zoll lang. Sein Schnabel ist hellaschfarben: die Augen umgiebt ein breiter, eyrunder, kahler, rother Raum, der an den Nasenlöchern anhebt, und sich hinten in einer Spitze endigt; die Nasenlöcher liegen in einer Art von Wachshaut; Kopf und Hals sind weiß, mit schwarzen Strichen bezeichnet; an den Ohren ist ein brauner Fleck; Rücken und Flügel sind äußerst schön mit schwarzen und hellbraunen Streifen und Linien bezeichnet, und haben weiße Ränder und Spitzen; die Brust ist schwarz, mit halbmondförmigen weißen Linien bezeichnet; der Bauch hellröthlichbraun, mit weißen Rändern, und in der Mitte unregelmäßig mit einer dunklen Farbe bezeichnet; der Schwanz weiß und hellbraun gesprenkelt, und mit schwarzen und weißen Streifen, oder zickzackförmigen Linien durchzogen; die Füße haben die Farbe des Schnabels, und hinten keinen Sporn.

Dieser Vogel ist in Indien zu Hause, und wird daselbst von Unkundigen für das Weibchen des Fasans mit dem Federstrauße *q*) gehalten, aber fälschlich, denn er kommt aus einer verschiedenen Gegend dieses Landes. Er ist gemein in den niedern Theilen von Bengalen, und in der Provinz Chittygong. — Herr Middleton. — Den nämlichen Vogel finde ich auch unter den Gemälden der Lady Impey. Es ist ein äußerst schöner Vogel, und, wenn man eine Vermuthung wagen wollte, so möchte sich vielleicht mit der Zeit zeigen, daß er das Weibchen des Zeylonischen Rebhuhns *r*) sey, dessen wahre Größe bisher noch nicht bestimmt worden ist.

(37.) b. Das Arragonische Rebhuhn. (Arragonian P.)

Tetrao pedibus antice hirsutis etc. Faun. Arragon. p. 81. No. 3. pl. f. 2. *s*)

Es

n) Perdix manillensis. Latham Ind orn. II. p. 655. n. 40. B.
o) Uebers von Büffons Vögeln VI. S. 127. B.
p) Diese und die zwey nächsten Arten, (36) a — c sind in dem Suppl. S. 222. — 224. hinzugekommen.
q) s. oben S. 724 Nr 11.
r) s. oben S. 718. Nr. 3.
s) Perdix arragonica. Latham Ind. orn. II. p. 645. n. 7. B.

Es ist größer als das gemeine Rebhuhn. Sein Schnabel ist schwarz; der Kopf aschfarben; die Kehle schwarz; der Hals ringsum rostigroth; die Brust gelbroth, mit einem schwarzen Band durchzogen; der Rücken braun und rostigroth geschäckt; Bauch, Schenkel und Schwungfedern schwarz; die Deckfedern der Flügel rostigroth, unter ihnen ist die Farbe weiß; der Schwanz keilförmig, und aschbraun, seine äußern Federn mit weißen Spitzen; der After weiß, mit rostigrothen Flecken; die Füße aschfarben, an der vordern Seite haarig, und hinten mit einem Sporn versehen.

Das Weibchen unterscheidet sich dadurch, daß es eine graue Brust, und ein schmäleres Band an derselben hat, als das Männchen.

Sie sind in der Gegend von Saragossa in Arragonien zu Hause, machen ihr Nest auf die Erde, legen vier oder fünf ziegelfarbige, braungefleckte Eyer, und sind unter dem Namen: Churra bekannt.

38. (36. c.) Die Wachtel aus Hudsonsbay. (Hudsonian Q.) *)

Lev. Mus.

Dieß ist die kleinste ihrer Familie, und nur fünf Zoll lang. Ihr Schnabel ist dunkelbraun; die Hauptfarbe des Gefieders hell bräunlich-milchbläulich, am Hinterhalse und über den Schenkeln mit unregelmäßigen weißen Flecken bezeichnet; Rücken, Flügel und Schwanz sind sparsam mit weißen Linien durchzogen, die an ihren untern Theile schwarz eingefaßt sind; die untern Theile des Körpers sind heller, als die obern, und ungefleckt; die Füße dunkelbraun.

Ich habe ein Exemplar dieser Art von der Hudson's-Bay erhalten, woher auch, wie ich höre, das im Leverschen Museum gekommen ist.

Zusätze.

39. Das Asiatische Rebhuhn.

Perdix asiatica. Latham Ind. orn. II. p. 649. n. 20.

Es ist sechs Zoll lang. Der Schnabel ist kurz, stumpf, dunkelbraun, der Unterkiefer blaß; der Kopf mit der Kehle gelbbraun; der Oberleib gelbroth, hellgelb und dunkelbraun gefleckt, auch hin und wieder schwarz gemischt; der Unterleib weißlich, jede Feder mit zwey schwarzen Bändern, doch nehmen die Farben nach dem Steiß zu an Lebhaftigkeit ab; die Schwungfedern röthlichgelb, dunkelbraun gefleckt; die Füße roth, hinten in der Mitte mit einem stumpfen Sporn versehen.

Sein Vaterland ist Indien, wo es in der Landschaft der Mahratten sich aufhält.

40. Das

*) Perdix hudsonica. Latham Ind. orn. II. p. 655. n. 41. B.

40. Das Kackerlick-Rebhuhn.

Tetrao Kakelik. L. l. 2. p. 762. n. 47. — Falk. III. p. 390.
Perdix Kakelik. Latham Ind. orn. 2. 655. No. 42.

Es hat die Größe einer Kropftaube. Schnabel, Augenlieder und Füße sind scharlachroth; die Brust ist aschgrau; der Rücken weiß und aschgrau gewellt.

Es wohnt heerdenweis in der Bucharey, Chiwa und Songoria. Seine Stimme ist: Kackerlick.

41. Das Caspische Rebhuhn.

Tetrao Caspius. L. l. 2. p. 772. No. 48. — S. G. Gmelin. It. IV. 67. t. 10.
Perdix Caspia. Lath. Ind. orn. II. p. 655. No. 43.

Es ist aschgrau, kaffebraun gefleckt; Nasen, Augenkreise und Schläfe sind kahl, und die Füße gelb.

Man trifft es bey Astrabat in Persien an.

42. Die Cambäyische Wachtel.

Perdix cambaiensis. Latham Ind. orn. II. p. 655. No. 44.
Mus. Brit.

Sie ist sechs Zoll lang. Der Schnabel ist stark, kurz und blaß; der ganze Körper röthlichgelb, unten bläßer, alle Federn mit dunkeln Farben genebelt; die Füße sind gelb; die hintere Zehe ist stumpf.

Sie wohnt in Indien, im Königreich Guzurat. B.

---

* * Mit drey Zehen.

43. (37.) Die Wachtel von Gibraltar. (Gibraltar Q.)

Tetrao Gibraltaricus. L. I. 2. p. 766. No. 58. *a*)
Lev. Mus.

Ihre Länge ist siebenthalb Zoll. Der Schnabel ist schwarz; der Scheitel kastanienbraun, weiß eingefaßt; der Rücken eben so mit schwarzen Streifen; die Deckfedern der Flügel rostigbraun, in der Mitte jeder Feder ein schwarzer, weiß eingefaßter Fleck, und mit weißen Endspitzen; Kinn und Kehle schwarz und schmutzigweiß gestreift; die Brust weiß, mit einem schwarzen

a) Perdix gibraltaria. Latham Ind. orn. II. p. 656. n. 45. B.

zen Halbenmonde an jeder Feder, außer längs der Mitte herab, die hell roſtfarben iſt, und hier iſt auch eine Miſchung dieſer letzten Farbe mit der ſchwarzen; Bauch, Seiten und After ſind heller, ins Gelbe ziehend; Schwungfedern und Schwanz dunkelfarbig, letzter kurz, ſchwarz und gelbrothbraun geſtreift, und weiß eingefaßt; die Füße blaß; nur drey Zehen, die alle vorwärts ſtehn.

In der Sammlung des Sire **A. Lever**, der ſie aus Gibraltar bekommen hat.

44. (38.) Die Andaluſiſche Wachtel. (Andalusian Q.)

(ſ. die zweyte Figur der acht und ſechzigſten Kupfertafel.)

Tetrao andalusicus. L. I. 2. p. 766. No. 59. *v*)

Die Hauptfarbe iſt ein ſchönes Gelbroth, und die Federn ſind unregelmäßig ſchwarz bezeichnet und geſtreift; die Seiten des Halſes ſind ſchwarz gefleckt; die untern Theile, von Kinn, bis zum After hell gelbröthlichweiß, mit einem gelben Anſtrich am Vorderhals und Bruſt; die Schwungfedern dunkelfarbig; Schnabel und Füße fleiſchfarben, letztere haben nur drey Zehen, die alle vorwärts ſtehn.

Sie iſt in Andaluſien zu Hauſe *w*)

45. (39.) Die ſchwarzhälſige Wachtel. (Black-necked Q.)

Tetrao nigricollis. L. I. 2. p. 767. No. 60. *x*)
La Caille de Madagaſkar. Briss. orn. 1. p. 252. No. 16. pl. 24. f. 2. — Buff. oiſ. II p. 479. *y*). Pl. enlum. 171.

Sie hat die Größe unſrer Wachtel, und iſt ſiebenthalb Zoll lang. Ihr Schnabel iſt aſchgrau; die obern Theile des Halſes ſind ſchwarz und weiß, mit einer Miſchung von Gelbrothem; die obern Theile des Halſes und Körpers ſind aſchfarben, gelbroth und ſchwarz geſchäckt, die letzte Haube in Streifen, die an einigen Theilen breiter ſind, und Flecken bilden; die Deckfedern der Flügel ſind unregelmäßig gelbroth und aſchfarben melirt; außerdem haben ſie noch unregelmäßige, gelblichweiße Flecken, die größtentheils mit einem weißen Streife begleitet ſind; die Schulterfedern ſind zum Theil eben ſo, außer daß an einigen ein weißlicher Streifen iſt; Kinn und Vorderhals ſind ſchwarz, das ſich in eine Spitze an der Bruſt endigt; die Bruſt ſelbſt, die Seiten des Körpers, der Bauch, die Schenkel und der After ſind aſchgrau; die Seiten der Bruſt gelbroth; die untern Deckfedern des Schwanzes ſchwarz geſtreift; die Schwungfedern braun,

v) Perdix andalusica. Latham Ind. orn. II. p. 656. n. 46. **B.**

w) Herr Pennant. Wahrſcheinlich einerley Vogel mit Shaw's dreyzehiger Wachtel, die, nach ihm, ein Zugvogel iſt, und im Laufen gefangen werden kann; denn wenn ſie einen oder zwey Sprünge gemacht hat, ſo iſt ſie ſo ermüdet, daß man ſie mit einem Stocke todt ſchlagen kann. Shaw's Trav. p. 300.

x) Perdix nigricollis. Latham Ind. orn. II. p. 658. n. 47. **B.**

y) Ueberſ. VI. S. 120. **B.**

braun, die drey oder vier äußern weißgerändet; der Schwanz wie die obern Theile des Körpers; die Füße aschgrau; die Hinterzehe fehlt.

Sie ist in Madagaskar zu Hause.

46. (40) Die Luçonische Wachtel. (Luzonian Q.)

Tetrao luzoniensis. L. I. 2. p. 767. No. 61. z)
Caille de l'Isle de Luçon. Sonn. Voy. p. 54. pl. 23. zz)

Diese ist ein Drittheil kleiner, als die Europäische Wachtel. Ihr Schnabel ist graulich; Kopf, Hinterhals und Kehle sind schwarz und weiß gemischt, an erstern sehr unregelmäßig; Vorderhals und Brust kastanienroth; der Bauch hellgelb; der Rücken schwärzlichgrau; die großen Schwungfedern grau, die kürzern an den Enden gelb, und in der Mitte ein minder schwarzer, zur Hälfte kastanienroth eingefaßter Fleck; der Schwanz kurz; die Füße hellgrau, nur drey Zehen, die alle vorwärts stehn.

Sie ist auf der Insel Manilla zu Hause.

Fünf und funfzigste Gattung. Trompetenvogel.

Der Schnabel ist mäßig lang, cylindrisch kegelförmig; die obere Kinnlade erhaben und länger. Die Nasenlöcher sind eyförmig, tiefliegend (sunk) und offen. Die Zunge ist knorplig, platt, und am Ende gefranzt. Die Füße sind bis etwas über die Kniee nackt *a*). Drey Zehen stehen vorwärts und eine rückwärts; diese letzte ist klein, mit einer runden Erhöhung unter ihr, die nur ein wenig von jedem absteht.

1. Der goldbrüstige Trompetenvogel. (Gold-breasted Trumpeter.)

(s. die neun und sechzigste Kupfertafel.)

Psophia crepitans L. I. 2. p. 720. No. 1. *b*)
Grus Psophia. Pallas Spicilea. IV. tab. 1.
Le Faisan des Antilles. Briss. orn. 1. p. 269.

L'Aga-

z) Perdix luconiensis. Latham Ind. orn. II. p. 656. n. 48. B.

zz) Uebers. von Büffons Vögeln. VI. S. 126. B.

a) Im Linneischen System wird er deshalb unter die Sumpfvögel gerechnet; ich glaube aber selbst, daß er hier an einem schicklichern Platze steht B.

b) Latham Ind. orn. II. p. 657. n. 1. B.

Der Goldbrüstige Trompetenvogel.
Psophia crepitans. Lin.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

L'Agami. Buff. ois. IV. p. 487. pl. 23. *c*) -- Pl. enlum. 169.
Le Caracara *d*). Buff. ois. II. p. 299. ? *e*) -- Hist. Antill. vol. II. ch. 5. §. 8.
L'Oiſeau Trompete. Fermin Surin. vol. p. 162. *f*)
Lev. Mus.

Es hat die Größe eines großen Haushuhns, aber einen langen Hals, und ſteht ſehr hoch auf den Beinen; ſeine Länge iſt zwanzig Zoll. Die Hauptfarbe ſeines Gefieders iſt ſchwarz; die Kopffedern ſind ſehr kurz, und pflaumenartig; der Schnabel iſt matt gelblichgrün, mit einer dunkelfarbigen Spitze (bey einigen mit einer ſchwarzen); die Naſenlöcher ſind länglich, und offen; der Augenſtern gelbbraun; die Augenkreiſe etwas kahl, und röthlich; die Federn am Vorderhalſe und am obern Theil der Bruſt ſehr glänzend goldgrün, mit einem blauen Widerſchein bey gewiſſen Lichte; die Federn zwiſchen den Schultern roſtigroth, ſo wie ſie herabwärts kommen, ins hellaſchfarbene ſpielend, locker und ſeidenartig; die Schulterfedern ſehr lang, und hängen über den Schwanz herüber, der ſehr kurz iſt, und aus zwölf ſchwarzen Federn beſteht; die Füße ſind lang und grünlich; die Klauen ſchwarz.

Bey einigen Vögeln variirt die Farbe ein wenig, indem die Flügel eine Miſchung von Weiße haben.

Dieſer ſonderbare Vogel iſt in verſchiedenen Ländern von Südamerika, in Braſilien, Guiana, Surinam u. ſ. w. zu Hauſe; in großer Menge aber findet er ſich im Amazonen-Lande. Seine Eyer ſind etwas größer als Hühnereyer, und von blaugrüner Farbe. Er ſoll ein ſehr kirrer Vogel ſeyn, der oft der Perſon nachläuft, die ihn beſorgt. Er iſt der Stimme wegen merkwürdig, die er von ſich gibt, und über deren Urſprung die Schriftſteller uneinig ſind; einige behaupten, ſie käme aus dem After *g*), andere, aus dem Bauche. Anfangs ſcheint der Schall aus dem Schnabel zu kommen, er wird zwey oder dreymal wiederhohlt, und iſt dem Worte: Scherkt, nicht unähnlich. Dieſer Schall wird von einem Geräuſche begleitet, das von innen heraus kömmt, und dem oft wiederholten Girren einer Taube ähnelt. Der Bauch ſcheint während dieſes Geräuſches ſehr in Bewegung zu ſeyn. Zuweilen läßt es der Vogel hören, ohne irgend einen vorhergegangenen Schall aus dem Schnabel *h*). — Er frißt gerne Brod, Fleiſch und kleine Fiſche; läuft ſchnell, mit weiten Schritten, die von den ausgebreiteten Flügeln unterſtützt werden, und ſchläft auf einem Fuße ſtehend, den Kopf zwiſchen den Schultern geſteckt, wie der Storch.

c) Ueberſ. XIII. S. 203. B.
d) Ueberſ. V. S. 309. Es iſt bis zur größten Wahrſcheinlichkeit gewiß, daß hier von Büffon nach Pater Du Tertre unſer Vogel beſchrieben wird. Er ſelbſt ſagt dieß in der Geſchichte ſeines Agami. B.
e) Ein von dieſem verſchiedener Vogel, unter dem Namen: Caracara, iſt im I. Bd. 1. Th. S. 58. No. 47. dieſes Werks erwähnt worden.
f) Vergl. auch meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 442. B.
g) Rostro mussitanti respondet per anum. Lin.
h) Wer mehr über dieſen Gegenſtand wiſſen will, den können wir auf die Ueberſetzung von Büffons Vögeln a. a. O. verweiſen, wo Hr. Profeſſor Otto, nach ſeiner ihn eigenen Genauigkeit, alles hieher gehörige geſammelt hat. B.

Ich vermuthe sehr, daß du Tertre's oben citirter Vogel, der nämlichr ist; er ist nach ihm, so groß als ein Capaun, mit einem Rabenschnabel; Hals und Beine sind länger als beym Hahn; die Federn des Halses und der Brust blau und glänzend, wie beym Pfau; der Rücken graubraun; Flügel und Schwanz schwarz; letzter sehr kurz.

Dieser Vogel soll auf den Curibäischen Inseln zu Hause seyn, wo er Fasan genannt wird. Er wird oft zahm gemacht, und unter andern Federvieh gehalten; er ist zänkisch und siegt mehrentheils; er tödet oft nicht bloß Haushühner, sondern auch Truthähne; und verfolgt die Einwohner, besonders die Neger, die er in die Füße pickt, wo es nicht selten Blut giebt. Sein Fleisch wird für eben so gut gehalten als Fasanenfleisch.

2. *i*) Der gewellte Trompetenvogel. (Undulated T.)

Psophia undulata L. I. 2. p. 721. No. 2. *k*) — — Jacquins Beytr. p. 24. No. 18. tab. 9.

Er hat die Größe einer Gans. Sein Schnabel ist dunkelblau; die Hauptfarbe des Gefieders am Kopf und an den obern Theilen des Körpers, einigermaßen der des großen Trappen ähnlich, nämlich hellröthlichbraun, sehr schön schwarz gewellt; die Federn am Hinterkopf lang, und bilden einen herabhängenden Federbusch; unter den Ohren entspringt ein schwarzer Saum, der an beyden Seiten des Halses herabläuft, im herabsteigen weiter wird, und sich am untern und vordern Theil des Halses vereinigt, wo die Federn sehr lang werden, und los herabhängen, einigermaßen, wie die Brustfedern der Numidischen Jungfer *l*); und diese ausgenommen, sind alle untern Theile weiß; die Füße sind an Farbe dem Schnabel nicht unähnlich.

Diese Art ist in Afrika zu Hause. Das Exemplar, von dem obige Beschreibung genommen ist, wurde von Tripoli gebracht.

i) Aus dem Suppl. S. 225.
k) Latham Ind. orn. II. p. 657. n. 2. B.
l) Demoiselle Ardea Virgo. Lin.

Sechs und funfzigste Gattung. Trappe.

Der Schnabel ist am Oberkiefer gewölbt. Die Nasenlöcher sind offen, und eyrund. Die Zunge ist an beyden Seiten, am Ende etwas gespalten (sloping), und zugespitzt. Die Beine sind lang, und über den Knieen etwas nackt. Die Füße haben nur drey Zehen und eine Hinterzehe (Lauffüße).

Sie sind bloß in der alten Welt zu Hause; keiner in der neuen.

1. **Der große Trappe.** (Great Bustard.)

Otis Torda L. I. 2. p. 722. No. 1. -- *m*) Faun. Suec. No. 196. -- Scop. ann. I. No. 159. — *n*) Kram. elench. p. 354. No. 1. -- Frisch. tab. 106. — Georgi Reise p. 172.

L'Outarde. Briss. orn. V. p. 19. — Buff. ois. II. p. 1. pl. 1. — *o*) Pl. enlum. 245.

Bustard. Raii Syn. p. 58. A. 1. — Will. orn. p. 178. pl. 32. Edw. pl. 79. 80. — *p*) Albin III. pl. 38. 39. — Br. Zool. I. No. 98. pl. 44. -- *q*) Arct. Zool. II. n. 186. *r*)

Br. Mus. Lev. Mus.

Dieß ist der größte Landvogel unserer Insel, denn das Männchen wiegt fünf und zwanzig Pfund, und oft noch mehr; seine Länge ist beynahe vier, und seine Breite neun Fuß. Kopf und Hals sind aschfarben; der Rücken hat schwarze und lebhaft rostfarbene Queerstreifen; die Schwungfedern sind schwarz; der Bruch ist weiß; der Schwanz roth und schwarz gestreift, und besteht aus zwanzig Federn; die Füße sind dunkelfarbig.

Das Weibchen ist ohngefähr halb so groß als das Männchen; der Scheitel dunkelorangenfarben, mit schwarzen Queerstrichen; der übrige Kopf braun; der untere und vordere Theil des Halses aschfarben; außerdem ist es dem Männchen gleich; aber die Farbe des Rückens und der Flügel ist matter.

Das Männchen unterscheidet sich auch dadurch vom Weibchen, daß es einen ohngefähr fünf Zoll langen Federbüschel an jeder Seite der untern Kinnlade hat; ausserdem ist es mit einem Beutel (pouch) versehen, der sieben Quart Wasser hält, und am Vorderhalse angebracht ist; der Eingang in derselben ist unmittelbar unter der Zunge. Dieser dient ihm, wenn

m) Latham Ind. orn. II. p. 658. n. 1. B.
n) Uebers. von Günther S. 127. Nr. 189. B.
o) Uebers. VI. S. 5. B.
p) Seligmanns Vögel III. Taf 41. 43. B.
q) Uebers. von Murr. S. 91. Taf. 43. B.
r) Uebers. II. S. 299. Nr. 102. Vergl. auch meine N. G. Deutschlands III. S. 278. Nr. 1. N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 454. Nr. 1. Meyers illum. Thiere I. S 19. Taf. 18. 19. B.

wenn das Weibchen über dem Neste sitzt, das gewöhnlich in einer Entfernung vom Wasser geschieht, oder auch die Jungen, bis sie sich selbst vom Neste wegbegeben können, zu tränken [s]. Einen fernern Nutzen desselben hat man zu Marocco beobachtet, wo man die Habichte nach den Trappen fliegen läßt; denn beym Angriffe des Habichts, hat man bemerkt, daß der Trappe sich dieses Wasserbeutels bedient, um es gegen seinen Gegner auszuspritzen, der nicht selten dadurch in die Flucht geschlagen wird [t].

Der Trappe ist, wie ich glaube, auf der alten Welt eingeschränkt. Ich höre nicht weiter von ihm, als bis Griechenland und Syrien gegen Süden, und bis Schweden und Rußland gegen Norden. In einigen dazwischen liegenden Ländern ist er in großer Menge, in andern äußerst sparsam, besonders in gutbewohnten Ländern [u]; denn dieser Vogel vermeidet aus Furchtsamkeit alle Gemeinschaft mit Menschen, um so mehr, da der aller elendeste Hund ganze Heerden Trappen davon jagen kann. In England trifft man sie noch hier und da in Truppen von funfzigen, oder mehrern an; sie halten sich in den offnen Gegenden von Süden und Osten auf, von Dorsetshire bis in die offenen Striche (Walds) in Gonkshire; und auf der Ebne von Salisbury, in Wiltshire, sieht man sie oft. In Schottland sind sie vermuthlich ausgerottet [v]. Sie sind sehr langsam im Auffliegen, laufen aber so schnell, daß sie nur von Windspielen (Greyhounds) eingeholt werden können. Man sagt, daß diese schnellen Läufer sie eingeholt haben, ehe sie sich noch vom Boden erheben konnten [w]. In England sind sie am zahlreichsten im Herbst; in Frankreich sieht man sie aber auch im Frühjahr. Sie sind auch in einigen Gegenden von Deutschland gemein [x]; daher man glauben sollte, sie zögen von einem Lande in das andere [y]. Sie sind gemein auf allen südlichen Ebenen von Rußland, und in den Tatarischen Wüsten; und leben einzeln, ausser zur Wanderzeit, wo sie sich in kleine Flügen vereinigen [z].

Dieser Vogel baut kein Nest, sondern legt seine Eyer auf die Erde, in die er ein Loch kratzt, in irgend einem trockenen Kornfelde [a]; es sind ihrer zwey, so groß wie Gänseeyer, hellolivenbraun, mit Flecken von dunklerer Farbe. Das Weibchen verläßt das Nest, wenn die Eyer in seiner Abwesenheit berührt worden sind. Ihr Futter sind Körner und verschiedene Pflan-

s) Dieß ist gegen alle Erfahrung. In Thüringen giebt es eine sehr große Menge Trappen, da weiß man aber, daß sich weder die Weibchen noch Junge tränken lassen. Erstere sind auch ohnehin zur Brütezeit allein (denn die großen Trappen leben in Polygamie) und letztere laufen sogleich aus dem Neste, wenn sie ausgekrochen sind. B.

t) Barringt. Miscell. p. 553.

u) Dieß ist der Erfahrung entgegen. Gerade in den bewohntesten und fruchtbarsten Gegenden Sachsens und besonders Thüringens trifft man sie in Menge an. B.

v) Br. Zool. — Flor Scot.

w) Man sagt dieß zwar allgemein; allein es ist dieß doch ein höchst seltner Fall; man muß sich den Wind entgegen ganz nahe haben an sie schleichen können. Der Anlauf, den sie zum Fliegen nehmen müssen, ist so groß nicht, als man gewöhnlich vorgiebt. B.

x) In Deutschland streichen sie nur aus einer Flur in die andere; vermeiden aber die Berge. B.

y) Die Trappen sind in Ungarn so gemein, daß man ihrer zuweilen vier bis fünf hundert in einem Fluge sieht. Keyslers Trav. IV. p. 176. — Kramer.

z) Decouv. Russ.

a) Am liebsten ins Haferfeld. B.

Pflanzenarten; doch freſſen ſie auch viele Würmer, die im Sommer vor Sonnenuntergang aus der Erde hervorkriechen *b*).

2. Der kleine Trappe. (Little B.)

Otis Tetrax L. I. 2. p. 723. No. 5. — *c*) Faun. Suec. No. 196. — Müller Zool. p. 27. No. 220 — Faun. Arrag. p. 79.
La petite Outarde, ou Canne-petiere. Briss. orn, V. p. 24. pl. 2. f. 1. 2. — Buff. oiſ. II. p 40 — *d*) Pl. enlum. 25. (das Männchen). 10. (das Weibchen.)
Anas campestris. Rai Syn. p. 59. No. 2. — — Will. orn. p. 179. pl. 32.
French Field Duck. Albin III. pl. 41.
Little Bustard. Edw. pl. 251. — Br. Zool. I. No. 99. — Phil. Trans. Vol. XLVIII. p. 502. pl. 16 — Arct. Zool. II. p. 321. A. *f*)
Lev. Mus.

Er hat die Größe eines Faſans, und iſt ſiebenzehn Zoll lang. Sein Schnabel iſt graubraun; der Scheitel iſt ſchwarz, mit gelbrothen Streifen; die Seiten des Kopfs, das Kinn und die Kehle ſind gelbröthlichweiß, mit kleinen, ſchwärzlichen Flecken bezeichnet; der ganze Hals ſchwarz, mit zwey unregelmäßigen weißen Bändern umgeben, das eine am obern Theile (top), das andere am untern Theile (bottom); Rücken und Flügel gelbroth, mit braunen Sprenkeln, mit zarten, unregelmäßigen ſchwarzen Linien durchzogen, und mit einigen perpendiculären Streifen von der letzten Farbe untermiſcht; die untern Theile des Körpers und die äußern Ränder der Flügel weiß; der Schwanz beſteht aus achtzehn Federn, die vier mittlern ſind lohgelb, mit ſchwärzlichen Streifen, die andern weiß, mit unregelmäßigen, ſchmalen, ſchwärzlichen Querbändern bezeichnet; die Füße grau.

Das Weibchen unterſcheidet ſich dadurch, daß es keinen ſchwarzen Hals hat; dieſer iſt ſtatt deſſen, ſo ziemlich von einerley Farbe mit den obern Theilen, die einigermaßen der des Männchens gleichen, die Linien daran ſind aber nicht ſo zart, und ſie ſind ſtärker mit unregelmäßigen Längsflecken bedeckt; die Bruſt iſt gelbröthlichweiß, mit ſchwärzlichen Streifen; die übrigen untern Theile ſind weiß; die Deckfedern des Schwanzes aber bey beyden Geſchlechtern mit ſchwärzlichen Strichen durchzogen *e*).

Der in der Brittiſchen Zoologie beſchriebene Vogel, ſcheint mir etwas verſchieden zu ſeyn, weil die Bruſt und die äußern Schwanzfedern einfärbig weiß ſind.

Dieſer

b) Br. Zool.
c) Latham Ind. orn. II. p. 659. n. 3. **B.**
d) Ueberſ. VI. S. 48. **B.**
e) Seligmanns Vögel VII. Taf. 41. **B.**
f) Ueberſ. II. S. 299 A. Vergl. meine N. G. Deutſchlands III S. 288. Nr. 2. Taf XVII. das Weibchen N. G des In- und Auslans des I. 1. S. 455. Nr. 2. **B.**
g) Wer (ſagt Willughby, nach Belon), wer eine vollkommene Beſchreibung von dieſem Vogel haben will, der denke ſich eine Wachtel von der Größe eines Faſans, aber ſehr ſtark gefleckt; denn gerade ſo iſt die Feld-Ente (Field-Duck.)

Dieser Vogel ist in vielen Ländern Europens zu Hause, aber nur zwey oder dreymal in England angetroffen worden, und alle Exemplare waren Weibchen; o schon man sich dieses, daß die meisten weiblichen Geschlechts waren, daraus erklären kann [h]) daß er in Polygamie lebt [i]). Die Männchen sollen sehr hitzig miteinander fechten, jeder, um Meister von einem gewissen Platze zu bleiben. Er ist häufig in Frankreich; und wird auch in andern Ländern gesehen, obschon selten. Linne' erwähnt seiner in seinem Verzeichniße Schwedischer Vögel [k]), sagt aber, er sey nicht gemein.

Das Weibchen legt seine Eyer im Junius, drey bis fünfe an der Zahl, und von glänzend grüner Farbe. Die Jungen folgen ihr, sobald sie ausgekrochen sind, wie junge Hühnchen, und fahren bey dem geringsten Geräusche zusammen, und verbergen sich (squat). In der Mitte des Augusts sind sie flücke.

Es ist dieß ein scheuer Vogel, wie der vorige, und dabey listig. Wenn er aufgestört wird, so fliegt er auf zwey oder dreyhundert Schritte, nicht hoch von Boden, und dann läuft er geschwinder, als ihn ein Mensch zu Fuße folgen kann [l]) Er soll von allen Arten Körnern, Ameisen, Käfern und grünen Getreide leben. In Frankreich fängt man sie häufig in Netzen, wie die Rebhühner, aber auch mit dem Habicht. Ihr Fleisch ist schwärzlich, wird aber dessen ungeachtet geschätzt, weil es von ausgesuchten (high) Geschmack ist. Auch ihre Eyer werden für eine Delikatesse gehalten.

Diese [m]) Art soll in Spanien sowohl als in Frankreich nicht selten seyn, und ihr Fleisch wird von einigen an Geschmack dem Hasenfleisch gleich geschätzt. Herr Tunstall hatte einen solchen Vogel in seinem Cabinet, der in Sussex geschossen wurde, und, wie er mir sagte, der Zergliederung zu Folge, ein Männchen war, obschon das Schwarze am Hals, das Charakteristische dieses Geschlechts fehlte, und er auch vor der Zergliederung für ein Weibchen gehalten wurde. Er ist sehr häufig in den südlichen und westlichen Ebenen von Rußland, und wandert in kleinen Flügen. Man findet ihn noch eine gute Strecke in den Tatarischen Wüsten, aber nicht in Sibirien [n]).

3. Der Arabische Trappe. (Arabian B.)

Otis arabs L. I. 2. p. 723 No. 2. o)
L'Outarde d'Arabie. Briss. orn. V. p. 30. No. 3.

Le

h) Ein Männchen ist hinlänglich für viele Weibchen. Salerne.

i) Da die Männchen im ersten Jahre, besonders ehe sie sich gemausert haben, noch wie die Weibchen aussehen, wie dieß bey den Hausvögeln, ja fast bey allen Vögeln der Fall ist, so ist leicht zu begreifen, warum man lauter Weibchen zu erhalten glaubt. B.

k) Dieß wird in der Hist. de Ois. geläugnet. Aber Büffon hätte die letzte Ausgabe der Schwed. Faune eben sowohl lesen können, als die erste.

l) Diese Verschlagenheit hat in Frankreich ein Sprichwort veranlaßt, daß nämlich ein solcher Mensch „die Lande nte spielt.

m) Zus. a. d. Suppl. S. 226.

n) Arct. Zool.

o) Latham Ind. orn. II. p. 659. n. 4. B.

Le Lohong, ou l'Outarde huppée d'Arabie. Buff, ois II. p. 52. *p*)
Le Paon ſauvage de l'Jsle de Luçon. Sonn. Voy. p. 85. pl. 49.
Arabian Bustard. Edw. pl. 12. *q*)

Er hat die Größe des **großen Trappen** (Nr. 1.); Schnabel, Hals und Beine aber ſind länger. Der Schnabel iſt blaß hornfarben; der Augenſtern mattbraun; der Hinterkopf mit einem Federbuſch geziert, und ſchwarz; die Stirn weißlich; an jeder Seite des Kopfs iſt ein ſchwarzes Zeichen, das ſich hinten in den Federbuſch verliert; der übrige Kopf, der Hals und die obern Theile des Körpers ſind gelbroth, mit Schwarz melirt, das ihm das Anſehen der Zeichnung eines **Auerhuhns** giebt; Kehle und Vorderhals ſind aſchfarben, mit braunen Strichen durchzogen; die Bruſt und die untern Theile weiß; die großen Schwungfedern ſchwarz, die kürzern ſchwarz und weiß, in Flecken; die zunächſt am Körper ſtehenden gelbroth, mit ſchwärzlichen Streifen durchzogen; die zwey mittlern Schwanzfedern von letzter Farbe; die andern weiß, ein wenig geſprenkelt, und mit einem ſchwarzen Band durchzogen; die Füße hellbraun.

Er findet ſich im **glücklichen Arabien.** Edward's ſah zu **London** einen lebendigen, der aus **Mocha** kam, wo er unter dem Namen: **Lohong** bekannt iſt.

Dieß iſt ohne Zweifel **Le Maire** *r*) und **Adanſon's fliegender Strauß**, und nicht der nächſtfolgende, wie **Büffon** *s*) vermuthet. Der lange Hals, der Federbuſch, und die Größe, alles ſpricht laut dafür, daß es der folgende nicht ſeyn kann, den **Linne'** mit ſeiner gewöhnlichen Scharfſicht und Kürze beſchrieben hat, und der kaum ein Drittheil der Größe des obigen hat.

Seine *t*) Länge iſt drey Fuß. Sein Schnabel iſt lang, ſpitzig, gerade, und am Ende ein wenig erweitert (enlarged), von Farbe dunkelſchwarz; Kopf, Hals und Bruſt ſind lichtgrau, mit halbzirkelförmigen, ſchwarzen Strichen bezeichnet; am Hinterkopf iſt ein langer Federbüſchel, der ſich in eine Spitze endigt, und den der Vogel horizontal trägt; die obern Federn dieſes Buſches ſind ſchwarz; die untern grau, mit ſchwarzen Bändern; Rücken, Flügel und Schwanz ſind braun, die Afterflügel weiß, mit grauen Rändern; der Bauch weiß; nur drey Zehen, die alle vorwärts ſtehn, und bis ans erſte Gelenk verbunden ſind.

Dieſer Vogel iſt auf allen **Philippiniſchen Inſeln** und auf dem **Vorgebirge der guten Hoffnung** zu Hauſe. Die Einwohner nennen ihn **Pfau**; aus welchem Grunde aber, läßt ſich nicht wohl beſtimmen, denn weder ſein Betragen noch ſeine Stellungen kommen mit dieſem Vogel überein. Obiges iſt **Sonnerat's** Beſchreibung, aus der mir offenbar zu erhellen ſcheint, daß es der **Arabiſche Trappe**, und keine beſondere Art ſey *u*).

p) Ueberſ. IV. S. 63. B.
q) Seligmanns Vögel I. Taf. 23. B.
r) Maire Voy. p. 106. — Adanson seneg. engl. ed. p. 294.
s) Hist. des Ois. II. p. 54.
t) Jetzt folgt die Beſchreibung von Sonnerats Vogel, a. d. Suppl. S. 226. 227.
u) Herr. Rector Lichtenſtein gedenkt unter den Namen

4. Die weißöhrige Trappe. (White-eared B.)

(ſ. die ſiebenzigſte Kupfertafel.)

Otis Jafra. L. l. 2. p. 734. No. 4. *v*).
Knorrkock, Knorr Hen. Kolbe Cap. Vol. II. p. 139. pl. 7. f. 2. *w*).

Er hat die Größe eines großen Haushuhns, und iſt zwey und zwanzig Zoll lang. Sein Schnabel iſt gelb, und am Ende, wo er ſchwarz iſt, etwas gebogen; der Scheitel ſchwärzlichbraun, unregelmäßig mit weißen Linien geſtreift; an beyden Seiten deſſelben iſt eine weiße Linie, und an den Ohren ein großer, weißer Fleck; der übrige Kopf, nebſt der Stirn, dem Halſe und den untern Theilen des Körpers iſt ſchwarz; rund um den untern, hintern Theil des Halſes herum läuft ein weißes Band, das gleich einem Halskragen, an die Bruſt vorläuft, ſich aber vorne nicht ganz ſchließt; die obern Theile des Körpers, ein großer Theil der Flügel, und der Schwanz ſind dunkel ſchwärzlichbraun, mit unregelmäßigen, gelbrothen Streifen von verſchiedener Form durchzogen; der äußere Rand der Flügel und die Schwungfedern ſind ſchwarz; über dieſen iſt ein großer weißer Raum (bedolwhite), der faſt die ganze Länge der Flügel einnimmt; die Schwungfedern der zweyten Ordnung (secundaries) ſind länger als die der erſten (quills), hängen über dieſe herab und verſtecken ſie im ruhigen Zuſtande; der Schwanz beſteht aus vierzehn Federn, iſt fünf Zoll lang, und ein wenig abgerundet, alle ſeine Federn ſind denen des Rückens nicht unähnlich, ſpielen aber mehr ins Aſchfarbene, und ſind an den Enden am hellſten, auſſerdem ſind ſie alle, die zwey mittlern ausgenommen, mit zwey ſchwarzen Streifen durchzogen; der untere Theil der Federn, die an der Mitte der Schenkel herumſtehen, iſt weiß; die Füße ſind gelb; die Klauen ſchwarz.

Beym Weibchen ſind Kopf und Hals wie der Rücken, die Streifen aber zärter, und Bruſt und Bauch ſchwarz wie beym Männchen, der weiße Fleck an den Ohren aber, und der Ring am untern Theil des Halſes fehlen ihm.

Der weiße Fleck an den Ohren iſt ſo ſichtbar, daß er mit allem Recht den Vogel einen charakteriſtiſchen Namen giebt. Er kann für keinen Federbuſch gehalten werden, wie Büffon *x*) zu glauben ſcheint. Inzwiſchen nennt Linné die Farbe des Scheitels und der obern Theile aſchgrau, und erwähnt gar keiner Sprenkeln (moltlings), ob es ſchon hinlängliche Spuren giebt, um gewiß zu ſeyn, daß er den hier beſchriebenen Vogel meynt, und keinen andern.

Dieſe Vögel finden ſich auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung vor, und ein Paar derſelben beſitzt jetzt Sir Joſeph Banks. Das Männchen habe ich auch in der Sammlung

men Arabiſche Trappe in ſeinem Verzeichniſſe des Hamburg. Naturalienkabinets S. 36. Nr. 327. das Weibchen als eine Varietät von dieſem Vogel. Er ſagt: Es iſt ein großer Trappe vom Vorgebirge der guten Hofnung, der, die Ohren ausgenommen, welche wie bey dem großen Trappen faſt nackt ſind, genau mit der Beſchreibung des Arabiſchen Trappen übereintrifft. B.

v) Latham Ind. orn. II. p. 659 n. 5. B.

w) Ueberſ von Büffons Vögeln IV. S 66. B.

x) „Cette huppe est sans doute ce que Mr. „Linnaeus appelle les Oreilles.“ Hist. des ois. II. p. 55.

Der Weissöhrige Trappe.

BRITISH MUSEUM
ZOOD
NATURAL HISTORY

ung des Karl Boddam, Esqr. gesehen. Herr Masson hat sie in Menge auf seinen Botanischen Reisen in das Innere des Landes, ohngefähr siebenzehn Tagreisen von Cap, angetroffen *y*). In diesen Ländern sind sie unter dem Namen: Korhahn bekannt. Kolbe nennt sie Knorrhahn, und das Weibchen, Knorrhenne, und sagt, sie dienten den andern Vögeln als Schildwachen, denn so wie sie Jemanden entdecken, erheben sie ein lautes Geschrey, das dem Worte Erach ähnlich ist, das sie sehr geräuschvoll wiederholen, und wodurch der Jäger oft seinen Zweck verfehlt. Sie halten sich auf Hecken und an Plätzen auf, die von den Wohnungen entfernt sind, bauen ihr Nest ins Gebüsch, und legen nie mehr als zwey Eyer in einem Jahr. Ihr Fleisch hat einen angenehmen Geschmack, ist aber nicht so zart als das der meisten zahmen Vögel. Man schießt sie mehrentheils bloß deßwegen, weil sie durch das Geschrey, das sie machen, andere Vögel warnen, sich davon zu machen.

Brisson hält diesen Vogel für das Perlhuhn; in Kolbe's Beschreibung ist aber nichts, das diese Vermuthung bestätigen könnte, ausser der Abbildung, die weiß gefleckt zu seyn scheint *z*).

Dieser *a*) Vogel (der Knornhahn) versteht die Kunst, sich vollkommen zu verbergen, bis man ihm sehr nahe kommt, wo er dann plötzlich hoch und fast perpendikulär in die Höhe fliegt, mit einem scharfen, hurtigen, knirrenden (quavering) Geschrey, wie Karrh, karrh; und dieß ist ein Aufruf an alle Thiere in der ganzen Gegend herum *b*).

Unsere letzten Reisenden *c*) trafen einen Trappen an der Küste von Neuholland, in der Trappen Bucht (Bustard Bay), an, der sechzehn Pfunde wog; wir haben aber keine weitere Nachricht von ihm, als daß er ein schwarzes Band über die Brust hat. Auf das Ansehen unsers letzten Kapitains King, kann ich auch noch beyfügen, daß dieser große Flüge von einer großen Art Trappen auf den Ebenen bey Norten Sund, 64 ½ Grad nördlicher Breite, angetroffen hat. Die ganze Beschreibung, die ich von dieser Art bekommen konnte, ist diese, daß sie sehr scheu war, sehr schnell lief, und schon eine beträchtliche Strecke vorher, ehe sie aufflog, so daß ihr niemand zum Schuß beykommen konnte *d*).

5. Der Indische Trappe. (Indian B.)

Otis bengalensis. L. l. 2. p. 724. No. 5. *e*).

y) In Veenkeurde Valley „sind die Felder voll von Korhähnen, einer Art Trappe." Phil. Trans. Vol. LXVI. p. 317.

z) Kolbe's Beschreibung lautet so: „Dieser Vogel hat die Größe einer gemeinen Haushenne. Sein Schnabel ist kurz und schwarz; die Federn auf dem Scheitel sind schwarz; die übrigen ein Gemisch (motley) von Rothen, Weißen und Aschfarbenen; die Füße sind gelb, die Flügel für einen so großen Vogel sehr klein; daher er auch nicht weit auf einmal fliegen kann.

a) Zus. a. d. Suppl. S. 227.

b) Sparm. Voy. Vol. I. p. 153.

c) Dieser Zusatz sollte eigentlich oben unter Nr. 1. beym großen Trappen stehen, wo er besser hinpaßt. B.

d) Arct. Zool. (Uebers. II. S. 299. Nr. 102. B.)

e) Latham Ind. orn. II. p. 660. n. 6. B.

Le grand Pluvier de Bengale. Briss. orn. V. p. 82. No. 13.
Le Churge, ou l'Outarde moyenne des Indes. Buff. ois. II. p. 56 *f*).
Indian Bustard. Edw. pl. 250. *g*).

Seine Länge ist drey und zwanzig Zoll, und seine Höhe, wenn er aufrecht steht, zwanzig Zoll. Sein Schnabel ist zwey und drey Viertel Zoll lang, gegen das Ende ein wenig gebogen, und von weißlicher Farbe; die Augen sind sehr groß; der Augenstern nußbraun; die Augenlieder aschgrau; die Seiten des Kopfs, um die Augen herum braun; der übrige Kopf, der Hals und die untern Theile schwarz, und die Federn hängen loose herab; Rücken, Steiß und Schwanz lebhaft braun, die Mitte jeder Feder schwarz; ein brauner, schwarz gefleckter Streifen läuft rings um die Brust herum; der Schwanz ist braun, schwarz gestreift und gefleckt; die Deckfedern der Flügel weiß, und einige wenige von den äußern blaß schwarz geründet; die großen Schwungfedern an der Aussenseite weiß, und an der Spitze aschgrau; die kürzern weiß, mit schwarzen Flecken und mit schwarzen Bändern durchzogen, einige von denen zunächst am Körper stehenden grau, mit kleinen schwarzen Flecken bezeichnet; die Füße weißlich; die Klauen braun.

Er ist in Bengalen *b*) zu Hause, wo er Churza genannt wird, und scheint einigermaßen mit dem letzten verwandt zu seyn, oder ist vielleicht eine Spielart von ihm. Edward's hat ihn nach einer Abbildung copirt, und ich höre nicht, daß jemand den Vogel ganz besessen hätte.

Dieser *i*) Vogel, der in Indien Churza genannt wird, wiegt zwölf bis vierzehn Pfunde. Beym Männchen sind der Kopf, der Hals, die Brust und die untern Theile schwarz, letzte aber spielen ins Aschfarbne; der Rücken ist sehr schön röthlichbraun und schwarz gesprenkelt, wie bey unserm großen Trappen; die Deckfedern der Flügel sind weiß; die Schwungfedern schwarz; Füße und Schnabel hell aschfarben.

Das Weibchen gleicht unserm großen Trappen sehr. Die Hauptfarbe desselben ist hellaschfarben, mit dunklerm und schwärzlichen Gewölke und Wellen; Kopf, Hals und Bauch einfarbig.

Diese Vögel werden in Menge in verschiedenen Theilen Indiens angetroffen, wo man sie ißt und sehr schätzt *k*) — Es ist mir noch immer sehr wahrscheinlich, daß dieser und mein weißöhriger Trappe (Nr. 4.) einer und eben derselbe seyn, weil sie den weißen Flecken an den Ohren ausgenommen, sehr wenig von einander verschieden sind.

6. Der

f) Uebers. VI. S. 69. B.
g) Seligmanns Vögel VII. Taf. 40. B.
h) Vielleicht ist es der nämliche Vogel, den Adanson: Großauge (Large-Eyes) nennt. Er ist, wie er sagt, so groß, als eine Henne; der Kopf steht in keinen Verhältniß mit den Augen; er hat drey Zehen, wie ein Trappe, und wie dieser, ein graues, mit weiß meliertes, Gefieder; sein Fleisch ist zart und kann gegessen werden. Adans. Seneg. p. 77.
i) Nun folgt noch eine Beschreibung des nämlichen Vogels, aus dem Suppl. S. 228.
k) Herr Middleton.

6. Der Kragen-Trappe. (Ruffed B.)

Otis Houbara L. I. 2. p. 725. No. 6. *l*)
Le Houbara, ou petite Outarde huppée d'Afrique. Buff. ois. II. p. 59. *m*) — Shaw's Trav. p. 252. Die gegenüberſtehende Platte, fig. 1.

Er hat die Größe eines Kapauns, iſt aber länger. Sein Schnabel iſt beynahe anderthalb Zoll lang und glatt, wie beym Staaren; der Körper iſt von lichtbrauner oder gelblicher Farbe, über und über mit kleinen, braunen Flecken beſäet; die Halsfedern ſind weißlich, mit ſchwarzen Streifen, und ſehr lang, ſo daß ſie aufgehoben werden können, wie beym Hahn und beym Kragen-Waldhuhn (Ruff) *n*); die großen Flügeldecken ſchwarz, und jede nahe auf der Mitte mit einem weißen Fleck bezeichnet; nur drey Zehen. — So weit geht Schaw's Beſchreibung, welcher ſagt, er halte ſich in den Arabiſchen Wüſten auf, und lebe von Vegetabilien (shrubs) und Inſecten. Er wird oft von dem Habicht verfolgt, wo er dann viel Umwege und Liſt braucht, um ihn zu entkommen *o*).

7. Der Rhaad-Trappe. (Rhaad B.)

Otis Rhaad L. I. 2. p. 725. No. 7. *p*)
Le Rhead. Buff. ois. II. p. 61. *q*) — Shaw's Trav. p. 255. Die gegenüberſtehende Platte, fig. 2.

Von dieſem Vogel, ſagt Schaw, giebt es zwey Sorten; die eine hat die Größe des Houbara, oder der letzten Art: Schnabel und Füße ſind ſtark; der Kopf ſchwarz; am Hinterkopf hängt ein Federbuſch von dunkelbrauner Farbe; die obern Theile des Körpers und die Flügel ſind gelb, mit braunen Flecken; der Bauch iſt weiß; der Schwanz hellbraun, mit ſchwarzen Queerſtreifen.

Die kleinere Art hat nur die Größe eines gemeinen Haushuhns, und keinen Federbuſch am Hinterkopfe; Schnabel und Füße *r*) ſind ſtärker, als beym Rebhuhn; die Zeichnung ſo ziemlich wie beym erſten; beyde haben nur drey Zehen.

Sehr wahrſcheinlich ſind dieſe beyden Vögel bloß Geſchlechtsverſchiedenheiten, wo nicht gar nur Spielarten von einander. Beyde wohnen in Arabien, und ſind unter dem Namen: Rhaad *s*), oder Saf-ſaf bekannt. Sie freſſen Körner und leben in Heerden.

8. Der

l) Latham Ind. orn. II. p. 660. n. 8. B.
m) Ueberſ. IV. S. 73. B.
n) Auf der Platte ſcheint der Kopf mit einem Federbuſch verſehen zu ſeyn.
o) Die Arabiſchen Schriftſteller ſagen, daß er bey dieſer Gelegenheit ſeinen Unarth in die Habichts-Augen zu ſchleudern ſuche (Boctarti Hieroz. P. II.). Allein er läßt ihn gewiß eben ſo wie andere Vögel aus Furcht fallen. B.
p) Latham Ind. orn. II. p. 660. n. 9.
q) Ueberſ. IV. S. 76. B.
r) So glaube ich leſen zu müſſen, obſchon im Original: „back et legs" ſteht. Ueberſ.
s) Rhaad bedeutet Donner, und Schaw ſcheint der Meynung zu ſeyn, daß, weil dieſe Vögel, wenn ſie ſich von der Erde zum Flug

8. Der weißkinnige Trappe. (White-chinned B.)

Otis indica L. I. 2. p. 725 No. 8. *t*) — Miller's illustr. tab. 33.

Er hat die Größe des dickknieigen Trappen (Nr. 9.) *u*). Der Scheitel ist schwarz; die obern Theile des Körpers sind braun, mit schwarzen Wellenlinien; der Schwanz ist dunkelfarbig; die Augenkreise sind schwarz gesprenkelt; an jeder Seite des Kopfs ist ein schwarzer Streifen; das Kinn ist weiß; die übrigen untern Theile sind dunkelgelblich milchbläulich; die Seiten beynahe weiß; die Füße hell schmutzigbraun.

Er ist in Indien zu Hause.

9. Der dickknieige Trappe. (Thick-knee'd B.)

Charadrius Oedicnemus. L. l. 2. p. 686. No. 10. *v*) — Aussely. Voy. p. 258. No. 32.
Le grand Pluvier, appellé vulgairement Courly de Terre. Briss. orn. V p. 76. No. 12. pl. 7. — Pl. enlum. 919. Stone Curlew. Raii. Syn. p. 105. A. 6 108. A. 4. — Will. orn. p. 506. 393. pl. 58. 77. — Albin I. pl. 69.
Thick-kneed Bustard. Br. Zool. I. No. 100. — Arct. Zool. *w*) Br. Mus. Lev. Mus.

Seine Länge ist sechzehn bis achtzehn Zoll. Sein Schnabel ist beynahe zwey Zoll lang, an der Wurzel gelblich, und gegen das Ende hin schwärzlich; die Augen sind groß; Augenstern und Augenlieder hellgelb; der Kopf groß und rund; die Federn desselben, des Halses und die obern Theile des Körpers hell lohgelblichbraun, mit einem schwärzlichen Streifen längs dem Schaft herab; die untern Theile so ziemlich eben so, aber sehr blaß; Kinn, Bauch, Schenkel und Afrer ausgenommen, deren Federn hellgelblichweiß sind; über und unter den Augen ist ein blaßes Band *x*), und ein anderes an den Deckfedern der Flügel das mit dem Rande parallel läuft; die Schwungfedern sind schwarz; der Schwanz abgerundet, und besteht aus zwölf Federn *y*), wovon die sechs mittlern braun bandirt sind, die drey äußern an jeder Seite sind weiß, mit dunkelfarbigen Streifen, alle, die zwey mittlern ausgenommen, am Ende mehr oder weni-

erheben, ein großes Geräusch machen, sie daher den Namen bekommen haben. (Saf Saf aber zeigt im Arabischen jenes Geräusch an, welches die Vögel im vollen Fluge mit ihren Flügeln machen. B.)

t) Aus dem Kopfe zu schließen, der auf der Platte in natürlicher Größe vorgestellt ist.

u) Latham Ind. orn. II. p. 661. n. 10. B.

v) Otis Oedicnemus Latham Ind. orn. II. p. 661. n. 11. B.

w) Hier steht er nicht. — Man vergleiche aber meine N. G. Deutschlands III. S. 197. n. 1. Hier rechne ich ihn noch, wie die mehresten Schriftsteller, unter die Regenpfeifer. Es scheint aber wirklich, als wenn ihn Latham hier unter den Trappen eine schickliche Stelle angewiesen hätte. B.

x) Ich kann die nackte Stelle, die nach Brisson, Pennant und andern, unter den Augen seyn soll, nicht finden; denn in meinem Exemplar, und den andern, die ich gesehen habe, sind diese Theile sehr gut mit Federn bedeckt.

y) Hasselquist sagt: dreyzehn.

weniger mit Schwarz bezeichnet; die Füße gelb; die Knie sehr dick, als wenn sie geschwollen wären; die äußere Zehe mit der mittlern bis ans erste Gelenk verbunden; die Klauen schwarz.

Dieser Vogel ist in drey Welttheilen, **Europa**, **Afrika**, und **Asien**, gemein, ich glaube aber nicht weiter gegen Norden, als bis **England**, wo **Norfolk** [z]), **Hampshire** und **Lincolnshire** die Gegenden sind, in denen er am häufigsten vorkommt. In mäßiger Menge ist er auch in einigen Gegenden von **Kent**, wo er sich auf den Hügeln und erhabenen Plätzen zu beyden Seiten des ganzen Thals, zwischen **Dartfort** und **Farminghan**, und jenseits desselben, aufhält, besonders in leimigen und trockenen Gegenden [a]). Er baut kein Nest, sondern legt zwey bis drey aschgraulich weiße, zwey und einen Viertel Zoll lange Eyer, die schwärzlich olivenbraun gefleckt und gleichsam gekritzelt (scratched), und bey einigen Exemplaren mit undeutlichen, dunkeln Zeichen versehen sind; diese legt er auf die bloße Erde, oder höchstens in einer kleinen Vertiefung in derselben, oder unter dem Schutze eines oder ein Paar Steine, und sitzt dreyßig Tage darüber. Er scheint sie sehr spät im Jahre auszubrüten, weil mir Junge, die noch nicht im Stande waren zu fliegen, in der Mitte [b]) des Octobers gebracht worden sind; und in der That haben dieß auch andere Schriftsteller bemerkt. Die Jungen folgen der Mutter, sobald sie ausgekrochen sind, gleich jungen Hühnern, und sind lange Zeit von grauer Farbe, und pflaumartig, wie die jungen Eulen.

Sein Geschrey ist sonderbar, eine drey bis viermal wiederhohlte Art von rauhem Pfeifen, das man über eine Meile weit hören kann; nach meiner Meynung gleicht es sehr dem Knarren eines **Brunnenseiles** (Well handle), oder eines ungeschmierten **Mühlsteins**. Dieses Geschrey läßt er bloß des Abends und bey Nacht hören. **Büffon** vergleicht es mit **Tuerlui, Tuerlui**; und sagt, der Vogel sey gemein in verschiedenen Provinzen **Frankreichs**; und wenn er einerley Vogel mit dem **Kirvan** des **Hasselquists** ist, so bewohnt er auch **Arabien**. Die **Türken** und **Egyptier**, sagt er, halten ihn lebendig in einem Käfig, und zwar seines Geschreyes wegen, das sie gern hören. Er fügt auch noch bey, daß man ihn gleichfalls zur Vertilgung der **Mäuse** brauche, die in **Palästina** nur allzu gemein sind; er würde vielleicht das nämliche thun, wenn man diesen Gebrauch von ihm wüßte, so nährt er sich aber in hiesigen Gegenden vermuthlich von Würmern, Raupen, Kröten u. d. gl.

Ich habe ein Exemplar dieses Vogels gesehen, das vom **Vorgebirge der guten Hoffnung** gebracht worden ist, und das jetzt Sire **Jos. Banks** besitzt. Es war vollkommen das nämliche, aber größer, und zwanzig Zoll lang. Er wird auch als ein Bewohner von **Owhyhee** angeführt [c]).

10. Der

z) Daher er der **Regenpfeifer von Norfolk** (Norfolk Plover) genannt wird.

a) Salerne bemerkt, daß **armes Land**, in einigen Gegenden **Brachvogel-Land** (Curlew Land), genannt werde.

b) Am Ende desselben. Albin. — Auf der Insel Malta soll er des Jahrs zweymal brüten.

c) Ellis's Narrat. Vol. II. p. 143.

10. *) **Der geöhrte Trappe.** (Passarage B.)

Otis aurita. Latham Ind. orn. II. p. 660. n. 7.

Er hat die Größe des **kleinen Trappen** (Nr. 2.) und ist achtzehn Zoll lang. Sein Schnabel ist lang und dünn, von Farbe blau und weiß; Kopf, Hals, Brust und Bauch schwarz; an den Ohren ist ein großer weißer Fleck; die Vereinigung des Halses und Rückens weiß; der ganze Rücken, die Flügel und der Schwanz schwarz, mit einem netzartigen Gewebe von den zartesten schwarzen und braunen Linien, das die schwarzen Maschen (meshes) umgibt; die größern Deckfedern der Flügel sind weiß; am Hinterkopf sind vier Paar haarähnliche Federn, jedes Paar ist von verschiedener Länge, und erweitert sich an seinem Ende in einem lanzenförmigen Büschel; die längsten sind vier Zoll lang, die kürzesten fallen kaum ins Auge; die Füße sind stark, und hellgelb; die Zehen bis an ihren Ursprung getrennt.

Er ist in **Indien** zu Hause, und wird Passarage Plover genannt *). Die Aehnlichkeit der Zeichnung bey diesem und meinem **weißöhrigen Trappen** (Nr. 4.) ist bemerkenswerth, da eine Zeichnung beynahe beyde Vögel vorstellen kann; weil aber der zuletzt beschriebene viel kleiner ist, und ausserdem noch die haarähnlichen Federn an den Ohren hat, so scheint klar zu seyn, daß er eine verschiedene Art ausmache

Bey der Mstrß. **Wheeler** finde ich ein Exemplar von einem Vogel, das ich für das **Weibchen** des obigen halte. Es ist neunzehn Zoll lang, oder drüber, und sein Gefieder dem des **kleinen Trappen** nicht unähnlich, aber minder fein in der Zeichnung. Ich finde, daß man diesen Vogel in **Indien** unter dem Namen: **Dovail** kennt, und einige **Engländer** nennen ihn Flecher. Er wird sehr geschätzt, und daher stark aufgesucht; ob er aber gleich nicht selten ist, so werden doch sehr wenige gefangen, weil es sehr scheue Vögel sind. Das Fleisch an der Brust ist theils weiß, theils braun, und wird für einen großen Leckerbissen gehalten.

Zusätze.

11. Der Chilische Trappe.

Otis chilensis L. l. 2. p. 725. — Molin. Chil. p. 231. — Id. (ed. Gall.) 241. Latham Ind. orn. II. p. 658. n. 2.

An Größe übertrifft er noch den **großen Trappen** (Nr. 1.). Schnabel und Füße sind wie gewöhnlich; Kopf und Kehle sind glatt; der Körper weiß; Scheitel und Schwanz, so wie die Flügel sind aschgrau; die vordern Schwungfedern schwarz; der Schwanz braun und aus achtzehn Federn bestehend.

Er

*) A. d. Suppl. S. 228. 229. — *) Lady Impey.

Er bewohnt die Felder in Chili; lebt haufenweis und nährt ſich von Kräutern. Das Weibchen legt ſechs Eyer, die größer ſind als Gänſeeyer. Man kann dieſen Vogel leicht zähmen.

12. Der Caffersche Trappe.

Otis cafra. Lichtenſtein a. a. O. S. 26. Nr. 328. Meyers Zool. Annalen B. 1. S. 158.

Das Männchen iſt zwey Fuß drey und einen halben Zoll lang, und das Weibchen zwey Fuß einen Zoll. Der Schnabel iſt weiß mit braunen Rücken; der Oberleib roſtfarben, ſchwarz gewellt; der Unterleib weiß; der Nacken, die Schwungfedern und ein Queerſtrich beynahe am Ende des Schwanzes ſchwarz; die Füße grün. Das Männchen unterſcheidet ſich vom Weibchen durch einen grauen Scheitel, durch die ſchwarze Kehle und weiße Wangen; auch ſind die Ohren des Männchens mit ſchmalen weißen und die des Weibchens mit dergleichen braunen Federn gehaubt.

Sein Aufenthalt iſt das Casserland.

Er iſt keineswegs eine Varietät des Afrikaniſchen Trappen, wie mancher vielleicht vermuthen dürfte; denn er iſt viel größer, auch unterſcheidet ihn die Farbe der Federn an Schnabel und Füßen hinlänglich. B.

Sechste Ordnung. Laufvögel. a)

Sieben und funfzigste Gattung. Dudu.

Der Schnabel ist groß; in der Mitte der obern Kinnlade einwärts gebogen, mit zwey schiefen Runzeln versehen, und am Ende stark übergekrümmt. Die Naſenlöcher stehen schief nahe am Rande, in der Mitte des Schnabels. Die Füße sind kurz, dick, etwas bis unter die Kniee befiedert, und enthalten (meist) drey Zehen, stehen vorwärts, eine rückwärts b).

1. Der gemeine Dudu. (Hooded Dodo.)

(s. die ein und siebenzigste Kupfertafel.)

Didus ineptus Linn. Syst. Nat. ed. XIII. 1764. 8o. Tom. I. Pars. 2. p. 728. No. 1. c)

Le Dronde. Briss. orn Vol. V. p. 15. — Buff. ois. vol. I. p. 480. d) — Pont. Ind. Orient. pl. 11. p. 70.

Dod-eersen, or Valghvogel. Herbert Trav. p. 382. pl. ll. p. 383.

Dodo. Ray. Syn. p. 37. No. 3. — Will. orn. p. 153. pl. 27. — Edw. pl. 294. e)

Dieser ungeschickte Vogel ist etwas größer als ein Schwan, und nicht viel unter drey Fuß lang f). Sein Schnabel ist stark, groß und am Ende gebogen; die Oeffnung desselben reicht über die Augen hinaus; von Farbe ist er hellblau, das Ende der obern Kinnlade ausgenommen, das gelblich ist, und einen rothen Flecken auf der Krümmung derselben, das Ende der

a) Struthicus. Struthiones. L.

b) Das Gesicht ist bis über die Augen nackt; die Flügel taugen nicht zum fliegen. B.

c) Latham Index ornithologicus. ll. p. 662.

d) Uebers. von Büffons Vögeln durch Martin und Otto. B. III. S. 230.

e) Seligmanns Vögel. VIII. Taf. 84. Meine N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 456 B.

f) Ein Gemälde von ihm ist im Brittischen Museum zu sehen.

Der gemeine Dú dŭ

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

der untern ist schwärzlich; der Augenstern ist weiß; die Hauptfarbe des Gefieders aschgrau und wenig zuzuhlen; Bauch und Schenkel weißlich, der Kopf ist groß, und scheint gleichsam mit einen schwarzen Hut oder Mütze (cowl) bedeckt zu seyn; die Flügel sind sehr kurz und gelblichaschfarben; die Schwanzfedern gekräuselt, stehn aufrecht über dem Steiß, und spielen ins Gelbe, wie die Flügel; die Füße sind mit vier Zehen versehen, wovon drey vorwärts, und eine rückwärts stehen, sehr stark, kurz und gelblich; die Klauen schwarz.

Dieß ist Edwards's Beschreibung, und ein Gemälde des Vogels ist jetzt im Brittischen Museum.

Herbert scheint, nach der Nachricht, die er in seinen Reisen von ihm giebt, ihn gesehen zu haben obgleich seine Figur schlecht ist. Er sagt, "er wäge selten unter funfzig Pfund. „Sein Schnabel ist krumm und einwärts gebogen; die Oeffnung (thrill), oder die Nasenlöcher stehn in der Mitte, von wo an bis zum Ende die Farbe lichtgrün ist, mit hellgelb melirt; „die Augen sind rund und lebhaft; er hat zarte Dunen statt der Federn; der Schwanz (train) „(der einem Chinesischen Bart (China-beard) gleicht, besteht aus nicht mehr, als drey oder „vier kurzen Federn; der Kopf ist verschiedentlich bekleidet; die eine Hälfte nämlich mit Dunen „von dunkler Farbe, die andere Hälfte kahl, und von weißer Farbe, als wenn ein Schleyer darüber gezogen wäre; die Füße dick und schwarz; und die Klauen groß.„ Ferner erfahren wir von ihm, daß "sein Gang langsam, und sein Körper rund und fett ist; einige bedienen „sich seiner zur Speise, es ist aber angenehmer ihn zu sehen, als zu essen; sein Magen ist so „hitzig, daß er leicht Steine verdauen kann, und hierin, so wie in seinem Bau hat er keine „geringe Aehnlichkeit mit dem Strauß. „

Dieses tölpische Geschöpf ist auf der Insel Mauritius (oder Frankreich), und auf der Insel Bourbon [g]) im Indischen Meere zu Hause [h]).

4. Der Einsiedler-Dudu. (Solitary D.)

Didus solitarius. L. l. 2. p. 728. No. 2. [i])
Le Solitaire. Buff. ois. l. p. 485. k) — Leguat. Voy. I. p. 95. pl. ibid.

Dieß ist ein großer Vogel, und das Männchen soll zuweilen fünf und vierzig Pfund wiegen. Er hat einige Aehnlichkeit mit dem Truthahn, in Rücksicht des Schnabels und der Füße, doch ist der Schnabel stärker gebogen, und die Füße sind höher. Sein Hals ist von

g) Dieß können nicht die einzigen Länder seyn, wo sie sich aufhalten, und sie müssen erst anders woher dahin gebracht worden seyn, denn man sagt, daß die Portugiesen, die sie zuerst entdeckt haben, weder Landvögel, noch vierfüßige Thiere in diesen beyden Ländern antreffen. S. Hist. des Os. Vol. V. p. 280.

h) Merkwürdig ist noch, daß man in seinem Magen Steine, von der Größe einer Faust, gefunden haben will, die man für Bezoar ausgab, und daß er nach neuern Nachrichten gänzlich ausgerottet seyn soll. B.

i) Latham Ind. orn. II. p. 652. n. 2. B.

k) Uebers. B. III. S. 238. B.

verhältnißmäßiger Länge, und sein Auge schwarz und lebhaft: der Kopf hat keinen Federbusch, und die Hauptfarbe des Gefieders ist braun und grau gemischt; er hat fast gar keinen Schwanz, und die Afterflügel schwellen in einen runden Knopf auf; die Flügel sind zum fliegen zu kurz; der Hinterleib abgerundet, wie ein Pferdesteiß, und mit Federn bekleidet, die man Deckfedern nennen kann.

Die Weibchen sind bald mit braunen, bald mit lohgelben Federn bedeckt, und haben ein sehr schönes Aussehen. Dieses Geschlecht hat auch eine Art von Witwen-Binde (Widow-peak) über dem Schnabel, und die Federn an der Brust breiten sich in zwey weiße Büschel aus, die einigermaßen dem Busen einer Frau gleichen; die Schenkelfedern sind am Ende abgerundet wie Schalen; und überhaupt, der ganze Vogel hat nach Leguat, ein edles und schönes Aussehen.

Er bewohnt die Insel Rodigo, wo er nicht ungewöhnlich ist; doch trifft man ihn nicht in ganzen Flügen an, sondern selten mehr, als zwey beysammen. Er baut sein Nest in verborgene Orte aus Palmblättern, in der Dicke von anderthalb Fuß, und legt ein Ey, das größer ist als ein Gänseey darein. Das Männchen brütet auch wechselsweise, und läßt, so lange die Henne brütet, das sieben Wochen dauert, keinen Vogel bis auf zwey hundert Ellen sich dem Orte nähern. Das Junge braucht einige Monate, ehe es für sich selbst sorgen kann; während dieser Zeit sind die Alten sehr für dasselbe besorgt, und auch nachher noch sehr treu gegen einander, obschon sie sich gelegentlich auch mit andern ihrer Art vermischen. Man sagt, es fände sich beständig ein Stein in ihrem Kropfe, welches weiter nichts beweiset, als daß man ihn bey allen körnerfressenden Vögeln findet, und daß also dieser Vogel zu der nämlichen Ordnung gehört. Die jungen Vögel sind zwar furchtsam, aber doch dumm genug, um Jedermann an sich kommen zu lassen; wenn sie aber größer werden, so sind sie scheuer, und laßen sich nicht zähmen. Zwey derselben wurden in Bourbon eingeschifft, sie starben aber bald, weil sie alle Nahrung ausschlugen. Man jagt sie zur Winterszeit, nämlich vom September bis im März, wo sie fett sind. Die jungen Vögel werden für delikat gehalten.

3. Der Nazar-Dudu. (Nezarene Dudu.)

Didus Nazarenus. L. l. 2. p. 729. No. 3. *l*)
L'Oiseau de Nazareth, et l'Oiseau de Nausée. Buff. ois. l. p. 485 *m*) — Cauche Madagascar. p. 130.

Dieß ist ein großer Vogel, größer als ein Schwan. Sein Schnabel ist etwas abwärts gebogen, und groß; der ganze Körper ist statt der Federn, mit schwarzen Dunen bedeckt; die Flügel aber sind befiedert, und über dem Steiß stehn einige gekräuselte Federn, die statt des Schwanzes dienen; die Füße sind lang und schmutzig, an jedem derselben drey Zehen.

Man hat ihn auf der Insel Frankreich *n*) angetroffen, und obige Beschreibung ist von Fre-

l) Latham Ind. orn. II. p. 663. n. 3. B.
m) Uebers. Bd. III. S. 247. B.
n) Von der Insel Nazar hat er seinen gewöhnlichen, aber unrecht ausgedrückten Namen: Vogel von Nazareth. B.

Der schwarze Strauss.

ISH MUSEUM
RAL HISTORY

Frere Cauche, der noch beyfügt, das Weibchen lege nur ein Ey, das weiß, und ſo groß als ein Pfennigsbrod ſey, und bey demſelben fände man immer einen weißen Stein, ſo groß, wie ein Hühnerey; es baue ſein Neſt aus Blättern und dürren Kräutern, in den Wäldern auf den Boden, und in dem Kropf des jungen Vogels fände man ebenfalls einen grauen Stein.

Die drey zuletzt beſchriebnen Vögel ſcheinen viele Verwandtſchaft mit einander zu haben; vielleicht, daß ſich bey fernern Beobachtungen zeigt, daß ſie alle zu einer Art gehören, und nur im Alter oder Geſchlecht verſchieden ſind.

Acht und funfzigſte Gattung. Strauß.

Der Schnabel dieſer Gattung iſt gerade, eingedrückt, wie ein Entenſchnabel, und am Ende abgerundet.

Die Flügel ſind im Verhältniß zur Größe des Körpers klein und untauglich zum Fliegen.

Die Füße bis über die Knie kahl, und enthalten zwey Zehen, die beyde vorwärts ſtehn.

Dieſer, und der folgende Vogel, nebſt einen dritten, der, neuern Beobachtungen zu Folge, aus einer gänzlich verſchiedenen Familie iſt, ſind von Linne' unter eine Gattung gebracht worden. Ich habe es, der ſehr unähnlichen Charaktere wegen, für ſchicklicher gehalten, ſie wieder zu trennen, wie es ſchon vorher Briſſon in ſeiner Ornithologie gethan hat.

1. Der ſchwarze Strauß. (Black Ostrich.)

Struthio Camelus L. 1. 2. p. 726. No. 1. — *a*)
Scop. ann. 1. No 160. *b*)
L'Autruche. Briss. orn. V. p. 3. pl. 1. f. 1. — Buff. ois. I. p. 398. pl. 29. — *c*)
Pl. enlum. 457. (das Weibchen.)
Ostrich. Raii. Syn. p. 36. No. 1. — Will. orn. p. 149. pl. 15. — Albin III. pl. 53. — Geatl. Magaz. XVIII. pl. II. p. 580.
Black Ostrich. Bronw's illust. pl. 16. (Das Männchen).
Lev. Mus.

(ſ. die zwey und ſiebenzigſte Kupfertafel.)

Dieß iſt ohne Zweifel der größte Vogel, den die Schöpfung aufzuweiſen hat. Er hat faſt acht Fuß Länge, und wenn er aufrecht ſteht, ſechs bis acht Fuß Höhe *d*). Der Kopf iſt klein, einen

a) Latham Ind. orn. II. p. 663.
b) Ueberſ. von Günther. S. 128. B.
c) Ueberſ. B III. S. 124.
d) S. ferner Zorns Pethinothologie II. S. 490. Meyers Illum. Thiere. Taf. 60. 61. Meine N. G. des In- und Auslandes I. 1. S. 448. B.
e) Im Jahre 1750 wurden in London zwey Strauſe

einem Gänsekopf nicht unähnlich; auch sein Schnabel ähnelt dem Gänseschnabel etwas, ist aber weniger eingedrückt, fünfthalb Zoll lang, und hornfarbig mit einer dunkelbraunen Spitze; der Augenstern nußbraun; die Augenlieder sind mit Haaren besetzt; der Kopf und der größte Theil des Halses sind unbefiedert, fleischfarbig und nur hie und da mit einigen wenigen zerstreuten Haaren besetzt; die untern Theile des Halses und des Körpers sind mit Federn bedeckt, die ausserordentlich locker in ihren Fahnen, und den Federn andrer Vögel ganz unähnlich sind; die Schwungfedern und die Schwanzfedern sind vollkommen schneeweiß, hier und da einige mit schwarzem Saum oder Spitzen, lang und von schönem wellenförmigen Bau; an jedem Flügel sind zwey Sporen, die ohngefähr einen Zoll lang sind; und an der Brust ist eine schwielige, kahle und harte Stelle, die dem Vogel zum Ruhepunkt dient, wenn er sich vorwärts beugt, um sich auf die Erde zu setzen; die Schenkel und die Seiten des Körpers sind kahl; die Füße stark graulichbraun, und nur mit zwey Zehen versehen, wovon die äußere sehr kurz und ohne Klaue ist.

Das Weibchen geht darin vom Männchen ab, daß bey ihm die Federn da braun sind, wo sie bey jenem schwarz sind *f*).

Dieser Vogel ist in Afrika und den daran gränzenden Theilen von Asien zu Hause, so wie auf verschiedenen benachbarten Inseln, und in sehr großer Menge in der Gegend des Vorgebirgs der guten Hoffnung. Sein Ey entspricht der Größe des Vogels, denn es ist so groß, wie ein Kinderkopf, und weiß von Farbe *g*). Man glaubt, daß das Weibchen ihrer funfzig, oder mehr, des Jahrs lege; die sie dann in den Sand verscharren, und bloß der Sonnenhitze zum Ausbrüten überlassen soll, die Jungen liefen dann, sobald sie ausgebrütet wären, davon. Dieß läugnen aber andere und Kolbe sagt: Männchen und Weibchen säßen wechselsweise über den Eyern; er habe sie ihre Eyer wohl hundertmal ausbrüten gesehen, sie auch oft aufgetrieben, und die Eyer weggenommen, um sich selbst und seinen Freunden damit eine Mahlzeit zu bereiten, (einige waren beynahe zum Ausschliefen); ein solches Ey giebt eine Mahlzeit für drey oder vier Personen, und sie schmecken sehr gut. Die Jungen, sagt er, können nicht gleich laufen, sondern werden von den Alten mit Gras und Wasser versehen, und, bis sie selbst für sich sorgen können, so wüthend von ihnen vertheidigt, daß es gefährlich ist, ihnen um diese Zeit nahe zu kommen. Wenn die Eyer berührt worden sind, so verlassen sie die Alten *h*).

Dieser Vogel hat zu seiner Größe auch eine verhältnißmäßige Stärke; denn man hat Beyspiele, daß einer zwey Männer auf seinen Rücken getragen hat, und mit der größten Leichtigkeit mit ihnen davon gelaufen ist *i*).

Die

Strauße gezeigt; das Männchen war zehn Fuß hoch und wog 300 und ein Viertel Pfund. Gentl. Magaz. Vol. XX. p. 536.

f) Büffon sagt aber, die Herrn Akademisten hätten acht Straußen, fünf Männchen und drey Weibchen zergliedert, aber keinen merklichen Unterschied in der Farbe gefunden. B.

g) Eine Abbildung s. in Klein Ov. pl. 1.

h) Büffon giebt zwar zu, daß der Strauß seine Eyer fast gar nicht aus dem Gesichte lasse, allein nur in den mehr nördlich gelegenen Ländern brauche das Weibchen über ihnen zu sitzen, in der heißen Zone wäre die Sonne allein hinlänglich, sie auszubrüten. Dieß heißt nur die positive Behauptung Kolbe's, daß der Strauß seine Eyer selbst ausbrütete, mit der Meynung anderer, die das Gegentheil behaupten, vereinbaren.

i) Adanson. Er hält ihren Lauf für geschwinder, als

Die Nahrung des Straußes sind Pflanzenstoffe, Gras, Früchte, Getreide u. s. w., außerdem hat man noch bemerkt, daß er verschiedene fremde Dinge verschluckt, als Stückchen von Eisen, Kupfer, Glas, Bley u. d. gl., ob er aber gleich dieß oft ohne Schaden thut [k]), hat man doch auch bemerkt, daß es ihm endlich übel bekommen ist [l]), denn er kann sie keineswegs verdauen. Einige Schriftsteller sagen, die jungen Vögel wären sehr gut zu essen.

Die Eingebohrnen fangen sie, indem sie dieselben zwey bis drey Tagen verfolgen, wo dann die Vögel durch die beständige Strapaze abgemattet, und weil sie keine Zeit haben um Futter zu sich zu nehmen, sehr leicht eingeholt, und mit Knitteln todgeschlagen werden; andere stecken sich in eine Haut von diesen Vögeln, und auf diese Art können sie ihnen nahe genug kommen, um sie zu überfallen; auch ist es nicht ungewöhnlich sie zu Pferde, mit Hunden zu jagen, wo dann, wenn man sie eingeholt hat, der Jäger nahe genug kömmt, um das gekrümmte Ende eines Stabs um ihre Beine zu werfen, womit man sie weiter zieht, und alsdann todschlägt oder lebendig fängt [m]).

Der Nutzen, den der Straus giebt, ist mannigfaltig. Die **Häute** sind sehr dick, und werden von den **Arabern** statt des **Leders** gebraucht. Von den Federn, dem Werthe und der Anwendung derselben, brauche ich nichts zu erwähnen. Das **Fett** [n]) wird von den **Arabern** zu medicinischem Gebrauche verwendet, nämlich gegen die Gicht und das Gliederreißen, und wird auch innerlich verschrieben. Die **Eyer** werden zu Trinkgeschirren und anderm Hausrath gebraucht, und oft zu diesem Zwecke in Gold gefaßt. Sie sind sehr hart und dauerhaft, und kommen dem Ansehen nach dem schönsten Elfenbein gleich. In **Ostindien** werden auch die Eyerschaalen, sowohl vom Strauß als Casuar, als Arzney gebraucht [o]).

Herr **Sparrmann** [p]) ist der Meynung, daß Männchen und Weibchen vom Strauß wechselsweise über den Eyern sitzen, da er auf einer seiner Reisen im Monat December ein **Männchen** vom Neste aufscheuchte. Es war auf dem bloßen Sand gemacht, und es lagen in demselben eilf Eyer zerstreut und ohne alle Ordnung. In einem andern Neste fand er funfzehn, und er glaubt nicht ohne Grund, daß die gewöhnliche Zahl sechzehn bis zwanzig sey.

Das

als den des schnellsten Pferdes. Voy. to Seneg. p. 87. — „Als ich da (zu Bintain) war, sah ich einen Strauß, auf dessen Rücken ein Mann ritt, der nach dem Fort reisete, denn es war ein Geschenk für den Gouverneur." Moore's Trav. into African. p. 318.

k) Er frißt sie auch wohl bloß, um die Verdauung zu befördern, wie die hühnerartigen Vögel, auch selbst die Sumpf- und Wasservögel, kleine Steinchen verschlucken. Freylich lesen die Haushühner bey Jägern auch zuweilen statt Quarzkörnchen bleyerne Hagelkörnchen auf und müssen alsdann diesen Vorwitz oder Irrthum mit dem Leben bezahlen; denn das Bley frißt die Magenhaut durch. B.

l) Pittield's Mem. p. 226.

m) Ich erinnere mich, ein Gemälde gesehen zu haben, daß diese Methode sehr genau darstellte.

n) Sie haben eine Art, den todten Körper des Straußes in Bewegung zu setzen; so, daß das Fett in eine Art von Oel aufgelöst wird, das sie dann als Arzeney verkaufen, und Straußenfett nennen. Pococke Trav. I. p. 209. Thevenot in seinen Reisen sagt das nämliche.

o) S. Faun. Arab. Mater. med. No. 6.

p) Zus. aus dem Suppl. S. 230. — Sparrm. Voy. I. p. 121. 122.

Das gewöhnliche Gewicht der Schaale ist eilf Unzen; ihre Tiefe siebenthalb Zoll; sie hält fünf und ein Viertel Pinte Flüssigkeit, und das Gewicht des frischen Eyes beträgt nicht viel mehr.

Die Hottentotten essen das Fleisch dieser Vögel, und die Colonisten am Cap bedienen sich der Eyer in Pfannkuchen (pankakes). Die zahmen Strauße am Cap haben Stärke genug, um mit einen Mann auf dem Rücken davon zu laufen, ohne daß dieses Gewicht sie zu hintern scheint. Im zahmen Zustande werden sie leicht boshaft und tödten oft das Hühnervieh, indem sie es unter ihre Füße treten. Sparrmann erzählt von einem, den man deswegen tödten mußte, weil er auf die nämliche Art Schaafe zu Tode getreten hatte.

Neun und funfzigste Gattung. Casuar.

Diese Gattung hat einen geraden, eingedrückten, am Ende zugespitzten, Schnabel. (Auf dem Scheitel des Kopfs steht ein aufrechtes Horn oder Helm, und in der Mitte des Halses zwey lappenförmige, herabhängende Fleischzapfen). Die Nasenlöcher sind eyrund. Die Flügel sind sehr klein, haben keine Federn, und sind zum Fliegen ungeschickt. Die Schenkel sind bis über die Knie unbefiedert. Die Füße haben drey Zehen, die alle vorwärts stehen. Der Schwanz fehlt.

1. Der gehelmte Casuar. (Galeated Cassawary.)

(s. die drey und siebenzigste Kupfertafel.)

Struthio Casuarius L. I. 2. p. 726. No. 2. — *q*) Frisch tab. 105.
Le Casoar. Briss. orn. V. p. 10. pl. 1. f. 2. — Buff. ois. 1. p. 464. — *r*) Pl. enlum. 313.
Emeu, Eme, or Cassowary. Raii Syn. p. 39. — Will. orn. p. 151. pl. 25. — Albin II. pl. 60. — F. F. Muller Zool. pl. 14. — Gentl. Magaz. XLIII. pl. III. p. 472. *s*)

Dieß ist ein großer Vogel, der dem Strauß an Größe nicht viel nachgiebt, ob er gleich, da er einen viel kürzern Hals hat, nicht so hoch ist; seine Länge ist ohngefähr vier Fuß, vom Schnabel aber bis zum Ende der Klauen sechsthalb Fuß. Der Schnabel ist fünfthalb Zoll lang, graubraun, am Ende ein wenig eingekerbt, und die Oeffnung desselben sehr weit; der Augenstern hat die Farbe des Topas; die Augenlieder sind mit Haaren besetzt; die Nasenlöcher länglich, und stehen am Ende des Schnabels; die Ohren groß und offen; auf dem Scheitel

q) Casuarius Emen. Latham Ind. orn. II. p. 664 n. 1. B.
r) Uebers. Bd. III. S. 209. B.
s) Meine N. G. des In- und Auslandes. I. 1. S. 451. B.

Der gehelmte Caſuar.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

tel steht eine Art von Helm, der an der Wurzel des Schnabels beginnt, und bis in die Mitte des Scheitels reicht, er ist drey Zoll hoch, und an der Wurzel einen Zoll breit, wird aber stufenweise schmäler; so daß der oberste Theil nicht über ein Viertel Zoll dick ist, die Farbe ist an der hintern Seite gelblich, vorne aber schwärzlich; die Seiten des Kopfs sind kahl, und wie der Hals bloß mit einer runzlichen, röthlichen Haut bedeckt, die sparsam mit Haaren besetzt, und blau und purpurroth gefärbt ist; am untern Theil, zu beyden Seiten vorwärts, stehen zwey fleischige Häute, anderthalb Zoll lang und drey Viertel Zoll breit, theils roth, theils blau, und nehmen ihren Ursprung ohngefähr in der Mitte des Halses, wo sie sehr schmal (slender) sind; an der Brust ist eine schwielige kahle Stelle, worauf der Körper des Vogels ruht, wenn er auf der Erde sitzt; der Körper überhaupt ist mit bräunlich schwarzen Federn, von lokkern Fahnen, bedeckt, deren mehrentheils zwey aus einem Schafte entspringen; am Steiß sind die Federn wenigstens vierzehn Zoll lang und hängen statt eines Schwanzes herab, denn der Vogel hat keinen Schwanz; die Flügel, oder was ihre Stelle vertritt, haben keine Federn, sondern bloß fünf kahle Schäfte, gleich den Stacheln (quills) des Stachelschweins; die längsten sind zehn oder eilf Zoll lang, und von dunkler Farbe; am Ende des letzten Gelenkes ist eine Art von Klaue; die Fußzehen stehen alle drey vorwärts, und jede ist mit einer Klaue versehen, die fast ganz gerad und spitzig ist, die innerste ist die längste; die Farbe der Füße und der Zehen ist graulichbraun, und die der Klauen schwarz.

Diese Art ist in den östlichen Theilen von Asien, gegen Süden, zu Hause. Man findet sie auf den Molukken, auf Banda, Java, Sumatra, und den unter gleicher Breite gelegenen Ländern, nirgends aber in Menge und auch nicht über die Gränzen der heißen Zone hinaus. Sie kann nicht fliegen, aber sehr schnell laufen. Ihr Ey ist kleiner und länger, als das Straußeney, grünlich grau, ins Aschfarbne spielend, und mit erhabenen r), kleinen dunkelgrünen Flecken bezeichnet. Im wilden Zustande ist der Vogel sehr grimmig, grunzt wie ein Schwein, und stampft mit den Füßen, wie ein Pferd.

Sein Futter nimmt er, im Zustande der Natur, ohne Zweifel aus dem Pflanzenreiche; denn in der Gefangenschaft frißt er Brod, Aepfel u. d. gl. das er alles ganz verschlingt, und nicht erst mit dem Schnabel zermalmt; er soll auch Steine, Eisen, und, ohne Unterschied alles was man ihm darreicht, verschlucken, wie der Strauß.

r) Linné nennt die Flecken gezähnelt; ova punctis excavatis. Eine Abbildung des Eyes s. in Klein. Ov. pl. 2.

Zusatz.

2. Der Neuholländische Kasuar.

Casuarius novae Hollandiae. Latham Ind. II. p. 665. n. 2.
New Holland Cassowary Phillip. Bot. Bay. t. p. 271.
— — — White South. Wales. t. p. 129. t. p. 290.
Meyers Zoologische Entdeckungen. B. I. S. 60.

Er übertrifft den vorhergehenden an Größe und ist sieben Fuß und zwey Zoll lang. Der Schnabel ist schwarz; der Scheitel eben; Kopf, Hals und ganzer Körper mit borstenförmigen dunkelbraun und grau gefleckten Federn bedeckt; am Bauche fällt die Farbe etwas ins weißliche; Kopf und Hals sind also befiedert; die Gurgel nur etwas nackt und himmelbläulich; die Federn am Körper an der Spitze ein wenig eingekrümmt; die Flügel so kurz, daß sie kaum sichtbar sind; die Füße dunkelbraun, hinten der ganzen Länge nach abstehend, sägenartig gezähnt.

Sein Vaterland sind verschiedenen Gegenden von Neuholland, besonders ist er in Botany-Bay und Port Jackson häufig.

Der häutige Fortsatz des Oberschnabels fehlt also bey diesem Vogel gänzlich, so wie der Schwanz.

White fand bey der Zergliederung, daß dieser Casuar keinen Kropf hatte. Die Leber war nicht größer als bey einer Schwarzdrossel. An dieser war eine große gut gefüllte Gallenblase befindlich. Im Magen fand man sechs bis sieben Pfund, Gras, Blumen, wenige Beeren und Saamen. Der Darmkanal war wenigstens sechs Ellen lang, und reichte regelmäßig cylindrisch vom Magen bis zum After. Herz und Lunge waren durch ein Mittelfell getrennt, und standen mit der Größe des Vogels im richtigen Verhältniß. Das Fleisch schmeckt gut, fast wie junges Rindfleisch.

Dieser Vogel läuft schneller als ein Windhund, und ist sehr scheu. B.

Die*) Gattung. Tuju**)

Der Schnabel ist gerade, eingedrückt, an der Spitze etwas abgerundet. Die Flügel sind nicht zum Fliegen gemacht; die Schienbeine sind am untern Theil von Federn enveloppt; die Füße haben vorn drey Zehen und hinten nur eine abgerundete Schwiele.

1. Der Amerikanische Tuju.

Rhea americana Latham Ind. orn. II. p. 665. n. 1.
Struthio Rhea L. l. 2. p. 266. n. 3. — Molin. Chil. p. 252.
Rhea Briss. V. p. 8. Id. 8vo II. p. 211.

Struth-

*) Rhea Latham Ind. orn. II. p. 665. B.

Struthio - camelus americanus, Nhandu - guacu Rai. Syn. p. 36. 2. — Will. p. 105.
Struthio nothus. Klein. Av. t. 56.
Struthio Emeu, Ens. Nieremb. p. 117. t. p. 118? — Johnst. Av. t. 56.
Le Touyouyou, Bajon Cay. II. p. 263.
Le Toyou Buff. p. 452. (Uebers. B. III. S. 195.)
L'Antruche, Ferm. Surin. 142.
American Ostrich, Will. (Angl.) p. 150. — Clavig hist. Mex. II. p. 290. 293. — Falk. Patag. p. 52. 53. und sonsten. — Wallis Voy. p. 373. Dam. Voy. III. p. 1. p. 76.
Amerikanischer Jabiru. Latham Synopsis. s. unten.

Herr Latham führt ihn in der allgemeinen Uebersicht seiner Vögel unter den Amerikanischen Jabiru an, im Ind. orn. aber stellt er ihn unter einer eignen Gattung noch unter den Hausvögeln auf.

Man hält ihn für den größten Vogel von Amerika, ob er gleich nicht völlig die Größe eines Straußes hat. Ein alter erreicht die Höhe eines Menschen, also sechs Fuß, und die Flügel klaftern acht Fuß. Er hat einen eben so langen Hals, einen eben so kleinen Kopf und eben so platten Schnabel, als der Strauß, doch sieht letzterer mehr einem Gänseschnabel ähnlich; in den übrigen Stücken scheint er mehr mit dem Casuar überein zu kommen; wegen dieser Verschiedenheit von Aehnlichkeit hat man ihn auch den Straußcasuar und Straußbastard geheißen; die Augen sind schwarz; die Augenbraunen mit Haaren versehen; der Kopf rundlich und mit Federn bedeckt; der Hals zwey Fuß, acht Zoll lang; die Flügelfedern bestehen nur aus zerschlissenen kleinen Federn, die ihn zum Flug ungeschickt machen; die Flügel- und Rükkenfarbe ist dunkelgrau; der übrige Körper ist weiß; die Steißfedern sind lang, beugen sich über den Rücken hin, und bedecken den After; weiter wird man auch keine Schwanzfedern gewahr.

Dieser Vogel wohnt in verschiedenen Gegenden von Südamerika, vorzüglich um den See Nahuelguapi.

Nach Büffon ist er in Guiana am gemeinsten, in den Hauptmannschaften Seragippe und Rio-grande, in den innern Provinzen von Brasilien, in Chili, in den großen Wäldern auf der Nordseite des Platastusses, in den unermeßlichen Sandstrichen, welche sich von diesem Flusse südwärts verbreiten und in ganz Magellan bis zum Hafen Dasire', und sogar bis an die Küste der Magellanischen Meerenge.

Man sagt er lege vierzig bis sechzig Eyer, und schreye den Jungen durch ein gewisses Zeichen zu. Seine Nahrung sind Früchte, Fleisch und Fliegen.

Er variirt zuweilen, so daß man Exemplare findet, die am ganzen Körper weiß, und wieder andere, die ganz schwarz sind.

Zusätze

Zusätze zum zweyten Bande der allgemeinen Uebersicht der Vögel.

Die *) Gattung.

Pflanzenmäher. Phytotoma.

Der Schnabel ist kegelförmig, grade, und sägenartig gezähnelt; die Nasenlöcher sind eyrund; die Zunge kurz und stumpf; die Füße sind vierzehig.

Diese Gattung steht im Systemzwischen der Finken- und Fliegenfänger-Gattung, und macht in Lathams Ind. orn. Genus XXXIX aus. Man kennt bis jetzt nur eine Art.

1. Der seltene Pflanzenmäher.

Phytotoma rara Mol. hist. nat. Chil. p. 226. — Jd. (ed. Gall.) p. 234. — Gmel. Syst. Lin. I. 2. p. 928. — Meine N. G. des In- und Auslandes I 1. S. 511.

Er hat fast die Größe einer gemeinen Wachtel; der Schnabel ist über einen halben Zoll lang, etwas dick, an der Spitze fast pfriemenförmig zugespitzt, an den Seiten wie eine Säge gezähnt; die Zunge ist sehr kurz und stumpf; der Augenstern dunkelbraun; der Leib oben dunkelaschgrau, unten heller; der Schwanz mittelmäßig lang und abgerundet; die vordern Schwungfedern und die Schwanzfedern mit schwarzen Punkten bestreut; die Hinterzehe viel kürzer als die vordern.

Dieser Vogel wohnt in Chili. Er hat eine rauhe Stimme, welche sich unterbrechen durch Ra, ra ausdrückt. Seine Nahrung sind frische Kräuter, deren Stängel er von der Wurzel weg mit seinem Schnabel, wie mit einer Säge abschneidet, daher er in den Gärten sehr schädlich ist, und von den Einwohnern daselbst verwünscht wird. Er nistet in schattigen, einsamen Gegenden auf die höchsten und ästigsten Bäume und legt weiße, rothgefleckte Eyer.

---

176. a) Der graubrüstige Sänger.

Motacilla griseothorax.
Maus Beyträge zur Naturgeschichte des Mainzer Landes zweyter Heft. S. 192.

„Die Länge dieses Vogels ist sechs Zoll; der Schnabel ist schwarz; die Stirn graubraun; Hals, Gurgel und Brust sind grau; der After weiß; die Weichen gelb und braun gefleckt; der Rücken rosifarben, dunkelbraun gestreift; die Füße gelb.

Das

a) Zusatz zu S. 516. oben.

Das Weibchen ist etwas weniger bläßer an der Brust, als das Männchen; übrigens an Größe und allem Uebrigen völlig gleich."

Ich finde in dieser kurzen Beschreibung keinen neuen Vogel, sondern die **Braunelle** Motacilla modularis Lin. s. oben S. 420. s. auch meine N. G. Deutschlands IV. S. 576 Note**), gleich nach dem ersten Mausern. Alles trifft Wort von Wort überein, nur daß die graue Farbe des Unterleibes bis zur Brust nicht genau genug angegeben ist.

177. Die weißstirnige Grasmücke.

Motacilla albifrons mihi.
Meine N. G. Deutschlands IV. S. 583. Nr. 11.

Diese Grasmücke ist von der Größe der schwarzköpfigen, fünf und einen halben Zoll lang. Der Schnabel ist oben hornbraun, unten bläulichweiß; der Augenstern dunkelkastanienbraun; der Vorderkopf bis hinter die Augen weiß; der übrige Oberleib aschfarbengrau, gegen das Licht gehalten etwas ins Grüne schillernd; der Unterleib hellgrau, welche Farbe an den Seiten der Brust am dunkelsten, am Steiß aber am hellsten ist; Schwung- und Schwanzfedern sind dunkelbraun mit der Farbe des Oberleibes geründet, doch so, daß die vordern Schwungfedern und die vier äußern Schwanzfedern nur undeutlich aschgraulichweiß geründet sind, dahingegen die übrigen Federn eine breitere Einfassung haben.

Das Weibchen (was man wenigstens dafür hält) ist nur am Kopf bis zu den Augen weiß, übrigens oben und unten hellgrauer.

Dieser Vogel, der sich gern in Dickigen von lebendigen Holz und immer verborgen aufhält, gehört unter die Seltenheiten. Ich hielt ihn sonst für eine Varietät der **schwarzköpfigen Grasmücke**; allein ich bin doch seit der Zeit vom Gegentheil überzeugt, und sehe ihn wirklich als eine verschiedene Species an. Er wird im Herbst in Sprenkeln und im Frühjahr wie die Nachtigall gefangen, ist aber weit scheuer und vorsichtiger. Singen habe ich noch keinen gehört, allein die Vogelsteller sagen, daß er nach der Nachtigall unter den Grasmückenarten der beste Singvogel wäre, und gerathen in Entzücken, wenn sie von ihm sprechen.

177. Der große Carolinische Sänger.

Motacilla Caroliniana.
The great Wren of Carolina. Bertram travels throuh North and Sonth Carolina. Philadelphia 1791. 8vo p. 291.

Der Obertheil des Körpers ist sehr dunkelbraun; die Kehle und Brust blaß ziegelfarben. Er bewohnt Carolina. B.

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY

Druckfehler.

Seite 407. Zeile 2. st. schwarzgesäunte l. schwarzgesäumte
S. — 412. Z. — 8. st Madagaskarischer Sänger l. Madagaskarische Nachtigall.
S. — 466. Z. — 11. st. gefleckter Weißschwanz l. gefleckter Steinschmätzer.
S. — 513. Z. — 1. st. Sumanischer l. Sunamisischer.
— — Z. — 11. st. Sunamsische l. Sunamisische.
S. — 515. Z. — 11. st. 54. l. 52.